

b. 조사 당시 월경의 주기가 규칙적인 학생이 48.6 % (615명)이고, 불규칙적인 학생이 51.4 % (670명)이다. 규칙적인 학생 615명 중 23일 형이 46.8 %로 가장 많고 30일 형이 40.6 %로 차위이며 기타의 형은 12.6 %이고 평균주기는 28.9일이다.

3. 월경지속일수

월경 지속일수는 4일간 지속이 30.8 %로 가장 많고 다음은 5일간 지속이 29.5 %, 3 일간이 15.3 %이다. 또한 1일간이 가장 짧으며 9일간이 가장 길고 평균지속일은 4.69 일이다.

4. 월경시의 자각증상

월경시의 자각증상 유무에 있어서 자각증상이 없다고 한 학생이 10.3 %이며 증상이 있다는 학생이 89.7 %로 대부분이었다. 자각증상 중 복통이 29.9 %로 가장 많고 다음은 신경증상 19.0 %, 요통 15.1 % 등의 순이며 고통이 심해서 휴양이 필요하다고 한 학생이 13.8 %로 나타났다.

5. 최초 월경시 처리방법

“미리 알고 있는데로 처리했다”가 36 %, “알지 못해서 찔찔했다”가 20 %, “곧 누구에게 물어봤다”가 43.0 % 등으로 각각 나타나고 있다.

일부도시 국민학교 취학아동의 보건생활에 관한 실태조사 연구

구 외 행

결 론

광주지방에 거주하는 여학생 1,642명을 대상으로 초경연령, 월경의 유무, 지역별 초경연령의 비교, 월별 초경 발생을 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 광주지방에 거주하는 여학생의 초경연령은 10—17세이며, 평균 연령이 14.03±1.85세였다.

2. 현 연령별 초경 발생 연령 및 백분율은 현재 15세에서는 13세에 초경이 있은 사람이 58.67 % 되었으나 20세에서는 21.54로 점차 초경이 빨라지고 있었다.

3. 현 연령별 월경 유무의 조사결과 15세의 여학생 중 54.54 % 가 월경이 없었으나 18세에서는 1명, 19세 이상은 모두 월경이 있었다.

4. 지역별 초경연령의 차이는 도시가 13.85세 지방이 14.27세로 도시에서 자란 사람이 약간 빨랐다.

5. 월별 초경 발생은 8월이 가장 많았고 다음이 12월, 1월의 순위였다.