

두통 829명(26.35%), 비출혈 150명(4.76%), 안과질환 10명(0.31%), 귀질환 3명(0.09%) 순서이고, 여학생은 보통 884명(37.20%), 두통 739명(31.10%), 외상 710명(29.88%), 비출혈 31명(1.30%), 안과질환 9명(0.37%), 귀질환 3명(0.12%) 순서이었다.

사춘기 청소년의 우울증에 관한 연구

대한 간호학회지 제7권 제2호, 1977.

오 경 옥

결 론

1976년 4월 26일부터 1976년 7월 4일까지 10세에서 18세에 이르는 청소년을 정상대조군 437명, 고아군 416명, 지체부자유아군 133군, 농아아군 109명을 연구대상으로 Zung의 The Self-rating Depression Scale을 적용하여 실시하였다.

각 대상을 10~14세군을 사춘기전기, 15~18세군을 사춘기 후기로 2개 연령군과 성별로 분류하여 집단별간에 우울득점을 비교분석한 결과 다음과 같다.

- 1) 우울득점은 농아아군을 제외하고 연상군에서 높은 경향을 보였다.
- 2) 우울득점은 4개군에서 성별간에 차이가 없었다.
- 3) 우울득점은 고아군, 지체부자유아군 및 농아아군에서 모두 정상대조군보다 높았다.
- 4) 비교군에서 우울득점은 고아군은 지체부자유아군보다 높았고, 농아아군은 지체부자유군보다 높은 경향을 보였다.
- 5) 우울증상에 발현 빈도는 정상대조군에서 심리적 증상이 상위수준에 발현되는 반면에 우울득점이 높은 고아군 및 농아아군에서는 신체적 증상이 상위수준에 있는 경향이 있었다.

도시 국민학교 아동의 상병 및 의료이용도에 관한 조사연구

조선대 간전논문집 제1집, 1977.