

이 강 오

결 론

1977년 6월 10일부터 7월 5일까지 순천시내 2개 여자고등학교 1.2학년 1,513명을 대상으로 월경과 정신위생에 관해 조사한 결과 다음과 같은 결과를 얻었다.

- 1) 초경연령은 13세부터 15세까지가 전체의 87.1%였고 평균 초경연령은 14.34세였다.
- 2) 현 연령별 초경연령은 연령이 낮을수록 초경연령이 빨라지고 있다.
- 3) 건강상태별로는 건강상태가 양호할수록 허약자에 비해 초경연령이 빨랐다.
- 4) 월경주기는 규칙적인 학생이 66.1%이며, 불규칙적인 학생이 33.1%였다.
- 5) 월경지속기간은 4일간 지속된다가 32.6%이며, 5일간 지속이 24.5%, 3일간 지속이 23.8%이고 평균지속기간은 4.35일이었다.
- 6) 월경량은 정상인 학생이 72.4%, 많은 학생이 10.4%, 적은 학생이 16.9%이었다.
- 7) 월경시 증상의 유무에 있어서 자각증상이 있다고한 학생이 75.8%이고, 없다고한 학생이 24.2%이었다. 자각증상으로는 배가아프다는 학생이 51.8%로 수위이고, 허리가 아프다가 34.3%, 활동의욕이 없다가 33.3%이었다.
- 8) 월경통이 있을 때 처리방법으로는 무처치 50.5%, 진통제 복용이 18.8%이었다.
- 9) 월경전 초경에 대한 지식을 가지고 경험한 학생이 전체의 73.2%이고, 지식없이 경험한 학생이 26.8%이었다.
- 10) 초경시의 심리반응으로 무섭고 놀랐다가 54.3%, 부끄러웠다가 35.7%로 생리적 현상인 월경에 대해 아직도 많은 학생이 공포감과 수치감을 가지고 있는 것을 볼 수 있다.
- 11) 월경에 대한 현재의 심리반응도 우울하다가 34.9%, 불안하다가 29.6%, 싫다가 28.3%이었다.
- 12) 대상자들의 여성생리의 관심도는 75.6%가 구체적으로 배우기를 희망하고 있었다.

일부지역 중고등학교 양호실 이용실태에 관한 조사연구

순천간전논문집 4집, 1978.

서정덕

결론

도시지역과 지방지역 중·고등학교학생의 학교보건활동중 양호실을 중심으로한 학생들의 양호내용을 비교하기 위해 1977년 3월 2일부터 1978년 2월 23일까지 등교일 230일동안에 걸쳐 도시지역 여자고등학교 1개교(2,153명)와 지방지역 중학교 1개교(813명), 남자고등학교 1개교(900명)를 대상으로 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1) 성별 양호실 이용도는 남학생 32.89%, 여학생 103.33%로 남학생보다 여학생이 높았다.

2) 중·고별 양호실 이용도는 중학생 37.75%, 고등학생 83.99%로 중학생보다 고등학생이 높았다.

3) 학년별 양호실 이용도는 1학년 45.03%, 2학년 80.45%, 3학년 74.62%로 2학년이 가장 높았고 1학년이 가장 낮았다.

4) 지역별 양호실 이용도는 도시지역 148.17%, 지방지역 39.48%로 지방지역보다 도시지역이 높았다.

5) 성별 질병상황은 남학생은 외상이 가장 많고 여학생은 복통이 가장 많았다.

6) 중고별 질병상황은 남·여학생 모두 복통이 가장 많았고 외상은 중학생 7.71% 고등학생 20.70%로 고등학생이 더 많았다.

7) 지역별 질병상황은 도시, 지방지역 복통이 가장 많았으며 외상은 도시지역 8.64%, 지방지역 29.32%로 지방지역이 더 많았다.

8) 양호실에서 행해지는 치료상황은 투약이 80.60% 외적인 처치 18.53%, 또 치료를 위하여 병원에 의뢰 0.13%, 조퇴조치로서 가정에 의뢰 0.8%로 양호실에서 치료 처치중 투약이 가장 많았다.

9) 성별 치료상황은 투약이 남, 여학생 모두 가장 많았으며 외적인 처치는 남학생 30.92%, 여학생 12.45%로 남학생이 더 많았다.

10) 지역별 치료상황은 투약이 도시, 지방지역 모두 가장 많았으며 외적인 처치는 도시지역 8.22%, 지방지역 31.15%로 지방지역이 많았다.

11) 양호실에서 투약되는 약물은 도시, 지방지역 모두 analgesics(진통제)가 가장 많았고 chemotherapeutics(화학요법제), obstipants(지사제)는 도시지역보다 지방지역의 투여가 더 많았다. antihistamineics(항히스타민제), laxatives(완화제), sedatives(진정제), antiemetics(최토제)는 도시지역에서만 투여되었다.

12) 양호실에서 1회에 투약하는 약물의 종류는 1종투여가 도시지역 73.29%, 지방지역 53.90%로 가장 많았고, 가장 많이 투여한 4종투여는 지방지역에서 1예있었고 도시지역보다 지방지역이 많이 투여하는 경향이 있다.