

받은 학생중에서도 위와 같은 답변이 46.5% 이었다.

4. 간호원의 역할

간호원의 업무는 대부분 의사의 지시대로 업무를 수행한다가 60.3% 이고 병원에서 간호원의 구별은 줄이는 캄을 쓴 여성이 63.8% 로 나타났다.

일부지방 고등학교 학생의 흡연 음주 습관성 약물사용 양상에 관한 조사 — 고등학교 2학년을 중심으로 —

적십자 간호 제2권, 1979.

조 회

1978년 7월 10일에서 7월 15일 사이에 대구에 소재하는 인문계 고등학교 2학년 515명을 대상으로 하여 이들의 흡연, 음주 습관성 약물사용에 대한 양상을 조사하기 위하여 관계된 설문지를 이용하여 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 조사대상자의 흡연 음주 습관성 약물 사용의 빈도는 아래와 같다.

대상자의 55.73%가 담배를 피우고 있으며 이들의 대부분은 가끔씩 피우고 있고, 처음으로 피우기 시작한 때는 고등학교 때부터가 55.01%였다.

음주하는 학생도 대상자의 71.26%이며 대부분의 학생은 가끔씩 마시는 것으로 나타났다며 처음 마시기 시작한 때는 고등학교 때부터가 50.15%였다.

습관성 약물사용은 17.09%가 사용한 경험이 있고 대부분의 학생이 가끔씩 사용하고 있고 사용하는 약물은 각성제, 안정제, 수면제, 환각제 순이었다. 이들 사용자의 대부분이 고등학교 시절부터 사용한 것으로 나타났다.

2. 인구학적 특성과 사용빈도

공립학교와 사립학교와의 비교에서 공립인 경우, 55.1%의 학생이 흡연을 하고 있고 사립인 경우 56.7%가 흡연하고 있으며 음주는 공립이 59.4%, 사립이 74.1%가 경험이 있으며 흡연 음주의 빈도의 공 사립간의 차는 없는 것으로 나타났다.

연령적으로는 16~17세가 흡연은 90.89%, 음주는 84.47%로 가장 많이 사용하는

것으로 나타났다.

종교에 따라서는 흡연, 음주 모두 종교를 갖지 않은 학생군이 많이 사용하며 종교 유무에 따른 사용빈도의 차는 통계적으로 유의한 차를 나타냈고 종교에 따른 흡연 및 음주의 빈도는 불교, 기독교, 천주교의 순이었다.

3. 학업성취도와 빈도와의 관계

학업성적이 우수한 학생군과 부진한 학생군과는 통계적 검정결과 유의한 차를 보이며, 대학진학 여부에 따른 빈도는 대학을 진학하지 않으려는 군이 더 많이 사용하는 경향을 보인다.

4. 사회적 행동과 사용빈도와의 관계

담배나 술을 마실 때는 담배는 63.76%, 술은 79.75%가 친구들과 어울려서 마시는 경우가 많으며

처음 사용시 타인으로부터 배운 경우가 담배는, 59.22%, 술은 59.4%로 나타났다.

담배를 피우는 장소는 집에서 피우는 경우가 39.02%, 공원 등 기타지역이 33.80%로 가장 많으며

경제상태에 따라서는 경제상태가 어려울수록 많이 사용하는 것으로 나타났다.

5. 심리적응과 사용빈도

부모와의 관계가 좋지 않은 군과 좋은 군과의 사용빈도의 차는 통계적 검정 결과 유의한 차를 나타냈으며, 기분이 좋지 않을 때 흡연이나 음주를 많이 하며

담배피우는 학생의 2.44%가 음주하는 학생의 2.45%가 정신과적 문제를 지니는 것으로 나타났다.

한국양호교사의 최근 추세에 관한 일 연구

간호학회지 제9권 제1호.

주 체 복

우리나라 양호교사의 추세와 양호교사의 인적 특성을 파악하고 그 관련요인을 분석함으로써 앞으로의 양호교사 추이를 제시하여 양호교사확보 대책에 기초자료를 제공하고자 『문교통계연보』 자료를 이용 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.