

것으로 나타났다.

종교에 따라서는 흡연, 음주 모두 종교를 갖지 않은 학생군이 많이 사용하며 종교 유무에 따른 사용빈도의 차는 통계적으로 유의한 차를 나타냈고 종교에 따른 흡연 및 음주의 빈도는 불교, 기독교, 천주교의 순이었다.

3. 학업성취도와 빈도와의 관계

학업성적이 우수한 학생군과 부진한 학생군과는 통계적 검정결과 유의한 차를 보이며, 대학진학 여부에 따른 빈도는 대학을 진학하지 않으려는 군이 더 많이 사용하는 경향을 보인다.

4. 사회적 행동과 사용빈도와의 관계

담배나 술을 마실 때는 담배는 63.76%, 술은 79.75%가 친구들과 어울려서 마시는 경우가 많으며

처음 사용시 타인으로부터 배운 경우가 담배는, 59.22%, 술은 59.4%로 나타났다.

담배를 피우는 장소는 집에서 피우는 경우가 39.02%, 공원 등 기타지역이 33.80%로 가장 많으며

경제상태에 따라서는 경제상태가 어려울수록 많이 사용하는 것으로 나타났다.

5. 심리적응과 사용빈도

부모와의 관계가 좋지 않은 군과 좋은 군과의 사용빈도의 차는 통계적 검정 결과 유의한 차를 나타냈으며, 기분이 좋지 않을 때 흡연이나 음주를 많이 하며

담배피우는 학생의 2.44%가 음주하는 학생의 2.45%가 정신과적 문제를 지니는 것으로 나타났다.

한국양호교사의 최근 추세에 관한 일 연구

간호학회지 제9권 제1호.

주 체 복

우리나라 양호교사의 추세와 양호교사의 인적 특성을 파악하고 그 관련요인을 분석함으로써 앞으로의 양호교사 추이를 제시하여 양호교사확보 대책에 기초자료를 제공하고자 『문교통계연보』 자료를 이용 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 1969. 12. 25 학교보건법 시행령이 발표된 후인 1970년부터 1978년까지 8년간의 양호교사의 연평균증가율은 국민학교가 4.61%, 중학교가 2.14%, 고등학교 15.26%로 고등학교의 증가율이 가장 높게 나타났다. 이들 전체의 평균증가율은 5.35%였으며 1978년 현재 양호교사수는 총 1,281명이었다.

2. 양호교사의 확보율은 1978년에 국민학교가 14.6%, 중학교 7.7%, 고등학교 15.2%로써 전체 평균은 13.2%로 나타났다. 이것은 1970년의 10.0%와 비교하면 3.2% 증가한 수준이다.

한편 지역별로 서울이 1978년에 66.7%로 확보율이 제일 높고 경상남도가 1.5%로 제일 낮다.

그리고 1970년에 비해 제일 많이 증가한 도는 전라남도로서 1970년 6.5%에서 1978년 15.4%로 증가되었다.

3. 양호교사의 확보율은 사립학교가 1970년 10.9%, 1978년 17.9%로써 국공립학교의 9.8%, 12.4%에 비해 높게 나타났으며 특히 사립고등학교가 확보율이 가장 많이 증가하였다.

4. 1978년도 양호교사 1인당 학생수는 국민학교가 5,981명, 중학교 14,923명, 고등학교 7,655명이었으며 양호교사 1인당 교원수는 각각 123명, 332명, 234명으로 나타났다. 그리고 중학교만이 1970년에 비해 1978년에 많이 증가되었다.

5. 초·중·고등학교 전 양호교사의 연령 분포는 1978년의 경우 20대가 54.1%로 과반수를 넘고 있는데 이것은 1970년의 경우와 비슷하였다.

양호교사의 학력은 1970년에는 고등학교 졸업자가 52.6%로 제일 많았으나 1978년에는 초급대학이상인 74.2%로 학력수준이 향상되었다.

양호교사의 경력은 1970년에는 5년 이하가 46.4%였으나 1978년에는 51.8%로 약간 증가되었으며 경력 10년 이하가 전체로 보면 82.7%에서 71.3%로 감소되었다.

양호교사 중 양호교사의 자격을 갖고 있는 경우는 1970년 96.2%에서 1978년 98.1%로 증가되었으나 아직도 1.9%의 무자격자가 있다.

양호교사 중 미혼자는 1970년에 25.7%였으나 1978년에는 34.7%로 9%가 증가하였다.

6. 양호교사는 학교수와 간호원수와 밀접한 관계를 보이며 이들 변수와는 다음과 같은 회귀 방정식이 산출되었다.

$$SN_i = -24,497 + 0.675 S_i + 0.196 N_i$$

이상의 결과를 이용하여 다음과 같은 건의를 제안한다.

1) 양호교사는 지금까지의 추세로서는 그 확보가 미비하고 증가속도도 느리기 때문에 정책적인 차원에서 강력한 양호교사 확보대책이 조속히 강구되어야 한다.

2) 학교당국은 무자격 양호교사를 배제하고 자격있는 양호교사를 확보하여 학교보건영역에서 충분한 지도능력을 발휘할 수 있도록 지원해야 한다. 그리고 양호교사의 이직율을 줄일 수 있도록 처우개선을 병행해야 한다.

3) 양호교사가 학교보건과 그 지역사회보건사업의 수행자로서의 사명감을 가지고

봉사하고 자기 책임을 다할 때 양호교사에 대한 사회와 학교, 나아가서는 정책당국이 그 중요성을 인식하게 될 것이며 양호교사 확보가 조속히 시행될 수 있을 것이다.

여고 3년간의 체위 발달에 관한 연구

순천간호전문 논문집 제7집, 1981.

김 순 옥

본 연구자는 과거와 현재의 전국 여고생 체위 발육실태와 대도시 여고생의 발육실태를 비교하여 신장, 체중, 흉위, 좌고등, 4항목을 측정된 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

즉 전체적인 체위 발달면에서 볼때 신장과 체중은 계속 증가 하는 반면, 흉위와 좌고 발육치가 근래에 들어 감소하는 경향이 있다.

1) 신장~신장 발육상태는 경제적 발달에 따른 영양 상태와 환경조건의 향상에 따른 결과에 의해 계속 증가일로에 있다. 특히 1962년도에서 1970년도 사이의 신장 증가보다 1970년도에서 1979년도 사이의 증가가 더 높게 나타난것은 위에서 말한 외적조건의 향상에 의한 것이라고 볼수 있다. 특히 전국 평균치보다 대도시에 위치한 Y 여고의 평균치가 더 높게 나타난것을 보아도 환경적 경제적 요인이 신장 발육과는 밀접한 관계가 있음을 보여주는 것이다.

2) 체중~계속 증가를 보이는 것은 신장과 같다. 그러나 증가율이 과거 1962년도에서 1970년도 사이의 증가치에 비해 근래 1970년도에서 1979년도 사이의 증가치가 감소한것으로 나타나고 있다. 특히 여고 1학년에서 여고 2학년 사이의 증가보다 여고 2학년에서 여고 3학년 사이의 증가치가 적게 나타난것은 정신적 긴장이 원인이 되지 않은가 한다.

3) 흉위~1962년도에서 1970년도 사이의 흉위는 다른 신장이나 체중과 마찬가지로 증가를 보였다. 그러나 경제적 환경적 향상에도 불구하고 근래에 들어 1970년도에서 1979년도 사이에서는 전국평균치가 만15세에서만 0.1cm 증가를 보였을뿐 만16세에서 0.1cm 감소했고, 만17세에서 0.6cm 감소를 나타내고 있다.

특히, 대도시에 있는 Y 여고 평균치의 경우 1979년도 평균치보다 낮은 흉위를 나타낸것은 주목할만 하다.

4) 좌고~흉위와 마찬가지로 과거 1962년도에서 1970년도 사이의 증가는 꾸준하나 근래에 들어 1970년도에서 1979년도사이의 만15세에서 0.7cm 증가를 보였을뿐 만16세에서 0.1cm 감소, 만17세에서 0.7cm 감소를 보이고 있으며 대도시에 위치한 Y 여고의