

로 해결되므로 제도개선이 광범위하게 마련되어야 한다고 본다.

4. 양호교사의 확대된 역할에 대비하여 현 시대에 맞는 직무내용의 전문화 조직화 및 체계화에 대한 지속적인 연구가 되어지기를 제안한다.

5. 양호교사의 직무 및 직업만족도에 영향을 미칠 수 있는 연구가 나오길 기대한다.

충북지역 중학교의 학교보건실태에 대한 조사연구

청주전문대학 논문집 제11집, 1985.

유재순 · 최재순 · 이경숙

본 연구는 1984년 10월 20일부터 12월 15일에 걸쳐 충북 전지역(3개시 및 10개 군)에 있는 중학교와 3개시 지역 국민학교에서의 양호교사 배치 현황을 파악하고, 양호교사가 없는 65개교 중학교와 14개 국민학교의 영양직책겸직교사를 대상으로하여 이들 학교 및 양호직책겸직 교사의 특성과 학교보건 활동실태에 대한 조사를 실시하여 분석한 것이다. 결과를 요약하면 다음과 같다.

A. 충북지역 양호교사 배치 현황

① 충북 전지역에 있는 108개교의 중학교에서 양호교사가 있는 학교는 4개교로 양호교사 배치율은 3.7% 였으며 중학교 양호교사 1인당 학교수는 27이었다.

② 충북의 3개시 지역에 있는 42개교의 국민학교중에서 양호교사가 있는 학교는 19개교로 양호교사 배치율은 45.2% 였으며 시소재 국민학교 양호교사 1인당 학교수는 2.2개교 였다.

B. 양호교사가 없는 학교의 특성

① 양호교사가 없는 학급수별로 분포는 7~12학급군이 44.6%, 18학급 이상군이 35.4% 였고 학생수별로는 1,000명 이상군이 37.0% 로 가장 많았으며 교원수는 10~19명군이 46.2% 였다. 또한 양호교사가 없는 시소재 국민학교의 경우에는 18학급 이상군이 42.9% 로 가장 많았다.

② 각 학교에 가장 인접해 있는 보건의료시설은 중학교의 경우 보건지소 32.3%, 개인 의원 30.8%, 약국 12.3% 의 순이었고 인접한 보건의료시설까지의 거리는 걸어서 10분 이내에 도착할 수 있는 경우가 47.7% 였다. 국민학교의 경우에는 약국, 개인의원의 순이였으며 50% 가 학교에서 걸어서 10분 이내의 거리에 보건의료시설이 있었다.

③ 독립된 양호실이 있는 중학교는 29.2%, 국민학교 28.6%였으며 44.6%의 중학교와 50.0%의 국민학교에서 만이 상수도를 사용하고 있었고 대부분의 학교에서 재래식 변소를 사용하고 있었다.

C. 겸직교사의 특성

① 중학교에서 양호직책을 겸직하고 있는 교사들의 연령은 25~29세군이 60.6%로 가장 많았고 5~10년의 교육 경력을 지닌 교사가 30.8%였다. 이들 중 여교사는 72.3%였고 50.8%가 기혼이었으며 사범대학 출신 교사가 75.4%였다.

국민학교 양호직책 겸직교사는 전원이 30세이상으로 5년 이상의 교육경력을 갖고 있었고 92.9%가 기혼인 여교사였으며 교육대학 출신은 85.7%였다.

② 겸직교사가 학교보건 업무를 담당하게 된 직접적인 동기는 자신의 의견과는 관계없이 학교측의 사정에 의해 담당한 경우가 대부분(중학교 86.2%, 국민학교 85.7%)이었다. 중학교 교사의 겸직경력은 1~2년인 경우가 가장 많아 40.0%였고 국민학교 교사의 겸직경력은 1년 미만인 경우가 35.7%로 가장 많았다. 겸직업무에 대하여 교육을 받은 경험이 있는 교사는 중학교 교사, 국민학교 교사가 각각 30.3%, 28.6%였다.

D. 학교보건 활동 실태

① 각 학교에서 가장 많이 실시하고 있는 학교보건 업무 내용은 기생충 검사로서 모든 중학교와 국민학교에서 실시하고 있었다. 일본뇌염 예방접종은 98.5%의 중학교와 92.9%의 국민학교에서, 간염 예방접종은 76.9%의 중학교와 14개교 모든 국민학교에서 실시하였다. 장티푸스 예방접종 실시율은 중학교, 국민학교 각각 83.1%, 85.7%였고 콜레라 예방접종은 36.9%의 중학교와 7.1%의 국민학교에서만 실시하였다. 또한 학교급식은 23.1%의 중학교와 64.3%의 국민학교에서 실시하였다.

② 각 중학교에서 지출한 연간 학생 1인당 보건위생비는 150원이었으며 지출된 보건위생비는 학급수, 학생수, 직원수등의 학교 특성 및 겸직교사의 특성과 유의한 연관성이 없는 것으로 분석되었다. ($p>0.05$)

③ 학생의 건강관리를 위하여 중학교 겸직교사가 겸직업무를 실시한 시간은 하루에 평균 30분 이상인 경우가 69.2%였다. 겸직교사의 양호업무 실시 시간은 각학교 및 겸직교사의 특성과 통계적으로 유의한 연관성이 없었다. ($p>0.05$)

④ 중학교 겸직교사가 겸직업무를 실시하면서 가장 어려웠던 사항은 양호설비나 예산부족으로 60.0%였고 국민학교 겸직교사의 경우엔 전문지식 및 기술부족이 50.0%였다.

⑤ 겸직교사가 가장 원하는 교육내용은 응급처치로서 60.0%였다.

상기한 결과들으로써, 효율적인 학교보건 관리를 위해서는 전문교육을 받은 양호교사의 충원이 필수적으로 요구되고 있음을 알 수 있었다. 그러나 교육행정의 제반 사정상 양호교사의 충원이 적절히 이루어지고 있지 못하고 있음이 현실정이나, 이러한 실정

을 고려하여 학생들의 효율적인 건강관리를 위한 방안을 모색해야겠기에 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

첫째, 양호교사가 없는 학교에서 운영되고 있는 양호직책 겸직교사제도의 효율성을 높이기 위하여 겸직교사 인선시 신중한 관심과 고려가 뒷받침 되어야겠다. 단순한 행정 사무 분장 계획안에 의한 인선이 아니라, 학교보건의 중요성을 충분히 인식하고 있고 봉사적으로 학생을 위해 헌신할 수 있는 자질을 갖춘 교사를 선정하도록 해야 되겠다.

둘째, 일반교사에게 업무를 겸직시키기 전에 업무 실시에 필요한 기본 교육을 받을 수 있는 기회를 먼저 마련해 주어야겠다.

셋째, 학교보건 활동에는 인적 자원 못지않게 물적 자원이 충분하게 뒷받침되어야 하므로 예산 확보에 대한 행정적인 지원이 이루어져야겠다.

넷째, 양호교사가 없는 학교에서의 보건관리 활동에 대하여 전문적, 행정적 측면에서의 조직화된 지도 및 감독체제가 마련되어야겠다.

다섯째, 학교행정 책임자에게 학교보건의 중요성을 올바르게 인식시켜줄 수 있는 교육 기회가 마련되어 학교보건에 대한 이해부족 및 무관심으로 인한 학교보건관리 부실이 없어져야겠다.

여섯째, 일반교사가 담임업무, 교무업무를 능률적으로 수행할 수 있도록 적절할 행정적인 배려가 마련되어야겠다. 즉 다른 잡무의 감소, 승진시 점수 인정, 겸직 수당 지급등을 고려해 볼 수 있겠다.

끝으로 학교보건사업은 그 학교가 속한 지역사회 보건사업과 분리된 상태에서는 결코 성공할 수 없으므로 지역사회의 여러 보건의료사업과의 긴밀한 유대 관계가 행정적, 제도적인 측면에서 이루어지면서, 학교보건에 대한 문교, 보사 당국, 교육자, 일반교사들의 적극적인 지원과 협조가 뒷받침된다면 보다 효율적인 건강관리가 이루어질 수 있으리라고 생각된다.

고등학교 남학생들의 성에 대한 경험, 지식 및 태도 조사 연구

목포 성신간호전문대학 논문집 제3집 제1호, 1985.

최희정

본 연구는 1985년 6월 10일부터 25일까지 H 시내에 소재하고 있는 2개 고등학교 3학년 남학생 350명을 대상으로 성에 대한 경험과 지식 및 태도를 파악하고 이들의 관계를