

⑥ 건강관리 자신감

설립주체(p < .05), 양호실 방향(p < .01).

(2) 업무수행정도에 영향을 주는 제 요인

① 학교보건사업계획 및 수행정도

설립주체(p < .05), 보건조직(p < .01), 양호교사 임상경력(p < .01)

② 양호실관리 수행정도

설립주체(p < .01), 보건조직(p < .059, 가정통신물 발송횟수(p < .05), 양호실 이용자수(p < .05)

③ 보건교육 수행정도

보건조직(p < .01), 가정통신문 발송횟수(p < .05), 결혼관계(p < .01)

④ 환경관리 수행정도

보건조직(p < .05), 양호교사 연령(.01), 양호교사 경력(p < .05).

⑤ 학교보건조직운영 수행정도

양호교사 연령(p < .05)

⑥ 건강관리 수행정도

양호교사 보건경력(p < .05), 학교보건예산(p < .05)

이와 같은 연구결과 학교간호사업 향상을 위하여 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1) 양호교사에 대한 계속 교사기회 제공

2) 학교보건예산 확보

3) 학교행정권자의 학교보건에 대한 인식고취 및 지원

4) 학교보건조직의 효율적 운영

5) 학교보건사업에 일차보건의료 적용

6) 학생과 양호교사와의 적정비율 유지

서울지역 국민학교 양호교사의 학교간호업무 수행정도에 관한 연구

한국 학교 보건학회지 제1권 제2호, 1988.

김 은 희

본 연구는 서울지역 국민학교 양호교사의 업무에 관한 실태를 파악하고 학교간호 업무 수행상의 개선점을 모색하기 위한 기초 자료를 제공하기 위하여 시도 되었다.

연구대상은 서울시내 국민학교에 근무하는 양호교사 중 연구에의 목적을 이해하고 참여에 수락한 98명이었다.

연구도구는 문헌고찰을 통하여 얻은 자료를 근거로 연구목적의 달성을 위하여 작성된 질문지를 사용하였고 3차에 걸쳐 수정·보완하였다.

자료수집은 1986년 8월 13일~10월 30일까지였으며 서울시 교육위원회의 협조로 설문지를 배부한 후 대상자의 직접 기록에 의하여 수집되었으며 본 연구를 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다.

1. 양호교사의 일반적 특성

대상자의 평균 연령은 35.9세였고, 현경력은 평균 9.2년이었다.

양호교사를 제외한 과거경력으로 임상분야 경력이 평균 3.4년, 보건분야 경력이 평균 0.3년이었다.

간호교육 배경으로는 전문대학 이상이 72.4%였고, 결혼상태는 기혼이 89.8%였다. 종교는 76.5%가 있는 것으로 나타났고, 국공립 학교에 94.8%가 근무하고 있었으며, 99.0%가 양호교사 단독업무를 보고 있었다.

2. 학교보건 자원에 관한 실태

양호교사 1인당 학생수는 2,630명, 학급수는 49.3학급, 교원수는 54명이었다.

학교보건에 관한 연간 총 예산은 30~59만원의 빈도가 제일 높았고, 그 중 의약품 구입비가 제일 많았다.

반면 전체 예산중 보건 예산의 차지 비율을 58.2%가 모르고 있었다.

학교보건 조직은 74.2%가 없었다.

양호실 방향은 42.9%가 중앙에 88.8%가 1층에 위치하고 있었다.

양호실 활동조건은 93.9%가 단독사용이었고, 10평 이하의 면적이 71.6%였다.

3. 학교간호 업무 실태

월 평균 양호실 이용자수는 413명이었다.

목적별 이용자 중 소화기계의 빈도가 제일 높았다.

가정 통신문의 연간 발송 횟수는 15.9회였고 보건교육에 관한 발송 빈도가 제일 많았다.

학교간호 업무별 할애시간 중 양호실 관리에 가장 많은 시간이 소요되고 있었다.

4. 학교간호 업무별 수행정도

학교간호 업무별 수행정도는 한다에 2점, 안한다에 1점을 주어 비교한 결과 전체적으로는 1.75였으며, 보건교육이 1.89, 환경관리가 1.86 사업계획 및 평가가 1.83, 양호실관리가 1.82, 건강관리가 1.78, 학교 보건조직운영이 1.32였다.

5. 학교간호 업무수행과 제 변수들간의 상관관계

학교보건 사업계획 및 평가의 영역에서 학교보건조직 유무($p < 0.01$), 과거 임상경력($p < 0.05$), 과거 보건경력($p < 0.05$), 학급수($p < 0.001$), 학생수($p < 0.01$), 보건

교육에 관한 가정통신문 발송 횟수($p < 0.01$), 양호실 이용자수($p < 0.05$)가 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

양호실 관리의 영역에서는 연령($p < 0.05$), 과거 임상경력($p < 0.05$) 학급수($p < 0.05$), 학생수($p < 0.05$), 가정통신문 발송 횟수($p < 0.01$)가 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

보건교육의 영역에서는 보건조직의 유무($p < 0.05$), 과거 임상경력($p < 0.05$), 과거 보건경력($p < 0.05$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 보건교육 할애시간 비율($p < 0.001$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

환경관리의 영역에서는 연령($p < 0.01$), 양호교사 현경력($p < 0.01$), 호봉수($p < 0.01$), 보건교육에 관한 가정통신문 발송 횟수($p < 0.01$), 가정통신물 발송 전체 횟수($p < 0.001$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 보건교육 할애시간 비율($p < 0.05$), 양호실 사용면적($p < 0.05$)에 따라 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 학교보건조직 운영의 영역에서는 학급수($p < 0.05$)가 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 건강관리의 영역에서는 학급수($p < 0.05$), 보건교육에 관한 가정통신문 발송 횟수($p < 0.001$), 가정통신문 발송 전체($p < 0.01$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

학교간호업무 전체에서는 연령($p < 0.05$) 과거 임상분야 경력($p < 0.05$), 과거 보건분야 경력($p < 0.01$), 학급수($p < 0.05$) 학생수($p < 0.05$), 보건교육에 관한 가정통신문 발송 횟수($p < 0.05$), 가정통신문 발송 전체 횟수($p < 0.05$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 보건교육 할애시간 비율($p < 0.01$), 양호실 사용면적($p < 0.05$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

B. 제언

본 연구자는 국민학교 양호교사와 그 업무실태를 분석하고 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 양호교사 스스로 학교 인구의 건강을 향상시키기 위한 자질향상에 적극적이어야 할 것이다.
2. 양호교사가 학교인구의 건강을 지키기 위하여 요구되는 제도적 지원이 충분해야 할 것이다.
3. 가정·학교·지역사회와의 공동노력과 학생·교사·보건의료인 학부모들의 올바른 역할수행이 이루어져야 할 것이다.

서울시 국민학교 양호교사들의 학교간호 업무수행 자신감에 관한 연구