

모 제사공장 여성 근로자들의 C. M. I에 의한 건강 측정

춘천간전 논문집 제8집, pp.33~55, 1978

김 성 실

제사공장 여성 근로자 120명을 대상으로 Cornell Medical Index 를 적용하여 건강 실태 조사를 한 바 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 전 대상자는 우울(N 항), 불안(P 항), 피로감(I 항)의 호소수가 많았다.
2. 연령별로는 30세 이상 군에서 호소수가 많았으며 습관(L 항), 우울(N 항), 노여움(Q 항)으로 정신증상의 호소수가 많았다.
3. 교육수준이 높아 질수록 호소수가 증가하는데 특히 우울(N 항), 불안(P 항)에 서 많은 호소를 하고 있다.
4. 근속연수별로 7년이상인 근로자에서 평균호소수가 10.9로 상회하기 시작하여 10년이상에서는 36.0으로 급증되며 우울(L 항)이 가장 높다.
5. 일일 근로시간 9~11시간에서 평균호소수가 20.0으로 가장 많았으며 불안(P 항)과 우울(N 항)의 호소수가 많다.

일부여성 근로자의 피로자각 증상에 관한 조사연구

대전간호전문학교 논문집 제4집, pp.143~159, 1978

민 복 기

저자는 대전시내에 소재한 2개의 방직회사 여성 근로자 648명을 선정 대상으로 하여 근무로 인하여 생기는 신체적 정신적 및 신경감각적 피로증상을 일본산업위원회의 “피로조사법”에 의한 피로호소율을 조사하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1) 연령별 분포는 21세가 17.6%로 가장 많았으며, 교육정도는 중졸이 48.3%로 가장 높았다.

2) 근무년한은 6개월이내가 19.4%로 가장 많았고, 건강상태는 보통이 52.3%이었다.