

조업이 50.5%로 가장 많았다. 1인당 평균 대상 근로자수는 114,7명 이었다. 대상 간호원의 평균 연령은 28세 전문대졸이 64.8%로 많았다. 미혼이 64.7%, 현직경력이 평균 2년 8개월이었고, 업무에 대체로 만족하고 있었다. 월평균 보수는 39만원이고, 의무실은 76.9%가 독립되어 있었다. 보건관리자는 촉탁이 60.4%이었고, 경영주는 대부분 산업간호에 대해 긍정적이었다.

2. 업무영역별 업무실시정도

간호제공업무가 평점 0.61로 가장 많이 실시되었고 다음은 산업간호사업운영 업무 0.53, 환경관리업무 0.37, 복지후생업무 0.33의 순이며, 간호제공 업무 중에서는 개인상담, 혈압측정 97.8%, 응급처치 94.4%의 순이었고, 보건교육의 수행율은 전반적으로 낮아 가족계획, 가정상비약, 유해물질에 대한 교육이 32.6%이었다.

3. 업종별 규모별 업무 수행정도

업종별로는 서비스업이 가장 높은 수행정도를 나타내었고, 다음은 제조업, 건설업, 금융의 순이었고, 이러한 차이는 매우 유의한 것이었다($p < 0.01$). 업무간의 차이도 유의한 것으로 나타났다($p < 0.05$). 규모별로는 유의한 차이가 없었다($p < 0.05$).

4. 업무수행 시간

1일평균 근무시간은 10.1시간이고, 간호제공업무에 가장 많이 할애되어 6.8시간이었으며 업무간에 매우 유의한 차이가 있는 것으로 나타났다($p < 0.01$). 요일별로는 목요일이 가장 많은 11.2시간이고 평일 중 가장 짧은 근무시간은 화요일의 9.8시간의 근무시간으로 나타났다($p < 0.05$).

산업건강관리 보건 담당자의 사기요인 분석 연구

충남의대잡지, 제15권 제1호, pp.11~14, 1988.

김종임 · 김태숙

본연구는 산업간호사 의사기측정도구개발을 위하여 1987년 8월에 질문지법을 이용하여 충청지역 63개 산업체를 대상으로 조사하였다.

1. 각 문항을 요인분석한 결과 산업체 건강관리보건담당자의 사기에 영향을 미치는 4가지 요인들이 추출되었고 이 4가지 요인들은 62.2%의 설명이 가능했다.

2. 사기에 관한 요인들은 4가지 하위차원 즉, 제1요인은 처우면, 제2요인은 직무내

용면, 제3요인은 지지면, 제4요인은 자아존중면으로 명명하였으며, 각각의 요인들은 보건담당자의 사기에 제1요인 41.8% 제2요인 8.8%, 제3요인 6.6%, 제4요인 5.7%의 설명력을 갖는 것으로 나타났다.

충청지역 산업보건 관리실태와 건강관리 보건담당자의 사기에 관한 조사연구

충남의대 잡지, 제15권, 1988

김태숙 · 김종임

본 연구는 충청지역 산업체의 보건관리 실태와 건강관리 보건담당자의 사기를 알아보기 위해 시도되었다.

1987년 8월에 63개 충청지역 산업체를 임의추출하여 질문지법을 사용하여 자료를 수집하였고 다음과 같은 결론을 내리고자 한다.

1. Webb's Scale에 의해 조사된 각 산업체의 보건관리실태는 백분률로 환산하여 46%였으며 목표와 조직에 대한 긍정적 점수분포는 63%를 나타내었다.
2. 건강관리 보건담당자의 특성을 보면 산업간호사가 21%였으며, 연령분포는 20~34세가 가장 많은 수를 차지하고 있었다.
3. 건강관리 보건담당자의 사기를 측정 한 결과 67%를 나타내었다.
4. 산업 보건관리 실태와 건강관리 보건담당자의 사기간의 상관관계는 통계적으로 유의하지 않았다.

위와 같은 결과에서 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

산업보건관리실태를 측정하는데 우리나라 실정에 더욱 적합한 도구의 개발이 필요하며, 건강관리 보건담당은 업무수행능력이 갖추어진 산업간호사로 이루어져야 하며 근로자들의 보다 질적인 산업체 건강관리가 이루어 질 때 국민건강의 향상을 가져올 수 있으리라 사료된다.

일부지역 여학생근로자의 영양실태 조사

중앙의학, 제53권 제8호, 1988.

안 태 성