

鼻痔에 관한 文獻的 考察

范 熙 邊*

I. 緒 論

鼻痔는 淡紅色 暗紫色 或은 灰白色을 띠는 光滑하고 유연한 新生物로서, 鼻腔의 一側 或은 兩側에 1個 或은 數個가 發生한다.⁴²⁾

初期에는 榴子樣 大棗樣과 같으며, 점차 커짐에 따라 鼻腔을 막으면 鼻閉塞되고, 語聲重濁하며 水樣 或은 粘液性 分泌物이 多量으로 增加하게 된다. 이로 인하여 嗅覺減退 或은 消失, 頭暈 頭痛 眉間脹痛 等症이 나타난다.³⁰⁾⁴²⁾

鼻痔는 흔히 鼻瘻肉, 鼻息肉, 鼻中塞肉, 鼻中肉贅라고도 하며³⁸⁾ 輕하면 鼻瘡, 重하면 鼻痔, 甚하면 鼻癰이 된다고 하였다.¹³⁾

西洋醫學에서는 鼻腔이나 副鼻洞이 慢性炎症 상태에 있을때, 或은 알레르기나 악성종양이 있을때 생긴다고 하였으며, 小兒에서는 드물고 성년기에서부터 잘 생기는데, 男子에게서 많다고 하였다.

호말부위는 中鼻道 特히 篩骨洞 開口部이며 鼻腔側壁이나 上顎洞內에도 생긴다고 하였다.

鼻閉塞이 없을 정도로 작을때는 內服 분무 점비 등 고식적인 치료를 하나, 鼻閉塞이 있게 되면 보통 外科的인 手術療法으로 切除하게 되는데, 手術을 해도 再發이 잘 된다고 하였다.⁴⁸⁾

이에 著者는 鼻痔의 韓方的인 發病原因과 治療處方에 關하여 여러 文獻을 中心으로 調査 整理한 結果를 報告하는 바이다.

II. 資料 및 方法

1. 資料

文獻 51種을 資料로 選定하여 鼻痔의 原因과 治方에 關한 內容을 拔萃하여 研究 檢討 하였다.

2. 方法

1) 文獻에 나타난 原因을 分類하고 頻度を 조사하였다.

2) 使用된 處方은 內服藥과 外用藥으로 分類하여 그 頻度を 조사하였고, 外用藥은 構成 藥物의 頻度を 조사하였다.

3) 構成藥物은 같으나 處方名이 다른 경우는 그 하나만을 기재하였다.

4) 處方名이 없는 外用藥은 모두 外用方으로 처리하였다.

III. 本 論

1) 諸病源候論¹⁾

肺氣通於鼻 肺藏爲風冷所乘則鼻氣不和, 津液壅塞爲鼻鼈, 冷搏於血氣 停結鼻內 故變生息肉.

2) 景岳全書²⁾

鼻鼈息肉 阻塞清道 雖鼻爲肺竅而其壅塞爲患者 乃經絡肌肉之病 此實陽明熱 滯留結而然故 內治之法 宜以清火清氣爲主.

3) 類證治裁¹²⁾

* 慶熙韓醫院 院長

有瘰癧肉如棗 生鼻中 爲鼻痔 由胃有食積 熱痰流注，有肺熱極而 生瘰癧肉，如榴子下垂 肺塞 鼻竅 氣不得通 由風熱鬱滯 有瘰癧肉痛甚 由膏粱積熱 濕蒸肺門 如兩齋之地 突產菌芝。

4) 醫學入門¹³⁾

鼻瘡鼻痔 熱同因

輕爲鼻瘡，重爲鼻痔 皆肺熱也。

鼻痔肺氣熱極 日久凝濁 結成息肉 如棗滯塞 鼻孔 甚者又名鼻臃。

5) 六科準繩¹⁰⁾

韓氏醫通云貴人鼻中肉贅 臭不可近 痛不可搖 束手待斃 豫但以白礬末加鋼砂少許 吹其上，傾之化水而消 與勝濕湯 加瀉白散 二貼愈。

此厚味壅濕熱 蒸於肺門 如兩齋之地 突生芝菌也。

肺虛而壅 鼻生痛肉 不聞香臭 羊肺散

胃中有食積 熱痰流注 宜星半蒼朮 酒芩蓮 神曲 辛芫 細辛 白芷 甘草 消痰積之藥內服。

6) 醫宗金鑑⁹⁾

鼻痔 初起榴子形 久垂紫硬碍氣通 肺經風濕 熱郁滯 內服 辛芫外點平。

此證生于鼻內 形如石榴子 漸大下垂 色紫微硬 撐塞鼻孔。碍人氣息難通 由肺經風濕熱鬱 凝滯而成。

7) 脈因證治¹⁵⁾

鼻爲肺之竅 同心肺 上病而不利也 有寒有熱 寒邪傷於皮毛 氣不利而壅塞 熱壅清道 酒鼓鼻 乃血熱入肺 礙鼻息肉 乃肺氣盛。

8) 瘡瘍全書⁴⁾

鼻居面中 爲一身之血運 而鼻孔爲肺之竅 其氣上通於腦 下行於肺 若肺氣清 氣血流通 百病不生 肺氣盛 一有限滯 諸病生焉 鼻孔中瘰癧肉 名曰鼻痔 皆由六氣七情所感而生 若生上入眼 名曰旁肉。若生下入鼻中 名曰瘰癧肉，室塞不通 當戒酒節慾 除煩惱，戒憂愁 內服煎劑 外用點藥 庶平後矣。

9) 古今醫統⁵⁾

肺臟調和則鼻氣通利而知香臭 若邪乘太陰 其氣蘊積於鼻者 則 津液壅塞 鼻氣不得宣調，故不知香臭而爲鼽也。至於生瘡變成瘰癧肉 或壅塞或 流涕 皆是肺經之邪壅滯也。

肺氣通於鼻 清氣出入之道 肺臟熱邪壅滯 上焦鬱結 伏留不散而成鼽瘰之患矣。

10) 醫學準繩六要⁶⁾

瘰癧肉 必由上焦積熱 鬱塞已久而生 然有諸中 然後形諸外 必有內服 清火利膈藥 二陳涼膈加減 須斷酒薄味。

11) 外科正宗³⁾

鼻痔者 由肺氣不清 風濕鬱滯而成 鼻內瘰癧肉 結如榴子 漸大下垂 閉塞孔竅 使氣不得宣通 內服辛芫清肺飲 外以 砂散 逐日點之 漸化爲水 乃愈。

12) 醫方考⁷⁾

夫鼻者氣之竅 氣清則鼻清 氣熱則鼻塞 熱盛則塞甚 此瘰癧肉之所以生也。故治之宜清其氣。

13) 外科秘錄²⁸⁾

鼻瘰者 生于鼻內 其形塞滿竅門 而礙于取息 故曰鼻瘰也。

鼻痔者 亦生鼻內 略小于鼻瘰 狀如櫻桃枸杞 皆肺經受毒氣 不能消 濕熱壅滯而生 此二病也 內治必頻清肺爲主 而佐之除濕降火之味 外用藥 點搽 亦易愈也。

14) 中醫五官科學⁴²⁾

在鼻竅歸 單側 或雙側 有一個或數個帶蒂活動 表面光滑 質軟 灰白色 或 淡紅色歸 肉樣贅生物 稱鼻息肉。又因其塊物形如峙狀 所以也育鼻痔之稱。

15) 奇效良方²⁹⁾

鼻者肺之通竅 主清氣出入之道路 若氣血和平 陰陽升降則 呼吸通和 榮衛行焉 鼻和則 知香臭矣 或 六淫七情 內外傷感 又因飲食勞倦

因時鼻氣不得宣通 清道壅塞 其為病也。……

或 冷滯氣塞 鼻則不聞香臭 於是為鼻衄 血脈聚 日久纏綿 轉如壅結 變生痛肉。

1. 原因

Table I.

No.	原 因	頻度
1	胃中食積 熱痰流注 ⁵⁾¹⁰⁾¹²⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁶⁾²¹⁾²⁴⁾³⁰⁾³⁵⁾³⁷⁾⁴⁰⁾⁴³⁾	13
2	肺經風濕熱鬱滯 ³⁾⁹⁾¹²⁾¹⁷⁾¹⁸⁾²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³³⁾⁴³⁾⁴⁶⁾	11
3	肺熱 ⁷⁾⁸⁾¹²⁾¹³⁾²⁴⁾²⁶⁾³⁶⁾³⁷⁾⁴⁰⁾⁴⁵⁾	10

2. 內服藥

Table II.

No.	處 方 名	構 成 藥 物	頻度
1	防風通聖散加味	滑石, 甘草, 石古, 黃芩, 桔梗, 防風, 川芎, 當歸, 赤芍藥, 大黃, 麻黃, 薄荷, 連交, 芒硝, 荆芥, 白朮, 梔子, 三稜, 海藻 ⁸⁾¹³⁾²⁴⁾³⁰⁾³³⁾³⁵⁾³⁶⁾³⁷⁾³⁸⁾⁴⁰⁾⁴⁴⁾⁴⁵⁾	12
2	辛荑清肺飲	辛荑, 黃芩, 梔子, 麥門冬, 百合, 知母, 石古, 升麻, 甘草, 枇杷葉 ³⁾⁹⁾¹⁷⁾¹⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³³⁾³⁴⁾³⁸⁾⁴³⁾	10
3	星 夏 散	南星, 半夏, 蒼朮, 神曲, 細辛, 白芷, 甘草, 酒灼, 芩連 ⁸⁾¹⁰⁾¹²⁾¹⁶⁾³⁰⁾³⁷⁾⁴⁰⁾⁴⁴⁾	8
4	羊 肺 散	羊肺, 白朮, 肉苁蓉, 木通, 乾干, 川芎 ⁸⁾¹⁰⁾¹⁶⁾²³⁾²⁶⁾³⁰⁾³⁴⁾³⁷⁾	8
5	瀉 白 散	桑白皮, 地骨皮, 甘草 ⁸⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾³⁰⁾³⁷⁾⁴⁰⁾	7
6	勝 濕 湯	白朮, 人蔘, 乾干, 白芍藥, 附子, 桂枝, 白茯苓, 甘草 ⁸⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾³⁰⁾³⁷⁾	6
7	單 蒼 耳 葉 丸	蒼耳葉 ¹³⁾²⁴⁾³⁷⁾⁴⁰⁾	4
8	辛 荑 散	辛荑, 細辛, 川芎, 防風, 古本, 升麻, 白芷 ⁷⁾²⁴⁾³⁸⁾	3
9	辛荑清肺飲加減	辛荑花, 冬桑葉, 野菊花, 黃芩, 梔子, 甘草, 生石古, 三稜, 海藻, 玄參 ³⁶⁾⁴²⁾	2
10	補 中 益 氣 湯	黃芪, 人蔘, 白朮, 甘草, 當歸身, 陳皮, 升麻, 柴胡 ³⁴⁾³⁸⁾	2

No.	原 因	頻度
4	厚味壅滯 濕熱蒸於肺門 ⁸⁾¹¹⁾¹²⁾³⁵⁾³⁷⁾ 膏梁積熱 濕蒸肺門 ¹⁰⁾ 胃經積熱上壅 薰灼鼻竅 ⁴²⁾	7
5	冷搏於血氣 停結鼻內 ¹⁾²²⁾	2
6	陽明熱滯留結而然 ²⁾	1
7	肺氣盛 ¹⁶⁾	1
8	風熱犯肺 肺夫宣通 邪留不去 郁而化火 ⁴²⁾	1
9	肺經受毒氣 ²⁶⁾	1
10	六氣七情 所感而生 ⁴⁾	1
11	上焦積熱 鬱塞已久而生 ⁶⁾	1
12	肺經之邪 壅滯 ⁵⁾	1

No	處方名	構成藥物	頻度
11	黃芩湯	黃芩, 梔子, 桔梗, 赤芍藥, 桑白皮, 麥門冬, 荆芥, 薄荷, 連交, 甘草 ³⁴⁾⁴⁴⁾	2
12	加味瀉白湯	桑白皮, 地骨皮, 白朮, 知母, 貝母, 桔梗, 梔子 麥門冬 生地黃, 人蔘, 白芍藥, 白茯苓, 陳皮, 甘草 ³⁵⁾	1
13	分消湯	黃芩, 炙甘草, 青黛, 桔梗, 天花粉, 麥門冬, 天門冬, 連交, 苦丁香 ³⁶⁾	1
14	葛根湯加味	葛根, 麻黃, 桂枝, 芍藥, 川芎, 黃芩, 桔梗, 辛荑, 石古, 甘草 ³⁸⁾	1
15	加味逍遙散	柴胡, 當歸, 白朮, 陳皮, 甘草, 黃芩, 茯苓, 白芍藥, 白芷, 桔梗, 半夏 ³⁸⁾	1
16	鬱金散	鬱金, 白芷, 細辛 ³⁸⁾	1
17	荆芥連交湯	荆芥, 連交, 防風, 當歸, 川芎, 白芍藥, 柴胡, 黃芩, 只角, 梔子, 白芷, 桔梗, 甘草 ³⁸⁾	1
18	加味麗通湯	黃芪, 蒼朮, 羌活, 獨活, 防風, 升麻, 乾葛, 辛荑, 薄荷, 荆芥, 黃芩, 甘草, 麻黃, 川芎, 白芷 ⁴⁰⁾	1
19	辛荑湯	黃芩, 辛荑, 梔子, 桔梗, 赤芍藥, 桑白皮, 麥門冬, 荆芥, 薄荷, 連交, 甘草 ⁴⁰⁾	1
20	加味瀉白散	桑白皮, 地骨皮, 甘草, 黃芩, 薄荷, 桔梗, 梔子, 川芎, 白芷, 辛荑 ⁴⁰⁾	1
21	清涕飲	白茯苓, 桔梗, 梔子, 黃芩, 辛荑, 白芷, 木通, 升麻, 柴胡, 防風, 蒼朮, 薄荷 ⁴⁰⁾	1
22	黃芩清肺飲	天花粉, 川芎, 當歸, 赤芍藥, 生地黃, 防風, 葛根, 連交, 紅花, 黃芩, 薄荷 ³⁶⁾	1

3. 外用藥

Table III.

No	處方名	構成藥物	頻度
1	瓜礬散	瓜蒂, 甘遂, 枯礬, 螺殼灰, 草烏灰 ⁸⁾¹²⁾¹³⁾¹⁶⁾¹⁹⁾²⁴⁾²⁹⁾³⁰⁾³⁴⁾³⁵⁾³⁷⁾⁴⁰⁾⁴²⁾⁴⁴⁾	14
2	瓜丁散	瓜蒂, 細辛 ²⁾⁸⁾¹⁰⁾¹⁶⁾²⁰⁾²²⁾²³⁾²⁷⁾³⁰⁾³³⁾³⁶⁾³⁷⁾³⁸⁾³⁹⁾	14
3	白礬散	白礬 礬砂 ⁸⁾¹⁰⁾¹¹⁾¹²⁾²⁷⁾³⁰⁾³²⁾³⁶⁾³⁷⁾³⁸⁾⁴⁰⁾	11
4	礬砂散	礬砂, 輕粉, 雄黃, 水片 ³⁾⁹⁾¹⁷⁾¹⁸⁾²⁸⁾²⁹⁾³⁰⁾³³⁾³⁶⁾	9

No	處	方	名	構	成	藥	物	頻	度
5	白	黃	散	白礬, 雄黃, 細辛, 瓜蒂, 雄犬胆汁	2)8)10)23)30)37)39)44)			8	
6	外	用	方	枯礬, 生豬油	2)19)22)26)29)38)39)43)			8	
7	辛	莢	膏	辛莢, 細辛, 木通, 木香, 白芷, 杏仁, 羊髓, 豬脂, 龍腦, 麝香	8)10)16)30)36)37)40)			7	
8	外	用	方	生稠節連實	11)18)19)27)29)38)39)			7	
9	輕	粉	方	輕粉, 杏仁, 白礬	15)19)27)29)30)38)			6	
10	外	用	方	明礬, 蓖麻仁, 監梅肉, 麝香	10)23)26)27)28)29)			6	
11	冰	片	方	冰片	17)18)29)30)36)38)			6	
12	外	用	方	白礬, 細辛, 白芷	10)13)14)16)24)			5	
13	輕	黃	散	輕粉, 杏仁, 雄黃, 麝香	2)10)16)36)			4	
14	地	龍	散	地龍, 豬牙皂角	10)22)23)26)			4	
15	外	用	方	雄黃	29)36)38)39)			4	
16	雄	黃	散	雄黃, 瓜蒂, 綠礬, 麝香	2)10)23)			3	
17	外	用	方	苦丁香, 甘遂, 青黛, 草烏灰, 枯白礬	10)23)29)			3	
18	外	用	方	甘遂, 朱砂, 雄黃, 雌黃, 藜蘆, 瓜蒂, 明礬	10)23)29)			3	
19	外	用	方	狗頭骨燒灰, 硫砂	21)26)27)			3	
20	外	用	方	灸獾皮	22)26)38)			3	
21	外	用	方	甘草	29)30)38)			3	
22	外	用	方	瓜蒂	26)27)47)			3	
23	二	丁	散	苦丁香, 丁香, 粟米, 赤小豆, 石古	10)23)			2	
24	明	礬	方	明礬, 甘遂, 白降丹, 明雄黃	18)29)			2	
25	外	用	方	辛莢, 細辛, 杏仁, 羊髓, 豬脂, 雄黃, 白礬, 輕粉, 麝香	13)24)			2	
26	外	用	方	生地胆汁, 細辛, 白芷	26)38)			2	
27	外	用	方	青瓜蒂, 雄黃, 麝香	26)38)			2	
28	外	用	方	藜蘆, 雄黃	26)38)			2	
29	外	用	方	細辛	26)31)			2	
30	外	用	方	瓜蒂, 白礬	25)30)			2	
31	外	用	方	黑牛耳垢	29)36)			2	
32	外	用	方	黃連, 白疾呂	29)36)			2	
33	通	草	膏	通草, 附子, 細辛	10)			1	
34	外	用	方	巴豆, 湯起石, 石蓮心	15)			1	
35	外	用	方	麝香, 巴豆, 丁香, 白丁香	16)			1	

No	處方名	構成藥物	頻度
36	外用方	苦丁香, 赤小豆, 丁香 ¹⁶⁾	1
37	外用方	礞砂 ²⁶⁾	1
38	外用方	青蒿, 石灰 ²⁶⁾	1
39	外用方	苦壺盧子, 苦丁香, 麝香 ²⁶⁾	1
40	外用方	瓜蒂, 丁香, 黍米 ²⁶⁾	1
41	外用方	丁香 ²⁶⁾	1
42	外用方	片腦 ²⁶⁾	1
43	外用方	地胆汁 ²⁶⁾	1
44	外用方	雄鷄腎 ²⁹⁾	1
45	外用方	細辛, 葶塵, 松蘿, 白礬 ²⁹⁾	1
46	外用方	枯礬, 烏梅炭, 冰片 ³⁰⁾	1
47	外用方	枯白礬, 蓖麻子 麝香 ³¹⁾	1
48	外用方	梁上塵, 石雄黃 ³¹⁾	1
49	外用方	白砒, 蜜陀僧, 白礬, 苦丁香, 麝香, 礞砂 ¹⁷⁾	1
50	外用方	生朮, 雄黃, 冰片 ⁴¹⁾	1
51	外用方	通草, 白礬, 眞珠 ³⁸⁾	1
52	外用方	白礬, 藜蘆, 瓜蒂, 附子 ³⁸⁾	1
53	外用方	細辛, 附子, 甘遂, 通草, 乾干, 吳茱萸, 桂心 ³⁸⁾	1
54	外用方	胡菜 ³⁸⁾	1

4. 外用藥中 構成藥物之 頻度

Table IV.

No	構成藥物	頻度	No	構成藥物	頻度
1	枯白礬	18	10	杏仁	4
2	瓜蒂	15	11	礞砂	3
3	雄黃	12	12	白芷	3
4	細辛	10	13	藜蘆	3
5	麝香	9	14	附子	3
6	甘遂	5	15	通草	3
7	龍腦	5	16	猪油	3
8	丁香	5	17	礞砂	2
9	輕粉	4	18	辛黃	2

No	構成藥物	頻度	No	構成藥物	頻度
19	草烏	2	30	雄犬胆汁	1
20	地胆	2	31	栗米	1
21	赤小豆	2	32	石古	1
22	蓖麻仁	2	33	地龍	1
23	巴豆	2	34	猪牙皂角	1
24	羊髓	2	35	綠礬	1
25	監梅	2	36	青黛	1
26	螺殼	1	37	朱砂	1
27	樛節	1	38	雌黃	1
28	木通	1	39	陽起石	1
29	木香	1	40	石蓮心	1

No.	構成藥物	頻度	No.	構成藥物	頻度
41	蠟 梢	1	54	青 蒿	1
42	白 丁香	1	55	石 灰	1
43	白 降 丹	1	56	苦 壺 盧 子	1
44	白 砒	1	57	黍 禾	1
45	蜜 陀 僧	1	58	片 腦	1
46	狗 頭 骨	1	59	黑 牛 耳 垢	1
47	眞 珠	1	60	雄 鷄 腎	1
48	狷 皮	1	61	黃 連	1
49	乾 干	1	62	白 疾 呂	1
50	吳 茱 萸	1	63	葶 塵	1
51	桂 心	1	64	松 蘿	1
52	胡 菜	1	65	梁 上 塵	1
53	甘 草	1			

IV. 總括 및 考察

內經에서는 西方白色 入通於肺 開竅於鼻라 하였고⁵⁰⁾ 또한 肺氣通於鼻 肺和則鼻能知香臭矣 故肺主開竅在鼻라 하여⁵¹⁾ 鼻를 肺와 밀접하게 연관시켰다.

鼻痔의 原因을 살펴보면 巢¹⁾는 肺於通於鼻 한데 肺臟이 風冷에 傷한 則 鼻氣不和하여 津液이 壅塞되면 鼻鼈이 된다 하였고, 冷搏於血氣하여 停結鼻內故로 變生息肉한다 하였다. 이는 鼻痔가 外感風冷에 依하여 鼻內의 血氣가 凝滯하여 形成된다고 보았음을 알 수 있다.

張²⁾은 鼻痔는 陽明熱이 結滯하여 形成된다고 보았고, 竇⁴⁾는 鼻孔은 肺之竅로서 其氣上通於腦하고, 下行於肺하는데, 만약 肺氣清하여 氣血流通하면 百病이 不生하고, 肺氣盛하여 阻滯하게 되면 諸病이 發生하게 되는데, 鼻痔는 六氣七情所感으로 發生한다고 하였다.

朱¹⁵⁾는 肺氣盛하여 鼻鼈息肉이 形成된다고

하였고, 吳⁷⁾는 鼻는 氣之竅인데 氣清則 鼻清하고 氣熱則鼻塞하며 熱盛則塞甚하여 瘰肉이 發生한다고 하여 鼻痔의 原因을 肺熱盛으로 보았다.

方¹⁴⁾은 丹溪의 說을 引用하여 瘰肉은 胃中 有食積하고 熱痰流注로 因하여 發生한다고 하였는데, 이후로 많은 醫家⁸⁾¹⁰⁾¹²⁾¹⁶⁾²¹⁾²⁴⁾⁴⁰⁾들이 이 說을 그대로 踏襲하였다.

陳³⁾은 肺氣不清하여 風濕鬱滯로 形成된다고 하였고, 徐⁵⁾는 肺氣通於鼻하고 清氣出入之道인데 肺臟熱邪壅滯하여 上焦鬱結하고 伏留不散하면 鼻痛之患이 생긴다고 하였다.

張⁶⁾은 瘰肉은 上焦積熱하여 鬱塞已久而生한다고 하였고, 吳⁹⁾等¹⁷⁾¹⁸⁾은 肺經風濕熱이 鬱滯하여 形成된다고 하였으며, 陳²⁸⁾은 肺經 受毒氣하여 不能消하고 濕熱壅滯而生한다고 하였다.

李¹³⁾는 肺氣熱極하여 日久凝濁하면 結成息肉하고 또한 食積熱痰으로 生痔한다고 하여 原因을 肺熱과 食積으로 보았는데 蔡²⁰⁾ 許³⁰⁾ 康⁴⁰⁾ 李²⁵⁾ 등이 이 說을 引用하였다.

龔¹¹⁾等⁸⁾¹⁰⁾¹²⁾은 厚味가 壅滯하고 濕熱이 肺門을 熏蒸하면 鼻痔가 發生하는데, 이것은 마치 비가 개인 땅에 突然 芝菌이 나는 것과 같다고 하였다.

以上 等の 文獻에서 鼻痔가 原因을 조사한 바에 依하면, Table I과 같이 胃中食積 熱痰流注가 13회로 가장 많았고, 肺經風濕熱鬱滯가 11회, 肺熱이 10회 厚味壅滯 濕熱蒸於肺門이 7회의 順으로 나타났다. 이것으로 미루어 보아 鼻痔는 주로 陽明經과 肺經의 風濕熱이 鬱滯하여 發生된다고 思料된다.

鼻痔에 使用된 處方을 內服藥과 外用藥을 구분하여 보았던바, 內服藥은 Table II와 같이 總 22種으로 防風通聖散加味가 12회로 가

장 많았고, 辛黃清肺散이 10회, 星夏散과 羊肺散이 각각 8회의 順으로 나타났다.

外用藥은 總 54種으로, Table III과 같이 瓜瓣散과 瓜丁散이 總 14회로 가장 많았고, 白礬散이 11회 磁砂散이 9회, 白黃散과 枯白礬末方に 각각 8회의 順으로 나타났다.

外用藥中 構成藥物에 對한 頻度數를 調査하여 보았을때, Table IV와 같이 枯白礬이 18회로 가장 많았는데, 枯白礬은 細胞内の 水分을 吸收하여 脫水 收縮을 일으킴으로써 腺의 分泌를 減少케 하고 痰症으로 인한 浸出物을 減少시키므로써 補炎作用과 收斂 燥濕의 效能을 나타내게 때문에 多用되었다고 생각된다.

瓜瓣는 15회로써, 吐劑의 主藥인데, 外用하면 患處를 식게 하기 때문에 使用되었다고 생각된다.

雄黃은 12회로써, 腐肉을 除去하는 效能이 있고, 驅蟲 解毒하는 功效가 있어 使用되었다고 생각된다.

細辛은 10회, 麝香은 9회로써 비교적 頻用되었는데, 둘 다 辛香한 氣味로써, 瘡癤 疔毒을 腫게할 用藥으로 使用되었다고 생각된다.

이 밖에, 甘蔗, 龍腦, 丁香, 輕粉, 杏仁, 砂, 白芷 등의 辛香한 藥物과 玄癩生新라는 效能을 가진 藥物이 비교적 頻用되었다는 것을 알 수 있다.

V. 結 論

以上과 같이 瘡癤의 原因과 治方에 對하여 調査 整理하였던 바 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 原因으로서는 胃中食積 熱痰流注가 13회로 가장 많았고, 肺經風濕熱鬱滯가 11회, 肺熱이 10회, 厚味滯滯 濕熱蒸於肺門이 7회의

順으로 나타났다.

2. 內服藥은 防風通聖散 加味가 12회로 가장 높은 頻度를 나타냈으며, 辛黃清肺散이 10회, 星夏散과 羊肺散이 각각 8회의 順으로 나타났다.

3. 外用藥은 瓜瓣散과 瓜丁散이 14회로 가장 頻用되었고, 白礬散이 11회, 磁砂散이 9회, 白黃散이 8회의 順으로 나타났다.

4. 外用藥中 構成藥物의 頻度數는 枯白礬이 18회, 瓜瓣가 15회, 雄黃이 12회, 細辛 10회, 麝香이 9회의 順으로 나타났다.

參 考 文 獻

1. 巢元方: 諸病源候論, 臺北, 集文書局, 1965, p.281.
2. 張介賓: 景岳全書, 서울, 翰成社, 1983, p.515, p.1318.
3. 陳實功: 外科正宗(醫部全錄中), 臺北, 新文豐出版公司 6卷 p.644.
4. 賈漢鄰: 瘡癤全書(醫部全錄中), 臺北, 新文豐出版公司 6卷, p.628.
5. 徐春甫: 古今醫統(醫部全錄中), 臺北, 新文豐出版公司 6卷, p.632.
6. 張三錫: 醫學準繩六要(醫部全錄中), 臺北, 新文豐出版公司 6卷, p.641.
7. 吳 嘔: 醫方考(醫部全錄中), 臺北, 新文豐出版公司 6卷, pp.644~645.
8. 許 棡: 東醫實錄, 서울, 南山堂, p.239.
9. 吳 謙: 醫宗全錄, 北京, 人民衛生出版社, 1982, 下 p.180.
10. 王肯堂: 證治準繩, 臺北, 新文豐出版公司, 1968, 雜病 p.528, 類方 pp.695~697.
11. 魏廷賢: 壽世保元, 臺北, 宏業書局有限公司, 1975, p.406.

12. 林珮琴：類證治裁，臺北，旋風出版社，1967，p.386.
13. 李 樞：醫學入門，서울，南山堂，1985，p.1441，p.1928.
14. 方 廣：丹溪心法附餘，서울，大星文化社，1982，p.488.
15. 朱丹溪：脈因證治，서울，東南出版社，1985，p.151.
16. 樓全善：醫學綱目，臺南，北一出版社，1962 3卷 p.39，p.41.
17. 祁 坤：外科大成，臺北，文光圖書有限公司，1968，p.234.
18. 陸青節：萬病醫藥顧問，臺北，大中國圖書公司，1976 外科 p.47.
19. 鮑相璈：驗方新編，臺北，大中國圖書公司，1973，p.17.
20. 魏之秀：名醫類案，臺北，廣福彩色印刷有限公司，1968，p.422.
21. 李用粹：證治彙補，서울，萬葉出版社，1983，p.246.
22. 平原宗軒：鄉藥集成方 京成 漢成圖書株式會社，pp.249~250.
23. 方 賢：奇效良方，香港，商務印書館，1977，p.1235.
24. 蔡陸仙：中國醫藥匯海，서울，成輔社 十卷 1978，p.443，p.451.
25. 李圭峻：密鑑重磨，서울，卷4 p.10.
26. 陝西省中醫藥研究院：本草綱目附方分類，서울，醫聖堂，pp.615~616.
27. 金在誠：五峰青史訣，大邱，大邱韓方研究會，pp.53~54.
28. 陳士鐸：外科秘錄，서울，醫聖堂，1987 卷十，pp.4~5.
29. 謝 顧：東洋醫學大辭典，서울，高文社，1987，p.974.
30. 蔡炳允：한방안이비인후과학，서울，경희대학교 한의과대학 外官科學教室，1981，p.339.
31. 天德山人：四象金匱秘方，서울，杏林書院，1975，p.37.
32. 李常和：韓方醫學指南，서울，翰林社，1974，p.362.
33. 金定濟：診療要鑑，서울，東洋醫學研究院，1974，p.339.
34. 朴炳昆：韓方臨床40年 서울，大光文化社，1979，p.376.
35. 蔡仁植：韓方臨床學，서울，大星文化社，1987，p.337.
36. 李珪璜：韓方秘錄，서울，성진출판사，1983，pp.369~371.
37. 孟華燮：方藥指針，서울，南山堂，1983，pp.417~418.
38. 何東燦：中醫耳鼻喉科學，臺北，正中書局，1973，pp.218~226.
39. 南采祐：青史訣，서울，癸丑文化社，1973，p.40，p.774.
40. 康命吉：濟衆新編，서울，杏林書院，1982，p.125.
41. 馬康慈：中醫師臨床手冊，衆文圖書公司，p.681.
42. 上海中醫學院：五管科學，香港，商務印書館，1977，p.99.
43. 金定濟，金賢濟：東醫臨床要賢，서울，書苑堂，1981，p.261.
44. 趙世衡：東醫 세 臨床處方集，서울，三醫社，1977，pp.188~190.
45. 裴元植：最新 韓方臨床學，서울，南山堂，1982，p.678.
46. 金賢濟，洪元植：韓醫學師典，서울，成輔社，1983，p.576.

47. 尹吉榮：東醫臨床方劑學，서울，明寶出版社，
1985，p.416.
48. 白萬基：最新耳鼻咽喉科學，서울，一潮閣，
1988，p.196.
49. 李尙仁外：韓藥臨床應用，서울，成輔社，
1982，pp.558～559.
50. 洪元植：精校 黃帝內經素問，서울，東洋醫
學研究院，p.21.
51. 張馬合註：黃帝內經（醫部全錄中）臺北，
新文豐出版公司 6卷 pp.621～622.