傘下支部動靜

▲中央本部

3月31日 1990년도 제21차 정기총회 개최 : 대의원 112名 참석

• 기간중 공로자 12명에 대한 시상

※표창자 명단 : 전북도지부장 이화익, 강원도원주시소장 황인구, 경기도포천군소장 이인기, 충북도단양군소장 장기홍, 충남도청양군소장 조병석, 전남도보성군소장 정형모, 전남도순주군소장 라한주, 경북도영주시소장 류복규, 경남도사천군소장 강명기 제주도북제주군소장 강경유, 부산시동래구출장소장 정삼조, 대구시공판장장 노갑용.

※세부상황 : 1면참조



◇제 21 차 총회시 시상광경

• 會員면접 및 상담계획 : 제3차 各所長 면접 및 상담계획을 5月중순부터실시할 예정으로 있사오니別途示達할 公文上 시간계획표에 의곡 차질없이 협조하여 주실것을 當府.

• 合同廣告계획 : 本會기본일부 및 各級사무소의 주소, 전화번호, 성명 (광고희망소장) 등을 게재하여 널리 홍보코저 하오니 지역업무에 필요한 희망자는개별적으로 서신 또는 전통상으로 신청하여 주시기바람. (지부장의 종합 신청도 가용함)

• 生藥栽培교재 보완제작계획 : 5月中 作業完了코비치할 예정이오니 心要하신 각급 所長 및 會員은 소요부수를 직접 신청하시기 바람.

▲江原道支部록생회

지난 3月31日 本部總會이후 도록생회장 (원주시소장 환인구) 主管으로 서울에서 개최

▲慶南道支部록생회

3月31日 本部 총회이후 도록생회장 (합양군소장 김창한) 主管으로 서울에서개최

▲慶北道支部록생회

지난 3月24日 道支部(支部長 안승관) 主管으로 영주시에서 개최

▲釜山市支部록생회

지난 4月10日 市支部(支部長 朴吉夫) 主管으로 月例록생회 개최

人事發令

• 경기도 支部長에 李雄滉(현여주군소장) 90·3·20日付 任命

• 전남도 支部長에 朴商泰(현고흥군소장) 90·3·26日付 任命

〈독자투고 1〉

사라진 컴프리

안양시소장 이 봉 선

영약처럼 알려졌다가 사라진 「컴푸리」는 한때 국내에서 떠들석 붐을 이루영초인데 웬일인지 갑자기그 붐은 사라지고 이제 겨우 일부지방에서 그 명맥을 간신히 이어갈뿐 「채소의 왕」으로 꼽혔던 영초로서는 쳐다보지도 않는다. 컴푸리 라는 이름의뜻은 「상한 것을 다스린다」는 의미라고 한다. 또 프랑스에서는 「병을 다스린다」라는 의미라고 한다.

그 이름에서 밝힌대로이 풀의 약효를 연상할수 있다. 영국 사람들은 이 컴푸리를 「기적의 풀」이라고 한다. 원래 컴푸리는 소련 코카사스 지방이 원산지로서 이것을 영국이 가져와 개량시킨 작물이라 한다.

높이 1·5m에 달하는다년생으로서 열른 보기에큰 잎이 담배잎과 매우 비슷하며 성숙한 잎은 크기가 70~90cm까지 되는것도 있다. 어떤 땅에서나 잘자라는 것이 특징중에 하나이다.

5~7월경까지 개화기는 유달리 길며 종자는 거의 결실하지 않으므로 주로뿌리에 의해 증식된다. 성장이 빠르고 환경에 순응성이 강하며 한대에서 아열대까지 재배하며 보통2~3년이면 완전 성숙한다. 컴푸리의 종류는 약10여종에 달하며 지중해 연안에서부터 유럽을 지나 코카사스지방, 서시베리아에 이르기까지 분포하고 있다고 한다. 유럽에서는 컴푸리를 「채소의왕」으로 존경을받으며 상용되고 있다. 컴푸리의 성분 자료에 의하면 100g당 수분90%, 단백질2·6%, 지질0·4%, 당질3·4%, 섬유1·6%, 회분1·8%, 칼슘208mg, 나트륨19mg, 인40mg, 비타민B1 0·07mg%, B2는 2·20mg%, C는 60mg%로 나와 있다.

컴푸리가 이상적인 조혈제라 하는것은 그 성분에서 말해주고 있다. 특이한 것은 코카사스 지방주민의 평균 수명이 130세라고 하는데 다름아닌 이 컴푸리 소채를 상식하고 있었기 때문이라고 알려져 있다. 소채 중에서 컴푸리의 영양가가 최고라는 이유는 비타민 B1, B2, B3, C와함께 미네럴등의 영양소가담뿍 들어있기 때문이다. 일본의 「오야스키」라 하는박씨 꼿꼿이 심고 苗頭가 나 또는 모종삽, 꼬창이로 구멍을 파고 한 개씩 심지만 이것만으로는 충분한 소생할수 없을까.

「채소의왕」이라는 이름에 걸맞게 컴푸리가 재배하며 가공으로 분말하여 상복하면 확실한 효과가 있다고 하였으며 또 컴푸리는 잎 보다도 뿌리에 비타민 B1, B2와 칼슘의 함유량이 더 많고 켈마튬등의 미네럴도 들어있는 것이 특징으로한국의 인삼성분과 흡사하다고 지적한바 있다. 이처럼 영양가가 높은 컴푸리가우리나라에서 자취를 감춘이유는 부엇때문일까? 혹시 녹용 때문인가, 아니면 더 좋은 약초가 있는지 모르지만 이 좋다고 하는 영초를 소생할수 없을까.

〈전호에서 계속〉

일당귀(日當歸)

⑤定植

본밭에 定植할 時期는 3월 하순~4월 중순사이에 싹이 2~3개 나왔을 때 실시만 될 수 있으면 일찍 실시하는 것이좋다. 밭은 깊고 갈고1 20~150cm의 두둑을 짓고 이랑 사이 45cm, 포기 사이 18~20cm 간격으로 깊은 골을 치고 •45로 되게 눕혀 심거나 또는 모종삽, 꼬창이로 구멍을 파고 한 개씩 꼿꼿이 심고 苗頭가 1~2cm 나오게 흙을 덮고 손으로 가볍게 눌러 주고 뿌리주위에 흙으로 북돋아주어 乾燥를 막는다. 심은 뒤에는 될 수 있으면乾草나 짚등을 깔아 주는 것이 좋다.

⑥肥培管理

定植 후에는 수시로中耕除草를 하고 꽃대가 올라오면 꺾어 버린다. 웃거름은 生育狀態를 봐서 줄 것이며 生育初期에는 별로 施肥할 것없지만 7~8월경에 많이 주는 것이 좋다. 그러나 害虫으로서는 진딧물, 야도충, 心喰虫, 붉은 응애등의 피해가 있다.

야도충과 심식충은 잡아 죽이고 진딧물은 황산니코틴 800배 액에 농용비누를 加用하여 뿌리거나 다이아지논 800배 액을 뿌려 준다.

특히 주의할 것은 地方에 따라 한발기에 들어서 붉은 응애의 피해를 입기 쉽다. 처음은아주 작은 害虫이 되어잘 눈에 보이지 않지만 어느덧 잎을 해쳐 버린다.



응 애

수시로 주의하여 살펴보고 發生初期에 驅除는 fenitrothion, diazinon, kelthane 등을 800배 액으로 뿌려주되 噴霧器의 壓力이 강한 것이라야효과가 있다.

⑦病虫害

病虫害로서 주로 苗頭에 菌核病이 발생하는데 건조가 심했다가 비가많이 내리고 排水가 되지 않을 때 발생한다. 병에 결린 포기는 발견하는데로 뽑아서 태워 버리고 그 구덩이에는 草木灰, 황가루 및 세레산 석회 등을 뿌려서 소독을 한다.

害虫으로서는 진딧물, 야도충, 心喰虫, 붉은 응애등의 피해가 있다.

야도충과 심식충은 잡아 죽이고 진딧물은 황산니코틴 800배 액에 농용비누를 加用하여 뿌

3、收穫·調製

定植한 그해 늦가을 11월경에 莖葉이 노랗게변하였을 때 뿌리가 상하지 않게 캐어 흙을 털고 몇 그루씩 새끼로엮어서 비나 이슬이 맞지 않는 곳에 매달아 말린다. 다소 乾燥하면 꺼내어 45℃의 물에 담구었다가 흙을 깨끗이 씻어내고 2~3그루씩 널판자 위에다 굴려서 뿌리의 형체를 조성한 다음 다시 60℃의 따뜻한 물에 5~6분간 담구었다가 끄내어 엮어서 앞서와 같이 말린다. 충분히 건조하게 되면 잎줄기 1·5~1·8cm 쯤 남기고 잘라 버린다.

收量은 生根으로 10a 당 800~1200kg, 乾劑로서 200~280kg 내외이다.

싹 오려내기한 것은 400kg를 얻을 수 있다. 우량품은 뿌리 몸이 크고 굵은 뿌리가 많으며 결하여 肉質은 黃白色으로서 外面은 약간 붉은색을 띠고 香氣가 있어야 한다.

系統出荷는 協會 中央共販場으로…



견 본



포장진열

공판장 사무실