

子宮筋腫의 治驗

—白鳳丸·白鳳丹·烏骨鷄丸劑 投與—

鄭 奉 天*

I. 結 論

子宮筋腫(內至子宮腺筋症)은 性成熟期婦人에 好發하며 不妊을 隨伴하는 경우가 많다.

子宮에 發生하는 良性腫瘍으로서 子宮筋腫은 生殖年齡의 20~25%, 病理解剖例의 50%, 全摘子宮의 42%가 認知되며 發生頻도가 높다.¹⁶⁾

本疾患은 渦卷모양 같은 平滑筋線維와 線維性間質部에 增殖하는 組織의 特徵이 있는데 다시 말하면 平滑筋細胞線維性間質部의 히아린物質로 構成되어 있어 各部分의 比率은 症例에 따라 또는 同一症例에 依해서도 變化가 極甚하다.¹⁶⁾

治療는 年齡 生産希望에 따라 保全的 療法와 單純子宮全摘術로 選擇하나 지금까지는 保全的 療法은 一時的인 것이며 再發率이 높으므로 安全治療를 要求하는 경우는 最終的으로는 子宮全摘術하나 一般的으로 無症狀으로 經過하거나 出産을 希望하는 경우와 內診(觸診)으로 鷄卵大以下인 경우 保全的療法(藥物療法)으로 治療에 臨하는 경우가 많다.

子宮筋腫에 關한 韓方醫學의 治療方劑에 對한 文獻을 調査한 結果 別添分型論治表와 方劑一覽表 및 全症例에 使用된 生藥의 統計分類表가 있었으나 中國(香港)等地에서 널리 使用되고 있으나 上記 別添表에 白鳳丸¹⁷⁾에 關한 記載가 없으며 桂枝茯苓丸¹⁸⁾ 등을 投與하여 治驗例(2例)가 發表된 바는 있으나 白鳳丸의 試驗例가 없는 東洋醫學誌 Vol-10 No.5, Vol-14 No.3에 白鳳丸을 投與하여 子宮筋腫을 治驗한 事例가 報告된바 있어 이를 追試하여 得한 治驗成績과 또 白鳳丸과 方劑藥味內容이 類似한 白鳳丹⁷⁾, 烏骨鷄丸⁸⁾註¹⁾을 并合投與하여 子宮筋腫이 治療되 症例

* 大田大學校 韓醫科大學

1) 濟陰綱目の 烏鷄煎丸과는 內容相異

烏雄鷄 烏藥 蛇床 丹皮 人蔘 白朮 黃芪 蒼朮 海桐皮 肉桂 附子 白芍藥 川烏 紅花 陳皮 莪朮 木香 玄胡索 肉豆久 琥珀 草果 熟地黃 大城出版社 p.173.

를 文獻考察과 함께 報告하는 바이다.

II. 觀察基準 및 方劑內容

I. 子宮筋腫의 種類⁹⁾

① 發生部位에 依한 分類

- (ㄱ) 子宮體筋腫
- (ㄴ) 子宮體頸筋腫
- (ㄷ) 子宮體腔部筋腫

② 發育方向에 依한 分類

- (ㄱ) 漿膜下筋腫 :
 - 有莖筋腫
 - 靱帶內筋腫
- (ㄴ) 壁內筋腫
- (ㄷ) 粘膜下筋腫

II. 症 狀⁹⁾

① 月經異狀 및 不正子宮出血

② 貧 血

- | | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 基準 | { | (가) 血色素 11.5mg/dl까지 正常(11~7mg/dl) |
| | | (나) 赤血球 450萬常(400~230萬) |
| | | (다) 白血球 7,000正常 |

③ 壓迫症狀 疼痛

④ 不 妊

⑤ 續發變性を 伴合하는 症狀

- (ㄱ) 基念轉 또는 壞死를 일으키면 下腹部激痛 惡心 嘔吐
- (ㄴ) 細菌感染이 있으면 下腹痛 및 發熱
- (ㄷ) 肉腫變化 및 變性を 일으키면 腫瘤는 增大하고 下腹部 發熱을 일으킨다.

III. 診 斷⁹⁾

- ① 雙合診에 依하여 子宮의 不平(凸凹)의 增大(筋腫結筋의 觸知)와 筋腫特有的 彈性硬度的

觸知

② 影像診斷

IV. 資料(投與藥物)

① 白鳳丸¹⁷⁾→中國 北京 北京市中藥廠 製劑

藥効書 內容

(成分) 烏雞 生地黃 人蔘 香附 白芍 川芎 當歸 蜜丸

(功能) 補氣 養血 止帶

(主治) 氣血兩虛 身體衰弱 腰痠腿類 產後 體弱

(服法) 每次一丸 每日 三次服 早晚服 溫黃酒或白開水送下

(禁忌) 生冷 氣惱芳穢

② 白鳳丹¹⁷⁾(I)(II)

眞白雄雞²⁾를 黃芪 當歸 甘草(各 100g)粉으로 7日間 飼料로 飼育하고 皮를 홀리지 않고 죽여 毛와 腸은 除去하고 當歸 生地黃 山藥 鹿角霜 天門冬 人蔘 丹蔘 山茱萸 木瓜 黃連 知母 小茴香 麥門冬 牛膝 藜朮 柴胡 別甲 生甘草 各 100g을 酒에 混合하여 桑木으로 重湯 三日煎하여 日中에는 晒하고 夜間에 煎하여 蜜丸으로 使用 1日 15g 3回分
白鳳丹(II) 眞白雄雞 使用을 烏骨雞³⁾로 하고 餘他는 白鳳丹(I)과 同一.

③ 烏骨雞丸¹⁷⁾(I)(II)

白色雞(註)의 腹內에 五味子 熟地黃 各 100g 古酒와 童子便(小便)을 合煎하여 다시 黃芪 白朮 茯苓 當歸 白芍 牡丹皮 川芎 各 100g을 細末粉하여 再加하여 合煎하고 山藥粉 100g로 丸하여 1日 15g 3回 服藥한다.

烏骨雞丸(II) 白色雞 使用을 烏骨雞³⁾로 하고 餘他는 烏骨雞(I)과 같다.

III. 考 察

韓漢醫學에서 子宮筋腫을 癥瘕라 하며 下腹部에 女性生殖器系統에 腫瘍疾患에 該當되는 病症이 있으며 그중에서 石瘕는 子宮筋腫으로 取扱되고 있다.¹⁾


內經³⁾에서는 石瘕를 寒氣가 子門에 客하여 子門이 閉塞되면 胞中에 留積하여 發生하며 劉³⁾

2) 鷄는 補肝作用 있으며 衝脈이나 任脈을 滋養한다.

3) 烏骨雞는 益腎作用 있으며 衝脈이나 任脈을 滋養한다.

는 血이 不流하여 郁滯되면 血凝하며 李⁹⁾는 瘀血 食積 或은 郁怒로 因하며⁹⁾ 朱는 左側小腹에 癥瘕는 瘀血로 因하여 張⁴⁾은 瘀血留滯하여 作瘕한다. 瘀血이 主要 原因으로 作用함을 알 수 있다.

癥瘕의 一般의 治療는 有形의 病態로 血病에 屬하는 癥積은 化痰消積을 爲主로 한다.



上記 圖表와 같이 分型論治에 依하여 白鳳丸의 性味 및 効能構成은 다음 表와 같다.^{17) 18)}

〈表 I〉 白鳳丸 構成生藥

	出典	主作用	性味	歸經	藥効及び選用	備考
烏 鷄	神農本草	補 精	甘, 溫	脾, 胃	溫中益氣 崩漏帶下 補虛溫中 產後乳少 病後虛弱 虛勞	白毛雄鷄
生地黃	神農本草	清 熱 (涼血)	甘, 微苦, 寒	心, 肝, 腎	清熱滋陰 陰血陽亢 涼血止血 血虛化燥 生津止渴 心煩內熱 生津止渴 月經不順	熟地黃=養血 甘微溫, 心, 肝, 腎經, 補養肝腎之要藥
人 蔘	神農本草	補 氣	甘, 微苦, 微溫	脾, 肺	補氣救脫 血虛 補益脾肺 陰萎 生津止渴 腎虛陽萎 寧神益智 氣血津液 大補元氣 不足	治虛勞內傷之 第一要藥
香附子	名醫別錄	理 氣	辛, 微苦, 微甘, 平	肝, 三焦	理氣解鬱 月經不順 調經止痛 產科諸病	氣病之總司 婦科之主司
白芍藥	神農本草	養 血	苦, 酸, 微寒	肝, 脾	補血斂陰 月經不順 柔肝止痛 痛經崩漏 養陰平肝 瀉痢 瀉痢 四肢拘攣	諸痛之良藥
川 芎	神農本草	理 血	辛, 溫	肝, 膽, 心包	活血行氣 血行不暢 祛風止痛 月經不順 陰虛氣弱	婦科方中之常要藥
當 歸	神農本草	養 血	甘, 辛, 苦	心, 肝, 脾	補血調經 主治一切 活血止痛 血症 潤腸通便 血虛, 血滯	爲血病之要藥 婦科之良藥

蜂 蜜	神農本草	潤 下	甘, 平	肺, 脾, 大腸	緩急止痛 補養, 矯 潤腸通便 味, 滋補 潤肺止咳	滋補藥多用蜜丸
-----	------	-----	------	-------------	----------------------------------	---------

〈表 II〉 常用된 中成藥과 膏, 散劑

人蔘歸脾湯(55)	參苓白朮丸(5)	骨刺消痛液(2)	左 金 丸(1)
四物五子湯(43)	女 金 丹(5)	舒肝止痛丸(2)	濟 坤 丹(1)
六味地黃丸(39)	香砂養胃丸(5)	養血安神丸(2)	調胃疏肝丸(1)
閉 經 丸(36)	五子行宗丸(5)	歸 脾 丸(2)	桑 麻 丸(1)
盆 腔 炎 丸(18)	分清止淋丸(4)	附子理中丸(2)	防風通聖丸(1)
加味逍遙丸(22)	通經甘露丸(4)	荷 葉 丸(2)	抗 癌 乙 丸(1)
香桂胡珀散(22)	柏子養心丸(4)	當歸養血丸(2)	復方靈芝片(1)
天王補心丹(21)	板藍根沖劑(4)	天 麻 丸(2)	妙 靈 丹(1)
補中益氣丸(20)	痛 頭 散(4)	通宣理肺丸(2)	香 蓮 丸(1)
枸菊地黃丸(17)	刺 五 加 片(3)	舒筋活血片(2)	牛黃降壓丸(1)
得 生 丸(15)	芎藭上清丸(3)	舒 肝 丸(2)	復方降壓片(1)
艾附暖宮丸(14)	加味保和丸(3)	和 脾 散(2)	明目地黃丸(1)
胎量盤 片(14)	當 歸 片(3)	穿 心 蓮(2)	金 蓮 花 片(1)
補腎強身片(14)	功血Ⅱ號(3)	益 母 草 膏(2)	玉液金丹(1)
八珍益母丸(11)	復 春(3)	暖 臍 膏(2)	加味異功散(1)
千金止帶丸(11)	羚翹解毒片(3)	扶 正 膏(1)	致 寶 錠(1)
鳴鷄白鳳丸(9)	麥味地黃丸(3)	牛黃止清丸(1)	鬱香正氣丸(1)
人蔘養榮丸(9)	龍膽瀉肝丸(3)	五子仁丸(1)	紫 雪 丹(1)
益母草沖劑(9)	養血調經膏(3)	銀翹解毒丸(1)	清 音 丸(1)
雲 南 白 藥(9)	老 鶴 草 膏(3)	六 應 丸(1)	養陰清肺膏(1)
安坤贊育丸(8)	救 苦 金 丹(2)	元胡止痛片(1)	感 冒 沖 劑(1)
姜桂烏珀散(8)	功血Ⅰ號(2)	牡 荊 油(1)	養陰生肌散(1)
河車大造丸(7)	香砂六君子丸(2)	鐵 笛 丸(1)	速効感冒片(1)
七制香附丸(7)	六合定中丸(2)	杜 仲 片(1)	羅漢果菊花晶(1)
百 寶 丸(6)	麻仁滋脾丸(2)	舒 筋 丸(1)	復方薄荷油(1)
二 妙 丸(6)	五子補腎丸(2)	香蓮化滯丸(1)	三黃一椒膏(1)
八寶坤順丸(6)	二母寧嗽丸(2)	補風退赤丸(1)	阿皎補血膏(1)
異位痛經散(6)	橘 紅 丸(2)	調 肝 丸(1)	

※ 東直門病院, 婦產科外來 4個月間 延人員 約 2000人의 患者를 母集團으로 하고 處方된 實際回數를 () 內에 表示한다.

〈表 III〉 方劑一覽表

1. 血淨飲: 白朮 15 黃耆 30 龍骨 18 牡蠣 18 生地 12 海螺蛸 12 茜草 9 川斷 12(g)
2. 消癥丸(黑龍江中醫學院): 內容不詳
3. 小化堅湯: 夏枯草 15 皂刺 15 香附 9 炒蒲黃 6 昆布 6 海藻 6 艾炭 3 紅花 3
4. 二號消瘤片: 生水蛭 生黃耆 生三棱 莪朮 當歸 生桃仁 附片 醋制大黃 海藻 血竭

5. 外敷消痞膏：麝香 公丁香 阿魏 細辛 五靈脂 穿山甲 桃仁 制大黃
6. 經驗方：蜜虫 大風艾 鐵包金 穿破石 靈芝
7. 自拟消症湯：當歸 9 川芎 6 紫石英 12 澤蘭 6 桃仁 9 醋炒莪朮 6 炒五靈脂 9 炒蒲黃 9 制香附 9 延胡索 6 荔枝核 9 兩頭尖 4.5 熟大黃 4.5 乾姜 4.5
8. 揮氏丙種寶丹：白薇 60 澤蘭 45 白芷 30 當歸 24 卷柏 60 肉桂 45 藁本 45 川芎 21 生石膏 60 桃仁 45 麥冬 45 人蔘 30 炒出汗蜀椒 60 茯苓 45 橡皮 15 炒車前子 45 蒲黃 45 乾地黃 60 細辛 60 乾姜 60 遠志 45 赤石脂 21 紫石英 90 禹餘糧 45 生龍骨 45 炒蛇床子 21 覆盆子 30 庵闍子 60(各藥共研爲極細末 蜜丸如桐子大)
9. 宮癥湯(月經期間中^은 300% 三稜注射液^을 4cc, 每日筋注)：續斷·夏枯草·懷牛膝各 12 王不留行·三稜各 9 昆布 15 薏苡仁 30 當歸·炮山甲·桃仁·莪朮·香附各 12
氣虛一加黨蔘或太子蔘, 血虛一加鷄血藤 白芍, 脾虛一加白朮 茯苓, 肝腎陰虛一加枸杞 桑椹 旱蓮草
10. 血竭化症湯：(酒吞)血竭末 乾漆 制沒藥 五靈脂 穿山甲 桃仁 制大黃
11. 血竭消聚湯：(酒吞)血竭末 桂枝 茯苓 桃仁 澤蘭 葫蘆殼 車前子 枳實 草薹 砂仁
12. 桃紅四物湯加昆布 海藻 三稜 莪朮 上別甲 丹蔘 劉寄怒 別甲 青皮 荔枝核 橘核
少腹脹一加木香 香附, 腰脹痛一加烏藥 牛膝, 失血過多·心悸·氣短一加黨蔘 黃耆, 脈弦硬·頭昏眩一加夏枯草 石決明
13. 無名方：三稜·莪朮·桃仁·丹皮·丹蔘·赤芍·白芍·王不留行·失笑散各 9 香附 12 乳沒藥各 4.5 延胡索 15
14. 夏枯草膏：牡蠣 昆布 海藻 夏枯草 元蔘 半夏 陳皮 青皮 三稜 莪朮
15. 復方烏賊骨茜草湯：煨烏賊骨 15 茜草炭 15 地榆炭 15 樅木 15 蒲黃炭(包) 10 槐米炭 30 薺菜 30 馬齒莧 30 生甘草 5
氣虛一加黨蔘 12 黃耆 12, 血熱一加生地炭 20, 血瘀一加煨花蕊石 20
16. 止血方(化瘀生新引血歸經)：制軍炭 6 炙甘草 6 炒白芍 9 川斷 9 小蘗炭 9 焦白朮 9 炒黨蔘 12 狗脊 12 藕節 30
17. 攻補兼施：炒黨蔘 12 焦白朮 12 川斷 12 狗脊 12 穿山甲 12 制軍 9 炙鷄內金 9 赤白芍 9 檳榔 9 炙甘草 5
18. 三甲煎加味：生牡蠣 30 生別甲 15 生龜板 15 生地 15 白芍 9 丹皮 9 麥冬 12 貫衆 12 夏枯草 6
月經期間中一加三七 或雲南白藥
19. 生脈散：黨蔘 12 麥冬 9 五味子 6 生地 15 白芍 9 生龍骨 15 生牡蠣 15 玉竹 12 昆布 12
月經期間中一加三七 或雲南白藥
20. 見睨丸：附子 1~2 鬼箭羽 3 紫石英 4 澤瀉 3 肉桂 1分-1 延胡 3 木香 3 大黃 2 三稜 3 檳榔 3 水蛭 3 桃仁 3 血竭 1.5~3(錢)
21. 自己方：桂枝 制香附 枳實 莪朮 蜈蚣 焦山楂 白芥子 海藻 蜜虫 浙貝母 甘草
22. 自己方：白芷 蜈蚣 香附 莪朮 蜜虫 研末外敷(加麝香)
23. 香鬱方：香附 9 鬱金 9 小茴香 9 川楝子 9 吳萸 6 枳殼 6 蘇羅子 9 路路通 9 木香 9 烏藥 9 生甘草 45
24. 三稜煎加味：三稜 7 莪朮 9 青皮 9 制半夏 9 焦麥穿 9 延胡索 12 失笑散 12(包煎) 血竭末 3(吞)
25. 芋芳丸：內容不詳
26. 丹蔘四物湯：丹蔘 15 當歸 9 地黃 9 白芍 9 川芎 9 茜草 9 阿膠 12 劉寄怒 9 益母草 12

蒲黃炭 9 紫草根 15

月經量多一加赤石脂 30 棕桐炭 9 烏賊骨 9 煨牡蠣 50, 月經量多偏熱者加一炒貫仲 9 地榆炭 9, 月經量多偏寒者加一炭姜 6 艾葉炭 9, 心慌氣短一加黨蔘 12 黃耆 15, 氣虛下陷・小腹墜脹一加補中益氣湯, 腰痛一加續斷 9 杜仲 9, 小腹脹一加香附 12 枳殼 9, 或加橘核 9 荔枝核 9

27. 加味生化湯：① 當歸 24 川芎 15 益母草 30 桃仁 9 焦姜 6(炮姜 1.5) 炒荊芥穗 6 炙草 3, ② 當歸 24 川芎 9 桃仁 9 三棱 6 莪朮 6 炮姜 5 肉桂 6 炙草 3

28. 雙柏散：大黃 黃柏 側柏 澤蘭

29. 祛瘀消症湯：見「婦科知要 p.88」內容不詳

30. 桂心丸：肉桂心 2 當歸 3 赤芍 3 丹皮 3 沒藥 3 榔片 2 乾膝 2 青皮 3 厚朴 2 三棱 2 延胡索 3 大黃 2 桃仁 3 別甲 5 共爲細面 蜜爲二錢重丸

31. 生脈散：北沙蔘 12 麥冬 9 五味子 6 茯苓 12 夜交藤 12 女貞子 12 昆布 12 海藻 12 生牡蠣 15 土貝母 12 蓮肉 12

32. 自己方：黨蔘 12 茯苓 12 山藥 12 制香附 6 生牡蠣 15 續斷 12 白芍 12 桑寄生 12 女貞子 12 枸杞子 12 蓮肉 12 生龍骨 15

經淨後一加土貝母 烏賊骨等化痰軟堅之藥

33. 自己方：健脾一黨蔘 白朮 茯苓 甘草 山藥 扁豆, 『補腎一菟絲子 狗脊 桑寄生 續斷, 調氣一橘皮 木香, 軟堅一牡蠣 昆布 別甲, 化痰止血一三七

34. 清熱安胎方：白朮 9 茯苓 12 山藥 12 橘皮 6 木香 6 黃芩 6 川斷 12 桑寄生 15 麥冬 9

35. 王渭川驗方：潞黨蔘 30 鷄血藤 18 生黃耆 60 桑寄生 30 黑故脂 12 地鱉虫 10 水蛭 6 炒蒲黃 10 紅藤 20 蒲公英 28 檳榔 10 鷄內金 10 琥珀末 6 炒五靈脂 12 砂仁 10 生別甲 24(g)

36. 王氏銀甲丸：銀花 15 連翹 15 升麻 15 紅藤 24 蒲公英 24 生別甲 24 地花地丁 30 椿根皮 12 大青葉 12 西茵陳 12 琥珀末 12 桔梗 12(g) 共研細末 煉蜜成 63丸 喪服一個月

37. 通竅活血湯合銀甲丸加減：

活血化瘀：選用 黑故脂 12 蟅虫 9 炒蒲黃 9 水蛭 9 地龍 15 蜈蚣 2條 白花蛇(烏梢蛇) 9,

補氣益血：選用 黨蔘 24~60 鷄血藤 18 生黃耆 24~60 桑寄生 15 菟絲子 15 鹿角膠 9~30,

消炎清濕：選用 紅藤 24 蒲公英 24 敗醬 24 桔梗 9 琥珀末 6(沖服或布包煎), 行氣：選用 檳榔 6 厚朴 6 台烏 9, 止血：選用 仙鶴草 60 夏枯草 60 大薊 12 小薊 12 茜草根 9, 調脾胃：

選用 鷄內金 9 台烏 9 九香虫 9 山楂 9 神曲 9 生谷芽 24~60

38. 琥珀散：三棱 6 莪朮 6 赤芍 9 當歸 9 劉寄奴 6 丹皮 9 熟地 12 官桂 3 烏藥 6 延胡索 6

39. 旋覆花代赭石湯合失笑散加減：旋覆花 6(包) 青葱 2寸 生蒲黃 6 五靈脂 12 烏賊骨 15 制香附 6 益母草 15

出血量多一加三七 3g 兼腹痛者一加雲南白藥 3g

40. 逍遙散：柴胡 9 當歸 9 赤芍 9 白朮 9 茯苓 9 貝母 9 牡蠣 9 三棱 9 莪朮 9 厚朴 9 別甲 9 桃仁 9 桂枝 9 香附 12 昆布 9 海藻 9

41. 桃紅四物湯：當歸 10 赤芍 5 桃仁 6 紅花 6 柴胡 9 香附 9 黨蔘 9 白朮 10 枳殼 6 臍皮 9 澤瀉 9 杜仲 9 甘草 4 莪朮 6

42. 當歸四逆湯：桂枝 12 白芍 9 當歸 12 木通 9 細辛 3 吳萸 6 肉桂 6 木香 6 三棱 5 莪朮 5 甘草 3 生姜 6

43. 當歸飲合血竭散：當歸 6 川芎 6 醋制別甲 16 吳萸 5 桃仁 6 赤芍 6 肉桂 3 檳榔 3 青皮 3 木香 3 莪朮 3 三棱 3 大黃 3 延胡索 6 血竭 3

44. 自己方：米黨蔘 10 乾姜炭 3 祁艾炭 10 蒼朮炭 6 川續斷 10 黑升麻 5 白朮炭 10 川杜仲 10 黑芥穗 5 生地炭 15 五倍子 5 熟地炭 15 赤石脂(血余炭 10g同布包) 10 五味子 5 山萸炭 18

- 鹿角膠 10 陳阿膠 10 紫厚朴 5 炙甘草 3
45. 處方(1)：綿黃耆 25 野黨參 12 熟地炭 18 當歸身 6 炒地榆炭 15 生地炭 18 醋祁艾 10 老紫草 10 鷄血藤 19 仙鶴草 18 茜草根 10 炙甘草 6 陳阿膠 12(別煎)
46. 處方(2)：綿黃耆 60 白人蔘 30 於白朮 60 當歸身 30 大熟地 60(酒炒) 雲茯苓 30 陳阿膠 60 川杜仲 30(炒) 桑寄生 60 苧麻根 30 川續斷 30 桑螺蛸 30 菟絲子 60 條黃芩 60 懷山藥 60 白扁豆 60(炒) 炒建曲 30 山萸肉 60 炙甘草 30
粟肉 600g 煮合丸藥 每日朝夕各 6g
47. 處方(3)：紫河車 60 鹿角膠 30 海藻 60 朝鮮蔘 30 龜板膠 30 昆布 60 炙黃耆 60 甘枸杞 60 黃精 60 於白朮 60 山萸肉 60 當歸 30 醋艾葉 30 老棕炭 30 槐磨 60 陳阿膠 30 地榆炭 60 白薇 30 炒枳殼 30 大熟地 30 蘇木 60 炒建曲 30 抗白芍 30 紫草 30 白茯苓 60 玉胡燐 60 靈仙 30 黑荊穗
共研細末 用米醋合爲小丸 每日朝夕各 3g
48. 活絡効靈丹：丹蔘 15 制乳香 10 制沒藥 10 當歸 10 黃耆 10 甘草 6 天花粉 10 田三七 3
49. 加味桂枝茯苓丸：桂枝 1.6兩 茯苓 20兩 丹皮 1.2兩 桃仁 6錢 白芍 1.6兩 丹蔘 1.2兩 鷄內金 1.2兩 川大黃 1.2兩 當歸 1.2兩
共研細末，煉蜜小丸 每日朝夕各 3錢
50. 加味桂枝茯苓丸：桂枝 10 茯苓 10 桃仁 10 丹皮 10 赤芍 10 茜草 10 乳香 10 沒藥 10 丹蔘 15 海螵蛸 15 生牡蠣 30 研末 煉蜜丸
51. 處方(1)：當歸 12 杭芍 12 川芎 10 澤蘭 12 卷柏 12 莪朮 10 川棟子 10 烏藥 12 寄生 12 小薊 12 炙甘草 10 鷄血藤 10
52. 處方(2)：處方(1) 加黃耆 黨蔘 枸杞 香附 陳皮 竹茹，去小薊 烏藥 寄生
53. 逍遙散：瘕一加香附 鬱金 元胡 青皮 川芎，癥一加牡蠣 別甲 三棱 莪朮 元胡 紅花 桃仁，若陰虛一加阿膠 熟地，若氣虛一加黨蔘 黃耆，大便乾結一加大黃
54. 攻堅散：牡蠣 昆布 海藻 夏枯草 元蔘 半夏 陳皮 青皮 三棱 莪朮
清熱解毒·蕩滌滯邪：半枝蓮 草河車 蒲公英 金銀花 黃芩 紫草 大黃，滋補肝腎·育陰和營：生地 沙蔘 旱蓮草 女貞子 天花粉 麥冬，行氣散結·開鬱導滯：柴胡 橘葉 香附 鬱金 路路通，破瘀攻堅 滿血通絡：乳香 沒藥 蒲黃 五靈脂 併用蜈蚣 2條 焙黃研細吞服
55. 升帶湯：白朮 人蔘 沙蔘 肉桂 苧薺粉 別甲 茯苓 半夏 神曲
不妊症合併餅腫(三診)一去苧薺粉 茯苓 加香附 烏藥 陳皮 乾薑 蘇葉
56. 丁香化癖散：白丁香一密陀僧·船上硫黃各一錢，礞砂半錢 輕粉少許
57. 桂枝茯苓丸加減煎：桂枝·茯苓·芍藥各 12 丹皮·桃仁·牛膝各 9·牡蠣·丹蔘各 15
肝鬱一加柴胡 青皮 香附 川棟，小便不利一加澤瀉 車前子，出血多一加樗白皮 地榆炭，瘀血重一加三七 五靈脂 蒲黃 乳香 沒藥，白帶多一加白薇 椿根白皮 水蛭 虻虫 紅花，便秘一加大黃 芒硝，軟堅散結一加三棱 莪朮 昆布 海藻 鷄內金 別甲，休虛一加當歸 黃耆 天葵子
58. 理衝湯：黃耆 蔘黨 白朮 生山藥 天花粉 知母 三棱 莪朮 生鷄內金
去 朮 知 山藥 天花粉，加 山甲 水蛭 生牡蠣 生別甲 夏枯草 橘核 牛膝
59. 逍遙散：加桂枝 桃仁 貝母 牡蠣 三棱 莪朮 香附 厚朴各 3
60. 玄胡四物湯：玄胡 13 當歸 10 白芍 18 黃芩 13 寸冬 10 炒杜仲 13 阿膠(炸沖) 13 白朮 13 香附 13 烏藥 13 艾葉 6
61. 桂枝湯合四君子湯：鮮茅根 30 忍冬藤 15 太子蔘 4.5 白芍 9 嫩桂枝 4.5 焦白朮 9 雲茯苓 9 甘草 6 鮮薑 6 大棗 5枚
62. 補中益氣湯：桑寄生 15 川斷 9 太子蔘 9 炙黃耆 18 五倍子 45 炙升麻 6 雲茯苓神各 12 焦白

朮 9 薑川朴 6 炙甘草 6

63. 自己方：老紅曲 15 焦六曲 9 制香附 9 山楂肉 15 萊菔子 9 大川芎 9 炮甲珠 6
紫礮砂 共爲細末 糯米飲丸 如小豆丈 朱衣 每服 3~6丸 日 2~3次
64. 萊菔湯：萊菔 1~2g 加水煮湯 300~500cc分 2~3次/日
65. 逐瘀止崩湯：當歸 10 五靈脂 10 炒蒲黃 10 阿膠 10 丹皮 10 丹蔘 10 烏賊骨 10 川芎 5 制沒藥 5 炒艾葉 3 三七 3 生龍牡各 3
66. 化瘀湯：桂枝 5 鷄內金 5 茯苓 5 赤芍 10 丹皮 10 桃仁 10 莪朮 10 三棱 10 檳榔 10 橘核 10 焦山楂 15(白帶多加梔白皮)
67. 經驗方：黃耆 30 黨蔘 30 牡蠣 10 昆布 30 別甲 15 海藻 15 夏枯草 15 烏梅 15 炒白朮 15 丹蔘 15 制乳沒各 6 當歸 6 白朮炭 6 桃仁 6 三棱 6(帶多加烏賊骨 30 赤芍 15 五靈脂 9 青皮 9)
68. 聞鬱正元散：白朮 陳皮 橘皮 香附 山楂 海粉 桔梗 茯苓 砂仁 元胡索 神曲 炙甘草 生薑
69. 處方：石見穿 三棱 水紅花子 蛇莓 半枝蓮 海藻 生貫仲 夏枯草 鬼箭羽 天葵子
○ 血崩腹痛(使無破血久幣而無留瘀之虞) 加鹿含草 五靈脂 花蕊石 炒蒲黃
○ 月經崩漏(活血化瘀，涼血止血，清火和血測經血自循經而不妄行一經期方) 加水牛角 赤芍 丹皮 紫草 生地
○ 經漏不止，或帶下色黃，綿綿不斷(活血化瘀，清熱固澁法) 加馬鞭草 馬齒莧 炒槐花 景天三七 羊蹄根 玉米須 白薇 赤石脂
○ 瘀血日久，而致虛證(活血化瘀兼健脾補中，滋養肝腎) 加黨蔘 白朮 山藥 茯苓 鷄內金 制黃精 白芍 桑寄生 生山楂 狗脊
70. 草薺歸芍固精湯合金鎖固糧丸加減：草薺 30 當歸 10 白芍 10 金櫻子 12 芡實 12 龍骨 15 牡蠣 30 潼蒺藜 10
○ 腎虛腰痛加川斷 狗脊 桑寄生
○ 脾虛納差加山藥 扁豆 白朮
○ 濕毒蘊盛加土茯苓 臭椿皮 川柏

用藥量の單比は特別の指定のないかぎり“g”とする。また、量の記載のない醫案集、處方も多數存在した。

〈表 IV〉 全症例に使用된 生藥統計分類表

1 軟堅〔150〕									
a 活血化瘀通路									
(生)別甲	25	穿山甲	10	皂角刺	3	水紅花子	2	瓦子	2
烏賊骨	1								
b 消痰									
海藻	14	(生)半夏	10	昆布	9	海帶	7	浙貝母	7
天花粉	3	(生)南星	3	瓜蒌	1	白芥子	1	薏苡仁	1
海浮石	1	海枳殼	1	密陀僧	1	兩頭尖	1		
c 解毒									
夏枯草	7	半枝蓮	6	貫仲	3	山慈姑	2	土貝母	1
玄蔘	1								
d 理氣									
旋覆花	1								

e 消食									
檳榔	13	阿魏	1						
f その他									
(生)牡蠣	11	龜板	2						
2 清熱(解毒)[88]									
升麻	13	蒲公英	11	桔梗	10	紅藤	10	金銀花	8
紫花地丁	7	連翹	7	大青葉	7	紫草	3	生甘草	3
白花蛇舌草	2	敗醬草	2	玄參	2	魚理草	1	土茯苓	1
草河車	1								
3 清熱[22]									
椿根皮	7	黃芩	4	西茵陳	2	白薇	2	知母	1
生地黃	1	地龍	1	山梔子	1	石決明	1	生石膏	1
竹茹	1								
4 止血[104]									
a 活血祛瘀止血									
蒲黃	20	三七	8	烏賊骨	5	醋制單炭	5	茜草	4
小蘗炭	3	卷柏	2	雲南白藥	2	黑薑	2	血金炭	2
大蘗	2	丹皮炭	1						
b 收斂固澀止血									
龍骨	5	煨牡蠣	4	赤石脂	2	椿根皮	2	仙鶴草	2
百草霜	1	藕節	1	欖木	1	棕櫚炭	1	陳棕炭	1
禹余糧	1								
c 涼血止血									
槐花炭	2	旱蓮草	1	(炒)貫衆	1	薑炭	1	(炒)荊芥	1
楞白皮	1	側柏葉	1	苧麻根	1	馬齒莧	1		
d 溫經止血									
艾葉炭	4	艾葉	4	伏龍肝	1				
e 補陰止血									
阿膠	5								
5 行氣[190]									
香附子	39	木香	27	桂枝	23	青皮	17	枳殼	15
川棟子(肉)	12	烏藥	12	厚朴	8	柴胡	7	砂仁	6
鬱金	4	橘葉	4	(焦)枳實	3	薄荷	2	元胡	2
蘇梗	1	青蔥	1	八月札	1	望江南	1	荔枝核	1
橘核	1	制川草烏	1	蘇子	1	沈香	1		
6 活血化癥(瘕症癥)[363]									
三棱	38	莪朮	36	當歸	29	川芎	25	赤芍	25
水蛭	17	(炒)五靈脂	16	桃仁	15	紅花	15	蜚虫	12
血竭	11	丹蔘	10	琥珀手	9	乳香	9	丹皮	9
(制)沒藥	8	生山楂	7	虻虫	6	蜈蚣	6	生蒲黃	6
乾漆	5	洋蘭	5	牛膝	5	益母草	5	杏仁	3
劉寄奴	3	九香虫	3	蘇木	2	王不留行	2	蛭蟪	2

全虫	2	地別虫	2	硝砂	2	橘葉	1	紅糧	1
鬼臼	1	延胡索	1	路路通	1	薑黃	1	小薊	1
細辛	1	白蒺藜	1	地龍	1	(煨)花蕊石	1	虎杖	1
7 安胎活表〔6〕									
黃芩	1	白朮	1	阿膠	1	杜仲	1	麥門冬	1
8 利水〔34〕									
薏苡仁	4	車前子	3	葫蘆瓢	2	車前草	2	乾蟾皮	1
甘遂	1	瞿麥	1	黑白丸	1	龍膽	1	白英	1
臭橘皮	1	地丁草	1	七葉一枝花	1	扁豆花	1	風尾草	1
石韋	1	赤小豆	1	五米須	1	六一散	1	茯苓皮	1
大腹皮	1	桑白皮	1	木通	1	輕粉	1	椒目	1
五米須	1	白槿花	1						
9 化濕〔26〕									
陳皮	14	半夏	4	蒼朮	3	藿香	3	草豆蔻	1
白蔻仁	1								
10 祛風濕〔10〕									
白芷	2	桑寄生	2	藁本	1	羌活	1	膽南星	1
防風	1	苡仁	1	白花蛇	1				
11 濕消食〔12〕									
鷄內金	6	紅曲	3	焦山楂	1	焦六曲	1	萊菔子	1
焦三仙	1	焦麥芽	1	神曲	1	生谷芽	1		
12 健脾，補氣，扶正藥〔158〕									
(炒)黨參	29	茯苓	26	黃耆	23	(炙)甘草	23	焦·炒白朮	22
(鮮)生薑	15	大棗	8	太子參	5	人蔘	2	三棱	1
菝朮	1	膠飴	1	蓮子	1	薑零汁	1		
13 補腎〔30〕									
續斷	10	桑寄生	5	山藥	5	菟絲子	4	杜仲	3
覆盆子	2	五味子	1						
14 補精〔6〕									
鹿角膠	3	鹿角霜	2	仙靈脾	1				
15 溫陽〔44〕									
肉桂	9	丁香	6	附子	5	紫石英	5	補骨脂	5
吳茱萸	5	狗脊	4	乾薑	3	益智仁	2		
16 補血〔120〕									
(炒)白芍	36	(大生)地黃	19	熟地	11	枸杞子	8	麥門冬	7
桑寄生	5	天門冬	5	北沙參	5	阿膠	5	女貞子	3
乾地黃	2	玉竹	2	何首烏	1	羌蔚子	1	石斛	1
肉蓯蓉	1	百合	1	鮮蘆根	1	鷄血藤	1	桑椹	1
黃精	1								
17 養心安神〔5〕									
酸棗仁	2	蓮肉	1	首烏藤	1	遠志	1		
18 發表解表，通絡〔20〕									

葱白	8	麝香	8	路路通	3	忍冬藤	1
19 潤肺寧嗽〔3〕							
生山藥	1	桑白皮	1	橘紅	1		
20 升提〔10〕							
升麻	5	柴胡	5				
21 固澁〔4〕							
五味子	2	五倍子	1	烏梅	1		
22 通下〔20〕							
(制)大黃	14	澤瀉	4	芒硝	1	(熟)大黃	1
23 潤腸通便〔3〕							
火麻仁	1	郁李仁	1				
24 不明〔4〕							
沈香曲	1	糯米草	1	胡聲殼	1	生筋耆	1

子宮筋腫의 合型論治檢討

西洋醫學的 診斷名(病理組織學的的 基礎的 檢査)와 中醫學的 辯病(辯證)名과의 異質的인 것으로 處理하는 方法으로 分型論治라는 手法을 使用하는데 子宮筋腫을 例들면 筋腫發生 原因을 氣滯 血瘀 痰濕으로 三大別하고 主要症狀으로 過多月經의 原因으로 脾虛(中氣下陷)血熱 外內寒, 瘀血로 分類한다. 다시 말하면 筋腫 自體는 邪實이고 그 結果 過多月經에 依하여 生體가 各種의 虛證에 陷하게 된다. 治療로서는 攻補兼治施가 되며 內經의 大積 大聚 其可犯也 衰其大半 而上으로서 注意되고 있다.

嚴蜜하게 子宮筋腫을 純中醫學(中國醫學)的으로 辯證하는 경우는 奇經入脈의 虛(本)과 癥積 瘀血等的 邪實(標)과 月經困難에 依한 身體條件의 因果關係를 가지고 連結的으로 病因處理를 論할 必要가 있다. 分型論治를 臨床에 應用할 때 西洋病名에 定해지면 2~3型的 分型으로 나누고 分類가 定해지면 適當하다고 生覺되는 方劑에 隨證 加減을 藥味로 處方을 만드는 것을 定型化한 漢方으로 되기 쉽다. 分型論治는 病態의 變化를 表現하기 어려우며 固定된 病態로서의 各分型로 分類하게 되는 傾向이 있게 된다.

그리하여 그 分型相互의 前後關係把握이 어렵게 된다.

例컨대 1人의 患者에 對한 細蜜히 辯證할 경우 病態의 現象이 너무나 復雜하기 때문에 藥味의 數만 많아져서 治療의 포인트인 重要當事를 把握못하거나 概念이나 그 取舍를 先人들이 단든 思考方式에 反하여 分型함으로 意外로 單純한 眞實에 反하는 感이 든다.¹⁷⁾¹⁸⁾

〈表 V〉 子宮筋腫 分型論治

1. 氣	滯	破氣散癥 香椽丸(8) 香鬱方(1)※23 大七氣湯(3) 木香檳榔丸(1) 加味烏藥散(1) 香砂六君子湯合銀甲丸(3)
------	---	------------------------------------------------------------------

	<p>{ 偏氣滯(瘦)舒肝解鬱消聚 逍遙散(1)※53 偏血瘀(癥)調氣活血逐瘀消損 逍遙散(1)※53</p>
② 肝鬱氣滯寒凝, 疑血阻	<p>活血化瘀, 行氣導滯, 散寒 當歸四逆湯(1)※42</p>
③ 肝 鬱	<p>疏肝 逍遙散(5)</p>
④ 肝氣鬱滯, 年血久瘤, 久積而成	<p>桂枝茯苓丸合當歸芍藥散</p>
14. 脾 腎 兩 虛	<p>① 健脾補腎, 理氣軟堅, 子宮筋腫, 逐漸軟化 自己方(1)※33</p> <p>② 氣血兩虛, 虛寒爲崇, 出血緩慢, 稽留時久, 凝結所成, 升陽補中, 固齒法 (一診) 自己方※44 (二診) 定坤丹合玉液金丹</p> <p>③ 肝氣鬱結, 衝任不固, 健脾益腎, 舒肝解鬱, 固攝衝任 自己方(1)※32</p>
15. 經 期 方	<p>A 活血 氣滯血瘀→因勢導利, 理氣活血 自己方(1) 逐瘀止崩湯(1)※65</p> <p>B 止血 養血活血止血兼消癥去瘀散結 安衝湯(1) 丹蔘四物湯(1) 固衝湯(1) 丹蔘四物湯合補中益氣湯(1) 血淨飲(1) ※1 復方烏賊骨茜草湯(1)※15 雲南白藥(4) 曲煥章百寶丹 7 (一診) 止血方※16 (月經量多) (二診) 攻補兼旋※17</p>
16. 筋腫合併子宮下垂	<p>(先) 氣血兩虛又傷新感, 養正去邪和營衛調氣血 桂枝湯合四君子湯※61</p> <p>(中) 養正除積, 脾虛 補中益氣湯※62 兼服四神丸, 桂枝茯苓丸</p> <p>(後) 脾氣漸復, 化源漸充增加消積力 自己方※63</p>
17. 不妊症合併筋腫	<p>① 脾氣虛弱, 衝任失調, 癥瘕內結 (一診) 四君子湯 (二診) 八珍湯 (三診) 無月經一桂枝茯苓丸 (四診) 月經來潮, 腹痛一升帶湯※55 (五診) 善後一定坤丹</p>
18. 妊娠合併筋腫	<p>① 氣血失和胎熱, 和血止痛, 清熱安胎 玄胡四物湯※60</p> <p>② 妊娠後脾腎不和, 心腎不交, 以治健脾和胃寧心益腎 清熱安胎方※34</p> <p>③ 肝氣鬱結, 痰阻血瘀, 行氣導滯, 消積化瘀 桃紅四物湯※41</p> <p>④ { (先) 氣滯血瘀 去瘀活血, 行氣止痛緩急 處方①※51 (後) 氣血兩虛 肝脾不和 攻補兼旋 處方②※52</p> <p>⑤ 瘀血日久正水已虛</p>

	桂枝茯苓丸 繼服 歸脾湯)1)
19. 習慣性流産合併筋腫	(一診) 出血, 益氣攝血調固衝任法(以止血) 處方①※45 (二診) 久病爲守法 用丸藥 (朝) 玉液金丹 (午後) 補中益氣湯 (晚) 安坤贊育丸 (三診) 妊娠 健脾補腎以固胎元 處方②※46 (四診) 産後出血 調補氣血兼化瘀腫 處方③※47
20. 通 用 方	消癥丸(1)※2 小化堅湯(1)※3 白擬消症湯(1)※7 經驗方(1)※6 二號消瘤片(1)※4 宮藏湯(1)※9 樞氏三種寶丹(1)※8 加味桂枝茯苓丸(1)※49
21. 外 敷 膏 藥	外敷消痞膏(1)※5 自己方(1)※22 雙柏散(1)※28
22. 食 事 療 法	山楂紅蔗糖煮物(1)
23. 術 前·術 後	(前) 三七粉, 血竭 (後) 防粘湯

○ () 內는 症例數 ○※1~70은 方劑一覽表의 番號
○ 方劑名 모두 「○○湯加減」의 意味이다.

(1) 1980年 6月부터 1989年 8月末까지 서울市內所在 病院·醫院(洋方)으로부터 子宮筋腫으로 診斷받고 保存的 治療法(藥物療法)으로 治療코져 天佑·奉天 韓醫院에 來院한 患者 108名을 對象하였고 白鳳丸·白鳳丹(I)(II) 烏骨鷄丸(I)(II)을 投與한 結果 다음과 같다.

108名	6個月以上 服藥	24(名)	22.2(%)
	3個月以上~5個月 服藥	15(名)	13.9(%)
	2個月 服藥	38(名)	35.2(%)
	1個月 服藥	31(名)	28.7(%)
	小 計	108(名)	100(%)

- ① 1個月未滿 治療者는 筋腫크기와 他症狀이 不變이거나 31名中 5名은 惡化경향이 있다 하여 中斷하였다.
 - ② 2個月未滿 治療者는 筋腫 및 症狀이 若干의 好轉을 느낀다. 38名中 15名이 別理由없이 治療를 中斷하였고, 3名이 惡化경향이 있었고, 나머지 20名은 不變이라는 理由로 中斷하였다.
 - ③ 3個月以上 4,5個月 治療者는 不變이거나 若干의 縮少 및 症狀의 好轉은 있는듯하나 期待未滿 및 別理由없이 中斷하였고
 - ④ 6個月以上 服藥한 24名은 內診結果 縮少 및 消失되어 確認되고 諸症狀이 消失됨. 但 合併症治癒는 別途임.
- 白鳳丸, 白鳳丹(I)(II) 烏骨鷄丸(I)(II)은 6個月以上 長期服藥을 效果를 顯視할 수 있다.

(2) 月經異狀	治療效果 (名)			
	108	24	若干未盡感	良好 消失
ㄱ) 月經過多 初診時愁訴	86	19	3	8 7
ㄴ) 月經困難 初診時愁訴	27	22	2	8 12
(3) 凝血 不正出血				
ㄱ) 異狀帶下				
① 膿性(黃色·青色·赤色·黑赤色)	73	22	5	→ 19
② 水樣性	108	—		
③ 凝血性(凝固 又 黑色)	83	22	2	→ 22
ㄴ) 不正出血				
① 月經後不正出血(崩漏)	57	22		22
② 接觸出血 又 疼痛				
① 內診時壓迫	10	8	1	7
② 性交時壓迫感 又 疼痛	22	7		7
(4) 貧血·血壓·體重 未達	108	24		24
ㄱ) 一般的貧血症狀(慢性疾患貧血 急性出血性貧血)				
易疲勞感 全身倦怠感 頭重 頭痛 眩暈 耳鳴 食 欲不振 卒倒發作 運動時心悸亢進 頸動脈引痛 Venousham 浮腫				
病理 検査	血色素 11.5mg/dl 外 正常(11~7mg/dl) 赤血球 450萬 正常(400萬~250萬) 白血球 7,000 正常		No. 6 No. 10 No. 19	正常으로 確認
但 白血球 增量 있으면 炎症性疾患 合併				
ㄴ) 血壓 100/60 以下	86	22	21 全員	110/70 以上 改善
ㄷ) 體重 未達 40kg 以下	97	22	全員	40kg 以上 向上

(5) 隨伴合併症變化 又 治療效果

(既往症)

- ① 甲狀腺 No. 4 $tatat/T_3(\text{ng/dl}) \times T_3\text{RSU}(\%) / 100 = 40$ (正常值: 32~71)
- No.10 $tatal/T_3(\text{ng/dl}) \times T_3\text{RSU}(\%) / 100 = 48$ (正常值: 32~71)
- No.11 検査值 없음
- ② 肺結核 No. 6 咽喉炎(梅核氣) 良好 喀痰消失
- 22才發病(陰性) 肋間神經痛(肝氣), 微熱消失 鼻塞消失
- ③ 肝炎 No.13 GOT $\frac{40}{55} \rightarrow \frac{35}{38} \rightarrow \frac{32}{38}$ 改善

worblewski-karmen法

子宮筋腫 24名에

患 者 No.	年 齡	初診時筋腫의 크기	發病豫測日病醫院 (洋方)에서 診斷 日	合併症	流産 2回 以上 2回以 上 經験	本院來院前 藥投與經験 方劑名	韓 臣	隨 伴	
								月經 過多	凝血不 正出血
1	41	鷄卵大	1年 前		有	○		+	+
2	42	鷄卵大	1年 前		有	+		+	+
3	45	鷄卵大	1年 前		有	+		+	+
4	45	鷄卵大	1年 前	甲狀腺	有	○		+	+
5	43	鷄卵大	6個月 前		有	○		+	+
6	48	鷄卵大	1年 3個月 前	肺結核	有	+		無月經	○
7	50	鷄卵大	10個月 前		有	+		+	+
8	42	鷄卵大	6個月 前		有	+		+	+
9	37	鷄卵大	6個月 前		有	○		+	+
10	44	鷄卵大	6個月 前	甲狀腺	有	○		+	+
11	37	鷄卵大	9個月 前	甲狀腺	有	+		○	+
12	35	手拳大	1年 前		有	○		+	+
13	40	鷄卵大	6個月 前	肝炎	有	○		○	+
14	45	鷄卵大	6個月 前		有	+		+	+
15	43	鷄卵大	6個月 前		有	+		+	+
16	40	鷄卵大	6個月 前		有	+		+	+
17	47	鷄卵大	1年 前	十二指腸	有	+		無月經	○
18	43	鷄卵大	1年 前		有	+		+	+
19	44	鷄卵大	1年 前		有	○		+	+
20	44	鷄卵大	8個月 前	肋膜炎	有	+		○	+
21	47	鷄卵大	1年 前		有	+		-	+
22	40	鷄卵大	1年 前		有	-		+	+
23	45	鷄卵大	1年 前		有	○		-	+
24	46	鷄卵大	1年 前		有	○		+	+

對症 綜合表

期間 1980/6~1989/8

月經困難	症 狀		性交 痛 內診時壓痛	使用方劑名	治療期間 (服藥期間)	効 果 (內診堅觸 部知音)	其 他
	貧血 血壓 115/60 以下	體 重 40kg 以下					
+	+	+		白鳳丸	1年 6個月	+	
+	+	+		白鳳丸	2年	+	
+	+	+		白鳳丸	1年	+	
+	○	+	+/+	白鳳丸	1年	+	
+	+	+		白鳳丸	1年	+	(漿膜下筋腫)註 ⁴⁾ (으로 診斷)
○	+	+	+/+	白鳳丸一 白鳳丹	3月→1年	+	
+	+	+		白鳳丸	6個月	+	
+	+	+	+ / ○	白鳳丸	6個月	+	
+	+	+		白鳳丸	6個月	+	八珍湯鹿茸兼用
+	○	○		白鳳丸	1年	+	
+	○	○	+ / +	白鳳丸	1年	+	
+	+	+	+ / +	白鳳丸	6個月	+	
+	+	+	○ / +	白鳳丸	1年 6個月	+	
+	+	+		白鳳丸一 白鳳丹	1年 6個月	+	
+	+	+		白鳳丸一 白鳳丹	2年	+	
+	+	+		白鳳丸一 白鳳丹	1年 6個月	+	
○	+	+	+ / +	白鳳丸一 白鳳丹	1年	+	四物湯合參朮健 11年 湯加鹿茸兼用
+	+	+	○ / +	烏骨鷄丸	1年	+	
+	+	+		烏骨鷄丸	1年 6個月	+	
+	+	+		白鳳丹	1年	+	
+	+	+		烏骨鷄丸	1年	+	(壁內筋腫으로) 診斷받음
+	+	+	+ / +	烏骨鷄丸	1年	+	
+	+	+		烏骨鷄丸	6個月	+	
+	+	+		烏骨鷄丸	6個月	+	

4) No.5 漿膜下筋腫으로 患者陳述임
No.21 壁內筋腫으로 患者陳述임

- ④ 十二指腸潰瘍 No.17 便秘 夜間空腹時疼痛消失 不眠改善
 ⑤ 肋膜炎 20 喘嗽 肋間神經痛(肝氣), 便秘消失
 27才發病(陰性)

IV. 緒 論

子宮筋腫患者에 白鳳丸, 白鳳丹(I)(II) 烏骨鷄丸(I)(II)을 6個月以上 投與한 患者 24名 (治療率 108 : 24=22.2%) 隨伴한 愁訴症消失과 內診·腹診으로 筋腫의 觸診上 縮少 및 硬度의 軟柔, 消失이 確認되었으나 造影法 診斷으로 初診時 筋腫의 位置, 크기, 種類를 記錄하고 本藥物投與로 消失 縮少 筋腫種類에 作用과 經過의 確認이 客觀性 있는 再試驗(追試)가 要望된다.

參 考 文 獻

1. 宋炳基：漢方婦人科學，서울，杏林出版社，pp.249~256，1980.
2. 王永註：黃帝內經，서울，高文社，p.75,80,112,123,147,172,281,296,353，1971.
3. 劉河間：劉河間三六書，서울，成輔社，p.185，1975.
4. 張介賓：景岳全書，서울，杏林書院，pp.538~539，1975.
5. 朱丹溪：丹溪心法附餘，臺北，上海科學技術出版社，p.49，1983.
6. 李 梴：醫學入門，臺北，僑聯東方公司，p.447，1963.
7. 龔廷賢：壽世保元，臺北，裕昌德書店，p.227，1957.
8. 陳修園：醫學從衆錄，上海科學技術出版社，1953.
9. 杉上陽 外：小婦人科書(改正版)，日本，金芳堂，pp.192~197，1979.
10. 室岡一：圖說產婦人科外來診指針，日本，金原出版社(株)，p.84，1974.
11. 山田英雄：貧血の病態診療マニュアル，新興醫學出版社，p.17，1988.
12. 鹽川優一 外：症狀による検査の選び方と読み方，南山堂，p.281 1975.
13. 梁秀烈 外：子宮筋腫의 治驗 1例，大韓韓醫學會誌，第1卷 第2號，pp.47~48，1991.
14. 이경섭 외：징가 治方에 관한 문헌고찰，東洋醫學，5：46~50，1990.
15. 産科と婦人科，Vol-56(増刊號)産婦人科検査テータのよみ方，日本，診断と治療社，p.161.
16. 産科と婦人科，Vol-57-No11
17. 東洋醫學 Vol-10-No5
18. 東洋醫學 Vol-14-No3 日本 自然社