

癲癇의 鍼灸治療에 대한 文獻的 考察

朴永哲 · 蔡禹錫*

I. 緒 論

癲은 《黃帝內經》¹⁾에서 처음 나타나며, 哀愁感情과 精神活動抑制를 基本으로 憂鬱한 狀態가 特徵的으로 나타나는 人格變化를 말하고, 癇은 間歇的인 發作에 同伴 되어 나타나는 意識障礙와 痙攣을 主症으로 하는 精神科 疾患의 하나로²⁾, 虞³⁾는 “多喜爲癲 多怒爲狂 然則喜屬於心而怒屬於肝 內二臟相火有餘之病”이라 하여 癲과 狂을 區別 하였고, 《黃帝內經》에서는 오늘날 一般的으로 大發作 이라 알려진 癇疾中 突然히 意識喪失 卒倒 痙攣發作을 일으키다가 잠시 후 깨어나는 癇疾發作의 內容이 있어 癲疾에 癇이 包含되어 있음을 알 수 있고⁴⁾, 癲症과 癇症이 區別은 宋代의 《濟生方》⁵⁾以後의 文獻에서부터 始作 되어 나타나고 있으나, 張⁶⁾은 “癲卽癇也 觀內經所原 癲症甚傷而治則無變 卽此可知”라 하였고, 巢⁸⁾는 “十歲以上爲癲 十歲以下爲癇”이라 하여, 癲과 癇이 同一한 疾病임을 알 수 있으며, 疾病의 概念이 現代와 多少 差異가 있으나 最近의 癇疾과 가장 類似하다⁴⁾.

役學的 側面에서 美國의 境遇는 人口 200名에 1名의 比率로, 우리나라와 日本의 境遇는 人口1000名당 1名의 比率로 發病 하고 있으나⁴⁾ 아직 病因과 機傳 및 治療方法이 明快하게 提示되지 못하고 있는 實情이다.

이에 著者는 黃帝內經 외 44種의 文獻을 통하여 癲癇의 原因, 症狀, 治法 및 鍼灸治療에 대하여 調査整理한 結果 若干의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 資料 및 調査方法

II. i. 資料

黃帝內經 외 44種의 文獻을 調査資料로 하였다.

- 1) 王冰 註 : 黃帝內經
- 2) 巢元方 : 諸病源候論
- 3) 嚴用和 : 濟生方
- 4) 扁鵲 : 扁鵲心書
- 5) 華陀 : 華氏中藏經
- 6) 孫思邈 : 備急千金要方
- 7) 滑壽 : 難經本義
- 8) 陳會 : 神應經
- 9) 陳士鐸 : 石室秘錄

* 大田大學校 韓醫科大學 鍼灸學教室

- 10) 朱震亨 : 丹溪心法
- 11) 劉河間 : 劉河間傷寒三六書
- 12) 東中醫學院 : 鍼灸甲乙經校釋
- 13) 高武 : 鍼灸節要
- 14) 高武 : 針灸聚英
- 15) 王肯堂 : 證治準繩
- 16) 張介賓 : 景岳全書
- 17) 虞搏 : 醫學正傳
- 18) 陳無擇 : 三因方
- 19) 樓英 : 醫學綱目
- 20) 林珮琴 : 類證治裁
- 21) 王執中 : 針灸資生經
- 22) 李梴 : 醫學入門
- 23) 龔延賢 : 萬病回春
- 24) 楊繼州 : 鍼灸大成
- 25) 廖潤鴻 編 : 鍼灸集成
- 26) 金定濟 : 診療要鑑
- 27) 崔容泰 外 : 精解鍼灸學
- 28) 崔容泰 外 : 鍼灸學(上,下)
- 29) 楊甲三 主編 : 鍼灸學
- 30) 邱茂良 主編 : 中國鍼灸治療學
- 31) 上海中醫學院 : 鍼灸學
- 32) 吳方濟 : 最新鍼灸藥物綜合治療學
- 33) 孫學全 : 鍼灸臨床問答
- 34) 上海中醫學院 : 中醫內科學
- 35) 黃義完 外 : 東醫精神醫學
- 36) 楊醫竝 編 : 中醫學問答
- 37) 金相孝 : 東醫神經精神科學
- 38) 金容基 : 鍼灸治療法
- 39) 李炳國 : 神傳秘方과秘穴
- 40) 安榮基 : 經穴學叢書黃帝內經
- 41) 洪錫殷 編 : 鍼灸基礎理論과臨床治療
- 42) 李炳國 : 鍼灸治療圖解處方集
- 43) 金康植 外 : 鍼灸配穴辭典
- 44) 李炳國 : 藥鍼의秘方
- 45) 金元圭 : 癲狂癩에 대한 文獻의考察및 臨床의研究

II. ii. 調查方法

癲癩에 대한 原因, 症狀, 鍼灸治療에 대하여 調查整理 하였다

Ⅲ. 本 論

Ⅲ. i. 原因

『黃帝內經¹⁾』

* 素問奇病論篇：帝曰 人生而有癩疾者 病名曰何 安所得之 岐伯曰 病名為胎病 此得之 在母腹中時 其母有所大驚 氣上而不下 精氣并居 故令子發為癩疾也.

* 素問宣明五氣論：五邪所亂 邪入於陽則狂 搏陽則為癩疾

* 靈樞邪氣臟腑病形：肺脈急甚 為癩疾 腎脈急甚 為骨癩疾

『醫學正傳³⁾』

癩為心血不足 多為求望高遠 不得志者有之.

『濟生方⁵⁾』

五癩 皆由驚動藏氣 鬱而生涎 閉塞諸經 故有是證 或在母腹中時受驚 或幼小受風寒暑濕 或因饑飽失宜逆於藏氣而得.

『景岳全書⁶⁾』

癩病多由痰氣 凡氣有所逆 痰有所滯 皆能壅閉經絡 格塞心竅

『石室秘錄⁷⁾』

* 癩疾之生也 多生於脾胃之虛寒所食水穀 不變精而變痰 痰凝胸膈間 不得化流 於心而癩症生矣.

* 癩癩之症 多因氣虛有痰.

『諸病源候論⁸⁾』

風癩由血氣虛邪入於陰經故也 人有血氣少則 心氣虛而精神離散 魂魄妄行 因為風邪所傷 故邪入於陰則為癩疾 又人在胎 其母卒大驚 精氣并居令子 發癩 皆由風邪故也. 癩者小兒病也 十歲以下為癩 其發之源 此因三種風癩驚癩食癩也 風癩者 因衣厚衣而風入為元 驚癩者 人驚怖大啼及發 食癩者 因乳哺不節所成 然小兒氣血微弱 易為傷動 因此三種變作諸癩.

『備急千金要方⁹⁾』

風入陰經則癩 夫歷節風著人 不久治者 令人骨節蹉跌 變成癩疾.

『丹溪心法¹⁰⁾』

* 五志之火 因七情而氣鬱而成痰 故為癩癩狂妄之證.

* 如癩因驚而得 驚則神不守舍 舍空而痰聚也.

『傷寒三六書¹¹⁾』

多喜為癩 喜為心志 心熱甚則多喜而為癩.

『醫學入門¹²⁾』

癩者異常也 平日能言 癩則沈默 平日不言 癩則呻吟 甚則僵仆直視 心常不樂此陰虛血少 心火不寧.

『證治準繩¹³⁾』

* 癩癩之發 由腎中陰火上逆而肝從之 若母受驚氣 混在其中 復被外邪則發作也.

* 陰陽癩由急慢驚 陽癩不因吐下 由其有痰有熱 客於心胃之間 因聞大驚而作 若熱盛 雖聞驚亦自作也 陰癩亦本於痰熱所作 醫以寒涼攻下太過 損傷脾胃 變而成陰.

* 癩病俗謂之失心風 多因抑鬱不遂 侘傺無聊而成

『難經本義¹⁴⁾』

二十難曰 重陽者狂 重陰者癲 脫陽者見鬼 脫陰者目盲。

『三因方¹⁵⁾』

癲癩病 皆由驚動 便藏氣不乎 鬱而生涎 閉塞諸經 厥而乃成 或在母胎中受驚 或少小感風寒暑濕 或飲食不節飽 逆於藏氣。

『醫學綱目¹⁶⁾』

*痰邪上逆則 頭氣亂 頭氣亂即脈道閉塞孔竅不通。

*小兒多患 胎寒 好啼 晝夜不止 因此成癩

『萬病會春¹⁷⁾』

*癩屬 氣血虛而 兼痰火

*癩者心血不足

『類證治裁¹⁸⁾』

癩症 肝膽心腎病 經言二陰急爲癩厥 謂少陰氣逆於經而上行則喉塞 音瘖而癩發矣 由心腎虛怯 癩風痰火條逆 痰涎上壅心包 經脈塞阻

『診療要鑑¹⁹⁾』

心膽虛弱人之 風痰 痰飲에 起因하며 心氣不足時 熱邪가 胸膈에 蓄積되면 痰과 熱이 相感하여 風이 心腸에 侵亂하면 悶愧 한다.

『中醫內科學²⁰⁾』

驚恐和飲食不節 造成臟腑失調 肝脾腎 驚恐損傷肝腎 使肝腎陰虧 肝風易動 飲食不節 損傷脾胃 以致精微不布 痰濁內聚 精志鬱結 勞累過度 則每易導致 肝風挾痰上逆 蒙閉清竅 發爲癩癩。

III. ii. 症狀

『黃帝內經¹⁾』

*素問 長刺節論：病初發 歲一發不治 月一發不治 月四五發 名曰癩。

*素問 厥論：陽明之厥 則癩疾欲走呼 腹滿 不得臥 面赤而熱 妄見而妄言

*靈樞 癩狂：癩疾始生 先不樂 頭重痛 視舉目赤 甚作極已而煩心 候之於顏。癩疾始作 而引口啼呼喘悸者 候之手陽明太陽。癩疾始作 先反僵因而脊痛 候之足太陽陽明 太陰手太陰。

『景岳全書⁶⁾』

癩病之至 忽然僵仆 而時作時止 狂病常醒 多怒而暴 癩病常昏 多倦而靜。

『諸病源候論⁸⁾』

癩病其發仆地 吐涎沫 無所覺是也。

癩者其發之狀 或口眼相引 而兩目清上搖 或手足撻縱 背脊強直 或頸項反折。

『備急千金要方⁹⁾』

凡癩發則臥地 吐涎沫無知 若強掠起如狂及遺糞者難療。

『醫學入門¹²⁾』

癩者異常也 平日能言 癩則沈默 平日不言 癩則呻吟 甚則僵仆直視 心常不樂此陰虛血少 心火不寧。

『證治準繩¹³⁾』

癩病 精神恍惚 言語錯亂 喜怒不常 有狂之意 不如狂之甚 狂者暴病 癩則久病也。

癩病與卒中瘳病上同 但癩病仆時口中作聲 將省時吐涎沫 省後又復發 有連日發者 有一日三五發者。

『難經本義¹⁴⁾』

顛疾始發 意不樂 僵仆直視 其脈三部陰陽俱盛是也.

『醫學綱目¹⁶⁾』

顛癇卽 頭眩也 痰在膈間則眩微不仆 痰溢膈上則眩甚仆倒於地而不知人. 凡顛癇仆時 口中作聲 將省時 吐涎沫 省後又復發 時作時止而不休息 中風中寒中暑尸厥之類 則仆時無聲 省時無涎沫者 後不復再發 間有發者 亦如顛癇之常法也. 凡顛癇 及中風中寒中暑中濕氣厥尸厥 而昏眩倒仆 不省人事者 皆由邪氣逆上陽分 而亂於頭中也 顛癇者 痰邪逆上也 痰邪逆上 則頭中氣亂 頭中氣亂則脈道閉塞 孔竅不通 故耳不聞聲 目不識人 而昏眩無知 仆도 瘳地也 以其病在頭顛 故曰顛疾.

『類證治裁¹⁸⁾』

卒然暈仆 口眼牽掣 腰背反張 手足抽搐

『精解鍼灸學²¹⁾』

癇疾

發作時에는 卒然히 昏倒하면서 全身에 痙攣이 일어나며 目は 上視하고 口眼喎斜하며 流沫을 嘔吐하고 五畜之鳴을 發하며 人事不省되어 舌咬傷 尿失禁하며 以是即成 하는데 一日 數回 發作하며 或 數日에 一回 發作한다.

『鍼灸節要³⁵⁾』

顛疾者始生 先不樂 頭重頭痛 視學目赤 甚作極已而煩心 候之於顏. 顛疾始作 而引口啼呼 喘悸者 候之手陽明太陽. 顛疾始作 先反僵因而脊痛. 骨顛疾者 頷齒諸俞分肉皆滿 而骨居 汗出煩惋 口多沃沫 氣下泄不治 脈顛疾者 暴仆 四肢之脈 皆脹而縱 脈滿 盡刺之出血 不滿 灸之 狹項 太陽灸帶脈於腰上去三寸 諸分肉本輸 口多沃沫 氣下泄不治

『鍼灸治療圖解處方集³⁶⁾』

癇癇

突然히 間歇的으로 發作이 일어나는 腦機能障礙疾患의 一種이다 症狀이 各樣各色이며 단순한 병이 아니다 精神을 잃고 쓰러지며 四肢가 뒤틀리고 눈을 치뜨고 하는 大發作에서부터 小發作 精神運動發作 및 한쪽 口角이나 手足의 局限性 抽動만 있는 局所性的 發作만을 일으키는 가벼운 것도 있다.

癇疾

癇疾은 지랄병을 일컫는다. 原因은 肝風動 火炎이 上起하여 陰陽의 氣가 逆亂되는 것이 本病의 發生原因이 된다고 보고 있다. 發作은 대체로 大發作 小發作 精神運動形發作 局限性發作의 네 종류가 있다. 이중 大發作을 비교적 많이 볼 수 있다.

『鍼灸基礎理論과 臨床治療³⁷⁾』

癇疾(顛癇)

意識障礙와 強直性 또는 間代性 痙攣을 일으킨다 腦에는 특별한 變化가 없으며 腦의 腫瘍 軟化 혹은 기타 疾患에서 發病하고 히스테리 알콜中毒 尿毒症과 같은 데서도 볼 수 있다. 遺傳性으로 兩親飲酒妊娠 頭部外傷 등에서 發生한다 發作時에는 卒倒 人事不省 口內泡沫 顏面暗赤 瞳孔散大 및 四肢가 뒤틀린다.

III. iii. 鍼灸治療

『黃帝內經¹⁾』

*長刺節論 : 病初發 歲一發不治 月一發不治 月四五發 名曰顛 病者諸分諸脈 其無寒者 以鍼調之 病已止

『醫學綱目¹⁶⁾』

癇症

鳩尾 後谿 湧泉 心俞 陽交 足三里 太衝 間使 上脘

『精解鍼灸學²¹⁾』

癩疾

小兒- 百會 身柱 肝俞

大人- 大椎 間使 百會 神門 後谿 中脘 鳩尾 鬼眼瀉血(灸) 勞宮 湧泉

男子- 陰莖頭 37壯

女子- 玉門頭 37壯

癩癩晝發 治 陽蹻(申脈) 癩癩夜發 治 陰蹻(照海)

兩脚轉筋者 中脘 間使 瀉，一日 二三次 行함

『扁鵲心書²²⁾』

癩症：中脘灸 50壯

『鍼灸甲乙經²³⁾』

《陽厥大驚發狂癩》

癩疾口沫 神庭及 兌端 承漿主之 其不口沫 本神及 百會 後頂 玉枕 天衝 大杼 曲骨 尺澤

陽谿 外丘 當上脘旁五分 通谷 金門 承筋 合陽主之

癩疾上星主之 先取 諛諛 後取 天容 風池

『針灸聚英²⁴⁾』

癩

灸百會 鳩尾 上脘 神門 陽蹻 陰蹻

鍼灸大成²⁵⁾

癩癩

攢竹 天井 小海 神門 金門 商丘 行間 通谷 心俞(灸百壯) 後谿 鬼眼

小海

『鍼灸學(下)²⁶⁾』

癩癩

平肝熄風 開竅化痰

*百會 間使 後谿 神門 風池 心俞 湧泉 鬼眼(灸)

*晝間發作 - 陽蹻(申脈)

*夜間發作 - 陰蹻(照海) 又灸 百會 風池 各27壯

*攢竹 天井 小海 神門 金門 商丘 行間 通谷 心俞 後谿 鬼眼瀉血

*癩癩驚風- 神庭灸7壯 百會 契脈

*小兒發作- 身柱 百會 肝俞

『鍼灸學²⁷⁾』

癩症

1. 實症-治則：熄風靜癩 寧心安心

治法：取 手足 厥陰 太陰 及 任督脈 經穴爲主 鍼刺 瀉法

風府 鳩尾 內關 太衝 三陰交 豐隆

2. 虛症-治則：固本扶正 健脾化痰 補益肝腎 養心熄風

治法：取 手少陰 足太陰陽明厥陰 經穴爲主 鍼刺 補法 并可灸

神門 三陰交 太衝 豐隆 四神聰 筋縮 陽陵泉

3. 其他療法：

1. 耳鍼：神門 皮質下 心 鍼 腦點 胃 強刺激 每次 選 2~3穴 留鍼 30分 間歇捻

鍼 隔日 一次 10次 一療程

2. 穴位注射：風池 大椎 瘧門 內關 足三里 藥用 維生素 B₁, B₁₂ 或 5% 當歸 注射液 每次 選用2~3穴 每穴 注入 0.5毫升
3. 電鍼：神庭 內關 太陽 足三里 風池 申脈 上述 三組穴位 交替選用 採用 脈衝 電密波 通電10~20分 本法使用于間歇期
4. 穴位埋纏：大椎 瘧門 翳明 神門 三陰交 每次 選 2~3穴 埋入羊腸纏 20天埋一次
5. 挑治法：長強上 五分 一寸 1.5寸處 共三穴 挑至 皮下組織 每週 一次 三次 一療程
6. 灸法：身柱 神道 膈俞 按照癩痕灸法操作 上述穴位可 單獨 使用 也可配合選用 所用 艾炷如黃豆大 每次每穴 各灸3壯 以灸瘡化膿爲好
『中國鍼灸治療學²⁸⁾』

顛癇

1. 肝風痰壅：治則 - 平肝熄風 割痰靜癇
肝俞 心俞 大椎 巨闕 太衝 豐隆 百會 加減-發作時 神昏抽搐 加 人中 湧泉 間使 發作後 頭昏頭痛加 風池 白晝發作加 申脈 夜間發作加 照海
2. 痰火閉竅 -治則：清肝瀉火 化痰開竅
肝俞 心俞 大椎 巨闕 百會 曲池 行間 加減- 煩燥失眠加 神門 頭昏頭痛加 風池 急性發作時 加 人中 湧泉 少商
3. 肝腎陰虛：治則- 滋補肝腎寧心安心
肝俞 腎俞 太谿 太衝 神門 三陰交 加減- 頭昏目眩 記憶力減退 加 風池 心悸怔忡加 內關
4. 脾胃氣虛：治則-補益脾胃 益氣化痰
脾俞 腎俞 足三里 豐隆 內關 加減- 少氣乏力 加 灸神闕 氣海 關元
5. 耳鍼療法：腦點 心 神門 皮質下 腦幹 肝 腎 每次取 2~4穴 強刺激 留鍼 20~30分
6. 水鍼療法：大椎 風池 足三里 內關 藥物選擇 維生素B₁ 注射液 100毫克 或 維生素B₁₂ 注射液 0.5毫及
操作法- 每次 選2~3穴 按水鍼操作法 分別注入 穴位中 每入 一次 十次爲一療程
7. 穴位埋纏療法：主用 大椎 瘧門 配用 翳明 神門
操作法 - 每次 取2~3穴 按穴而埋纏 操作法 每入 每隔20天 每式 一次
8. 頭鍼療法：運動區 感覺區 足運感區
操作法- 按頭鍼操作法 強刺激 留鍼30~60分 每日 或 隔日 一次
『鍼灸學(上海)²⁹⁾』

1. 鍼刺用法

原則：開竅化痰 平肝熄風

常用穴：風府 風池 人中 大椎 腰奇

備用穴：申脈 照海 內關 (或 間使) 神門 (或 通里) 合谷 太衝 三陰交 陽陵泉 巨闕 中脘 豐隆 神庭

2. 耳鍼療法 : 神門 心 腎 鍼 胃 皮質下 腦點
3. 水鍼療法 : 大椎 心俞 意舍 鳩尾 瘕門 內關 足三里 每次 選擇 其皆穴位 用 1% 維生素B₁ 或 0.1~1毫克 維生素B₁₂ 一般 每穴注射 0.3~0.5 毫升左右
4. 電鍼療法 : 神庭 內關 太陽 足三里 風池 僕參 用中等度脈衝電通電 5~10分
5. 灸法 : 百會 鳩尾 上脘 神門 申脈 照海
6. 足鍼療法 : 34號穴 2號穴
『神應經³⁰⁾』

顛痛

攢竹 天井 小海 神門 金門 商丘 行間 通谷 心俞(灸百壯) 後谿 鬼眼

『最新鍼灸藥物綜合治療學³¹⁾』

百會 風池 心俞 肝俞 鳩尾 中脘 神門 間使 豐隆 照海 各穴行中刺激法 隔日二日 施治一次

『鍼灸臨床問答³²⁾』

印堂 風府 大椎 腰奇 爲主 風痰氣逆加 足三里 豐隆 太衝 肝腎陰虛加 肝俞 腎俞 脾胃氣虛加 脾俞 胃俞 頭暈頭痛加 百會 太陽 安眠₂ 四肢抽搐加 後谿 神志不清加 人中

『藥鍼의 秘方³³⁾』

瘕門 後谿 大椎 肩井 風池 上星 天柱 長強

『鍼灸配穴辭典³⁴⁾』

癩

《四川》

治法 : 滋腎養肝

配穴 : 主穴 太谿 太衝

割痰開竅配穴 : 滋養肝腎 - 然谷 照海 心俞 崑崙 申脈 行間 本神 目窓 足三里 豐隆 中脘 鳩尾 加減穴 : 發作時 - 人中 大椎 百會 內關 合谷 太衝 隱白 心身不寧 - 神門 少衝 後谿 支正 內關 大陵 間使 天井 絲竹空

《南京》

治法 : 任督脈을 主로 하고 割痰開竅를 從으로 한다

配穴 : 鳩尾 大椎 腰奇 間使 豐隆

『鍼灸節要³⁵⁾』

癩疾者始生 先不樂 頭重頭痛 視舉目赤 甚作極已而煩心 候之於顏. 取太陽陽明太陰 血變而止 癩疾始作 而引口啼呼喘悸者 候之手陽明太陽 左强者攻右 右强者攻左 血變而止. 癩疾始作 先反僵因而脊痛 候之足太陽陽明手太陽 血變而止. 治癩疾常與之居 察其所當取之處 病至視之 有過者瀉之 置氣血於瓢壺之中 至其發時 血獨動矣 不動 灸窮骨二十壯 窮骨者髀骨也 骨癩疾者頤齒諸俞分肉皆滿 而骨居 汗出煩惋 口多沃沫 氣下泄不治 脈癩疾者暴仆 四肢之脈 皆脹而縱 脈滿 盡刺之出血 不滿灸之 挾項 太陽灸帶脈於腰上去三寸 諸分肉本輸 口多沃沫 氣下泄不治 癩疾者 疾發如狂者 死不治.

『鍼灸治療圖解處方集(上)³⁶⁾』

癩疾

主用穴 : 風府 風池 人中 大椎 腰奇

配用穴 : 申脈 照海 間使 神門 合谷 太衝 三陰交 陽陵泉 巨關 中脘 豐隆 神庭 每日 一回 혹은 隔日一回 治療한다. 中等刺戟을 주고 15~20分間 留鍼하고 間歇運鍼 한다. (밤에 發作 하면 申脈을 빼고 낮에 發作 하면 照海를 빼고 刺鍼한다)

癩癩 1 : 主用穴 : 瘰癧 大椎 腰奇 後谿

配用穴 : 百會 神道 心俞 鳩尾 申脈 照海 內關 神門 合谷 太衝

* 後谿는 合谷까지 透刺한다 强刺戟 15~30分間 留鍼하고 間歇運鍼

癩癩 2 : 主用穴 : 手哭鬼 足哭鬼 上星 長強 身柱

配用穴 : 天柱 申脈 照海 湧泉

主用穴은 各穴마다 5~7壯灸하고 配用穴은 高루 取穴하여 强刺戟을 준다
3일 治療하고 하루 쉬는 方法으로 長期間 治療한다.

『鍼灸集成³⁸⁾』

癩癩

*百會 神庭各七壯 鬼眼三壯 陽谿間使 三十壯 神門心俞 百壯 肺俞百壯 申脈 太衝
尺澤七壯

*陰莖頭 尿孔上宛宛中 三七壯 著火哀乞即差不問男女重者七七壯輕者五壯七壯.

*足大趾本節內紋及獨陰穴各七壯.

『神傳秘方과 秘穴³⁹⁾』

癩癩

肺俞에서 厥陰俞까지의 胸椎兩旁을 點刺瀉血 한다.

『鍼灸治療法⁴⁰⁾』

癩症

*心俞 脾俞 神門 中脘 豐隆 人中 少商

*方 1 -主穴 : 人中 湧泉 取穴 : 內關 足三里 發作時 人中에 刺鍼 하고 發作한
後에 湧泉에 鍼刺 하면 直覺 蘇醒한다 惡心이 있고 全身이 無力하면 다음날 內
關과 足三里에 鍼刺 한다.

*方 2 -瘰癧 後谿 取穴 : 風池 人中 內關 十宣 大椎 腰奇 正發作時 人中에
鍼刺한다 發作 間歇에 主穴을 鍼刺하고 效果가 없으면 配穴을 改善한다 (腰奇
鍼刺는 上向斜刺 2.5~3.0寸 刺入 한다)

*方 3 -主穴 : 長強(放血) 配穴 : 百會透前頂 後頂 內關

IV. 考 察

癩癩의 原因은 《素問 奇病論》¹⁾ 에서는 “在母腹中時 其母有所大驚”이라 하여 先天의 要因을 말하였고, 巢⁷⁾는 “邪入於陰則爲癩疾 又人在胎 其母卒大驚 精氣并居令子 發癩”이라 하여 癩疾의 遺傳의 要因을 言及 하였고, “癩者小兒病也 ……十歲以下爲癩 ……其發之源 此因三種風癩驚癩食癩也”라 하여 癩癩의 原因을 風驚食의 三種으로 分類 하였으며 癩癩의 種類를 原因에 根據하여 風癩驚癩食癩으로 分類 하였고 癩症이 주로 小兒에서 多發 한다고 하였다. 張⁶⁾은 “癩病多由痰氣 凡氣有所逆 痰有所滯 皆能壅閉經絡 格塞心竅”라 하여 癩疾의 原因이 痰에 있음을 말하였고, 虞³⁾는 “癩爲心血不足 多爲求望高遠 不得志者有之”이라 하여 心血不足 으로 神氣乏力 하여 發生된다 하였으며, 高³⁵⁾는 癩疾 외에 骨癩疾 脈癩疾이 있음을 말하였으며, 楊⁴¹⁾은 思慮가 太過 하고 원하는 것을 얻지 못하면 肝氣가 鬱結 되고 脾의 機能이 失調 되어 그 結果 氣鬱生痰 하고 痰이 神明을 阻塞하여 癩症이 發生 된다 하였고 또한 心脾 兩臟이 虛하여 氣血不足 을 誘發하고 心神을 營養하지 못하여 神明을 保存치 못한 結果 癩症이 發生된다 하였

고 病因에 根據 하여 痰氣鬱結과 心脾兩虛 兩種 으로 나누고 있어, 一般의인 癲癇이 肝風痰壅·痰火閉塞經絡心竅 肝腎陰虛 脾腎氣虛 七情氣鬱 등에 發生 됨을 알 수 있다.

症狀은 《靈樞·癲狂病篇》¹⁾에서 “癲疾始生 先不樂 頭重痛 視舉目赤 甚作極已而煩心 引口啼呼喘悸 先反僵因而脊痛”라 하여 癲疾에 癲과 癇을 包含 시키고 있으며, 巢⁷⁾는 “癲病其發仆地 吐涎沫 無所覺是也 癇者其發之狀 或口眼相引 而兩目清上搖 或手足掣縱 背脊強直 或頸項反折”이라 하여 癲症과 癇症을 區別하고 있다. 楊⁴¹⁾은 痰氣鬱結과 心脾兩虛 兩種 으로 나누어 說明하고 있는데 痰氣鬱結의 症狀은 “表情淡漠 神志痴呆 語無論次 時哭時笑 喜怒無常 不思飲食 舌苔白膩 脈狀弦細或弦滑”등 精神이 抑鬱된 樣相을 보이고, 心脾兩虛의 境遇는 “神思恍惚 魂蒙顛倒 失眠多夢 沈默寡言 心悸易驚 善悲欲哭 肢體困乏 倦怠無力” 등의 氣血不足 으로 인한 症狀이 나타난다 하였다. 高³⁵⁾는 “癲疾者始生 先不樂 頭重頭痛 視舉目赤 甚作極已而煩心” “癲疾始作 而引口啼呼喘悸者” “癲疾始作 先反僵因而脊痛.”이라 하여 癲疾의 다양한 症狀을 언급 하였으며, 癇疾의 症狀이 다양하여 後人들이 이것을 五癇으로 分類 하였으나, 近代에 와서는 臨床上 一般의 大發作, 小發作, 精神運動發作, 自律神經發作의 四類型으로 나누어 볼 수 있는데 4), 大發作은 發作前에 恐懼 胸悶 頭昏 등의 先條가 있다가 突然히 足仆 이상한 叫聲 意識喪失 全身強直이 나타나고 以後에 抽搐 牙關緊閉 嘔吐白沫(或 血沫) 瞳孔散大 大小便失禁 의 症狀을 나타내다가 잠시후 抽縮이 停止 되며 昏睡狀態에 들어 갔다가 若半 時間 以上이 지난뒤에 漸漸 清醒하게 된다. 靈樞에 本症을 妙術하기를 “癲疾始生 先不樂 頭重痛” “癲疾始作而引口啼呼 喘悸” 以及 “口多沃沫 氣下泄”이라 하였는데 이말은 即 大發作의 症狀을 두고 한말이다, 小發作은 突然 잠간사이에 神志喪失 呆立 瞪目直視 言語中斷등이 나타나고 손에 쥔 物質을 脫落 하는 症狀이 있으나 但 跌仆와 抽搐의 症狀은 없고, 精神運動性發作은 突然히 意識이 모호 해지며 作業途中 혹은 睡眠中에 갑자기 起立 徘徊 奔走등을 發作하여 數分 乃至는 몇시간 동안 持續하며 發作을 한 뒤에는 發作中에 한 行爲를 記憶하지 못한다, 局限性發作은 一側口角이나 手足 혹은 足趾에 局限性 抽動이 始作 되다가 점차 한쪽 肢體로 擴散해 가고 또 한쪽 肢體가 突然히 感覺異常 혹은 感覺消失의 症狀이 나타나며 無意識 障礙도 많은 것으로⁴⁰⁾, 癲症은 精神分裂症의 破孤型이나 妄想型 또는 燥鬱病의 鬱病에서 흔히 볼 수 있는 症狀들이라 할 수 있다⁴²⁾.

癲癇은 肝風痰壅으로 發生된 境遇는 平肝熄風 割痰定癇 시키고, 痰火에 의해 閉竅되어 나타난 때는 清肝瀉火 化痰開竅 하며, 肝腎陰虛로 인한 것은 滋補肝腎寧心安神 시키고 脾腎氣虛로 인한 것은 補益脾腎 益氣化痰의 治法을 利用한다²⁸⁾

鍼灸治療에서 使用된 經穴의 數가 많은 經絡은 足太陽膀胱經, 督脈, 任脈, 足少陽膽經, 手太陽小腸經, 手厥陰心包經, 足少陰腎經, 足厥陰肝經, 手少陰心, 手陽明大腸經, 手少陽三焦經, 手太陰肺經, 足太陰脾經, 足陽名胃經의 순으로 나타났으며, 各經穴이 使用된 頻度數는 神門(18회), 百會(16회), 風池·大椎(15회), 心俞(14회), 申脈·內關(13회), 照海·間使·豐隆·後谿(11회), 足三里(10회), 鳩尾(9회), 中脘·肝維(8회), 湧泉·神庭·人中(7회) 등의 순으로 調査 되었으며 背部의 督脈과 膀胱經을 爲主로 陰經보다 陽經이 多用 되었음을 알 수 있었고, 應急處置에 利用되는 經外奇穴의 經穴에 強刺戟을 施術하는 것으로 나타났다. 《表.1.》

神門은 扶正祛邪 하고 寧心安神 시키며 清火涼營²⁷⁾ 하여 調氣逆·清心熱²⁶⁾ 하는 作用이 있으며, 百會는 頭頂部에 位置하여 百疾을 다스리고 熄風醒腦·升陽固脫²⁷⁾ 清熱開竅²⁶⁾ 하는 效能이 있어서 肝風痰壅 등에 의해 發病된 癲癇을 治療 한다. 기타의 經穴들

도 癩癩이 주로 火熱에 의한 것이고 神明과 관계가 많은 까닭에 주로 泄熱 시키는 背部 陽經의 經絡과 寧心安神 시키는 經穴이 多用되었다고 思料된다. 《表.2.》

《表.1.》 經絡 및 經穴의 使用回數

	經絡	經穴 및 使用回數	穴數	使用回數
陰經	手太陰肺經	少商. 尺澤(2)	2	4
	手厥陰心包經	內關(13), 間使(11), 勞宮. 大陵(1)	4	26
	手少陰心經	神門(18), 通里. 少衝(1)	3	20
	足太陰脾經	三陰交(6) 隱白(1)	2	7
	足厥陰肝經	太衝(6) 行間(5) 商丘(3)	3	14
	足少陰腎經	照海(11) 湧泉(7) 太谿(2) 然谷(1)	4	20
	任脈	鳩尾(9) 中脘(8) 巨關(4) 上脘(3) 神關. 氣海. 關元. 承漿. 曲骨(1)	9	29
陰經穴의 總計		手三陰經(9) + 足三陰經(9) + 任脈(9)		27
陰經穴使用回數總計		手三陰經(50) + 足三陰經(41) + 任脈(29)		120
陽經	手太陽小腸經	後谿(11), 小海(3), 天容. 支正(1)	4	16
	手陽明大腸經	合谷(4), 陽谿(2), 曲池(1)	3	7
	手少陽三焦經 足太陽膀胱經	天井(4), 契脈. 絲竹空(1) 心俞(14), 申脈(13), 肝俞(8), 金門(4) 攢竹. 腎俞. 天柱. 脾俞(3), 膈俞(2) 承筋. 諛諛. 厥陰俞. 胃俞. 僕參(1) 崑崙. 玉枕. 肺俞. 意舍. 大杼. 合陽(1)	3 20	6 68
	足陽明胃經	豐隆(11) 足三里(10)	2	21
	足少陽膽經	風池(15), 陽陵泉(3) 本神(2) 太衝. 外丘. 肩井. 目窓(1)	7	24
	督脈	百會(16), 大椎(15), 神庭. 人中(7) 瘡門(6) 風府(5) 身柱(4), 上星. 長強(3) 神道. 後頂(2), 筋縮. 兌端. 前頂(1)	14	73
	陽經穴의 總計		手三陽經(10) + 足三陽經(29) + 督脈(14)	
陽經穴使用回數總計		手三陽經(29) + 足三陽經(113) + 督脈(73)		215
經外奇穴		鬼眼. 腰奇(6), 太陽(3) 翳明. 陰莖頭(2) 十宣(2), 印堂. 四神聰. 安眠2. 癩癩穴		19 30

	癩癩1穴. 手哭鬼. 足哭鬼. 玉門頭(1) 獨陰(1)		
經穴의 總計	陰經(27)+陽經(53)+經外奇穴(19)		99
經穴使用 數의 總計	陰經(120)+陽經(215)+經外奇穴(30)		365

《表.2.》 經穴의 穴性 및 鍼灸法

經絡	穴名	穴性	針灸法
陰	手太陰肺經	尺澤 肅降肺氣 滋陰潤肺27) 泄肺炎 降逆氣 清上焦之熱26)	灸七壯38)
	少商	泄熱開竅 回陽救急 利咽鎮痙27) 通經氣 清肺逆 利咽喉 回陽救逆26)	
經	手厥陰心包經	內關 寧神鎮痛 疏肝和中27) 疏三焦 寧神安心 寬胸理氣 和胃 鎮定鎮痛26)	穴位注射: 藥用 維生消 B1, B12或5%當歸注射液 注入0.5毫升27) 電鍼: 脈衝電密波通電 10~20分本法使用於 間歇期27) 水鍼療法: 維生素B1注射 液100毫克或維生素B12 注射液0.5毫克分別注入 穴位中28) 用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29) 中等度脈衝電通電29) 強刺載15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
	間使	寬胸解鬱 寧心降逆27) 調心氣 清神志 和胃祛痰 通經治絡26)	兩脚轉1筋者間使瀉一日 二三次行21) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 灸30壯38) 每日或隔日一回治療 中等刺載15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	大陵	寧心安心 寬胸和胃27) 清心寧神 和胃寬胸 清營涼血26)	
	勞宮	清心安心 消腫止痒27) 清心火 除濕熱 疏風涼血 安心和胃鎮靜 開竅回陽26)	
	手	神門	扶正祛邪 寧心安神27)

少陰心經		安心寧神 清火涼營 調氣逆 清心熱26)	27) 灸法29) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 灸百壯38) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
	通里	寧志安心 益陰清心27) 安心寧神 熄風和營26)	
	少衝	清熱熄風 寧神醒腦27) 開心竅 清神志 勞厥逆 泄邪熱26)	
足太陰脾經	三陰交	健脾利濕 兼調肝腎27) 補脾土 調運化 通氣滯 消下焦 調血室精宮 祛經絡風濕26)	埋入羊腸纏20天每一次 27) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	商丘	健脾化濕 肅降肺氣27) 健脾胃 化濕滯26)	
	隱白	健脾寧神 調經通血27) 調血通血 扶脾溫脾 清心寧神 溫陽回厥	
足厥陰肝經	太衝	平肝熄風 健脾化濕27) 清熄肝火肝陽 疏泄下焦濕熱 舒肝理氣 通絡活血26)	灸七壯38) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
	行間	平肝熄風 寧心安心27) 泄肝火 涼血熱 清下焦 熄風陽26)	
足少陰腎經	照海	調陰寧神 通調利陰27) 通經化熱 泄火疏氣 清神志 利咽喉26)	灸法29) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 낮에發作하면뻐다36) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36) 強刺戟,三日治療하고 하루신다36)

	湧泉	益腎調便 平肝熄風27) 清腎熱 降陰火 寧神志 勞厥逆26)	強刺戟, 三日治療하고 하루신다36)
	太谿	益腎納氣 培土生金27) 滋腎陰 退虛熱 壯元陽 利胞宮 強健腰膝26)	
	然谷	益腎固泄 導赤清心27) 退腎熱 疏厥氣 利下焦26)	
任脈	鳩尾	安心寧神 寬胸定喘27)	用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29) 灸法29) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
	中脘	和胃健脾 通降扶氣27) 和胃氣 化濕滯 利中焦 調昇降26)	灸50壯22) 兩脚轉筋者中脘瀉一日 二三次行21) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	上脘	和胃降逆 化痰寧神27) 利脾胃 化痰濁 疏氣機 寧神志26)	灸法29)
	巨關	安心寧心 寬胸止痛27) 消胸隔痰飲 化中焦濕滯 清心寧心 理氣暢中26)	每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	神關	溫陽救逆 利水固脫27) 溫通溫陽 勞厥固脫 運腸胃氣機 化寒濕積滯26)	少氣乏力灸28)
	氣海	益氣調陽 調經固精27) 調氣益元 培腎補虛 和營血 利經帶 溫下焦 祛濕鎮陽固精26)	少氣乏力灸28)
	關元	培補元氣 導赤通淋27) 培腎固元 補益元氣 回陽固脫 溫調血室精宮 除祛寒濕陰冷 分清別濁 調元散邪26)	少氣乏力灸28)
	曲骨	通里小便 調經止痛27)	

		承漿	生津斂液 舒筋活絡27) 調陰陽氣機乖逆 消浮沈面目風邪 26)	
陽 經	手太陽	後谿	清心解鬱 清熱載虛27) 寧心安心 清熱利濕 通督脈 固表分26)	合谷까지透刺한다36) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
	小腸經	小海	疏肝安心 清熱消腫27) 散太陽經邪 通小腸熱結 祛風氣 清神志26)	
		支正	疏肝寧神 清熱解表27) 清神 解表熱 疏驚邪26)	
		天容	利咽消腫 聽耳降逆27) 祛風泄火 消散陽明邪熱26)	
手陽明大腸經		合谷	清熱解表 明目聽耳27) 發表解熱 消風解表 鎮痛安心 清泄肺氣 通降腸胃 通經活絡26)	每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
		曲池	散風止痒 清熱消腫27) 消邪熱 利關節 祛風濕 調氣血26)	
		陽谿	發熱 耳鳴 咽喉痛 難聽	灸30壯38)
手少陽三焦經		天井	聽耳寧神 理氣消痰27) 化經絡痰濕 消三焦氣火26)	
		絲竹空	散風清熱 寧神鎮驚27) 平肝熄風 明目鎮痛 清火泄熱 通調三焦氣機26)	
		契脈	聽耳定驚27)	
足太陽膀胱經		心俞	寬胸痛氣 安心寧神27) 養心安營 清神寧志 調理氣血26)	用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29) 灸百壯29) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 灸百壯38) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
		申脈	鎮定止痛 安心寧心27) 疏表邪 治風痰 寧神志 舒筋脈26)	電鍼: 脈衝電密波通電 10~20分本法使用於 間歇期27) 灸法 29)

		灸七壯38) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36) 밤에發作하면 뺨다36) 強刺戟, 三日治療하고 하루신다36)
肝俞	疏肝利膽 安心明目27) 補營血 消癥瘕 補肝膽濕熱 能寧神明目26)	行中刺激法隔日二日 施治一次31)
金門	安心止癩 疏通經絡27)	
通谷	寧神安心 清熱載虛27) 疏導經氣26)	
攢竹	散風鎮驚 清熱明目27) 善泄太陽熱氣 治絡明目26)	
天柱	熄風寧神 祛風散寒27)	強刺戟, 三日治療하고 하루신다36)
腎俞	益腎助陽 納氣利水27) 滋補腎陰 鎮氣化 祛水濕 強腰脊 益水壯火 益清明目26)	
脾俞	健脾利濕 昇清止泄27) 扶土祛水濕 利脾調運化 益營血 26)	
肺俞	調肺利氣退熱	厥陰俞까지胸椎兩旁 點刺瀉血39)
胃俞	和胃健脾 理中降逆27) 健脾和胃 化濕消滯 扶中氣虛弱 26)	
膈俞	化血止血 寬胸降逆27) 清血熱 利虛損 和胃氣 寬胸隔26)	癥瘕灸法 艾柱如黃豆大 3壯灸瘡化膿爲好27)
玉枕	解表清熱 明目降逆27)	
大椎	解表清熱 宣肺止咳27) 祛風邪 解表退熱 舒筋脈 調骨節 26)	
諛譎	理氣止痛 清熱宣肺27)	
意舍	健脾利濕 和胃利膽27) 疏泄濕熱 健運脾陽26)	用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29)

	合陽	散寒導氣 調經止崩27)	
	承筋	調理中焦 清泄壯熱27)	
	崑崙	清熱載瘡 鎮痙止癩27) 祛太陽經邪 利胞宮滯血 舒筋化濕 健腰強腎 消腫止痛26)	
	僕參	調化中焦 鎮痙舒筋27) 通經活絡 消腫止痛26)	中等度脈衝電通電29)
足陽明胃經	足三里	和胃健脾 通腑化痰 昇降氣機27) 爲脾胃 調中氣 和腸消滯 疏風化濕 通調經絡 調化氣血 扶正培元 祛邪防病 強健脾胃26)	穴位注射:藥用 維生素B1, B12或5%當歸注射液 注入0.5毫升27) 電鍼:脈衝電密波通電 10~20分本法使用於 間歇期27) 水鍼療法:維生素B1注射 液100毫克或維生素B12 注射液0.5毫克分別注入 穴位中28) 用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29) 中等度脈衝電通電29)
	豐隆	化痰定喘 寧心安心27) 和胃氣 化痰濕 清神志26)	行中刺激法隔日二日 施治一次31) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
足少陽膽經	風池	平肝熄風 清熱解表27) 調氣血 祛風解表 疎邪清熱 清頭開竅 明目益清 利機關26)	夜間發作灸27壯26) 穴位注射:藥用 維生素B1, B12或5%當歸注射液 注入0.5毫升27) 電鍼:脈衝電密波通電 10~20分本法使用於 間歇期27) 水鍼療法:維生素B1注射 液100毫克或維生素B12 注射液0.5毫克分別注入 穴位中28) 中等度脈衝電通電29) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	本神	安心寧神 熄風鎮痙27)	
	陽陵泉	疏肝利膽 舒筋鎮痙27)	每日或隔日一回治療

	舒筋脈 清泄濕熱 驅腿膝風邪 疎經絡濕滯 強健腰腿26)	中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	外丘 安心鎮痙 疏肝寬胸27)	
	天衝 寧心安心 消腫止痛27)	
	目窓 開竅明目 熄風鎮痙27) 疎通經絡 清頭明目26)	
	肩井 祛風清熱 消腫止痛27) 割痰開竅26)	
督脈	百會 熄風醒腦 升陽固脫27) 熄肝風 潛肝陽 清神志 回陽固脫 去陽氣下陷 清熱開竅26)	夜間發作灸27壯26) 灸24) 灸法 29) 行中刺激法隔日二日 施治一次31) 7壯38) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36) 百會透前頂40)
	大椎 清熱解表 載瘡止痛27) 疎風散寒 解表通陽 利氣降逆 鎮靜安心與健腦26)	穴位注射:藥用 維生消 B1, B12或5%當歸注射液 注入0.5毫升27) 埋入羊腸繯20天每一次 27) 水鍼療法:維生素B1注射 液100毫克或維生素B12 注射液0.5毫克分別注入 穴位中28) 用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	神庭 安心醒腦 降逆平喘27) 健腦寧神 散風熱 通鼻竅26)	癲癇驚風灸7壯26) 電鍼:脈衝電密波通電 10~20分本法使用於 間歇期27) 中等度脈衝電通電29) 7壯38) 每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	人中 醒神開竅 清熱熄風27) 清熱開竅 清神志 祛風邪 疎內熱 能助陰 降逆氣 鎮痛寧神 回陽救逆26)	每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)

	痙門	散風熄風 開竅醒神27) 通經絡 利機關 開神竅 清神志26)	穴位注射:藥用 維生素 B1, B12或5%當歸注射液 注入0.5毫升27) 埋入羊腸繯20天每一次 27) 用1%維生素B1或0.1~1 毫克維生素B120.3~0.5 毫升左右注射29)
	風府	散風熄風 通關開竅27) 祛風邪 利機關 清神志 泄氣火26)	每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36)
	身柱	宣肺清熱 寧神鎮痙27) 利氣降逆 去邪退熱 清心寧志補肺 止咳喘26)	癥痕灸法 艾柱如黃豆大 3壯灸瘡化膿爲好27) 5~7壯灸36)
	上星	熄風清熱 寧神通鼻27) 散風熱 通鼻竅26)	5~7壯灸36)
	後頂	醒腦安心 熄風鎮痙27)	
	兌端	寧神醒腦 生津止渴27)	
	神道	寧神安心 清熱平喘27)	癥痕灸法 艾柱如黃豆大 3壯灸瘡化膿爲好27) 強刺戟15~30分間留鍼 間歇運鍼36)
	筋縮	平肝熄風 寧神鎮痙27)	
	長強	寧神鎮痙 通便消痔27) 通任督 調臟腑26)	5~7壯灸36) 放血40)
經外奇穴	四神聰	寧神安心 明目聰耳27)	
	印堂	鎮痙清神 明目通鼻27)	
	太陽	清熱消腫 止痛泄惡27)	電鍼:脈衝電密波通電 10~20分本法使用於 間歇期27) 中等度脈衝電通電29)
	翳明	熄風寧神 退翳明目27)	埋入羊腸 20天每一次 27)
	安眠	平肝熄風 寧神鎮痙27)	
	腰奇	鎮痙止癩 寧神通便27)	每日或隔日一回治療 中等刺戟15~20分留鍼 間歇運鍼36) 上向斜刺2.5~3.0寸

		刺入40)
陰莖頭		灸37壯21) 灸37壯38)
玉門頭		灸37壯21)
鬼眼		大人瀉血或灸21) 3壯38)
獨陰		灸七壯38)
手哭鬼		5~7壯灸36)
足哭鬼		5~7壯灸36)

V. 結 論

癩癩의 鍼灸治療에 대하여 黃帝內經 外 44種의 文獻을 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 原因은 胎中에 있을때 産母가 大驚하여 發生되는 先天的 要因과 痰塞閉經絡心竅 七情氣鬱 氣血虛而 兼痰火 등으로 나타났다.
2. 症狀은 癩疾이 시작될때 先不樂 頭重痛 視舉目赤 甚作極已而煩心 引口啼呼喘 悸 先反僵因而脊痛 등의 다양한 樣相을 보이며, 十歲以上에서 發病되면 癩, 十歲以下에서 發病되면 癩이라 命名 하는 것으로 나타났다.
3. 治法은 割痰定癩 清肝瀉火 滋補肝腎寧心安神 補益脾腎을 爲主 나타났고 鍼灸治療에 使用된 經穴의 數가 많은 經絡은 足太陽膀胱經, 督脈, 任脈, 足少陽膽經, 手太陽小腸經 手厥陰心包經 足少陰腎經, 足厥陰肝經 등의 순으로 나타났으며, 各 經穴이 使用된 頻度數는 神門, 百會, 風池 大椎, 心俞, 申脈 內關, 照海 間使 豐隆 後谿, 足三里 등의 순으로 調査 되었다.

以上에서 癩癩의 原因, 症狀, 治法 및 鍼灸治療에 대한 調査는 基礎 및 臨床에서 도움이 될 것으로 思料된다.

參 考 文 獻

- 1) 王水 註 : 黃帝內經, 北京, 中華書局, pp. 41, 143, 210, 250, 294, 347, 年度未詳
- 2) 金元圭 : 癩狂癩에 대한 文獻의 考察 및 臨床의 研究, 大田大學校韓醫科大學院本草學教室, 1989.
- 3) 虞 搏 : 醫學正傳, 北京, 人民衛生出版社, p. 267, 1981.
- 4) 黃義完 外 : 東醫精神醫學, 서울, 現代醫學書籍社, pp. 373~388, 1987.
- 5) 嚴用和 : 濟生方, 서울, 驢江出版社, pp. 743-503, 743-509, 1987.

- 6) 張介賓：景岳全書，서울，翰成社，pp.609~610，1978.
- 7) 陳士鐸：石室秘錄，北京，人民衛生出版社，pp.14,34~35,140,207，年度未詳.
- 8) 巢元方：諸病源候論，台北，文光圖書有限公司，pp.181~182，1977.
- 9) 孫思邈：備急千金要方，北京，人民衛生出版社，pp.77~78,258~261，1982.
- 10) 朱震亨：丹溪心法，台北，五洲出版社，pp.357~362，1969.
- 11) 劉河間：劉河間傷寒三六書，서울，翰成社，pp.274~275，1981.
- 12) 李 梴：醫學入門，서울，翰成社，p.398，1977.
- 13) 王肯堂：證治準繩，上海，上海科學技術出版社，p.309,313，1984.
- 14) 滑 壽：難經本義，台北，旋風出版社，pp.26,59，1978.
- 15) 陳無擇：三因方，서울，翰成社，pp.339~342，1977.
- 16) 樓 英：醫學綱目，台南，北一出版社，pp.12~13，1973.
- 17) 龔延賢：萬病回春，서울，行林書院，pp.226~228，1972.
- 18) 林珮琴：類證治裁，台北，旋風出版社，p.239~242，1974.
- 19) 金定濟：診療要鑑，서울，東洋醫學研究院，p.230，1983.
- 20) 上海中醫學院：中醫內科學，上海，上海科學技術出版社，p.537，1971.
- 21) 崔容泰 外：精解鍼灸學，서울，行林書院，p.842，1974.
- 22) 扁 鵲：扁鵲心書，서울，行林書院，pp.67~68，1972.
- 23) 山東中醫學院：鍼灸甲乙經校釋，北京，人民衛生出版社，pp.1308~1323，1980.
- 24) 高 武：針灸聚英，上海，上海科學技術出版社，p.176，1978.
- 25) 楊繼州：鍼灸大成，서울，大成文化社，pp.407~408，1985.
- 26) 崔容泰 外：鍼灸學(上,下)，서울，集文堂，pp.307,314,324,326,331,383,388,400,403~404,428,430,432,441,446,454,467,475~476,478~481,483~484,486~489,508,511,516,522~524,526,536,538~539,542,573~576,579,594,601,606,626,629,632~633,648,650,667,688,695,697~698,700~701,703,706~710,718~719,726,729,731~734,1184~1186，1988.
- 27) 楊甲三 主編：鍼灸學，北京，人民衛生出版社，pp.179,183,187~189,193~195,201,234,246~256,275~276,299~300,302,313~315,317~318,325,335,337~339,348,350,352,366~367,378~379,384~385,392,394,398~401,405~408,413~417,420,425,427,629~631，1989.
- 28) 邱茂良 主編：中國鍼灸治療學，江蘇科學出版社，pp.291~297，1988.
- 29) 上海中醫學院：鍼灸學，北京，衛生出版社，pp.481~483，1977.
- 30) 陳 會：神應經，北京，中醫古籍出版社，pp.46~47，1989.
- 31) 吳方濟：最新鍼灸藥物綜合治療學，台北，聖家鍼灸研究社，pp.163~164，年度未詳.
- 32) 孫學全：鍼灸臨床問答，山東科學技術出版社，p.135，1987.
- 33) 李炳國：藥鍼의秘方，서울，現代鍼灸院，pp.200~201，1992.
- 34) 金康植 外：鍼灸配穴辭典，서울，一中社，pp.120~121，1991.
- 35) 高 武：鍼灸節要，華聯出版社，pp.14~15，年度未詳.
- 36) 李炳國：鍼灸治療圖解處方集，서울，現代鍼灸院，p.16，1987.
- 37) 洪錫殷 編：鍼灸基礎理論과 臨床治療，서울，東洋書籍，pp.284~288，1991.

- 38) 廖潤鴻 編 : 鍼灸集成, 北京, 中國書店, p.17, 1986.
- 39) 李病國 : 神傳秘方과秘穴, 서울, 現代鍼灸院, p. 59, 1989.
- 40) 金容基 : 鍼灸治療法, 서울, 書苑堂, pp. 222~225, 1977.
- 41) 楊醫竝 編 : 中醫學問答, 北京, 人民衛生出版社, pp.120~121, 1985.
- 42) 金相孝 : 東醫神經精神科學, 서울, 行林出版社, pp.193~194, 1980.
- 43) 王執中 : 針灸資生經, 서울, 一中社, pp.17~19, 年度未詳.
- 44) 華 陀 : 華氏中藏經, 台北, 自由出版社, pp. 7, 12, 1978.
- 45) 安榮基 : 經穴學叢書, 서울, 成輔社, pp. 106~107, 342~343, 1986.