

産後血暈에 관한 文獻的 考察

孫宰麟 · 柳同烈

I. 緒 論

産後血暈은 産後急症의 하나로 産後에 갑자기 眩暈을 일으켜, 일어설 수가 없으며,甚하면 昏迷하여 말을 하지 못하게 되고 人事不省에 빠지는 것을 말한다.¹⁾

産後血暈에 대하여 張²⁾은 金匱要略에서 新産三大病症의 하나인 “鬱冒”로써 처음言及하였고, 巢³⁾等⁴⁾은 “産後血運悶”, 王⁵⁾은 “産後血暈心悶”, 李⁶⁾는 “血暈悶”, 齊⁷⁾等^{6,8,9,10)}은 “暗風”, 陳¹¹⁾等^{1,4,5,8,9,10,12-39)}은 “血暈”, 沈⁴⁰⁾은 “眩暈昏冒”라 하여 그 表現이 多樣하다.

産後血暈의 原因으로 宋¹⁰⁾은 亡血復汗, 敗血上攻, 氣血虛極, 痰熱上升으로 나누었고,²¹⁾은 敗血流入肝血熱逆上, 瘀血奔心虛火炎上, 惡露升虛上攻의 有餘證과 陰血暴亡心虛火炎, 血隨氣上, 虛火戴血上升腹中空虛의 不足證으로 나누고 있다. 主要症狀은 分娩後 忽然頭暈하고 目眩眼昏하여 起坐不能하고, 或은 心中이 滿悶하며 惡心嘔吐하고, 或은 痰이 끓어올라 氣急해지며, 甚하면 口衾神昏하여 人事不省이 된다.^{4,34,41)}

妊娠中뿐만 아니라 産後에도 頻發하는 眩暈에 對한 文獻的 實驗的 研究는 一部있으나⁴²⁻⁴⁵⁾ 未洽한 實情이며, 特히 産後血暈에 對한 研究는 거의接할 수 없는 實情이다.

이에 著者는 古代로부터 現代에 이르는 歷代文獻中에서 産後血暈의 다른 表現, 原因及 處方을 考察 整理하여 보았으며 약간의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 本 論

1. 資料調査 및 研究方法

1) 資料調査

韓醫學의 歷代文獻中에서 金匱要略에서부터, 最近의 東洋醫學叢書 中醫婦科學에 이르기까지 約 46餘種의 文獻을 選定하여 産後血暈에 關한 部分을 拔萃하여 이를 研究 對象으로 삼았다.

2) 研究方法

(1) 産後血暈의 表現을 文獻調査 整理하였다.

(2) 産後血暈의 原因을 文獻調査 整理하였다.

(3) 産後血暈에 使用된 處方을 文獻調査 整理하였다.(但 內服藥에 한함)

(4) (1), (2), (3)에서 얻어진 資料들 中에서 重複되는 內容은 重複되는 대로 整理하였다.

2. 疾患分類

* 大田大學校 韓醫科大學 婦人科學敎室

鬱冒, 血運悶, 血暈心悶, 血暈, 血運, 運悶, 血暈悶, 暗風, 產後眩暈, 血眩, 暈煩不省, 目暈, 暈, 昏暈, 氣脫血暈, 眩暈昏冒, 血厥.

3. 文獻調查

1) 金匱要略方論²⁾

門曰新產婦人有三病 一者病輻 二者病鬱冒 三者大便難何謂也.

師曰新產血虛 多汗出喜中風 故令病輻 亡血復汗 寒多故令鬱冒 亡血津液胃燥 故大便難. 產後鬱冒 其脈微弱 不能食 大便反堅 但頭汗出 所以然者 血虛而厥 厥而必冒. 小柴胡湯主之.

2) 巢氏諸病源候總論³⁾

產後血運悶候

運悶之狀 心煩氣欲絕是也. 亦有去血過多. 亦有下血極少. 皆令運. 若產去血過多 血虛氣極 如此而運悶者 但煩悶而已. 若下血過少而氣逆者 則血隨氣上掩於心 亦令運悶則煩悶而心滿急. 二者爲異 亦當候其產婦血下多少 則知其產後應運與不運也.

3) 外臺秘要⁵⁾

產後血暈心悶方一十首

廣濟療產後血暈心悶不識人或神言鬼語氣欲絕方

又療產後心悶血氣衝上血暈羚羊角散方

崔氏凡暈者 皆是虛熱 血氣奔 腹中空所致 又凡產後忽悶冒汗出不識人者是暴虛故也方.

4) 類證普濟本事方⁴⁶⁾

婦人產後有三種疾 鬱冒則多汗 汗則大便秘 故難於用藥 惟麻子蘇子粥 最佳則穉

5) 太平惠民和劑局方¹²⁾

芎 湯 治產後去血山崩 暈悶不省 及傷胎去血多 崩中去血多 金瘡去血多 拔牙齒去血多 不止懸虛 心煩眩暈 頭重目暗 耳聾滿塞 暴頭傾倒 竝皆治之

蒲黃散 治產後惡露下快 血上 心煩悶滿急 昏迷不省 或狂言妄語 氣喘欲絕

大聖散 治婦人血海虛冷 久無子息 及產後敗血衝心

黑神散 治婦人產後 惡露不盡 胞衣不下 攻衝心胸 毗滿或臍腹堅脹撮痛 及血暈神昏 眼黑口衄 產後瘀血諸疾 竝皆治之

內炙散 治婦人產前產後一切血疾 …… 血迷血運血珂時發疼痛 頭目眩暈 惡血上心 悶絕昏迷 惡露不乾 體虛多汗 手足逆冷 竝宜服之

6) 產育寶慶集¹⁶⁾

第四論曰 產後血暈悶者何 答曰產後氣血暴虛 未得安靜 血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花 極甚者 令人悶絕 不知人 口衄神昏 氣冷 醫者不識 呼爲暗風 若作此治之病必難愈 但服清魂散即省.

陳言評曰產後眩暈 頃刻害人 須量虛實爲治 若胸中宿有痰飲阻病不除 產後多致眩暈 又血盛氣弱 氣不使血 逆而上攻 此等皆非清魂可療 仍用半夏茯苓湯 血壅 須用牧丹皮散 但藥尤難輒用 當識輕重 所謂擾乎可擾亦無擾 若氣血平人 因去血多致暈者 芎 湯尤佳.

牧丹皮散 治產後血暈 悶絕狼狽 若口衄則須拗開灌之必效

7) 三因極一病證方論⁸⁾

第四論曰產後血暈者何 答曰產後氣血暴虛 未得安靜 血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花 極甚者 令人悶絕 不知人事 口衄神昏 氣冷 醫者不識 呼爲暗風 若作此治之 病必難愈 但服清魂散自愈

評曰產後眩暈 頃刻害人 須量虛實爲治 若胸中宿有痰飲阻病不除 產後多致眩暈 又血盛氣弱 氣不使血 逆而上攻 此等皆非清魂可療 瘀暈仍用半夏茯苓湯 血壅須用牧丹 但 藥尤難輒用 當識輕重 所謂擾乎可擾 若氣血平人 因去血多致暈者 川芎湯

8) 女科百問⁷⁾

第八十三問產後血運者何也

答曰 產後氣血暴虛 未得安靜 血隨氣上 迷亂心神故眼花 甚者令人迷絕 口衄神昏氣冷 醫者不識呼爲暗風 若作此治病必難愈 但服清魂散 七寶散 初產後調血和氣補虛壓驚悸 治虛運

9) 醫說⁴⁷⁾

凡產後運悶有四種 有下血太多虛極運悶宜服羊肉湯兼黑神散 有血不少血上逆於 心亦令運悶 如心腹刺痛宜腹四物湯可桂 黑神散 芎 散 有體中素多風疾因產損傷氣血 兼虛而運悶 四物湯加防風羌活 熱多者與獨活柴胡湯并治風痰藥 有心氣將 溫過度邪熱上乘於心逆令人言語錯亂運悶者宜服鎮心補心丹 生薑生地黃散 至寶丹 桃奴丸

10) 婦人良方大全¹¹⁾

產後血暈 乃血入肝經 甚至眼花胸悶 用黑神散主之 下血過多用清魂散補之 愚按前症若惡露上行 用失笑散 血下過多芎歸湯 若過勞所傷補中益氣湯 氣血虛極用清魂散 ……

一婦 …… 產後眩暈胸滿咳嗽用四物加茯苓半夏桔梗而愈

一妊婦因產飲酒惡露甚多患血暈 口出酒氣 此血得酒熱而妄行虛而作暈也 以佛手散加藕甘葛二錢一劑而

佛手散 治產後去血眩暈欲絕

11) 仁齋直指¹³⁾

黑神散 治婦人產後惡露不盡胎衣不下血氣攻心眩暈等證

清魂散 治產後血暈昏不知人

愈風散 …… 治血暈四肢強直或築心眼倒吐瀉欲死

12) 宣明方論⁴⁹⁾

辰砂大紅丸 治產後寒熱運悶血氣塊硬疼痛不止

13) 保命集⁴⁹⁾

治血運血結血聚於胸中 或偏于少腹 或連于脇肋 四物湯四兩倍當歸川芎加鬼箭紅花玄胡各一兩同爲末如四物湯煎服 取清調沒藥散服之

治產後風虛血眩精神昏昧 荊芥散

14) 世醫得效方¹⁴⁾

黑神散 治產後惡露不盡 或胎衣不下攻衝心腹胸膈毗滿 或臍腹堅脹撮痛 及神昏 血暈眼花口衄 產後瘀血諸疾

蔘蘇飲 治婦人產後血暈 不省人事 面黑氣喘

15) 金匱鉤玄¹⁵⁾

產後血暈

虛火載血漸漸暈來

用鹿角燒灰出火毒研爲極細末以好酒調灌下即醒行血極快也

16) 玉機微義¹⁶⁾

局方芎歸湯 治產後去血過多暈煩不省

嚴氏清魂散 治產後血暈昏不知人更宜取漆器於床前燒薰之類置醋炭更服此藥

獨行散 治產後血暈昏迷

17) 薛氏醫案¹⁷⁾

·產後血暈乃血入肝經甚至眼花昏悶用黑神散主之 下血過多用清魂散補之 或以醋湯細飲或預燒秤錘以醋沃之 或 醋塗口鼻 或燒器薰之使產母鼻吸其氣庶無此患 (註)愚按前症 若惡露上行用失笑散 血下過多芎歸湯 若過勞所傷補中益氣湯 氣血虛極用清魂散 …….

·奪命丹 治血暈腹痛

·佛手散 治產後去血眩暈欲絕

18) 石山醫案⁵⁰⁾

·一婦產後時發昏懋身熱汗多眩暈口渴 或時頭痛惡心醫用四物涼血之劑 病不減復用小柴胡

19) 丹溪心法附餘¹⁸⁾

○ …… 產後血暈 因虛火載血上行漸漸暈來方用鹿角燒炭

·芎歸湯 治產後去血過多 暈煩不省 一切去血 竝宜服之

·黑神散 治婦人產後惡露不盡 胞衣不下 血氣攻心 眩暈等症

·黑龍丹 治妊婦臨產臨生 或胎衣不下 產後血暈 不省人事

·神仙索金散 治婦人產後血暈

·血竭破棺散 治婦人產後血閉 血迷 血暈 血勞 嗽血 ……

·清魂散 治產後血暈 昏不知人

·奪命散 治產後血暈 血入心經 言語顛倒 健忘失志 及產後百病

·卷荷散 治產後血上沖心 血刺 血暈 血氣腹痛 惡露不快 竝皆治之

·愈風散 …… 亦治血暈 四肢強直 或築心眼倒 吐瀉欲死

·石蓮散 治氣吃噎 又治吐逆 心鉦 目暈 可畏飲食

20) 名醫類案⁵¹⁾

·一產婦鬱冒 脈微弱 不能食 大便反堅 但頭汗出所以然者 血虛而厥 厥而必冒 小柴胡湯主之

·一婦產後時發昏懋 身熱汗多 眩暈口渴 或時頭痛思心醫用四物涼血之劑 病不減 復用 小柴胡

21) 濟陰綱目⁹⁾

·大全云 產後血暈者 由敗血流入肝經 以致眼黑頭旋 不能起坐 甚至昏悶不省人事 謂之血暈 以細酒調黑神散最佳 若作暗風中風治之 誤矣 然者由有三 有用心使力過多而暈者 有下血過多而暈者 有下血少而暈者 其暈雖周 治之則異當審詳之

·崔氏云 凡暈者 皆是虛熱 血氣奔進 腹中空虛所致

·薛氏曰 產後元氣虧損 惡露乘虛上攻 眼花頭暈 或心下滿悶 神昏口衄 或痰壅盛者 急用失笑散主之 若血下多而暈 或神昏煩亂者 大劑芎歸湯補之 或芸苔子散 或童子小便 有痰加二陳湯 若因勞心力而致者 宜補中益氣湯加香附 若因氣血虛極 不省人事 用清魂散 惟以芎歸湯 及大補氣血之劑 凡產可用醋漆器薰 或用半夏末 冷水和丸 入鼻孔中 竝無前患 丹溪先生云 血暈因氣血俱虛 痰火泛上 宜以二陳導痰 或加減朱砂安神丸 以麥門冬湯下亦可 ……

·一產婦因產飲酒 惡露甚多 患血暈 口出酒氣 此血得酒熱而妄行虛而作暈也 以佛手散加乾葛二錢一劑而 酒性慳悍 入月及產後不宜飲 恐致前證產婦人衆喧裏氣熱 亦致此證

·仲景云 產後鬱冒 其脈微弱 嘔不能食 大便反堅 但頭汗出 所以然者 血虛而厥 厥而必冒 冒家欲解 必大汗出 以血虛下厥 孤陽上出 故頭汗出 所以產婦喜汗出者 亡陰血虛 陽氣獨盛 故當汗出 陰陽乃復 所以大便堅 嘔不能食也 小柴胡湯主之 病解能食 七八日更發熱者 此為胃實 大承氣湯主之 今按鬱冒即暈也 觀此則產後血暈 有汗不和解三法 當分表裏虛實精而別之 清魂散 產後血暈者 血氣暴虛 未得安靜 血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花 極甚者

令人悶絕不知人 口衄 神昏氣冷 宜先取乾漆 或漆器燒烟 鼻中薰之 類置醋炭房 內此進此藥即醒

芎歸湯 治產後去血過多 昏暈不省

獨行散 治產後血暈 昏迷不省 沖心悶絕

奪命散 治產後血暈 血入心經 言語顛倒健忘失志及產後百病

黑神散 治婦人產後惡露不盡 或胎衣不下 血氣攻沖 心腹吡滿 或臍腹堅脹撮痛及 血暈神昏 眼黑口衄 產後瘀血諸疾

紅花散 治產後血昏血暈血崩 及月事不勻 遠年乾血氣

鹿角散 治產後血暈 此乃虛火載血 漸漸暈將上來 用鹿角

牧丹散 治產後血暈悶絕 口衄 則幹開口灌之

荊芥散 治產後風虛血暈 精神昏昧

22) 赤水玄珠¹⁹⁾

·良方曰 產後血暈乃血入肝經 甚至眼花昏悶 用黑神散主之 下血過多用清魂散補之

·薛氏曰 若惡露上行 用失笑散 血下過多芎歸湯 若過勞所傷補中益氣湯 血虛極用清魂散 ……

·一婦 …… 產後眩暈 胸滿咳嗽 用四物加茯苓半夏桔梗而愈

·一婦因飲酒惡露甚多患血暈 口出酒氣 此血得酒熱而妄行虛而作暈也 以佛手散加魏甘葛二錢一劑而癒 酒性慄悍 入月反產後不宜飲恐致前症

·奪命丹 治血暈腹痛

·清魂散 產後氣血暴損 虛火妄動 血隨火上 以致心神昏亂 口衄 眼花 甚至悶絕而

·佛手散 治產後去血眩暈欲絕 ……

23) 景岳全書²⁰⁾

氣脫血暈

·產時胎胞既下氣血俱去忽爾眼黑頭眩神昏口衄昏不知人 古人多云惡露乘虛上攻故致血暈不知此證有二 曰血暈曰氣脫也 若以氣脫作血暈而用辛香逐血化痰等劑則 立刻斃矣不可不慎也

·一氣脫證 速用人蔘一二兩急煎濃湯 徐徐灌之

·一血暈之證本由氣虛所以一時昏暈然血壅痰盛者亦或有之如果形氣脈氣俱有餘胸腹脹痛上衝此血逆證也宜失笑散 若痰盛氣粗宜二陳湯 如無脹痛氣粗之類悉屬氣虛宜大劑芎歸湯八珍湯之類主之

24) 女科經綸²¹⁾

·產後血暈 屬敗血流入肝血熱逆上 大全曰 產後血暈者 由敗血流入肝經 眼生黑花 頭目旋暈 不能起坐 昏悶不省人事謂之血暈 …… 服童便最好

·產後血暈 屬瘀血奔心虛火炎上 陳良甫曰 產後瘀血奔心 因分娩後 不飲童便 以致虛火上炎也 用鹿角燒炭 童便調下即醒 此物行血極效 又用五靈脂半生半熟 名獨行散 又用返魂散即益母丸也

·產後血暈 屬惡露乘虛上攻 家居醫錄曰 產後元氣虧損 惡露乘虛上攻 眼花頭暈 或心下滿悶 神昏口衄 或痰壅盛急用失笑散主之 若血下多而暈 或神昏煩亂大劑芎歸湯補之加童便 (慎齊按已上三條序產後血暈之屬有餘也敗血入肝惡露上攻此瘀血爲患當用行血逐瘀之藥)

·產後血暈屬陰血暴亡心虛火炎 李東垣曰 婦人分娩 昏冒瞑目 因陰血暴亡 心神無所養 心與包絡 君火相火也 得血則安 亡血則危 火上熾 故令人昏冒 火乘肺 故瞑目不省人事 是陰血暴亡 不能鎮撫也

·產後血暈 屬血隨氣上 郭稽中曰 產後血暈者何 曰產後氣血暴虛 未得安靜 血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花或悶絕不省 口衄神脫 但服清魂散即醒

·產後血暈 屬虛火載血上升腹中空虛所致 朱丹溪曰 婦人產後血暈 乃虛火載血漸漸上暈也 又崔氏云 凡暈皆是虛熱 血氣奔進腹中空虛所致(慎齊按 已上三條 序產後血暈之屬于不足也 陰血暴亡 虛火上升 皆由腹中空虛所致 當用補血滋陰降火之藥 但滋陰不可用地芍 降火不可用苦寒)

25) 辨證寄聞全書²²⁾

血暈門

·辨證論治一: 婦人甫產兒後 忽然眼目昏花 惡心欲吐 心中無奈 或神魂外越 恍若天上雲行 人以爲惡血衝心之患也 誰知是氣虛欲脫而血暈乎

·臨床處方: 方用解暈湯

·辨證論治二: 婦人子方下地 即昏暈不語 此氣血雙脫也 本在不救 然能救之得法 亦能生者 我受天師秘傳 何敢隱而不告 以救萬世產亡之婦乎

·臨床處方: 方用 當是時急用縫夜針刺其眉心之穴 得血出即語笑 然後以獨蓼湯 人蓼一錢 急煎灌之 無不生者 尚貧之婦 無力買蓼 用當歸補血湯 黃者二兩當歸一兩煎湯一碗灌之亦生

26) 醫學心悟²³⁾

·產後血暈 宜燒漆器 薰醋炭以開其竅 若瘀血上攻胸腹脹痛拒按者 宜用歸芎湯下 失笑丸 若去血過多 心慌自汗 用歸薑飲加人蓼 虛甚者更加熟附子 若脾胃虛弱 痰厥頭眩而嘔惡者 用六君子湯 大抵產後眩暈 多屬氣虛 察其外證 面白眼合 口張手撒 皆爲氣虛欲脫之象 若兼口鼻氣冷 手足厥冷 此爲真虛挾寒 速宜溫補 每用人蓼兩餘 而以薑附佐之 庶得回春 不可忽也

27) 葉天士女科²⁴⁾

臨產血暈

·臨產去血太多 昏不知人 產下即死者 名曰血暈宜芎歸湯 若產後虛脫 面白眼閉口開手冷 六脈細微 急用人蓼一兩 水煎濃湯灌之 遲則無及矣 若火盛血逆而昏暈者 宜清魂散 如不醒 以韭汁和醋灌之 仍不醒 急人中 提頂 心頭髮 薑汁和童便灌之 或荊芥穗二錢研末 童便調灌 若失血過多 虛熱太甚 目暗神昏手足厥冷者 宜蓼歸湯若 產 忽然衄口 言語顛倒 如見鬼神 此敗血攻心也 宜妙香散

·產後血暈 由氣血暴虛 血隨上 迷亂心神 故眼前生花 甚者 悶絕口衄 神昏氣冷 宜清魂散 或立應湯 若產兒下地時 用荊芥穗炒黑爲末 每服五分 童便調服 可預防血暈之患 又用韭菜切細 盛瓶中 以熱醋沃之 向產婦面薰之 若下血多而暈 但昏悶煩亂而已 當補血 宜芎歸湯 若下血少而暈 乃惡露上 於心 心下急滿 神昏口衄 不省人事 當破血行血 宜奪命散

28) 醫宗金鑑 婦科心法要訣²⁵⁾

血暈證治

清魂散

·產後血暈 惡露少 面唇色赤 是停瘀 惡露去多 唇面白 乃屬血脫不須疑 虛用清魂 荊芥穗 人蓼 芎 草 澤蘭隨 腹痛停瘀 佛手散 醋漆熏法總相宜 註: 產後血暈 有因惡露去少 內有停瘀 上攻迷暈者 面唇必赤色 有因去血過多 血脫而暈者 面唇必色白 血弱者 宜用清魂散 即荊芥穗人蓼川芎甘草澤蘭葉也 若停瘀腹痛者 用佛手散 二者俱宜類燒乾漆及用火燒鐵釘 醋不時熏之

29) 醫宗金鑑 婦科心法要訣釋²⁶⁾

血量不在惡露的多少 而當觀察其兼證 如兼面唇色赤 口鼻氣粗 腹痛 脈實有力等 實證者 爲停瘀 可用生化湯去乾薑加失笑散或奪命散等 其因虛的 面唇色白 氣息微弱 腹不痛 脈來 虛弱無力 宜急用獨蔘湯 以補氣 繼則辨陰虛 或陽虛而扶正 虛而兼瘀 病不太重的 可用清 魂散 火燒鐵秤錘 醋熏鼻 此爲舊時產房必備 此系民間有效驗方

30) 醫方一盤珠²⁷⁾

清魂散 治血量不省人事
失笑散 治血量
龍牙清魂散 治產去血過多 虛暈 語 或言鬼神 或出蠻腔野調 弄石 不認親人多不治 惟此方可以挽回
加味益母散 治血量 惡露不行
芎歸瀉心湯 治血量 心神恍惚

31) 續名醫類案²⁸⁾

薛立齋 治一婦 因產後飲酒惡露甚多患血量 口出酒氣 此血得酒熱而妄行虛而作暈也 以 佛手散加魏甘葛二錢一劑而痊
王執中曰 產後血量 寒熱往來 或血 心惡疾也 予閱食療本草見 有用鹿角燒爲末

32) 女科輯要⁴⁰⁾

眩暈昏冒
去血過多者 宜重用阿膠水化略加童便服 血去不多者 宜奪命散

33) 陳修園醫書七十二種 達生編²⁹⁾

產後宜用鐵秤錘 或溪中白石子 燒紅入醋 令醋氣入鼻 以免血量 且收斂神氣 又能解穢 每 日三四次 亦三日止 臨產有血量 不省人事者 以此法救之立效 或有惡血衝心 血量昏悶 不 省人事者 用韭菜一把切碎放有嘴 瓶內 以熱醋一大碗灌入 密札口 扶起病人 以 嘴向鼻 遠遠薰之 或將產婦 自己頭髮含口中即愈

34) 血證論³⁰⁾

產後血量 由血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花 甚者悶絕 口衄 神昏氣冷 有下血過多而暈 者 屬虛 但昏悶煩亂而已 法當補血 宜炙甘草湯 及八珍湯加棗仁龍骨朱砂丹皮有下血過少 而暈者 乃惡露上 於心 心下滿急 神昏口衄 絕不知人法當破血 宜當歸延胡索血竭沒藥荊 芥穗京墨 紅醋 童便引 血量之證 吐衄家間亦有之 醫者不可不知

35) 四明宋氏女科秘書³¹⁾

產後因氣血虛 痰火泛上作暈 二陳湯導痰 氣血虛實加減用之 產後類類作暈 遍身麻木 手 足厥冷 多服蔘 歸芎薑桂不效者 此瘀血阻住 不得流痛 急用紅花一兩 大黃三四錢 水煎類 服自效

卷荷散 治產後惡血不快 血上沖心刺痛 血量等症

36) 增補萬病回春³²⁾

一產後氣血大脫虛極 昏暈不省者 切不可驚哭叫動則驚散真氣 乘昏暈死 可用熱米湯 布 按元氣復醒 依本方加人蔘黃 去牡丹皮益母草烏藥 先則熱醋熏鼻即醒

益母丸 治婦人胎前產後 或難產胎胞不下 血量不醒 或惡露不盡 俱可服之

37) 婦科病中醫治療法³³⁾

產後血量 有因惡露排泄未盡 內有停瘀 血氣上攻 使腦部充血 發生血暈的 有因產後失血 過多 以致腦部貧血 而發生血暈的 充血血量 必面唇發赤 貧血血量 必面唇發白 前者宜用 行血逐瘀 以降低血壓之法 後者宜大補氣血 佐以強心之劑 都可生效

38) 中醫症狀鑑別診斷學³⁴⁾

產後眩暈: 鬱冒, 血暈, 血運, 血厥

產後忽然 頭暈目眩 不能起坐 或心中滿悶 惡心嘔吐 或痰涌氣急 甚則 神識昏迷不省人事

① 產後血虛眩暈

氣脫者 面白冷汗淋 脈微欲絕 宜回陽固脫 方用獨參湯 或參附湯 血脫者 不省人事 面色蒼白 脈浮大而虛 宜養血固脫 方用當歸補血湯 氣血兩脫者 宜氣血雙補 方用救運至聖丹 或白微湯

② 產後血瘀眩暈

宜和營逐瘀 方用清魂散 合失笑散

39) 東洋醫學叢書·中醫婦科學⁴⁾

產後血暈: 產後血運悶候

產婦分娩後 突然頭暈眼花 不能起坐 或心胸滿悶 惡心嘔吐 痰涌氣急 心煩不安甚則口衄 神昏 不省人事

產後鬱冒 與產後血暈不同 前者 是由亡血復汗感寒而致; 後者 乃產後失血過多血不上榮 或瘀血上攻于胸所致 導致血暈的病因病機 有虛實二端 虛者 乃由陰血暴亡 心神失養 實者 則為瘀血上攻 擾亂心神所致

① 血虛氣脫

益氣固脫; 獨參湯

② 瘀阻氣閉

行血逐瘀; 奪命散加當歸 川芎

40) 東醫寶鑑³⁵⁾

產後血暈 由氣血暴虛 血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花 甚者 悶絕口衄 神昏氣冷 宜用清魂散(良方)

產後血暈 有二 有下血多而暈者 但昏悶煩亂而已 當補血 宜用芎歸湯 有下血少而暈者 乃惡露上 於心 心下滿急 神昏口衄 絕不知人 當破血行血 宜奪命散花藥石散(良方)

產後血暈 宜用四味湯荊芥散醒墨法(諸方)

41) 診療要鑑³⁶⁾

血暈

下血過多하여 貧血로 眩暈하는 것인데 다만 昏悶하고 煩亂할 뿐이니 補血해야 함. 芎歸湯加荊芥 白芍藥

瘀血이 잘 排出되지 않아 眩暈하는 것인데 惡露가 心胸으로 上衝하여 心下가 滿急하며, 精神이 昏迷하고 口衄하며, 人事不省하는 것이니, 破血行血 시킴 奪命散(良方)

42) 東洋醫藥原理³⁷⁾

血暈

產後에 갑자기 눈에 充血이 되어 붉고 嘔逆하며, 中心이 無主한 듯이 어지러워 정신을 못 차리는 증세

① 下血過多 ~ 昏悶煩亂 ~ 補血 ~ 芎歸湯

② 下血過少 ~ 惡露不盡 ~ 破血·行血 ~ 奪命散·花藥石散

43) 晴崗醫鑑³⁸⁾

產後血暈, 產血過多, 氣血虛損, 女三十七歲 ~ 當歸補血湯

44) 漢方婦人科學¹⁰⁾

血量: 産後眩暈, 鬱冒, 暗風

- ① 亡血復汗 ~ 昏冒, 人事不省, 合目汗出, 寒多, 嘔吐, 不能食 ~ 補血歸經 小柴胡湯
- ② 敗血上攻 ~ 眼生黑花, 頭目旋暈, 起坐不能, 心下滿悶 ~ 活血祛瘀
黑神散 奪命散 失笑散 芎歸湯加童便
- ③ 氣血虛極 ~ 面白, 身倦, 汗出, 懶言, 食少 ~ 健脾益氣
補中益氣湯加香附子 六君子湯 芎歸湯
- ④ 痰熱上昇 ~ 頭暈, 心下滿悶, 吐痰涎, 喘悶 ~ 導痰理氣
二陳湯 導痰湯 朱砂安神丸 拘膽丸 酒毒 佛手散加乾葛

45) 太韓醫學全集³⁹⁾

産後에 氣血暴虛하여 血이 氣를 따라 上逆하므로 心神을 迷亂하여 眼前生花
甚則悶絶口衄, 神昏氣冷 ~ 清魂散

- ① 下血過多 ~ 昏悶煩亂 ~ 補血 ~ 芎歸湯
- ② 下血過少 ~ 惡露가 心에 上, 心下滿急, 神昏口衄, 目不識人
~ 破血, 行血 ~ 奪命散, 花藥石散

大體로 荊芥散 全生活血湯

46) 臨床婦産科學¹⁾

産後血量: 産後에 갑자기 血量을 일으켜 일어설 수가 없으며 심하면 昏迷하여 말을
못하고 人事不省에 빠지는 것

- ① 血虛氣脫 ~ 眩暈, 心悸, 心亂, 煩躁, 嘔吐, 昏迷, 人事不省, 甚則眼合口開, 四肢
冷, 冷汗淋, 顔色蒼白, 舌淡少苔, 脈微絶或浮大而虛
~ 補氣固脫 清魂散 小柴胡湯 芎歸湯 當歸補血湯
- ② 血瘀氣逆 ~ 下腹部疼痛, 拒按, 甚則心下部苦悶感, 呼吸促迫, 眩暈, 昏迷, 口衄,
人事不省, 痙攣, 牙關緊急, 顔色紫暗, 唇紫, 舌紫, 脈澀或弦
~ 行血逐瘀 玄胡索散

Ⅲ. 總括 및 考察

血量은 産後에 發生하는 眩暈症 中の 하나로 볼 수 있는데, 대개 産後에는 그 原因
이 出血이나 其他津液損傷, 敗血妄行 등의 血의 異常으로 因하여 眩暈症이 發生하므로
陳¹¹⁾을 비롯한 여러 歷代醫家^{1, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 39)}는 産後에 오는 眩暈症을 産後血量으로 表現
하고 있다.

西醫學에서 眩暈은 動脈硬化症, 高血壓, 低血壓과 같은 心臟血管系統의 疾病, 各種貧
血, 白血病과 같은 血液疾病, 頭部外傷과 그 後遺症, 腦炎, 腦腫瘍과 같은 中樞神經系
統疾病, 甲狀腺 機能低下, 低血糖, 간성혼수등과 같은 內分泌 및 代謝性 疾病, 미로염을
비롯한 耳鼻咽喉科 疾病, 그밖에 藥物中毒과 副作用 등 많은 疾病에서 볼 수 있다.⁵²⁾

劉³³⁾는 “産後血量 有因惡露排泄未盡 內有停瘀 血氣上攻 使腦部充血 發生血量的; 有
因産後失血過多 以致腦部貧血 而發生血量的”이라하여, 腦部貧血과 腦部充혈으로써 血量
이 發生한다고 하였고, 宋¹⁰⁾은 “血量이란 産後眩暈의 뜻”이라 밝힌바, 일반적으로 眩
暈이란 概念이 血量을 包括하나, 産後에는 眩暈과 血量을 同一視한 概念으로 看做하는
것으로 思料된다.

金匱要略²⁾에서 鬱冒는 “新産婦人 …… 亡血復汗 寒多 故令鬱冒”라고 하는데, 血液이

衰小耗竭되어 나타나는 것으로서 이는 産後血暈에 對한 最初의 記錄으로 볼 수 있다.

東洋醫學叢書 中醫婦科學⁴⁾에서 “産後鬱冒與産後血暈不同, 前者是由亡血復汗感寒而致; 後者乃産後失血過多, 血不上榮或瘀血上攻于腦所致”라 하였으나, 武⁹⁾는 濟陰綱目에서 “仲景云 産後鬱冒 …… 今按鬱冒即暈也. 觀此則産後血暈有汗下和解三法 當分表裏虛實精而別之”라 하였고, 宋¹⁰⁾ 등³⁴⁾도 鬱冒가 血暈의 다른 表現임을 말하고 있다.

또한 鬱冒는 厥症의 하나인 出血過多나 血入肝經하여 肝氣逆上으로 發生하는 血厥과 같은 뜻으로 使用된다.^{34, 52)}

血暈에 對하여 巢³⁾ 등⁴⁾은 “産後血暈悶”, 王⁵⁾은 “産後血暈心悶”, 沈⁴⁰⁾은 “眩暈昏冒”로 表現하고 있는데, 그 原因을 살펴보면, 去血過多, 下血極少 등으로 大同小異함을 알 수 있다.

李⁶⁾는 産育寶慶集에서 “第四論曰産後血暈悶者何 答曰産後氣血暴虛未得安靜血隨氣上迷亂心神 故眼前生花 極甚者 令人悶絕不知人 口衄神昏氣冷 醫者不識呼爲暗風 ……”라고 하였고, 陳⁸⁾은 “第四論曰 産後血暈者 …… 呼爲暗風……”라 하여 血暈悶 暗風 血暈이 같은 概念임을 밝히고 있다.

以上에서 볼 때, 産後에 發生하는 眩暈과 鬱冒 血厥 暗風 血暈悶 血運悶 血暈心悶 眩暈昏冒 血暈을 동일한 概念으로 看做하여도 무방할 것으로 思料된다.

産後血暈의 다른 表現을 보면, 17種으로 血暈(35回), 産後眩暈(14回), 鬱冒(6回), 血運, 暗風(各5回), 昏暈(4回), 運悶, 暈(各3回), 血運悶, 暈煩不省(各2回), 血暈心悶, 血暈悶, 血眩, 目暈, 氣脫血暈, 眩暈昏冒, 血厥(各1回) 등이 使用되었다. (Table I)

이 중에서 血暈이 가장 多用되고 있어 一般的으로 血暈이라 稱하는 것으로 思料된다.

血暈의 原因으로 巢³⁾ 등^{6, 8, 9, 11, 12, 16-19, 23-25, 27, 30, 33, 35-40, 47)}은 下血過多,²¹⁾ 등⁴⁾은 陰血暴亡, 張²⁾ 등¹⁰⁾은 亡血復汗이라 하였으며, 陳¹¹⁾ 등^{17, 19)}은 過勞所傷, 武⁹⁾는 勞心力, 程²³⁾ 등²⁰⁾은 氣脫, 王⁵⁾ 등^{1, 9, 10, 11, 17, 22, 24, 26, 32, 34, 47)}은 氣血虛極, 李⁶⁾ 등^{7, 8, 9, 19, 21, 24, 30, 35, 39)}은 氣血暴虛血隨氣上, 宋³¹⁾ 등⁹⁾은 氣血俱虛痰火泛上이라 하였다.

唐³⁰⁾ 등^{3, 9, 24, 35, 37, 39, 40)}은 下血過少, 楊¹³⁾ 등^{1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 17-21, 23, 25, 29, 33, 34, 36)}은 惡露上行, 方¹⁸⁾ 등^{9, 12, 21, 22, 24, 29, 31, 47)}은 敗血攻心, 薛¹⁷⁾ 등^{9, 11, 19, 21)}은 敗血流入肝經이라 하였고, 朱¹⁵⁾ 등^{5, 9, 18, 21)}은 虛火戴血, 魏²⁸⁾ 등^{9, 11, 19)}은 因産飲酒惡露甚多, 陳⁸⁾ 등⁶⁾은 胸中宿有痰飲, 張²⁰⁾은 痰盛氣粗, 宋¹⁰⁾은 痰熱上昇, 葉²⁴⁾은 火盛血逆, 張⁴⁷⁾은 心氣將溫過度 邪熱上乘於心이라 하였다. (Table II)

以上の 原因을 綜合해 보면, 下血過多 陰血暴亡 亡血復汗은 ‘血虛’, 過勞所傷 勞心力 氣脫은 ‘氣虛’, 氣血虛極 氣血暴虛 血隨氣上 氣血俱虛 痰火泛上은 ‘氣血俱虛’, 下血過少 惡露上行 敗血攻心 敗血流入肝經은 ‘血瘀’, 虛火戴血 因産飲酒惡露甚多 胸中宿有痰飲 痰盛氣粗 痰熱上昇 火盛血逆 心氣將溫過度 邪熱 上乘於心은 ‘虛熱 痰熱’ 등 5가지로 分類要約되며, 血瘀, 血虛, 氣血俱虛, 虛熱痰熱, 氣虛의 順으로 큰 比重을 차지하고 있다. 또한 이러한 原因을 大別하면, 血虛氣脫, 血瘀氣逆으로 나눌 수 있다.

血暈에 使用된 處方은 모두 65餘種으로 芎藭湯, 清魂散이 多用되었으며, 奪命散, 黑神散, 失笑散, 佛手散加味, 小柴胡湯, 四物湯加味, 獨參湯, 荊芥散加味, 二陳湯, 補中益氣湯, 當歸補血湯 順으로 使用되었다. (Table III)

芎藭湯은 當歸, 川芎으로 構成되어 있으며, 清魂散은 澤蘭葉, 人參, 荊芥, 川芎으로 構成되어 있어, 주로 出血過多로 因한 血暈證에 活用될 수 있으나 가장 많이 活用된 處方이라고 해서 血暈證을 治療하는데 가장 適合한 處方이라고는 할 수 없으며 각기

原因에 따라 適合한 處方을 使用하는 것이 바람직하다고 思料된다.

原因을 血虛氣脫과 血瘀氣逆으로 大別하였을 때, 血虛氣脫로 因하여 發生하는 血量證에는 芎歸湯, 清魂散, 獨蔘湯, 補中益氣湯, 佛手散, 當歸補血湯, 鹿角散 等の 處方이 多用되었고, 血瘀氣逆으로 因한 血量證에는 奪命散, 黑神散, 失笑散, 佛手散加味, 二陳湯, 導痰湯, 花藥石散, 清魂散 順으로 使用되었다. (Table IV)

또한 單方으로 荊芥, 童便等이 産後血量에 活用된 점이 特異하였는데 荊芥는 理血 止血 清頭目的 效能이 있으며, 童便은 破瘀血하고 虛勞를 治하는 效能이 있어 活用되었다고 思料된다.

Table I. 産後血量의 다른 表現

表現	引用文獻番號	頻度
血量	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	35
産後眩暈	6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 23, 29, 34, 50, 51	14
鬱冒	2, 9, 10, 34, 46, 51	6
血運	7, 12, 33, 34, 49	5
暗風	6, 7, 8, 9, 10	5
昏暈	9, 20, 24, 32	4
運悶	12, 47, 48	3
暈	5, 9, 31	3
血運悶	3, 4	2
暈煩不省	16, 18	2
血量心悶	5	1
血量悶	6	1
血眩	49	1
目暈	18	1
氣脫血量	20	1
眩暈昏冒	40	1
血厥	34	1

Table II. 産後血暈의 原因分類

原 因		引 用 文 獻 番 號	類 度 數	
			回數	%
血虛	下血過多	3, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 47	23	27 回 23.28%
	陰血暴亡	4, 21	2	
	亡血復汗	2, 10	2	
氣虛	過勞所傷	11, 17, 19	3	6 回 5.17%
	勞心力	9	1	
	氣脫	20, 23	2	
氣血俱虛	氣血虛極	1, 5, 9, 10, 11, 17, 22, 24, 26, 32, 34, 47	12	24 回 20.69%
	氣血暴虛血隨氣上	6, 7, 8, 9, 19, 21, 24, 30, 35, 39	10	
	氣血俱虛痰火泛上	9, 31	2	
血瘀	下血過少	3, 9, 24, , 30, 35, 37, 39, 40	8	44 回 37.93%
	惡露上行	1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 33, 34, 36	22	
	敗血攻心	9, 12, 18, 21, 22, 24, 29, 31, 47	9	
	敗血流入肝經	9, 11, 17, 19, 21	5	
虛熱·痰熱	虛火戴血	5, 9, 15, 18, 21	5	15 回 12.93%
	因産飲酒惡露甚多	9, 11, 19, 28	4	
	胸中宿有痰飲	6, 8	2	
	痰盛氣粗	20	1	
	痰熱上昇	10	1	
	火盛血逆	24	1	
	心氣將溫過度邪熱上乘瘀心	47	1	

Table III. 引用處方

處 方	引 用 文 獻 番 號	頻度
芎歸湯(芎 湯)	1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 35, 36, 37, 39, 47	20

清魂散	1, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 39	19
奪命散	4, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 26, 35, 36, 37, 39, 40	14
黑神散	9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 34, 47	11
失笑散	9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 34	10
佛手散(加味)	9, 10, 11, 17, 19, 25, 28	7
小柴胡湯	1, 2, 9, 10, 50, 51	6
四物湯加味	11, 19, 47, 49, 50, 51	6
獨參湯	4, 20, 22, 24, 26, 34	6
荊芥散(加味)	9, 34, 35, 39, 49	5
二陳湯	9, 10, 20, 31, 34	5
補中益氣湯	9, 10, 11, 17, 19	5
當歸補血湯	1, 22, 34, 38	4
鹿角散	9, 15, 18, 28	4
導痰湯	9, 10, 31	3
獨行散	9, 16, 21	3
益母丸	21, 27, 32	3
花藥石散	35, 37, 39	3
牧丹皮散	6, 9	2
愈風散	13, 18	2
蔘蘇飲	14, 34	2

券荷散	18, 31	2
加減朱砂安神丸	9, 10	2
八珍湯	20, 30	2
六君子湯	10, 23	2
蔘附湯	34, 4	2

羚羊角散	5	1
蒲黃散	12	1
大聖散	12	1
內炙散	12	1
半夏茯苓湯	6	1
七寶散	7	1
羊肉湯	47	1
鎮心補心丹	47	1
生薑地黃散	47	1
至寶丹	47	1
桃奴丸	47	1
辰砂大紅丸	48	1
沒藥散	49	1
黑龍丹	18	1
神仙索金散	18	1
血竭破棺散	18	1
石蓮散	18	1
芸苔子散	9	1

麥門冬湯	9	1
大承氣湯	9	1
紅花散	9	1
解暈湯	22	1
逍遙散加減	34	1
四味湯	35	1
拘膽丸	10	1
全生活血湯	39	1

玄胡索散	1	1
歸薑飲加味	23	1
參歸湯	24	1
妙香散	24	1
立應湯	24	1
生化湯加減	26	1
加味益母散	27	1
芎歸瀉心湯	27	1
炙甘草湯	30	1
熱米湯	32	1
救運至聖丹	34	1
白薇湯	34	1
清暈湯	34	1
童便	5, 9, 21, 28	4

Table IV. 原因에 따른 引用處方

原因	處方	引用文獻番號	頻度
血虛氣脫	芎歸湯	1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 35, 36, 37, 39, 47	19
	清魂散	1, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 39	10
	獨參湯	4, 20, 22, 24, 26, 34	6
	補中益氣湯	9, 10, 11, 17, 19	5
	佛手散	11, 17, 19	3
	鹿角散	9, 15, 18	3
	當歸補血湯	1, 34, 38	3
	荊芥散(9, 49), 六君子湯(10, 23), 八珍湯(20, 30), 小柴胡湯(1, 10)		各 2回
	大聖散(12), 羊肉湯(47), 七寶散(7), 黑神散(47), 四物湯加味(47), 芸苔子散(19), 歸姜飲加味(23),		各 1回

	芩歸湯(24), 立應湯(24), 炙甘草湯(30), 熱米湯(32), 救運至聖丹(34), 白薇湯(34), 芩附湯(4)			
血瘀氣逆	奪命散	4, 9, 10, 18, 24, 26, 35, 36, 37, 39, 40	11	
	黑神散	9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19	9	
	失笑散	9, 10, 11, 17, 19, 20, 21, 23, 34	9	
	佛手散加味	9, 10, 11, 19, 25, 28	6	
	二陳湯	9, 10, 20, 31	4	
	導痰湯	9, 10, 31	3	
	花藥石散	35, 37, 39	3	
	清魂散	24, 26, 34	3	
	卷荷散(18, 31), 加減朱砂安神丸(9, 10), 芩歸湯(10, 23)		各 2회	
	妙香散(24), 羚羊角散(5), 蒲黃散(12), 大聖散(12), 拘膽丸(10), 鎮心補心丹(47), 生薑生地黃散(47), 至寶丹(47), 桃奴丸(47), 黑龍丹(18), 麥門冬湯(9), 獨行散(21), 益母丹(21)		各 1회	

IV. 結 論

産後血暈에 關하여 文獻的으로 考察하여본 결과 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 血暈은 17餘種으로 表現되고 있으며, 이 중 血暈, 産後眩暈, 鬱冒, 血運, 暗風, 昏暈 等の 名稱이 多用되었다.
2. 血暈의 原因을 大別하면 血虛氣脫과 血瘀氣逆이며, 이는 血虛, 氣虛, 氣血俱虛, 血瘀, 虛熱 痰熱 等 5가지로 요약되며, 血瘀, 血虛, 氣血俱虛 等이 큰 비중을 차지하고 있다.
3. 血暈에 使用된 處方은 65餘種으로 芩歸湯, 清魂散, 奪命散, 黑神散, 失笑散 等の 順으로 活用되었으며, 單方療法으로 童便 等이 多用되었다.
4. 血虛氣脫로 因한 血暈證에는 芩歸湯, 清魂散, 獨參湯, 補中益氣湯等이 多用되었고, 血瘀氣逆으로 因한 血暈證에는 奪命散, 黑神散, 失笑散, 佛手散加味, 二陳湯 等の 處方이 多用되었다.

參 考 文 獻

1. 姜明孜 : 臨床婦産科學, 서울, 成輔社, pp.287-290, 1989.
2. 張仲景 : 仲景全書 金匱要略方論, 서울, 大星文化社, p. 430, 1984.

3. 巢元方：巢氏諸病源候總論，台中，昭人出版社，pp.729-730，1982.
4. 國際韓醫學學生會：東洋醫學叢書中醫婦科學，서울，一中社，pp.129-131，1990.
5. 王 燾：外臺秘要方(中國醫學大系中卷5)，서울，驪江出版社，pp.406-407，1986.
6. 李師聖，郭稽中等：產育寶慶集(中國醫學大系中卷11)，서울，驪江出版社，pp.123-124，1986.
7. 齊仲甫：女科百問，上海，上海古籍書店，pp.下59-60，1983.
8. 陳 言：三因極一病證方論(中國醫學大系中卷11)，서울，驪江出版社，pp.404-405，1986.
9. 武之望：濟陰綱目，台北，旋風出版社，pp.388-395，民國66.
10. 宋炳基：漢方婦人科學，서울，杏林出版社，pp.467-469，1984.
11. 陳自明：婦人良方大全(卷十八)，서울，金泳出版社，pp.6-8，1975.
12. 陳師文：太平惠民和劑局方(中國醫學大系中卷9)，서울，여강출판사，p.656，p.658-659，p.666，p.673，pp.738-741，1986.
13. 楊 灝：仁濟直指(中國醫學大系中卷12)，서울，驪江出版社，p.545，1986.
14. 危亦林：世醫得效方(中國醫學大系中卷14)，서울，驪江出版社，p.468，p.470，1986.
15. 朱震亨：金匱鉤玄(中國醫學大系中卷14)，서울，驪江出版社，p.739，1986.
16. 徐用誠：玉機微義(中國醫學大系中卷36)，서울，驪江出版社，pp.521-523，1986.
17. 薛 己：薛氏醫案(中國醫學大系中卷31)，서울，驪江出版社，pp.885-886，1986.
18. 方 廣：丹溪心法附餘，서울，大星出版社，p.749，p.751，p.757，p.761，p.763，1989.
19. 孫一奎：赤水玄珠(券二十二)，北京，人民衛生出版社，pp.14-15，1986.
20. 張介賓：景岳全書(中國醫學大系中卷46)，서울，驪江出版社，pp.36-37，1986.
21. 蕭 燾：女科經綸，江蘇省，江蘇科學技術出版社，pp.193-196，1986.
22. 錢鏡湖：辨證奇聞全書，台北，甘地出版社，pp.447-449，1980.
23. 程國彭：醫學心悟，香港，友聯出版社，p.258，1961.
24. 葉天士：葉天士女科，서울，大星文化社，pp.294-295，pp.320-321，1984.
25. 吳 謙：醫宗金鑑婦科心法要訣，서울，大星文化社，p.492，1991.
26. 傅方珍：醫宗金鑑婦科心法要訣訣釋，河南省，河南科學技術出版社，pp.173-174，1981.
27. 洪金鼎：醫方一般珠(券之七)，台北，新文豐出版公司，pp.6-7，民國65.
28. 魏之琇：續名醫類案(中國醫學大系中卷52)，서울，驪江出版社，pp.750-751，1986.
29. 陳修圓：陳修圓醫書七十二種達生編，台北，文化圖書有限公司，p.10，p.25，1987.
30. 唐容川：血證論，台北，力行書局有限公司，p.111，民國73.
31. 宋林阜：四明宋氏女科秘書，서울，裕昌德書店，p.87，pp.89-90，1960.
32. 龔廷賢：增補萬病回春(下)，대구，東洋綜合通信教育部，pp.110-111，p.114.

1985.

33. 劉子剛 : 婦科病中醫治療法, 台北, 文化圖書有限公司, pp.179-180, 民國69.
34. 中醫研究院 : 中醫症狀鑑別診斷學, 北京, 人民衛生出版社, pp.391-392, 1987.
35. 許浚 : 東醫寶鑑, 서울, 大星文化社, pp.204-205, 1981.
36. 金定濟 : 東洋醫學診療要鑑, 서울, 東洋醫學研究院, p.679, 1983.
37. 李正來 : 東洋醫藥原理, 대전, 第一文化社, pp.473-474, 1990.
38. 金永勳 : 晴崗醫鑑, 서울, 成輔社, p.436, 1984.
39. 李正來 : 太韓醫學全集, 서울, 第一文化社, pp.1957-1958, 1989.
40. 沈堯封 : 女科輯要, 北京, 人民衛生出版社, pp.84-85, 1988.
41. 金賢濟 洪元植 : 韓醫學辭典, 서울, 成輔社, p.527, 1983.
42. 嚴柱五 : 八珍湯 및 八珍湯加杜蘆丸料煎湯液이 白鼠의 妊娠雜病에 미치는 影響, 원광대학교, 1988.
43. 尹鐘和 : 芎歸湯水針이 흰쥐의 失血性貧血恢復效果에 미치는 影響, 동국대학교, 1988.
44. 黃淳旭 : 氣血에 미치는 四物湯, 補中益氣湯의 影響에 관한 實驗的 연구, 대구한의과대, 1990.
45. 權在龍 : 四物湯 및 季節別 活用方이 血液에 미치는 影響, 대구한의과대, 1991.
46. 許叔微 : 類證普濟本事方(中國醫學大系中卷9), 서울, 驪江出版社, p.464, 1986.
47. 張 杲 : 醫設(中國醫學大系中卷10), 서울, 驪江出版社, p.206, 1986.
48. 劉完素 : 宣明方論(中國醫學大系中卷12), 서울, 驪江出版社, p.819, 1986.
49. 張元素 : 保命集(中國醫學大系中卷13), 서울, 驪江出版社, pp.89-91, 1986.
50. 陳 桷 : 石山醫案(中國醫學大系中卷33), 서울, 驪江出版社, pp.367-368, 1986.
51. 江 權 : 名醫類案(中國醫學大系中卷33), 서울, 驪江出版社, pp.870-871, 1986.
52. 과학백과사전종합출판사 : 東醫學辭典, 서울, 驪江出版社, p.971, p.973, p.1144, 1989.