

## 본초강목 수재생약의 식물분류학적 고찰—I. 초부편

성정숙 · 서강태 · 문성기 · 이정규\*  
경성대학교 이과대학 생물학과, 약학대학 약학과\*

### Classification of Entries in Bon-cho-kang-mok (Ben Cao Gang Mu). — I. Entries in the Part of Herbs

Jung Sook Sung, Kang Tae Suh, Sung Gi Moon and Chung Kyu Lee\*

Department of Biology, College of Natural Sciences and

\*College of Pharmacy, Kyungsung University, Pusan 608-736, Korea

**Abstract**—The plant entries in the part of herbs in Ben Cao Gang Mu<Bon-cho-kang-mok(本草綱目)> was classified according to the protocols of Engler and other botanists. Total numbers of plant written in chinese names were 635. Among them only 432 entries were able to be classified by elucidation of several references. They were classified as eight Divisions, 13 Classes, nine Subclasses, 60 Orders, 38 Suborders, 119 Families, 304 Genera, 377 Species with 25 Varieties and one Forma. According to the category of division, the Angiospermae was the largest group of 94 Families, 276 Genera, 348 Species, 24 Varieties and one Forma, whereas only one Genus and one Species was belonged to Fungi and the Gymnospermae. Other 203 entries were unable to be classified because of their ambiguities in name.

**Keywords**—Medical herb · Bon-cho-kang-mok · Ben Cao Gang Mu · plant classification

한국, 중국 및 일본 3국의 약전, 규격집 및 여러 전통의약서에 기재된 천연약물의 명칭은 대부분 중국에서 유래하였으며, 우리나라의 대표적인 의약서인 허준의 「동의보감」(1613)에 인용된 참고서적 83종 중에서 80종이 「신농본초경」, 「명의별록」과 「본초강목」<sup>1)</sup> 등의 중국서적인 점은 더욱 이를 뒷받침한다.<sup>2,3)</sup> 육 등<sup>2)</sup>에 의하면 우리나라 의서나 약재에 관한 문헌은 고려시대 이후의 「동인경험방」, 「향약고방」, 「광제비급」(1785), 「제중신편」(1791), 「향약집성방」(1431), 「동의보감」(1613), 「방약합편」(1885), 「선한약물학」(1930) 등과 근래의 「현대본초학」(1970), 신씨 본초학 등이 있다.

현대적인 약용식물의 지리적 조사에 관한 것으로 덕유산의 약품자원식물에 관한 보고<sup>4)</sup>를 비롯

하여 백석산,<sup>5)</sup> 팔공산,<sup>6)</sup> 계룡산,<sup>7)</sup> 대암산,<sup>8)</sup> 한라산<sup>9)</sup> 등의 약용 및 자원식물에 관한 연구보고가 있고, 생약의 본초학적 연구로는 황정류의 본초학적 연구<sup>10)</sup>를 비롯하여 국화과식물,<sup>11)</sup> 택사과식물,<sup>12)</sup> 비름과식물<sup>13)</sup> 등의 연구보고가 있으며, 기타 생약류의 기원에 관한 연구보고<sup>14-23)</sup>가 있으나, 문헌적 연구를 시도한 것은 주로 「방약합편」과 「동의보감」을 연구대상으로 하여 병증에 관한 분류가 주류를 이루고 있고, 약재사용빈도에 관한 것으로는 “「방약합편」에 수록된 약물의 빈도조사”<sup>24)</sup>, “「방약합편」에 있어서의 수치의 종류와 이와 관련된 약물 및 처방에 관한 문헌적 연구”<sup>25)</sup>, “「향약집성방」에 미수재된 향약본초에 관한 조사연구(식물편)”<sup>26)</sup>, “「방약합편」상의 당귀 배합처방에 대한 통계적 연구”<sup>27)</sup>, “한방 처방

**Table I.** Entries of herbal part in Bon-cho-kang-mok (Ben Cao Gang Mu) and subjects of the study.

Sorts of herbs	Numbers of entries (species)	Numbers of unidentified
1. Common herbs(山草: 上, 下)	70	4
2. Aromatic plants(芳草)	56	3
3. Herbs in damp ground(隰草: 上, 下)	126	6
4. Poisonous plants(毒草)	47	4
5. Vines(蔓草)	93	29
6. Hydroplants(水草)	22	2
7. Lithoplants(石草)	19	4
8. Hepaticae(苔類)	16	5
9. Weeds and others(雜草)	9	8
10. Unclassifiables	153	138
12 sorts(635 entries)	611 entries (with 24 additives)	203 entries

의 통계적 연구(1)-생약의 처방출현 빈도 및 기원분포<sup>28)</sup> 등이 발표되었다. 우리나라 한의학이 중국의 영향을 크게 받았음에도 불구하고 중국의 의약서나 본초서에 관한 연구는 거의 없는 편이며 이것마저도 약물의 성분분석에 관한 연구에 치중해 약재로 사용되는 약초의 식물분류학적 연구가 미흡한 실정이라서 중국본초의 백과사전이라 불리는 「본초강목」<sup>29)</sup> 중의 초부편에 수록된 635품목에 대하여 기원을 밝혀 분류학적으로 정리하였다.

최근 수요의 급증에 따른 외국산으로부터 많은 한약재가 무분별하게 수입되고 있어 생약의 유통에 많은 문제점을 야기하고 있는 바,<sup>31)</sup> 본초서에 수록된 약재의 정확한 기원을 밝힘으로써, 국내 생약유통에 있어 한약명칭상의 문제점들과 오용을 바로 잡는데 기초 자료를 제공하고자 한다.

### 자료와 방법

자 료 - 본초강목은 16부로 나누어 '강'으로 하고 이것을 다시 62류로 분류하여 '목'으로 하였다. 즉 수부(水部) 2류, 화부(火部) 1류, 토부(土部) 1류, 금석부(金石部) 5류, 초부(草部) 11류, 곡부(穀部) 4류, 채부(菜部) 5류, 과부(果部) 6류, 목부(木部) 6류, 복기부(服器部) 2류, 충부(蟲部) 4류, 인부(鱗部) 4류, 개부(介部) 2류, 금부(禽部) 4류, 수부(獸部) 4류, 인부(鱗部) 1류 등 총 16부 62류로 분류하고 있다. 이

중 초부인 산초(山草), 방초(芳草), 습초(隰草), 독초(毒草), 만초(蔓草), 수초(水草), 석초(石草), 태류(苔類), 잡초(雜草) 등 11류에 속하는 611품목과 목차에서는 누락되었으나 본문중에는 수록된 24품목을 추가한 총 635품목을 대상으로 하였다(Table 1).

분류방법 - 수록된 약재의 기원식물 동정은 「중약대사전」<sup>31)</sup>, 「신정화한약」<sup>32)</sup>, 「Chinese Medicinal Herbs」<sup>33)</sup>, 「원색천연약물대사전」<sup>34)</sup>, 「세계유용식물사전」<sup>35)</sup>, 「한국농식물자원명감」<sup>36)</sup> 외에 「중약약전」<sup>37)</sup>, 「약품식물학 각론」<sup>38)</sup>, 「신약품식물학」<sup>3)</sup>, 「약초의 성분과 이용」<sup>39)</sup> 등에 근거하고 기타 약용식물에 관한 연구보고를 참고하였으며 배열은 Engler의 식물분류체계에 따라 정리하였다.<sup>40,41)</sup> 각 품목에 대한 국명 및 한명은 「중한식물명칭사전」<sup>42)</sup> 외에 「한국농식물자원명감」<sup>36)</sup>, 「한국동식물도감」<sup>43-45)</sup> 등에 근거하여 기재하였다. 단 본래의 약재에 해당하는 중국에서의 기원식물과 우리나라에서 공인된 대표적 기원식물 은 차이가 날 수 있다.

### 결과 및 고찰

분류목록 - 본초강목 초부에 수록된 635품목 중 기원을 찾아 분류정리된 것은 432품목이고 이들을 Engler 분류법에 의하여 정리한 결과 403종의 식물로, 그 구성은 8문 13강 9아강 60목 38아목 119과 304속 377종 25변종 1품종으로 분

**Table II.** Classification of herbs in Ben Cao Gang Mu

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
•CHLOROPHYTA	Ulvaceae	
••CHLOROPHYCEAE	<i>Enteromorpha clathrata</i> (Roth) Grev.	乾苔: 격자파래
••••ULOTRICHIALES		
•••••ULVINALES		
•••••CONJUGATAE	Zygnemataceae	
••••••EUCONJUGATAE	<i>Spirogyra</i> sp.	陟釐*: 해감* <i>Zygnema</i> sp. <sup>32)</sup>
•••••SIPHONALES	Codiaceae	
	<i>Codium fragile</i> (Sur.) Har.	水松: 청각
•PHAEOPHYTA	Chordriaceae	
••HETEROGENERATAE	<i>Nemacystus decipiens</i> (Sur.) Kuckuck	海蘊
•••HAPLOSTICHIDAE		
••••CHORDARIALES		
•••POLYSTICHIDAE	Laminariaceae	
••••LAMINARIALES	<i>Laminaria japonica</i> Aresch.	昆布: 다시마
••CYCLOSPOREAE	Sargassaceae	
••••FUCALES	<i>Sargassum enerve</i> Ag. (= <i>S. fulvellum</i> Agardh)	海藻: 모자반
•FUNGI	Lycoperdaceae	
••BASIDIOMYCETES	<i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex. Pers.)	馬勃
•••HOLOBASIDIOMYCETIDAE	Lloyd	
••••GASTROMYCETALES		
•••••LYCOPERDINALES		
•LICHENES	Cladoniaceae	
••ASCOLICHENES	<i>Cladonia rangiferina</i> Web.	石蕊: 꽃이끼
•••PYRENOCARPEAE		
••••LECIDEALES		
•••••LECANORALES	Usneaceae	
	<i>Usnea barbata</i> Wigg. Emend Motyka. var. <i>cinchon arum</i> Mull.	白龍鬚
•BRYOPHYTA	Marchantiaceae	
••HEPATICAE	<i>Marchantia</i> sp.	垣衣: 우산이끼*
••••MARCHANTIALES		*representative Korean name
••MUSCI	Polytrichaceae	
•••POLYTRICHIDAE	<i>Polytrichum</i> sp.	土馬鬚: 솔이끼*

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
•••••POLYTRICHALES		※ representative Korean name
•PTERIDOPHYTA	Lycopodiaceae	
••LYCOPSIDA (LYCOPODIINAE)	<i>Lycopodium clavatum</i> L. (= <i>L. clavatum</i> var. <i>nipponicum</i> Nakai)	石松: 석송
••••LYCOPODIALES	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	玉柏: 만년석송
•••••SELAGINELLALES	Selaginellaceae	
	<i>Selaginella tamariscina</i> (Beauv.) Spring	卷柏: 부처손
••ARTICULATAE	Equisetaceae	
••••EQUISETALES	<i>Equisetum hiemale</i> L.	木賊: 속새
••FILICES	Ophioglossaceae	
••••EUSPORANGIATAE	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	陰地蕨: 고사리삼( <i>Sceptridium ternatum</i> Lyon.)
•••••OPHIOGLOSSALES		
••••LEPTOSPORANGIATAE	Schizaeaceae	
•••••FILICALES	<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.	海金沙: 실고사리
	Dicksoniaceae	
	<i>Cibotum barometz</i> (L.) J. Sm.	拘脊: 금모구척 cf. 고비( <i>Osmunda japonica</i> Thunb.); 새깃아재비 ( <i>Woodwardia japonica</i> Smith)
	Polypodiaceae	
	<i>Adiantum flabellulatum</i> L.	鐵線草: 부채잎공작고사리
	<i>Pteris multifida</i> Poir.	石長生, 仙人掌草 <sup>32)</sup> : 봉의꼬리
	<i>Pteris laeta</i> (Wall.) Ching	井口邊草
	<i>Lemmaphyllum microphyllum</i> Presl.	螺髻草: 콩짜개덩굴
	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai	貫衆: 관중
	<i>Davallia fortunei</i> (Kunze) J. Sm.	骨碎補: 넉줄고사리( <i>D. mariesii</i> Moor.)
	<i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farw	石葦: 석위
	<i>Phymatopsis griffithiana</i> (Hook.) J. Sm.	金星草
	<i>Stenoloma chusanum</i> (L.) Ching	烏韭 <sup>*</sup> : 바위고사리 (*synonym of 烏蕨 <sup>31)</sup> )

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and	Chinese names of entries:
••Class	scientific name	Korean name
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
••••MARSILEALES	Marsileaceae <i>Marsilea quadrifolia</i> L.	蘋: 네가래
••••SALVINIALES	Azollaceae <i>Azolla imbricata</i> (Roxb.) Nakai	滿江紅: 물개구리밥( <i>A. salvinia</i> Stapf)
•GYMNOSPERMAE	Ephedraceae	
••CHLAMYDOSPERMAE	<i>Ephedra distachya</i> L.	麻黃: 쌍수마황, 마황( <i>E. sinica</i> Stapf)
••••GNETALES		
•ANGIOSPERMAE	Moraceae	
••DICOTYLEDONEAE	<i>Ficus pumila</i> L.	木蓮: 왕모람
•••ARCHICHLAMYDEAE	(= <i>F. stipulata</i> Thunb., <i>F. thunbergii</i> Max.)	
••••URTICALES		
	<i>Humulus japonicus</i> Sieb. et Zucc.	葎草: 한삼덩굴
	Urticaceae	
	<i>Urtica cannabina</i> L.	蕁麻: 가시잎췌기풀 cf. 췌기풀( <i>U. thunbergiana</i> Sieb. et Zucc.)
	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaud. (= <i>B. frutescens</i> Thunb.)	苧麻 <sup>1,29</sup> : 모시풀
	<i>Elatostema involucratum</i> Fran. et Sav.	赤車使者
••••SANTALALES	Santalaceae	
•••••SANTALINEAE	<i>Thesium longifolium</i> Turcz.	九龍草: 긴잎제비꽃
••••POLYGONALES	Polygonaceae	
	<i>Rheum officinale</i> Baill.(= <i>R. palmatum</i> L.)	大黃: 약대황
	<i>Antenoron filiforme</i> (Thunb.) Roberty et Vautier	海根: 이삭여뀌
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	蕭蓄: 마디풀
	<i>Polygonum barbatum</i> L.	毛蓼: 숨털여뀌 cf. 이삭여뀌( <i>Tovara filiformis</i> Nakai)
	<i>Polygonum bistorta</i> L. (= <i>Bistorta vulgaris</i> Hill.)	拳參: 범꼬리
	<i>Polygonum blumei</i> Meisdn. (= <i>Persicaria blumei</i> Gross., <i>P. longisetia</i> Kitagawa)	馬蓼: 개여뀌

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Polygonum chinense</i> L. (= <i>Ampelgoum umbellatum</i> Masamune)	赤地利·火炭母草: 개모밀 덩굴
	<i>Polygonum cuspidatum</i> SEIB. et Zucc.	蛇蔞草 <sup>32</sup> : 虎杖: 호장 ( <i>Reynoutria japonica</i> Makino)
	<i>Polygonum hydropiper</i> L. (= <i>P. hydropiper</i> Spach.)	蓼·水蓼*: 여뀌 (*in Korea: <i>P. flaccidum</i> Meisn.)
	<i>Polygonum japonicum</i> Meissn.	蠶蔞草: 흰꽃여뀌
	<i>Polygonum multiflorum</i> Thunb.	何首烏: 하수오
	<i>Polygonum orientale</i> L.	葎草: 털여뀌( <i>Amblygonon</i> <i>pilosum</i> Nakai)
	<i>Polygonum tinctorium</i> Ait. (= <i>Persicaria tinctoria</i> H. Gross.)	藍澱·藍·靑黛: 쪽
	<i>Rumex acetosa</i> L.	酸模: 수영
	<i>Rumex japonicus</i> Houtt. (= <i>R. crispus</i> L. var. <i>japonicus</i> Makino)	羊蹄: 참소루쟁이
•CENTROSPERMAE	Phytolaccaceae	
••PHYTOLACCINEAE	<i>Phytolacca acinosa</i> Roxb.	商陸: 자리공( <i>P. esculenta</i> Van Houtt.)
•••••PORTULACINEAE	Portulacaceae	
	<i>Portulaca grandiflora</i> Hook.	佛甲草: 채송화
•••••CARYOPHYLLINEAE	Caryophyllaceae	
	<i>Vaccaria segatalis</i> (Neck.) Garcke	王不留行: 말뱅이나물(말 뱅이나물) cf. 장구채( <i>Melandryum</i> <i>firmum</i> Rohrb.)
	<i>Dianthus superbis</i> L. (= <i>D. superbis</i> L. var. <i>longicalycina</i> Max.)	瞿麥: 슬괘랭이꽃
	<i>Lychnis coronata</i> Thunb. (= <i>L. glandiflora</i> Jacq.)	翦春羅: 참동자꽃
•••••CHENOPODIINEAE	Chenopodiaceae	
	<i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad.	地膚: 땀싸리

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	Amaranthaceae	
	<i>Achyranthes bidentata</i> BL.	牛膝: 당우슬 cf. 쇠무릅( <i>A. japonica</i> Nakai)
	<i>Celosia argentea</i> L.	青葙子: 개맨드라미
	<i>Celosia cristata</i> L.	鷄冠花: 맨드라미
••••MAGNOLIALES	Myristicaceae	
	<i>Myristica fragrans</i> Houtt.	肉豆蔻: 육두구
	Schisandraceae	
	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.	五味子: 오미자( <i>S. chinensis</i> Baill. var. <i>typica</i> Nakai)
	Illiciaceae	
	<i>Illicium lanceolatum</i> A.C. Smith.	莽草
••••RANUNCULALES	Ranunculaceae	
•••••RANUNCULINEAE	<i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.	烏頭·側子·附子·天 雄·漏藍子: 바꽃(바꽃)
	<i>Aconitum coreanum</i> (Ievl.) Raipaics.	白附子·鼠尾草: 노랑돌쩌귀 ( <i>A. koreanum</i> R. Raym.)
	<i>Aconitum ochranthum</i> Mey.	牛扁 cf. 진범( <i>A. pseudolaeve</i> Nakai var. <i>erectum</i> Nakai)
	<i>Cimicifuga foetida</i> L.	升麻: 황새승마, cf. 승마( <i>C. heracleifolia</i> Komar.)
	<i>Coptis chinensis</i> Franch.	黃連: 황련 cf. 일황련( <i>C. japonica</i> Makino)
	<i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Reg.	白頭翁: 세잎할미꽃 cf. 할미꽃( <i>P. koreana</i> Nakai)
	<i>Clematis apiifolia</i> Dc.	女萎: 사위질빵
	<i>Clematis chinensis</i> Osbeck	威靈仙: 누른종덩굴 cf. 으아리( <i>C. mand-</i>

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
		<i>sburica</i> Max.): 외대으 아리( <i>C. brachyura</i> Maxim.): 냉초( <i>Vero- nicastrum sibirica</i> L.)
	<i>Clematis maximowicziana</i> Franch. et Sav.	白花藤: 참으아리 cf. 마삭줄( <i>Trachelosper- mum asisticum</i> Nakai var. <i>oblanceolata</i> Nakai)
	<i>Ranunculus japonicus</i> Thunb. (= <i>R. acris</i> L. var. <i>japonicus</i> Max.)	毛茛: 미나리아재비
	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	石龍芮: 개구리자리
	Berberidaceae	
	<i>Dysosma versipellis</i> (Hance) M. Cheng.	鬼臼
	<i>Epimedium grandiflorum</i> Morr.	淫羊藿: 삼지구엽초( <i>E. koreanum</i> Nakai)
	Lardizabalaceae	
	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	預知子: 으름덩굴
	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.	通草: 목통< <i>A. quinata</i> (Thunb.) Decne.> cf. 큰취방울( <i>Aristolochia manshuriensis</i> Komarov)
	Menispermaceae	
	<i>Fibraurea recisa</i> Pierre.	黃藤
	<i>Stephania cepharantha</i> Hayata	白藥子*: 민합박이덩굴 * <i>Platycodon grandiflo- rum</i> (Jacquin) A. Dc., exception of the reference. <sup>31)</sup>
	<i>Stephania delavayi</i> Diels.	解毒子
	<i>Stephania japonica</i> (Thunb.) Miers. (= <i>S. bernandifolia</i> Miq.)	千金藤: 함바기(함박이)
	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore.	防己: 분방기 cf. 멩덩이덩굴( <i>Cocculus trilobus</i> Dc.)

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Sinomenium acutum</i> (Thunb.) Rehd. et Wils.	淸風藤: 방기
•••••NYMPHAEINEAE	Nymphaeaceae <i>Brasenia schreberi</i> J.E. Gmelin <i>Nuphar pumilum</i> (Timm) Dc. (= <i>Nymphogantus subpumilum</i> Miki)	蓴: 순채 萍蓬草: 왜개연꽃 cf. 개연꽃 < <i>Nymphoganthus japonicum</i> (Dc.) Fernald>
•••••PIPERALES	Saururaceae <i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill. (= <i>S. loureiri</i> Decais.)  Piperaceae <i>Piper betle</i> L. <i>Piper longum</i> L. <i>Piper wallichii</i> (Miq.) Hand-Mazz. var. <i>hupehense</i> (C. Dc.) Hand-Mazz.  Chloranthaceae <i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.  <i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	三白草: 삼백초  蒟醬: 나도후추 華荻: 필발 南藤 鬼督郵: 홀아비꽃대 cf. 천마( <i>Gastrodia elata</i> Blume) 及己: 쌍꽃대
•••••ARISTOLOCHIALES	Aristolochiaceae <i>Aristolochia contorta</i> Bge. <i>Asarum forbesii</i> Maxim. <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt. var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.	馬兜鈴·天仙藤: 쥐방울덩굴 杜衡: 남세신 細辛: 만주족도리풀 cf. 족도리풀( <i>A. sieboldii</i> Miq.)
•••••GUTTIFERALES •••••DILLENIINEAE	Paeoniaceae <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.  <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr. (= <i>P. moutan</i> Sims.)	芍藥: 함박꽃(적작약) cf. 백작약( <i>P. albiflora</i> Pall. var. <i>hirsuta</i> Regel): 산작약( <i>P. obovata</i> Max.) 牡丹: 모란

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	Actinidiaceae	
	<i>Actinidia polygama</i> (Sieb. et Zucc.) Miq.	含水藤: 개다래나무( <i>A.</i> <i>polygama</i> Max.)
•••••THEINEAE	Guttiferae	
	<i>Garcinia morella</i> Desv.	藤黃
••••SARRACENIALES	Droseraceae	
	<i>Drosera burmanni</i> Vahl	錦地羅: 메근끈이주걱
••••PAPAVERALES	Papaveraceae	
•••••PAPAVERINEAE	<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R. Br.	博洛廻: 죽자초
	<i>Papaver rhoeas</i> L.	麗春草: 개양귀비
	<i>Corydalis yanhusuo</i> W.T. Wang	延胡索 cf. 왜현호색( <i>C. ambigua</i> Chm. et Schl.)
•••••CAPPARINEAE	Cruciferae	
	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss.	芥: 겨자( <i>B. cernua</i> Hemsl.)
	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L.	甘藍: 양배추
••••ROSALES	Crassulaceae	
•••••SAXIFRAGINEAE	<i>Cotyledon fimbriatus</i> (Turcz.) Berge (= <i>Orostachys fimbriatus</i> (Turcz.) Berger)	昨葉何草: 쯤바위솔
	<i>Sedum erythrostictum</i> Miq.	景天: 큰평의 비름( <i>S.</i> <i>spectabile</i> Boreau)
	Saxifragaceae	
	<i>Dichroa febrifuga</i> Lour.	常山: 상산 cf. 상산( <i>Orixa japonica</i> Thunb.)
	<i>Saxifraga stolonifera</i> (L.) Meerb. (= <i>S. sarmentosa</i> L.)	虎耳草: 범의귀
•••••ROSINEAE	Rosaceae	
	<i>Rubus chingii</i> Hu	覆盆子: 개복분자딸기 cf. 복분자딸기( <i>R. core-</i> <i>anus</i> Miq.)
	<i>Rubus corchorifolius</i> L.	懸鉤子: 수리딸기

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Rubus tephrodes</i> Hance	蓬蘽
	<i>Rosa chinensis</i> Jacq. (= <i>R. indica</i> Lindl.)	月季花: 월계화
	<i>Rosa multiflora</i> Thunb. (= <i>R. polyantha</i> Sieb. et Zucc. var. <i>genuina</i> Nakai)	營實薔薇: 들장미(절레나무) *일반적으로 營實을 말함.
	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	地榆: 오이풀
	<i>Geum japonicum</i> Thunb. var. <i>chinense</i> F. Bolle	水楊梅 cf. 뱀무( <i>G. japonicum</i> Thunb.)
	<i>Potentilla kleiniana</i> Wight et Arm.	蛇含: 가락지나물( <i>P. kleiniana</i> Wight et Arm. var. <i>robust</i> Fr. et Sav., <i>P. wallichiana</i> Del.)
	<i>Duchesnea indica</i> (Andr.) Focke	蛇莓: 산뱀딸기( <i>D. wallichiana</i> Nakai., <i>D. for- mosana</i> Odosh., <i>Potentilla wallichiana</i> Seringe)
•••••LEGUMINOSINEAE	Leguminosae	
	<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	榼藤子: 까마귀베개
	<i>Caesalpinia sepiaria</i> Roxb.	雲實: 참실거리나무 cf. 실거리나무( <i>C. japoni- ca</i> Sieb. et Zuoc.)
	<i>Cassia sophera</i> L.	甞芒決明: 털결명자
	<i>Cassia tora</i> L.	決明·馬蹄決明: 초결명 cf. 결명차( <i>C. obtusifolia</i> L.)
	<i>Sophora flavescens</i> Ait.	苦參: 너삼 cf. 고삼( <i>S. angustifolia</i> S. et Z.)
	<i>Sophora subprostrata</i> Chun et T. Chen	山豆根: 광두근
	<i>Indigofera psudotinctoria</i> Matsum.	狼牙: 개물감싸리
	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	小青: 남아비싸리

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Psoralea corylifolia</i> L.	補骨脂: 보골지(과고지)
	<i>Millettia reticulata</i> Benth	藍藤: 계혈등
	<i>Astragalus complanatus</i> R. Br.	沙苑蒺藜: 선황기
	<i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.	黃耆: 황기
	<i>Glycyrriza uralensis</i> Fisch.	甘草: 우랄감초 cf. 시베리아감초( <i>G. glabra</i> L. var. <i>glandulifera</i> Regel. et Herd.)
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	百脈根: 벌노랑이
	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	胡盧巴: 눈개자리
	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	葛根: 칩( <i>P. thunbergiana</i> Bentham)
	<i>Wisteria sinensis</i> Sweet	紫藤: 자등덩굴
••••GERANIALES	Oxalidaceae	
•••••GERANIINEAE	<i>Oxalis corniculata</i> L. (= <i>Xanthoxalis corniculata</i> Small.)	酢漿草: 팽이밥
	<i>Averrhoa carambola</i> L.	羊桃: 파리복숭아
	Zygophyllaceae	
	<i>Tribulus terrestris</i> L.	蒺藜: 남가새(납가새)
•••••EUPHORBIINEAE	Euphorbiaceae	
	<i>Ricinus communis</i> L.	蓖麻*: 아주까리(피마자) *represented in Korea.
	<i>Stellera chamaejasme</i> L.	狼毒: 서홍닥나무 cf. 낭독( <i>Galarboeus pallasii</i> Turcz., <i>G. fischeriana</i> Hara, <i>Euphorbia pallasii</i> Turcz.)
	<i>Euphorbia kansui</i> Liou	甘遂: 감수 cf. 개감수( <i>Galarboeus sieboldianus</i> Hara)
	<i>Euphorbia latbyris</i> L.	續隨子*·蘭茹*: 기름용대극. *the synonymous in the reference. <sup>33)</sup>

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Euphorbia pekinensis</i> Rupr.	大戟 <sup>*</sup> : 대극 *substitued by <i>Galarboeus sieboldianus</i> Hara (개감수) in Korea.
	<i>Galarboeus helioscopia</i> L. (= <i>Tithymalus helioscopius</i> Hill.)	擇漆: 등대풀
	<i>Spranskia tuberculata</i> (Bge.) Baill.	透骨草
•••••RUTALES	Rutaceae	
•••••RUTINEAE	<i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. (= <i>D. alpus</i> L.)	白鮮: 백선
	<i>Skimmia reevesiana</i> Fortune	茵芋: 황산계나무
•••••POLYGALINEAE	Polygalaceae	
	<i>Polygala tenuifolia</i> Willd.	遠志: 원지
•••••SAPINDALES	Balsaminaceae	
•••••BALSAMINEAE	<i>Impatiens balsamina</i> L.	鳳仙: 봉숭아
	<i>Impatiens textori</i> Miq.	坐拏草: 물봉숭
•••••CELASTRALES	Celastraceae	
•••••CELASTRINEAE	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	扶芳藤: 줄사철나무( <i>E. gracilis</i> SIEB.)
•••••RHANMALES	Vitaceae	
	<i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Mak. (= <i>Vitis dunniana</i> Lev.)	白蘘: 가회톱
	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagn. (= <i>Cissus japonica</i> Willd.)	烏蘘莓: 거지덩굴
	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	千歲藥: 새머루
	<i>Vitis thunbergii</i> Sieb. et Zucc	紫葛
	<i>Parthenocissus heterophylla</i> (Bl.) Merr.	三角風: 홀잎담쟁이덩굴
	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Sieb. et Zucc.) Plance. (= <i>P. thunbergii</i> Nakai, <i>Negundo nikoense</i> Miq.)	地錦: 담쟁이덩굴
•••••MALVALES	Malvaceae	
•••••CHLAENINEAE	<i>Abutilon theophrasti</i> Medic.	苘麻: 어저귀( <i>A. avicennae</i> Gaert.)

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.	蜀葵: 접시꽃
	<i>Abelmoschus manihot</i> (L.) Medic.	黃蜀葵: 황촉규( <i>Hibiscus manihot</i> L.)
	<i>Malva verticillata</i> L.	冬葵子: 돌아욱 cf. 아욱( <i>M. olitoria</i> Nakai)
	<i>Malva verticillata</i> L. var. <i>chinensis</i> (Miller) S.Y. Hu	菟葵
•••••THYMELAEALES	Thymelaeaceae	
	<i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc. (= <i>D. pseudo-genkwa</i> Nakai, <i>D. fortunei</i> Lind.)	芫花: 이팝나무
	<i>Daphne odora</i> Thunb.	瑞香: 서향나무
	<i>Wikstroemia canescens</i> Meissn.	蕘花: 산닥나무( <i>W. trichotoma</i> Makino, <i>Diplomorpha trichotoma</i> Nakai)
•••••VIOLALES	Violaceae	
••••••FLACOURTIINEAE	<i>Viola yedoensis</i> Mak.	紫花地丁: 호제비꽃
•••••CUCURBITALES	Cucurbitaceae	
	<i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spr.	木鼈子: 목별
	<i>Trichosanthes cucumeroides</i> (Ser.) Maxim	王瓜: 왕과 cf. 큰새박( <i>Tbladiantha dubia</i> Bunge)
	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim.	栝樓: 하늘타리
•••••MYRTIFLORAE	Myrtaceae	
••••••MYRTINEAE	<i>Baeckea frutescens</i> L.	長松: 나도비자루
	Combretaceae	
	<i>Quisqualis indica</i> L.	使君子: 사군자
	Haloragaceae	
	<i>Myriophyllum spicatum</i> L. (= <i>M. spicatum</i> L. var. <i>muricatum</i> Max.)	水藻: 이삭물수세미
••••••CYNOMORIINEAE	Cynomoriaceae	
	<i>Cynomorium songaricum</i> Rupr.	瑣陽: 쇠양
•••••UMBELLIFLORAE	Araliaceae	

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Aralia cordata</i> Thunb. (= <i>A. continentalis</i> Kitagawa)	土當歸: 맛두릅(독활); 바 디나물( <i>Angelica decursiva</i> Fr. et Sav.)
	<i>Tetrapanax papyriferus</i> (Hook.) K. Koch	通脫木*: 통탈목 * 통초를 사용하기도 함. <sup>23)</sup>
	<i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer (= <i>P. schinseng</i> Nees.)	人參: 고려인삼
	<i>Panax pseudo-ginseng</i> Wall. var. <i>notoginseng</i> (Burkill) Hoo & Tseng	三七* * <i>Gynura pinnatifida</i> in the reference. <sup>33)</sup>
	<i>Hedera nepalensis</i> K. Koch var. <i>sinensis</i> (Tobl.) Rehd.	常春藤: 매담장나무 cf. 담쟁이덩굴( <i>Partheno- cissus tricuspidata</i> Planchon); 송악( <i>H. rhombea</i> Sieb. et Zucc., <i>H. tobleri</i> Nakai)
	Umbelliferae <i>Bupleurum chinese</i> Dc.	茺胡·竹葉柴胡 cf. 시호( <i>B. falcatum</i> L.); 개시호( <i>B. longeradia- tum</i> Turcz. form. <i>longeradiatum</i> Hara)
	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urban (= <i>Hydrocotyle asiatica</i> L.)	積雪草: 병풀
	<i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.	防風*: 방풍 * 원방풍 <i>Siler diverica- tum</i> in China. <sup>46)</sup> cf. 방풍( <i>Ledebouriella seseloides</i> Wolff); 갯방풍 ( <i>Glebniia littoralis</i> Fr. Schim.)
	<i>Angelica anomala</i> Lallemand. (= <i>A. ursina</i> Max.)	白芷香*: 개구릿대 * same as <i>Angelica da- burica</i> in the referen- ces. <sup>33,47)</sup>
	<i>Angelica daburica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook (= <i>A. glabra</i> Makino)	白芷: 구릿대

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Angelica japonica</i> A. Gray. (= <i>A. kiusiana</i> Max.)	都管草: 갯강활
	<i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan	獨活(羌活* · 羌獨活): 독활 ( <i>Aralia cordata</i> Thunb.) * <i>Angelica koreana</i> Max. in Korea, <i>Notop- terygium incisum</i> Ting in China, but same in the references. <sup>1,29)</sup>
	<i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels	當歸: 당귀 cf. 참당귀( <i>A. gigas</i> Nakai)
	<i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.	芎藭·藜蘆: 천궁( <i>Cnidium officinale</i> Makino)
	<i>Ligusticum sinense</i> Oliv.	藜蘆: 남방고본 cf. 고본( <i>L. tenuissimum</i> Kitag.)
	<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cusson	蛇牀: 별사상자 cf. 갯사상자( <i>C. japoni- cum</i> Miq.)
	<i>Oenanthe javanica</i> (Bl.) Dc. (= <i>O. stolonifera</i> Dc.)	水英: 미나리
	<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.	防撥: 갯기름나물
	<i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn	前胡: 흰기름나물 cf. 바다나물( <i>P. decur- sivum</i> Max., <i>Anthriscus sylvestris</i> Hoffm.)
•••SYMPETALAE	Pyrolaceae	
••••ERICALES	<i>Pyrola rotundifolia</i> L. subsp. <i>chinensis</i> H. Andres	鹿蹄草: 참노루발 cf. 노루발풀( <i>P. japonica</i> Klenz.)
	Ericaceae	
	<i>Rhododendron molle</i> (Bl.) G. Don	羊躑躅: 털만병초 cf. 황색철쭉( <i>R. japoni- cum</i> Surin. form. <i>flavum</i> Nakai)

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
••••PRIMULALES	Myrsinaceae <i>Ardisia crispa</i> (Thunb.) A. Dc.	百兩金硃砂根: 백량금 ( <i>Bladbia crenata</i> Hara)
	<i>Ardisia japonica</i> (Horns.) Bl.	紫金牛: 자금우( <i>Bladbia japonica</i> Thunb.)
	Primulaceae <i>Lysimachia capillipes</i> Hemsl.	排草香: 가는까치수염 cf. 배초향( <i>Agastache rugosa</i> Kuntz.)
	<i>Lysimachia foenumgraecum</i> Hance	薰草零陵香: 향좁쌀풀
••••OLEALES	Oleaceae <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl	連翹: 노랑개나리 cf. 개나리( <i>F. koreana</i> Nakai)
	<i>Jasminum nudiflorum</i> Lindl.	迎春花: 영춘화
	<i>Jasminum sambac</i> (L.) Ait.	茉莉: 말리화
••••GENTIANALES	Loganiaceae <i>Gelsemium elegans</i> Benth.	鉤吻: 단장초
	<i>Strychnos nux-vomica</i> L.	番木鱧: 마전나무
	Gentianaceae <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.	秦艽
	<i>Gentiana scabra</i> Bge.	龍膽 cf. 용담( <i>G. buergeri</i> Miq.)
	Menyanthaceae <i>Nymphoides peltatum</i> (Gmel.) O. Ktze. (= <i>N. peltatum</i> Britt. et Rendl.)	蓴菜: 노랑어리연꽃
	Apocynaceae <i>Nerium indicum</i> Mill. (= <i>N. odorum</i> Soland.)	水甘草: 헝죽도
	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindk.) Lem.	絡石: 당마삭덩굴 cf. 왕마삭나무( <i>T. asiaticum</i> Nakai); 마삭덩굴( <i>T. asiaticum</i> Nakai var. <i>oblanceolata</i> Nakai)

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
	Asclepiadaceae	
	<i>Cynanchum atratum</i> Bge. (= <i>Vincetoxicum atratum</i> Morr. et Decis.)	白薇: 백미꽃
	<i>Cynanchum auriculatum</i> Royle ex Wight	隔山消
	<i>Cynanchum stauntoni</i> (Decne.) Schltr. ex Lévl.	白前: 백전
	<i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag. (= <i>Pycnostelma paniculatum</i> Schum.)	徐長卿·線香: 산해박
	<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Mak. (= <i>M. rostellata</i> Turcz.)	蘿摩: 박주가리
	Rubiaceae	
	<i>Uncaria rhyncophylla</i> (Miq.) Jacks.	釣藤: 조구등
	<i>Morinda officinalis</i> How	巴戟天: 파극천
	<i>Serissa serissoides</i> (Dc.) Druce	曲節草: 개두메별꽃
	<i>Galium kinuta</i> Nak. et Har. (= <i>G. boreale</i> L. var. <i>japonica</i> Max., <i>G. japonicum</i> Makino)	翦草: 민둥갈퀴
	<i>Rubia cordifolia</i> L.	茜草: 꼭두서니( <i>R. akane</i> Nakai)
	<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn. (fil)	刺虎: 호자나무( <i>D. indicus</i> Gaertn. (fil) var. <i>indicus</i> Hara)
•••••TUBIFLORAE	Convolvulaceae	
•••••CONVOLVULINEAE	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	旋花: `큰매꽃 cf. 매꽃( <i>C. japonica</i> Choisy)
	<i>Cuscuta chinensis</i> Lam. (= <i>C. maritima</i> Makino)	菟絲子: 갯실새삼
	<i>Pharbitis nil</i> (L.) Choisy	牽牛子·白牽牛: 털잎나팔꽃 cf. 나팔꽃( <i>P. nil</i> Choisy var. <i>japonica</i> Hara)
•••••BORAGININEAE	Boraginaceae	
	<i>Lithospermum erythrorhizon</i> Sieb. et Zucc. (= <i>L. officinale</i> L. subsp. <i>erythrorhizon</i> Hand-Mazz.)	紫草: 지치

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
•••••VERBENINEAE	Verbenaceae	
	<i>Callicarpa longissima</i> (Hemsl.) Merr.	赤藥子: 좁은작살나무
	<i>Clerodendron cyrtophyllum</i> Turcz.	大靑: 참누리장나무 cf. 산쪽풀( <i>Merrurialis leiocarpa</i> Sieb. et Zucc.)
	<i>Verbena officinalis</i> L.	馬鞭草: 마편초
	Labiatae	
	<i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O. Ktze. (= <i>Lophanthus rugosus</i> Fisch.)	藿香: 배초향(방아잎)
	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb. (= <i>A. decumbens</i> Thunb. var. <i>typica</i> Fr. et Sav.)	紫背金盤: 금란초
	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	迷迭香: 미질향
	<i>Elsholtzia splendens</i> Nakai ex F. Maekawa (= <i>E. cristata</i> Willd. var. <i>ramosa</i> Nakai)	香薷: 꽃향유 cf. 향유( <i>E. patrini</i> Garck.)
	<i>Schizonepeta tenuifolia</i> (Benth.) Brig.	假蘇: 가새잎말들깨풀
	<i>Mosla chinensis</i> Maxim.	石香薷: 실산들깨
	<i>Mosla grosseserrata</i> Maxim.	薺葦: 쥐깨 cf. 배암차즈기( <i>Salvia plebeia</i> R. Brown)
	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y. Wu et H.W. Li	石薺葦: 들깨풀( <i>M. punctata</i> Max.)
	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz.	澤蘭: 십싸리
	<i>Mentha haplocalyx</i> Briq. (= <i>M. canadensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Hara)	薄荷: 토박하 cf. 박하( <i>M. arvensis</i> L. var. <i>piperascens</i> Malinv.)
	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. var. <i>typica</i> Makino)	荏: 들깨( <i>P. frutescens</i> Britt.)
	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. var. <i>crispa</i> (Thunb.) Hand-Mazz.	蘇·紫蘇·回回蘇: 차조기풀 cf. 차즈기( <i>P. sikokiana</i> Nakai)
	<i>Leonurus heterophyllus</i> Sweet	茺蔚 cf. 익모초( <i>L. sibiricus</i> L.)

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Leonurus pseudo-macranthus</i> Kitag.	雙菜: 개속단 cf. 개속단( <i>L. macranthus</i> Max.)
	<i>Salvia chinensis</i> Benth. (= <i>S. japonica</i> Thunb.)	石見穿: 둥근배암차즈기
	<i>Salvia miltiorrhiza</i> Bge.	丹參: 단삼
	<i>Salvia plebia</i> R. Br. (= <i>S. minutiflora</i> Bunge)	荔枝草: 배암차즈기
	<i>Salvia plectranthoides</i> Griff.	紫參 cf. 둥근배암차즈기( <i>S. japonica</i> Thunb.)
	<i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi	黃芩: 황금
	<i>Prunella vulgaris</i> L. (= <i>P. vulgaris</i> L. var. <i>aleutica</i> Fern.)	夏枯草: 두메꿀풀 cf. 꿀풀( <i>P. asiatica</i> Nakai). 제비꿀( <i>Thesium chinense</i> Turcz.)
	<i>Stachys baicalensis</i> Fisch.	水蘇: 흰털개석감풀 cf. 개석감풀( <i>S. aspera</i> Michaux. var. <i>japonica</i> Max.)
	<i>Mesona chinensis</i> Benth.	仙人草: 양분초
•••••SOLANINEAE	Solanaceae	
	<i>Physalis alkekengi</i> L. var. <i>franchetii</i> (Mast.) Mak.	酸漿: 파리( <i>P. alkekengi</i> L.)
	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	莨菪: 사리풀
	<i>Tubocapsicum anomalum</i> (Franch. et Sav.) Mak. (= <i>Solanum philipinense</i> Merr.)	龍珠: 알파리
	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	白英·蜀羊泉: 배풍등( <i>S. lyratum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> Nakai)
	<i>Solanum nigrum</i> L.	龍葵: 까마중
	<i>Datura metel</i> L.	曼陀羅花: 흰꽃독말풀 cf. 흰독말풀( <i>D. alba</i> Nees.)

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
	Buddlejaceae	
	<i>Buddleia lindleyana</i> Fort.	醉魚草: 좀붓들레아
	Scrophulariaceae	
	<i>Picrorrhiza kurroo</i> Royle ex Benth.	胡黃連: 호황련
	<i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.	玄參 cf. 현삼( <i>S. burgeriana</i> Miq.)
	<i>Digitaria sanguinalis</i> (L.) Scop.	薺草: 바랭이
	<i>Pedicularis resupinata</i> L.	馬先蒿: 송이풀
	<i>Rebmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch. (= <i>R. glutinosa</i> Libosch. var. <i>purpurea</i> Makino et Nemoto)	地黃: 지황
	<i>Hemistepta lyrata</i> Bge.	蘘蒿: 지칭개나물
	Bignoniaceae	
	<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) Loisel. (= <i>Bignonia grandiflora</i> Thunb.)	紫葳: 능소화
	<i>Incarvillea sinensis</i> Lam.	角蒿: 뿔쑥
	Acanthaceae	
	<i>Justica procumbens</i> L. (= <i>J. procumbens</i> var. <i>leucantha</i> Honda)	爵牀: 쥐꼬리망초
	Orobanchaceae	
	<i>Cistanche salsa</i> (C.A. Mey) G. Beck	肉蓯蓉: 육종용
	<i>Orobanche coerulescens</i> Steph. (= <i>O. japonensis</i> Makino)	列當: 초종용
••••PLANTAGINALES	Plantaginaceae	
	<i>Plantago asiatica</i> L.	車前: 질경이( <i>P. asiatica</i> L. var. <i>denisiuscula</i> Pilg.)
••••DIPSACALES	Caprifoliaceae	
	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	忍冬: 인동덩굴( <i>L. japoni-</i> <i>ca</i> Thunb. var. <i>repens</i> Rehd.)
	<i>Sambucus javanica</i> Reinw.	蒴藋·陸英: 개지렁쿠나무
	<i>Triosteum sinuatum</i> Max.	獨用將軍

Table II. Continued

Classification		
•Division	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Viburnum utile</i> Hemsl.	羊屎柴
	Valerianaceae	
	<i>Nardostachys chinensis</i> Batal.	甘松香: 감송향
	<i>Patrinia</i> sp.	攀倒甌( <i>P. heterophylla</i> Bge. in reference. <sup>31)</sup> )
	<i>Patrinia villosa</i> Juss. (= <i>Valeriana villosa</i> Thunb.)	敗醬: 무갈
	<i>Valeriana jatamansii</i> Jones	蜘蛛香 cf. 넓은잎취오줌풀( <i>V.</i> <i>officinalis</i> var. <i>latifolia</i> Miq.)
	Dipsacaceae	
	<i>Dipsacus asper</i> Wall.	續斷: 천속단 cf. 속단( <i>D. japonicus</i> Miq.)
•••••CAMPANULALES	Campanulaceae	
	<i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch.	沙參: 층층잔대 cf. 잔대( <i>A. triphylla</i> Dc. var. <i>japonica</i> Hara)
	<i>Adenophora trachelioides</i> Maxim.	薺薺 cf. 모싯대( <i>A. remotiflora</i> Miq.)
	<i>Lobelia chinensis</i> Lour. (= <i>L. radicans</i> Thunb., <i>Isolobus</i> <i>roxburghianus</i> Dc.)	半邊蓮: 수염가래꽃
	<i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. Dc. (= <i>P. glaucum</i> Nakai)	桔梗: 도라지
	Compositae	
	<i>Gynura segetum</i> (Lour.) Merr.	土三七: 삼칠초( <i>G. japoni-</i> <i>ca</i> Juel.)
	<i>Gynura</i> sp.	見腫消< <i>Gynura procum-</i> <i>bens</i> (Lour.) Merr. in reference <sup>31)</sup> >
	<i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. (= <i>E. japonicum</i> Thunb. var. <i>angustum</i> Nakai)	蘭草: 향동골나물

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Elephantopus scaber</i> L.	天芥菜: 지담초
	<i>Aster fastigiatus</i> Fisch.	女菀: 옷굿나물
	<i>Aster tataricus</i> L. (= <i>A. tataricus</i> L. (fil.) var. <i>bortensis</i> Nakai)	紫菀: 개미취
	<i>Carpesium abrotanoides</i> L. (= <i>C. abrotanoides</i> L. var. <i>thunbergianum</i> Makino)	天名精: 담배풀
	<i>Gnaphalium affine</i> D. Don (= <i>G. multiceps</i> Wall.)	鼠麴: 떡쑥
	<i>Inula britannica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Rupr.) Reg.	旋覆花: 금불초( <i>I. japonica</i> Thunb.)
	<i>Blumea balsamifera</i> (L.) Dc.	艾納香: 두메향쑥
	<i>Bidens bipinnata</i> L. (= <i>B. pilosus</i> L. var. <i>bipinnata</i> Hook)	鬼鍼草: 줌도개비바늘
	<i>Bidens tripartita</i> L.	狼把草: 가막사리
	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L. var. <i>pubescens</i> Mak.	豨薟: 털진득찰( <i>S. pubescens</i> Makino)
	<i>Eclipta prostrata</i> L. (= <i>E. alba</i> Hassk.)	鱧腸: 한련초
	<i>Xanthium sibiricum</i> Part. ex Widd.	棠耳: 도꼬마리
	<i>Achillea alpina</i> L.	蒼: 톱풀( <i>A. sibirica</i> Ledeb.)
	<i>Artemisia annua</i> L.	黃花蒿: 개똥쑥
	<i>Artemisia anomala</i> S. Moore	九牛草 劉奇奴草: 유기노 cf. 외잎쑥( <i>A. monophylla</i> Kitamura)
	<i>Artemisia apiacea</i> Hance (= <i>A. carvifolia</i> Buch-Ham. var. <i>apiacea</i> Pampan)	靑蒿: 개사철쑥
	<i>Artemisia capillaris</i> Thunb.	茵陳蒿: 사철쑥
	<i>Artemisia argyi</i> Lévl. et Vant.	艾: 흰황새쑥 cf. 쑥( <i>A. asiatica</i> Nakai)

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Artemisia japonica</i> Thunb. (= <i>Chrysanthemum japonicum</i> Thunb.)	牡蒿: 제비쑥
	<i>Artemisia keiskeana</i> Miq.	菴藷: 맑은대쑥
	<i>Artemisia sieversiana</i> Ehrh. ex Willd.	白蒿: 흰쑥
	<i>Kalimeris indica</i> (L.) Schulz-Bip.	馬蘭: 쑥부쟁이 cf. 까실쑥부쟁이( <i>Aster agetatoides</i> Turcz. var. <i>obatus</i> Hand.-Mazz.)
	<i>Chrysanthemum indicum</i> L. (= <i>C. indicum</i> L. var. <i>coreanum</i> Lev.)	野菊: 섬감국
	<i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. (= <i>Tanacetum morifolium</i> Kitam.)	菊: 국화
	<i>Calendula arvensis</i> L.	金盞草: 금송화
	<i>Tussilago farfara</i> L.	款冬花: 관동화
	<i>Senecio integrifolius</i> (L.) Clairvill var. <i>fauriei</i> (Levl. et Vant.) Kitamura	拘舌草: 들쑥쟁이( <i>S. campestris</i> Dc.)
	<i>Senecio palmatus</i> Pall.	薇銜: 삼잎방망이
	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham.	千里及: 방망이
	<i>Carduus crispus</i> L. (= <i>C. crispus</i> L. var. <i>congesta</i> Fr. et Sav.)	飛廉: 지느러미영경귀
	<i>Arctium lappa</i> L. (= <i>A. edule</i> Nakai)	惡實: 우엉
	<i>Cirsium chinense</i> Gardn. et Champ.	苦蕒
	<i>Cirsium japonicum</i> Dc.	大薊*: 영경귀( <i>C. maackii</i> Max. var. <i>koraiense</i> Nakai) * same as <i>Cephalanoplos segetum</i> (Bge.) Kitam. in references, <sup>1,29)</sup> but different from the specy in the reference. <sup>31)</sup>
	<i>Cephalanoplos segetum</i> (Bge.) Kitam.	小薊: 조맹이( <i>Cirsium segetum</i> Bunge)

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Saussurea lappa</i> Clarke	木香: 운목향 cf. 목향( <i>Inula belenium</i> L.)
	<i>Saussurea romuleifolia</i> Franch.	蛇眼草: 애기분취
	<i>Rhaponticum uniflorum</i> (L.) Dc.	漏蘆: 뽕국채
	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	紅藍花·燕脂 <sup>32</sup> : 잇꽃
	<i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) Dc. (= <i>Atractylis lyrata</i> Honda)	蒼朮: 가는잎삼주 cf. 당삼주( <i>A. chinensis</i> Koidz.)
	<i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.	白朮·朮: 참삼추
	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers. (= <i>C. minuta</i> Matsumura)	石胡荽: 중대가리풀
	<i>Monochasma savatieri</i> Franch.	千年艾: 털녹영초
••MONOCOTYLEDONEAE	Alismataceae	
••••HELOBIAE	<i>Alisma plantago-aquatica</i> L. var. <i>orientale</i> Samuels (= <i>A. orientale</i> Juzep.)	澤瀉: 질경이택사 cf. 택사( <i>A. canaliculatum</i> A. Braun et Bouche)
•••••ALISMATINEAE		
•••••POTAMOGETONINEAE	Potamogetonaceae <i>Zostera marina</i> L.	海帶*: 거머리말 * <i>Laminaria religiosa</i> Miy. <sup>32</sup>
••••HYDROCHARITACEAE	Hydrocharitaceae <i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers. (= <i>O. japonica</i> Miq.)  <i>Vallisneria spiralis</i> L. (= <i>V. asiatica</i> Miki)	龍舌草: 물질경이  苦草: 나사말
••••LILIIFLORAE	Liliaceae	
•••••LILIINEAE	<i>Veratrum nigrum</i> L.  <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge.  <i>Hemerocallis fulva</i> L. (= <i>H. fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel)	藜蘆: 참여로  知母: 지모  萱草: 왕원추리 cf. 원추리( <i>H. aurantica</i> Baker)
	<i>Hosta plantaginea</i> (Lam.) Aschers.	玉簪花: 비녀옥잠화

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don	貝母 cf. 패모( <i>F. ussuriensis</i> Max.)
	<i>Tulipa gesneriana</i> L.	鬱金香: 튜올립
	<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	天門冬: 천문동( <i>A. lucidus</i> Lindley)
	<i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> Franch.	蚤休
	<i>Paris tetraphylla</i> A. Gray	王孫
	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce var. <i>Pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	麥蘘: 둥글레( <i>P. japoni-</i> <i>cum</i> Morr. et Decais.)
	<i>Polygonatum sibiricum</i> Redoute	黃精: 충충갈고리둥글레 cf. 진황정( <i>P. falcatum</i> A. Gray)
	<i>Ophiopogon japonicus</i> Ker-Gawl. (= <i>Mondo japonicum</i> Farwell.)	麥門冬: 소엽맥문동 cf. 맥문동( <i>Liriope grami-</i> <i>nifolia</i> Baker)
	<i>Smilax china</i> L. (= <i>S. taquetii</i> Lev.)	菝葜: 명감나무
	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	土茯苓: 민청미래덩굴 cf. 명감나무( <i>S. china</i> L.)
	Stemonaceae	
	<i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq.	百部: 백부
	Amaryllidaceae	
	<i>Lycoris radiata</i> (L'her.) Herb.	石蒜: 가을가재무릇
	<i>Eubotryoides grayana</i> Hara. var. <i>oblongifolia</i> Hara.	木藜蘆 cf. 문주란( <i>Crinum asia-</i> <i>ticum</i> var. <i>japonicum</i> Bak.)
	<i>Narcissus tazetta</i> L. var. <i>chinensis</i> Roem.	水仙: 수선화
	Hypoxidaceae	
	<i>Curculigo orchioides</i> Gaertn.	仙茅: 선모
	Dioscoreaceae	
	<i>Dioscorea bulbifera</i> L.	黃藥子: 둥근마

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Dioscorea cirrhosa</i> Lour.	趙魁
	<i>Dioscorea hypoglauca</i> Palib.	萹藨 cf. 각시마( <i>D. tenuipes</i> FR. et Sav.)
•••••PONTEDERIINEAE	Pontederiaceae	
	<i>Monochoria vaginalis</i> Presl var. <i>pauciflora</i> (Bl.) Merr.	薺草
	Iridaceae	
	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) Dc. (= <i>Ixia chinensis</i> L., <i>B. punctata</i> Moench.)	射干: 범부채( <i>B. chinensis</i> Leman.)
	<i>Iris pallasii</i> Fisch. var. <i>chinensis</i> Fisch. (= <i>I. lactea</i> Pall. var. <i>chinensis</i> Koidz.)	蠡實: 타래붓꽃
	<i>Iris tectorum</i> Maxim.	鳶尾: 연미붓꽃
	<i>Crocus sativus</i> L.	番紅花: 사프란
•••••JUNCALES	Juncaceae	
	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen.	燈心草: 골풀( <i>J. effusus</i> L.)
	<i>Juncus effusus</i> L. var. <i>decipiens</i> Buchen. f. <i>utilis</i> Mak.	石龍芻: 자리골풀
	<i>Juncus</i> sp.	龍常草
	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Naki (= <i>L. campestris</i> Dc. var. <i>capitata</i> Miq.)	地楊梅: 핑의밥
•••••COMMELINALES	Commelinaceae	
•••••COMMELININEAE	<i>Commelina communis</i> L.	鴨跖草: 닭의장풀
	<i>Pollia japonica</i> Thunb.	杜若: 나도생강
•••••ERIOCAULINEAE	Eriocaulaceae	
	<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	穀精草: 논고위까람 cf. 곡정초( <i>E. sieboldianum</i> Sieb. et Zucc.)
•••••GRAMINALES	Gramineae	
	<i>Melica scabrosa</i> Trin.	金絲草: 참쌀새
	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Mak. (= <i>A. hispidus</i> Makino var. <i>breviticus</i> Hara)	蕪草: 조개풀
	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv.	地筋* * root of 참비름 <i>Amara-</i> <i>thus mangostanus</i> L. <sup>48)</sup>

Table II. Continued

Classification	Family name and scientific name	Chinese names of entries: Korean name
•Division		
••Class		
•••Subclass		
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) Beauv. (= <i>H. bungeana</i> Trinius)	白茅香·茅香: 향모
	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) P. Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C.E. Hubb.	白茅: 선별기 cf. 띠( <i>I. cylindrica</i> Beauv. var. <i>koenigii</i> Durand. et Schinz.)
	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn. (= <i>L. gracile</i> Brong. var. <i>elatum</i> Hack.)	淡竹葉: 조릿대풀
	<i>Miscanthus sinensis</i> Anderss. (= <i>M. sinensis</i> Anders. form. <i>decompositus</i> Nakai)	芒: 참억새
	<i>Indocalamus tessellatus</i> (Munro) Keng.	箬
	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv. (= <i>Panicum viride</i> L., <i>S. purpurascens</i> Opiz.)	狗尾草: 강아지풀
	<i>Zizania caduciflora</i> (Turcz.) Hand.-Mazz. (= <i>Z. cauduciflora</i> Nakai)	菰: 줄 cf. 줄풀( <i>Z. latifolia</i> Turcz.)
••••PRINCIPES	Palmae <i>Calamus margaritae</i> Hance	省藤
•••••SPATHIFLORAE	Araceae <i>Acorus calamus</i> L.	白菖: 창포( <i>A. asiaticus</i> Nakai, <i>A. calamus</i> L. var. <i>asiaticus</i> Pers.)
	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	昌蒲: 석창포
	<i>Amorphoballus rivieri</i> Durieu	蒟蒻: 곤약( <i>A. konjac</i> C. Koch.)
	<i>Alocasia odor</i> (Roxb.) C. Koch.	海芋: 알로카시아 cf. 꽃토란( <i>Zantedeschia</i> <i>aethiopica</i> Spreng.)
	<i>Arisaema amurense</i> Maxim.	虎掌天南星: 둥근잎천남성 cf. 천남성( <i>A. japonica</i> Blume)
	<i>Arisaema ringens</i> (Thunb.) Schott.	由跋: 푸른천남성
	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. (= <i>Arum ternatum</i> Thunb.)	半夏: 끼무릇

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
	Lemnaceae	
	<i>Spirodela polyrrhiza</i> Schleid. (= <i>Lemna polyrrhiza</i> L.)	水萍: 개구리밥
	Typhaceae	
	<i>Typha latifolia</i> L.	香蒲: 큰부들 cf. 애기부들( <i>T. angustata</i> Bory et Chan-Ford)
•••••CYPERALES	Cyperaceae	
	<i>Cyperus rotundus</i> L.	莎草香附子*: 향부자 (*일반적으로 香附子로 사용됨.)
	<i>Scirpus maritimus</i> L.	荊三稜*: 매자기 *삼릉 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch.-Ham. <sup>31)</sup>
•••••SCITAMINEAE	Musaceae	
	<i>Musa paradisiaca</i> L. var. <i>sapientum</i> O. Ktze.	甘蕉: 바나나* (감초) cf. 파초( <i>M. basjoo</i> Sieb.) *Korean name <sup>42,49)</sup>
	Zingiberaceae	
	<i>Alpinia chinensis</i> Rosc.	廉薑: 당량강
	<i>Alpinia japonica</i> Miq.	山薑: 꽃양하
	<i>Alpinia katsumadai</i> Hayata	豆蔻: 초두구
	<i>Alpinia officinarum</i> Hance.	高良薑: 고양강
	<i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.	益智子
	<i>Amomum cardamomum</i> L.	白豆蔻: 백두구
	<i>Amomum villosum</i> Lour.	縮砂密: 축사인
	<i>Curcuma longa</i> L.	薑黃·鬱金: 강황
	<i>Curcuma zedoaria</i> (Berg.) Rosc.	蓬莪朮: 아출
	<i>Kaempferia galanga</i> L.	山柰
	<i>Zingiber mioga</i> Rosc. (= <i>Amonum mioga</i> Thunb.)	襄荷: 양하
•••••MICROSPERMAE	Orchidaceae	
	<i>Cymbidium ensifolium</i> (L.) Sw.	蘭花

Table II. Continued

Classification		
•Division		
••Class	Family name and	Chinese names of entries:
•••Subclass	scientific name	Korean name
••••Order		
•••••Suborder		
	<i>Gastrodia elata</i> Bl.	赤箭天麻: 천마
	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb.	白及: 자란
	<i>Cremastra variabilis</i> (Bl.) Nakai (= <i>C. appendiculata</i> Makino)	山慈姑: 약난초
	<i>Dendrobium nobile</i> Lindl.	石斛: 고귀석곡 cf. 석곡( <i>D. moniliforme</i> Swartz)
	<i>Luisia morsei</i> Rolfe	釵子股

류되었다. 나머지 203 품목에 대해서는 그 기원을 확인할 수 없었는데 본서에서도 이름은 있으나 사용되지 않는 것(有名未用)으로 표시한 것이 138 품목이었다.

분류정리된 것을 세분하면 Angiospermae는 Dicotyledoneae가 295종으로 73.20%, Monocotyledoneae가 78종으로 19.36%로 전체의 92.56%를 기록하여 제일 많은 종수로 나타났다. Pteridophyta가 18種으로 4.46%, Cholorphyta가 3종으로 0.74%, Phaeophyta가 3종으로 0.74%, Lichenes와 Bryophyta가 2종으로 0.50%, Fungi와 Gymnospermae가 1종으로 0.25%로 소수의 종으로 기록되었다(Table II).

기원 미확인종에서 가장 많은 부분을 차지하는 것은 잡초류와 명칭은 있으나 사용되지 않는 것(有名未用)으로 이들에 대한 연구도 본초학의 발전을 위하여 반드시 이루어져야 할 것으로 생각된다.

(1995년 6월 9일 접수)

### 참 고 문 헌

1. 이시진: 「重訂本草綱目」(상·하), 문화도서공사 (1981).
2. 육창수, 문영희, 이경순: 「한국본초학」, 계축문
3. 화사 (1984).
4. 육창수, 안덕균: 덕유산의 약품자원 식물, 생약학회지, 3(4), 217 (1972).
5. 육창수, 김종우: 백석산의 생약자원조사, 경희약대논문집, 1, 79 (1973).
6. 양인석: 팔공산의 약용식물, 생약학회지, 6(4), 251 (1975).
7. 유병태, 신창남: 계룡산의 약용식물상, 충남과학연구지, 9(1), 119 (1982).
8. 육창수, 홍남두, 이경순, 김태희: 대암산의 생약자원(II), 경희약대논문집, 16, 181 (1988).
9. 김일혁, Michio Takido, Hiroyuki Ageta, 육창수: The Folk Medicine and Medicinal Plants of Mt. Han-La, 생약학회지, 22(4), 252 (1991).
10. 안덕균: 황정류의 본초학적 연구, 생약학회지, 16(2), 105 (1985).
11. 주영승: 한국산 국화과 식물에 대한 본초학적 연구, 석사학위논문, 원광대학교 대학원 (1986).
12. 이상명: 한국산 택사과 식물의 분류학적 연구, 석사학위논문, 경남대학교 대학원 (1987).
13. 김성수: 한국산 비름과 식물에 대한 본초학적 연구, 석사학위논문, 원광대학교 대학원 (1988).
14. 유승조: 한약의 오용과 대응-자원식물의 기원에 관하여-, 생약학회지, 11(1), 24 (1980).
15. 김동걸, 이상인: 창포류의 기원에 관한 서지학

- 적연구, 본초분과학회지, 2(1), 91 (1987).
16. 김선희, 안덕균: 하고초의 기원에 관한 문헌적 고찰, 본초분과학회지, 2(1), 127 (1987).
  17. 박선동, 노승현: 맥문동에 관한 연구, 본초분과학회지, 2(1), 43 (1987).
  18. 김재학, 안덕균: 제니에 관한 문헌적 고찰, 본초분과학회지, 5(1), 117 (1990).
  19. 김호철, 이상인: 금은화의 기원에 관한 문헌적 고찰, 본초분과학회지, 5(1), 111 (1990).
  20. 박상희, 염정록, 장일무: 한·중·일의 공정서(약전 및 규격집)에 수록된 전통천연약물의 품질에 관한 조사(I)—기원에 관한 분류학적 검토—생약학회지, 2(3), 112 (1991).
  21. 유승조: 유통 생약(한약)의 기원에 관하여, 생약학회지, 23(3), 171 (1992).
  22. 지형준: 약용작물의 재배현황과 기원식물, 생약학회지, 23(3), 178 (1992).
  23. 사종만: 중약품종이론에 대한 연구, 생약학회지, 24(3), 1 (1993).
  24. 강성용, 최민호, 변재영, 한종현: 방약합편에 수록된 약물의 빈도조사, 원광한의학, 1(1), 19 (1991).
  25. 박선동: 「방약합편」에 있어서의 수치의 종류와 이와 관련된 약물 및 처방에 관한 문헌적 고찰, 본초분과학회지, 5(1), 145 (1990).
  26. 신민교: 「향약집성방」에 미수재된 향약본초에 관한 조사연구(식물편), 원광대학교논문집, 20, 301 (1985).
  27. 이훈영: 「방약합편」상의 당귀 배합처방에 대한 통계적연구, 경희대학교 학도호국단, 고헌논문집, 1, 167 (1977).
  28. 홍문화: 한방 처방의 통계적 연구(I), 생약의 처방출현 빈도 및 기원분포, 생약학회지, 3(2), 57 (1972).
  29. 이시진: 「圖解本草綱目」, 고문사 (1983).
  30. 홍남두: 국내 생약의 수급에 관한 조사보고, 경희약대논문집, 1, 95 (1973).
  31. 江蘇新醫學院: 「中藥大辭典」, 上海科學技術出版社 (1977).
  32. 赤松金芳: 「新訂和漢藥」, 醫齒藥出版株式會社 (1980).
  33. Bliss, B.: Chinese medicinal herbs, Geopline Press, San Francisco (1973).
  34. 김재길, 김일혁, 정보섭: 원색천연약물대사전 상·하, 남산당 (1989).
  35. 屈田滿, 緒方健, 新田あや, 星川清親, 柳宗民, 山崎耕宇: 「世界有用植物事典」, 平凡社 (1989).
  36. 안학수, 이춘녕, 박수현: 「한국농식물자원명감」, 일조각 (1982).
  37. 中國衛生部藥典委員會: 中國藥典, 中草藥及已製品, 人民衛生出版社 (1977).
  38. 약품식물학연구회: 「개정판 약품식물학각론」, 학창사 (1982).
  39. 과학백과사전출판사: 「약초의 성분과 이용」, 일월서각 (1991).
  40. Melchior, H. and Werdermann, E.: Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien. 1. Band. Gebruder Borntraeger Berlin-Nikolassee (1954)
  41. Melchior, H.: Engler's Syllabus der Pflanzenfamilien, 2. Band. Gebruder Borntraeger Berlin-Nikolassee (1964)
  42. 한진건: 「중한식물명칭사전」, 과학출판사 (1992).
  43. 이덕봉: 「한국동식물도감」, 제15권 식물편(유용식물), 삼화서적주식회사 (1974)
  44. 강제원: 「한국동식물도감」, 제8권 식물편(해조류), 삼화서적주식회사 (1968).
  45. 최두문: 「한국동식물도감」, 제24권 식물편(선태류), 삼화서적주식회사 (1980).
  46. 남준영, 유경수: 방풍의 생약학적 연구, 생약학회지, 6(3), 151 (1975).
  47. 김동걸: 약류의 약효에 관한 연구(II), 대전대학교논문집 8(2), 251 (1989).
  48. 정보섭, 신민교: 「도해향약(생약)대사전」, 식물편, 영림사 (1990).
  49. 이선주: 한국 향토 민속약 규명에 관한 연구 (I), 생약학회지, 6(2), 75 (1975).