

현재까지 시현연구  
기관에서 육성 보급화  
풀풀이 없고 각자 양여  
자생하는 것을 채취하  
여 재배하는 지방재배  
종자를 그 범이가 크  
다. 특히 농가에서 담귀  
묘를 심은 후 꽃대가  
올라온 것을 그대로  
채증하여 종자를 쓰고 남  
았다는 점을 생각할  
때 꽃대가 빨리 올라  
는 것을 이 선발되어  
재배되고 있는 것이  
많으므로 꽃대가 올라  
온 것이 적은 농가  
의 3년생에서 채증종  
종자를 구입하여 심는  
것이 좋다. 종묘를 구입하여 심  
을 때는 모식점이 0


(1) 재배정지  
(가) 기후  
중부부의 산간고령  
지에 재배하는 것이  
유리하다. 특히 일교  
차가 크고 일사량이 많을  
잘되고 풀밭도 우량하  
다.

(나) 토양  
토성이 깊고 물빠짐  
좋으면서 수분유지  
가 잘되는 양토나 사  
암토가 좋다. 모래땅  
이나 자갈밭에서는 잡  
뿌리 발달이 많고 질  
흙에서는 뿌리의 비대  
가 잘 안될 뿐만 아니라  
수확력이 많이 듣다. 이어작기를 실  
어하므로 화분과 자물  
과 훌륭지를 하도록  
한다.

재민고 시리즈



## ◆ 토당귀 식물



### ◆ 토당귀 약재

토심이 깊은 사양토가 재배적지  
거름을 많이 주면 오히려 역효과

(다거름주기(施肥)  
거름은 꽂대가 올라  
온 것과 관계가 있  
으니 주의해 주어야 한다. 즉 생육초기에 질소비료를 많이 주면 증기와 잉어 부식성하게 자라면서 꽂대도 많아 올라오는 경향이 있으므로 생육후기 주비중 점 시비가 필요하다. 밀거루는 10a 당퇴밀 1,500kg 이상 이소 4kg 질소 7kg 칼리 7kg 인산 8kg 태를 보아서 생육이 잘이 정지하여 전나풀면 되도록 한 풀상순에 질수를 주고 생육을 좋으면 주지 않고 있다.

• 선종 : 뿌리에 흙을 만들고 줄기와 빨대를 끌어 풀의 저하는 물을 수량 감소가 크다. 방제법으로는 화불과 작물과 윤작을 한다.

(바) 수확과 조제

수확은 정석한 그해 가을 11월초~12순간 이 날짜에 뿐하면 뿌리가 살든지 않게 캐낸 다음 흙을 떨고 건조시킨다. 알짜 으로 캐내려면 흙이 둘고 노루비도 많아 틀어 소리포크 레인을 이용하면 흙과 절이다.

5 cm 정도의 규모를 구하여 쓰는 것이 좋다. 물 칙경 0.7 cm 이상의 것을 심으면 꽃대가 많을 데다가 물 칙경 0.3 cm 이하의 소묘는 실은 후 죽는 것 많다.

나  
파종이 끌려나면 살을  
잘 썩은 부여로를  
제로 쳐서 종자가 되  
이지 않게 놓고 충분  
량의 물을 주어 발아  
에 지장이 없도록 한  
당.  
발아까지 수분유지  
를 위하여 병풀을 데우거나  
주었다가 2 / 3 절도가 빠졌으면 견연  
준다.  
2)파종기 : 땅이 어  
기전 농가들이나 땅이  
풀린 이를 풀에 파종을  
는데 가을파종이 발아  
가 잘 된다. 불파종이나  
마른풀자리를 그대로 하  
증하면 빨아가 잘되고  
않으므로 파종전에 조  
피의 빨아 억제를 제거  
제거하고 한다.  
파종기에도 빨아  
※빨아 어제를 친다

거.. 흘리는 물에 3일 이상 담가 종자를 둘러싸고 있는 빛이 역률을 제거한 후 가도록 되어 있다. 7월이 내에 파종하면 3) 묘판시비.. 비옥도가 충분도인 땅에서 옷거리를 주지 않 는다. 묘는 배же 세우고 메마르게 길렀서 종, 소묘(묘진경 0.6cm 이하)를 많이 생 삽할 수 있도록 한다. 묘상에 거름을 많이 주면 세례이 가능한 것이다. 무성하게 자라면서 세례이 약한 것은 죽어버려 묘농사를 실패하게 된다.

(나) 약주식기(定植)  
아주식기는 3월 하

술부터 하는데 일찍 싫는 게 아주 뿐만 아니라 좋을 데에 빨려는 능력을 놓지 않고 구름이 진달래 턱하여 젖은 품방으로 떠나가지고 싶으면 묘의 건조되어 활약이 놓아진다.

\* 심는 방법 :: 40cm의 땅을 만들고 45cm 각도로 묘꼴이 구부러지지 않도록 20cm 간격으로 심는데 보이지 않을 정도로 물을 주면 흙을 물어뜯는 별개 흙준다. 나를 만나면 떠오르거나 걸어 등으로 떠나가면 전조가 밤지되고 집중의 발성이 억제되

- (급) 주요 관리
  - 묘상 관리 .. 발아 후 생육이 어느 정도 진전되면 제초와 함께 과도하게 밀식된 곳을疏아준다.
  - 본발 관리 .. 뿌대가 뽑아 버린다. 잘 조밥 제는 실은 후 3일 이내에 펜디아제를 뿌려 주고 6월 중순경에 풀만 뽑고 복주기 를 한다.
- 구형병 : 비가 많을 때 틀째 잡이 암되어면 발瘟증이나 배수로 정비를 잘 해주고 병에 걸린 폭기는 뽑아서 뿐에 태우고 구멍을

# 입 안내

# 중앙 회원 가입 안내

국산한약재는 조상의 얼이 담겨있는 소중한 전통의약입니다.  
본회에서는 아래와 같이 중앙회원을 모집하오니 많은 참여 바랍니다.

태 살

농촌지도기관, 영농법인, 작목반, 생약분야단체, 학계, 제약 및 식품회사, 우리생약에 관심 있는 모든 분

혜택

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1) 생약재배에 관한 기술지도 | 2) 생약계약재배 및 수매알선    |
| 3) 입산채취증 발급      | 4) 생약의 수출입 알선       |
| 5) 생약분야 정보제공     | 6) 한국생약보(시세표 포함) 제공 |

구비서류

- 1) 가입서 양식(본부에 비치)
  - 2) 주민등록등본 1통
  - 3) 증명사진 2매
  - 4) 회비 : • 개인 : 월 3,000원×12개월 = 36,000원  
가입비 10,000원 합계 46,000원
  - 단체 : 월 10,000원×12개월 = 120,000원  
가입비 10,000원 합계 130,000원

가입문의 : 협회사무국 전화(02) 967-8133