

AIDS News

태국 에이즈 겨냥 TV 콘돔 광고 허용


태국 정부는 날로 확산되고 있는 에이즈 문제에 보다 적극적으로 대처하기 위해 콘돔제조회사와 합동으로 TV방송에 콘돔 및 콘돔사용법을 광고하기로 했다고 발표했다.

태국 보사부는 현재 75~80만으로 추산되는 태국의 에이즈 감염자는 특별한 조치가 취해지지 않을 경우 오는 2000년이면 3~4백만명으로 늘어날 전망이다면서 케이블 TV 방송을 통해 에이즈 예방 차원에서 콘돔을 광고하기로 했다고 밝혔다.

보사부는 현재 태국에서 '듀렉스'와 '킹텍스'라는 두종류의 브랜드로 콘돔을 생산하고 있는 '런던로열 컨슈머 프로덕츠 타일랜드사'의 협조로 콘돔을 다큐멘터리 시리즈로 광고할 것이라고 말했다. (방콕=연합)

아세안 에이즈 정보센터 설립 추진

아세안(동남아 국가연합)은 방콕에서 열린 제5



●세계에이즈의 날 행사에 참석한 넬슨 수상.

차 아세안 정상회담에서 에이즈 문제에 공동대처하기 위한 정보교환 및 전략 수립을 위한 에이즈 정보센터의 설립을 제안했다.

소라-아트 클린프라툼 태국 보사부 부장관은 에이즈는 이지역의 인적·물적 교류가 빈번해짐에 따라 공동으로 저지해야 할 과제로 부상했다고 지적하고 에이즈 문제에 관한 지역정보네트워크의 설립은 이 지역 주민들에게 에이즈를 이해시키는 데 큰 도움을 주게 될 것이라고 말했다. (방콕=연합)

복지부 에이즈 예방 달력 대량 제작

보건복지부는 에이즈 예방을 홍보하는 내용이 담긴 책상용 달력 4만5천부를 제작, 전국 주요 행정기관, 보건기관 등에 보냈다.

우리나라의 토속 야생화를 곁들여 제작된 이 달력에는 에이즈란, 에이즈의 감염경로, 에이즈에 감염되지 않는 경우, 에이

즈의 발병단계, 에이즈의 주요 증상, 에이즈 검사는 어떻게, 에이즈 예방방법, 에이즈에 감염되면, 에이즈 감염자와 환자란, 에이즈 상담방법 등을 담고 있다.

복지부 관계자는 이번 달력 제작을 놓고 일부 반대 의견이 있었으나 에이즈를 더 이상 방치할 수 없어 4천5백만원을 들여 달력을 제작했다고 말했다. (서울=연합)

미국 범정부적 에이즈퇴치 강화 다짐-클린턴 의회의 지출 삭감 조치 반대

빌 클린턴 대통령은 에이즈 치료법을 발견하기 위한 정부의 노력을 배증하겠다고 다짐하고 이와



●헝가리 젊은이들의 촛불기원 행사.

AIDS News

관련된 정부지출을 삭감하려는 의회의 어떠한 조치에도 반대할 것이라고 경고했다.

에이즈 및 에이즈 바이러스에 관해 처음으로 열린 백악관회의에서 클린턴 대통령은 연구예산 조정을 포함한 범정부 차원의 연구계획을 90일내에 준비하도록 지시했다고 밝혔다.

클린턴 대통령은 또 앨고어 부통령에게 에이즈의 백신 및 기타 에이즈 감염 예방법 등의 개발을 촉진하는 방안을 검토하기 위해 의학과 제약업계 관계자들이 참석하는 회의를 소집토록 요청했다고 말했다.

에이즈는 현재 25~44세 미국인들의 사인 1위를 차지하고 있으며, 젊은이, 여성 및 소수민족에게서 새 에이즈 감염자 수가 가장 빠르게 증대하고 있다. 미질병통제예방센터(CDC)는 최근 보고를 통해 에이즈 환자로 진단된 미국인이 50만명이고 사망자는 30만명이 넘는다고 말했다.



●홍보유인물을 배포하고 있는 자원봉사자들.

세계보건기구(WHO) 추정에 따르면 전세계의 에이즈 환자는 4백 50만 명이며 HIV에 감염된 성인은 1천 8백만명이고 어린이도 1백 50만명에 달하고 있다. (워싱턴 로이터=聯合)

프랑스 병원직원 37명 에이즈 감염-오염혈액, 감염 생체 물질 취급영향

프랑스에서 의료업무나 기타 병원내 업무와 관련된 사고로 에이즈에 감염된 것으로 생각되는 의사, 간호사 및 그밖의 병원직원의 수는 37명에 달한다

고 프랑스 보건부의 보고서가 밝혔다.

이들 감염자 중 10명은 업무와 관련한 감염임이 입증되었고 나머지 27명은 '추정' 감염자로 분류됐다고 말했다.

입증된 감염자 10명은 모두 에이즈에 오염된 혈액 또는 에이즈에 감염된 생체물질이 들어있는 주사기로 상처를 입은 후 검사에서 에이즈 바이러스인 HIV 양성반응을 나타낸 간호사들이다.

'추정' 감염자로 분류된 27명 중에는 간호사 7명과 내과의사, 진료보조원, 생

물학자 각 2명외에 외과의사, 수술보조원, 치과 의사, 치과보조원, 실험실 기술원, 병원감염부 각 1명이 들어있다.

사고발생시의 검사에는 음성반응을 보였으나 그 후 4주~6개월 사이에 실시된 검사에서 양성반응을 보일 경우 입증된 감염자로 분류되며 에이즈에 대한 양성반응이 의료사고와 관련됐다는 충분한 증거가 발견되지 않을 경우에는 '추정' 감염자로 분류된다.

이들 에이즈 감염의 대다수는 업무와 관련된 사

AIDS News

고 때문인 것으로 인정됐다고 보건부가 말했다.


보건부 보고서는 보건종사원이 주사침에 의한 사고 발생시 에이즈에 감염될 위험도가 0.32%고 에이즈 감염 혈액이 점막과 접촉할 경우 에이즈에 감염될 위험도는 0.04%라고 추정했다. (파리 로이터=聯合)

제3세대 에이즈 진단시약 개발 ~녹십자 미, 영사에 이어 세계 3번째

(주)녹십자는 종래 에이즈 진단시약에 비해 1~2주 이상 빨리 에이즈 항체를 검출할 수 있는 제3세대 에이즈 진단시약 '제네디아 HIV 1/2 엘리자 3.0'을 개발했다고 밝혔다.

제3세대 에이즈 진단시약의 자체 개발은 올 초 개발에 성공한 미국 애보트와 영국 류렉스 웰컴에 이어 세 번째며 국내에서는 처음이다.

(주)녹십자는 자체 연구 개발팀이 지난 92년부터 서울대 유전공학연구소 김선영 교수팀, 한국과학기술원 생명공학연구소



● '효과적인 홍보·예방교육만이 에이즈 파급을 멈추게 할 것이다' - 매직 존슨.

이영익 교수팀과 공동으로 개발에 나서 3년만에 제품화에 성공했다.

제3세대 에이즈진단시약은 기존 제2세대 진단시약이 에이즈에 감염된 지 4주 안팎이 지나야 체내에 형성되는 후기항체만 검출할 수 있는 것과 달리 감염 후 1~2주안에 나타나는 초기항체를 검출할 수 있다.

제2세대 시약으로는 감염된 지 한달 안팎의 보건자가 현혈한 혈액에 대한 감염여부 조사가 불가능했으나 제3세대 시약을 사용하면 감염된 지 1~2주안팎의 보건자도 보다 정확히 가려낼 수 있어 감염된 잠복기 혈액의 수혈

에 따른 감염사고를 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다. (서울=聯合)

미국 20~30대 92명중 1명 에이즈 감염-'93년 25~44세 사망자 사인 에이즈 으뜸

27세에서 39세 사이의 미국인 92명 중 1명이 에이즈에 감염돼 있으며 이 중에서도 흑인과 중남미계 등 소수 민족들의 감염률은 이를 크게 상회한다는 연구 결과가 나왔다.

미국 국립암협회의 필립 로젠버그 연구원은 최근 주간 사이언스지에 지난 93년 현재 흑인청년 33명 중 1명이 에이즈 감염자로 추정된다는 내용의 충격적인 조사보고서를

실고, 만일 이같은 추세가 계속된다면 젊은이들은 '에이즈 위협으로 죽음 등의 통과 의례'를 거쳐야 하는 '매우 암울한 미래'를 맞이하게 될 것이라고 경고했다.

미국립 질병통제예방센터(CDC)는 현재 에이즈가 젊은이들을 점점 더 위협하고 있다고 밝히면서 지난 93년 25~44세까지의 사망자 중 에이즈로 인한 사망률이 제일 높았다고 밝혔다.

미정부는 최근 에이즈 환자수가 해마다 4만명씩 늘어나면서 사망자도 같은 숫자에 달하는 등 안정 추세를 보이고 있다고 발표했다. 로젠버그 연구원은 그러나 최근 수년간 백인 청년에 한해 감염률이 감소되고 있을 뿐이라고 이같은 낙관론을 반박하면서 현재 흑인과 중남미계 청년들에 대한 감염 위험률이 크게 늘어나고 있으며 "HIV 감염자수도 급속적인 확산 추세"라고 경고했다. (워싱턴 AP=聯合) A