

# 肺癌의 辨證과 治方에 對한 文獻的 考察

裴基采, 金聖勳\*

## I. 서 론

肺癌은 전세계적으로 가장 흔한 惡性腫瘍의 하나로 산업의 발달에 수반된 大氣汚染 및 吸煙 등으로 인해 發生率 및 死亡率도 계속 급격한 증가 추세에 있으며 국내에서도 胃癌, 肝癌에 이어 세 번째로 높은 死亡率을 보이며 增加추세에 있다. 韓醫學 文獻上 肺癌의 病名은 記載되어 있지 않으나 《靈樞·脹論》<sup>2)</sup>에 “肺脹者 虛滿而喘咳”라 하였고, 《素問·玉機眞藏論》<sup>1)</sup>에 “咳嗽脫形 脈小數疾 大骨枯槁 大肉陷下 胸中氣滿 喘息不便 內痛引肩項 身熱 脫肉破脰”이라 하였으며, 《素問·咳論》<sup>1)</sup>에 “肺咳之狀 咳而喘息有音 甚則唾血”이라 하였고, 《難經》<sup>4)</sup>에 “肺之積 名曰息賁 在右脇下 覆大如杯 久不已 令人洒淅寒熱喘咳 發肺癰”이라 하여 現在의 肺癌의 主要症狀과 類似하게 記述되어 肺脹<sup>2)</sup>, 肺咳<sup>3)</sup>, 肺積<sup>4)</sup>, 息賁<sup>4)</sup>, 肺癰<sup>7)</sup> 등의 病症이 肺癌의 範疇에 屬한다고 볼 수 있다<sup>10), 12)</sup>.

韓醫學의 肺氣가 損傷되어 肺氣가 虛해지면 邪毒이 肺에 侵犯하여 宣發과 肅降機能이 失調되고 氣機가 不暢하여 津液이 散布되지 못하므로 脈絡이 阻塞되어 氣滯血瘀하고 痰濕이 內聚하여 腫塊가 形成된다고 하여 氣滯, 血滯, 熱毒, 濕, 痰 등의 邪氣를 病因으로 보았으며, 主要症狀으로는 咳嗽, 胸痛, 咯血, 體重減少, 發熱, 胸悶, 氣短(호흡곤란) 등이 나타난다. 臨床의 으로는 陰虛內熱型, 氣陰兩虛型, 脾虛痰濕型, 陰陽兩虛型, 氣滯血瘀型 등으로 辨證하여 그 治法으로 滋陰生津, 益氣養陰, 益氣健脾, 滋陰溫陽 등의 扶正培本法을 中心으로 化痰軟堅, 清熱解毒, 化癥散結, 行氣活血, 清熱化痰, 止咳化痰 등을 加減應用하는 ‘扶正祛邪法’이 多用되고 있다<sup>12)</sup>.

現代醫學의 肺에서 發生하는 腫瘍은 다른 臟器에서와 같이 惡性腫瘍과 良性腫瘍으로 크게 나누지만, 그 대부분이 惡性腫瘍인 氣管支癌腫으로 90-95%를 차지하고, 약 5%가 氣管支類癌腫(bronchial carcinoid)이며, 그 외 2-5%가 상피성, 비상피성 양성종 및 육종으로 구성되며 吸

煙, 비소, 석면, 니켈, 석탄 등의 職業性因子, 大氣汚染 등의 環境因子와 밀접한 관계가 있으며 治療는 手術療法, 放射線療法, 化學療法 등이 있으나 肺癌의 早期發見의 어려움으로 因해 病機가 진행된 경우가 많으므로 대체로 豫後가 不良하여 效果的인 治療法의 開發이 要求되고 있는 실정이다.

이에 著者는 肺癌患者에 대한 症狀改善, 生存期間, 手術後의 體力恢復, 放射線·化學治療에 대한 治療效果의 增加 및 副作用을 輕減시킬 수 있는 韓方 處方, 藥劑 開發 및 效率의 臨床活用方案을 提示하기 위하여 歷代 諸文獻의 治方 및 最近 中醫에서 常用되고 있는 治方의 構成藥物에 對한 文獻的 考察을 통하여 比較分析한 바 약간의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

## II. 본 론

### 1. 素問今釋<sup>1)</sup>

#### 1) 奇病論篇第四十七

帝曰:病脇下滿氣逆二三歲不已 是爲何病?  
岐伯曰:病名曰息積 此不妨于食 不可灸刺 積爲導引服藥 藥不能獨治也.

#### 2) 藏氣法時論篇第二十二

肺病者 喘咳逆氣 肩背痛 汗出尻陰股膝脾膈胛足皆痛 虛則少氣不能報息 耳聾喑乾 取其經 太陰足太陽之外 厥陰內血者

#### 3) 刺熱篇第三十二

肺熱病者 先淅然厥 起毫毛 惡風寒 舌上黃身熱 熱爭則喘咳 痛走胸膺背 不得大息 頭痛不堪 汗出而寒 丙丁甚 庚辛大汗 氣逆則丙丁死 刺水太陰太陽明 出血如大豆 立已.

#### 4) 玉機眞藏論篇第十九

大骨枯槁 大肉陷下 胸中氣滿 喘息不便 內痛引肩項 身熱 脫肉破脰.

#### 5) 咳論篇第三十

肺咳之狀 咳而喘息有音 甚則唾血.

### 2. 精校黃帝內經靈樞<sup>2)</sup>

#### 1) 邪氣臟腑病形篇四

\* 大田大學校 韓醫科大學 病理學教室

肺脈滑甚 爲息賁上氣。

2) 五邪第二十

邪在肺 則病皮膚痛 寒熱 上氣喘 汗出 咳動肩背

3) 脹論篇第三十五

黃帝曰 願聞脹形 岐伯曰 ...肺脹者 虛滿而喘咳

3. 金匱要略注釋<sup>3)</sup>

問曰：熱在上焦者 因咳爲肺痿。..... 曰：寸口脈數 其因咳 口中反有濁唾涎沫者何？師曰：爲肺痿之病。若口中辟辟燥 咳即胸中隱隱痛 脈反活數 此爲肺癰 咳唾膿血。脈數虛者爲肺痿。

肺痿之病 從何而得之？師曰：或從汗出 或從嘔吐 或從消渴 小便利數 或從便難 又被快樂下利 重亡津液 故得之。

上氣面浮腫 肩息 其脈浮大 不治：又加利尤甚。上氣喘而躁者 屬肺脹 欲作風水 發汗則愈。肺痿吐涎沫而不咳者 其人不渴 必遺尿 小便數。所以然者 以上虛不能制下故也。此爲肺中冷 必眩 多涎唾 甘草乾薑湯以溫之。

\* 甘草乾薑湯

甘草四兩半 乾薑炮二兩

右咬咀 以水三升 煮取一升五合 去滓 分溫再服。

若服湯已渴者 屬消渴。咳而上氣 喉中水雞聲 射干麻黃湯主之。

\* 射干麻黃湯

射干十三枚一法三兩 麻黃四兩 生薑四兩 細辛 紫苑 款冬花各三兩 五味子半升 大棗七枚 半夏大者洗八枚一法半升

右九味 以水一斗二升 先煮麻黃兩沸 去上沫 內諸藥 煮取三升 分溫三服。

咳逆上氣 時時唾濁 但坐不得眠 皂莢丸主之。

\* 皂莢丸

皂莢八兩刮去皮用酥炙

咳而脈浮者 厚朴麻黃湯主之 脈沈者 澤漆湯主之。

\* 厚朴麻黃湯

厚朴五兩 麻黃四兩 杏仁半升 石膏如雞子大 半夏半升 乾薑二兩 細辛二兩 小麥一升 五味子半升

右九味 以水一斗二升 先煮小麥熟 去滓 內諸藥 煮取三升 溫服一升 日三服。

\* 澤漆湯

半夏半斤 生薑五兩 白前五兩 紫蓼五兩一作紫苑 甘草 黃芩 人蔘 桂枝 各三兩 澤漆三升以東流水五斗 煮取一斗五升

右九味 咬咀 內澤漆汁中 煮取五升 溫服五合 至夜盡。

火逆上氣 咽喉不利 止逆下氣者 麥門冬湯主之。

\* 麥門冬湯

麥門冬七升 半夏一升 人蔘二兩 甘草二兩 粳米三合 大棗十二枚

右六味 以水一斗二升 煮取六升 溫服一升 日三夜一服。肺癰 喘不得臥 葶藶大棗瀉肺湯主之。

\* 葶藶大棗瀉肺湯

葶藶熬令黃色搗丸如彈子大 大棗十二枚

右先以水三升 煮棗取二升 去棗 內葶藶 煮取一升 頓服。

咳而胸滿 振寒脈數 咽乾不渴 時出濁唾腥臭 久久吐膿 如米粥者 爲肺癰 桔梗湯主之。

\* 桔梗湯

桔梗一兩 甘草二兩

咳而上氣 此爲肺脹。其人喘 目如脫狀 脈浮大者 越婢加半夏湯主之。

\* 越婢加半夏湯

麻黃六兩 石膏半斤 生薑三兩 大棗十五枚 甘草二兩 半夏半升

右六味 以水六升 先煮麻黃 去上沫 內諸藥 煮取三升 分溫三服

肺脹 咳而上氣 煩躁而喘 脈浮者 心下有水 小青龍加石膏湯主之

\* 小青龍加石膏湯

麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草 乾薑 各三兩 五味子 半夏 各半升 石膏二兩

右九味 以水一斗 先煮麻黃 去上沫 內諸藥 煮取三升 強人服一升 羸者減之 日三服 小兒服四合。

肺癰 胸滿脹 一身面目浮腫 鼻塞涕出 不聞香臭 酸辛 咳逆上氣 喘鳴迫塞 葶藶大棗瀉肺湯主之。

4. 難經譯釋<sup>4)</sup>

五十六難

肺之積 名曰息賁 在右脇下 覆大如杯 久不已 令人 洒淅寒熱喘咳 發肺癰。

5. 太平聖惠方<sup>6)</sup>

息賁 上氣咳嗽 喘促咳嗽 結聚脹痛 腹脇脹滿 咳嗽 見血 痰粘不利 坐臥不安 胸膈壅悶 食少無力 咳嗽 胸痛 嘔吐痰涎 面黃體瘦

6. 三因極一病症方論<sup>5)</sup>

病者寸口 脈數而虛 按之溢。身冷 內煩 多唾 唇燥 小便反難 大便如爛瓜豚腦狀 欲咳不咳 咳出乾沫 唾 中出血 心中溫溫液液 上氣 喘滿。或燥而渴者 多因 發汗 利小便。或嘔吐 消渴 數服快樂 重亡津液 致

熱在上焦 故成肺癆。

肺癆五臟華蓋 百脈聚氣 運動血脈 已養臟腑 灌注皮毛。將理失宜 氣與血亂 則成肺癆肺癰矣。

\* 息賁湯

半夏 桂心 人蔘 葶藶 吳茱萸 桑柏皮 炙甘草各一錢五分 右作一服 水二鍾 生薑五片 紅棗二枚 煎至一鍾 食前服。

\* 半夏湯

治肺積息賁咳嗽。

細辛 半夏 桔梗 桑根白皮 前胡各一兩五錢 貝母 訶黎勒 柴胡 炙甘草各一兩 人蔘 白朮 右咬咀 每服三錢 水一盞 生薑三片 棗三枚 劈破同煎至七分 去滓 溫服 食後臨臥各一服。

\* 枳實散

治息賁氣 腹脇脹硬 咳嗽見血 痰粘不利。

枳實 木香 檳榔 赤茯苓 五味子 話萆壅 訶黎勒 甘草各半兩 杏仁一兩 右咬咀 每服三錢 水一鍾 生薑半分 煎至六分 去滓 不拘時溫服。

### 7. 濟生方<sup>6)</sup>

息賁之上 在右脇下 覆大如杯 喘息奔溢 是為肺積；診其脈浮而毛 其色白 其病氣逆 背痛少氣 喜忘目瞋 膚寒 皮中疔痛 或如風緣 或如鍼刺。

### 8. 東垣十書<sup>52)</sup>

\* 息賁丸

治肺之積 在右脇下復大如杯 久不已 令人灑淅寒熱 喘嗽 發肺癰 其脈浮而毛。

厚朴八錢 黃連炒一兩三錢 乾薑炮 川椒炒 白茯苓 紫菀各一錢半 人蔘二錢 桂枝 桔梗 荊三稜 天門冬 陳皮 川烏炮 白豆久各一錢 青皮五分 巴豆霜四分 右除茯苓巴豆霜 旋即入外余藥 共為細末 煉蜜丸如桐子大 每服二丸 一日加一丸 兩日加二丸 加至大便微溏 再從二丸加服 淡薑湯送下 食遠服。周而復始 積減大半 勿服。秋冬加厚朴五錢 連前一兩三錢 黃連減七錢用六錢。

\* 加減息賁丸

仲夏合此 其積為病 寒熱喘咳 氣上奔 脈濇 失精亡血 氣滯則短氣 血凝泣則寒熱相參 氣分寒 血分熱。治法宜益元氣 洩陰火 破氣削其堅也。

川烏 乾薑 白豆久 桔梗各一錢 紫菀 厚朴 川椒炒 天門冬 荊三稜 白茯苓各一錢五分 人蔘 桂枝各二錢 陳皮八錢 黃連一兩三錢 巴豆霜四分 紅花少許 青皮七分 右為末 湯炮蒸餅為丸 如棗子大 初服二丸 一日加一丸 二日加二丸 加至大便微溏為度。再從二丸

加服 煎生薑湯送下 食前 忌酒濕面腥辣生性冷之物。

### 9. 儒門事親<sup>53)</sup>

息賁者 喘息賁而上行也 此舊說也。余以謂賁者 賁門也 手太陰之筋 結胸裏而貫膈 入賁門 下抵季脇 其病支轉筋痛 甚則成息賁 手心主結于臂 其病胸痛 息賁 又云：肺下則居賁迫肝 善脇下痛 肝高則上支賁 兩脇惋為息賁。若是言之 是積氣于賁而不散 此靈樞說五臟處言此息賁者多 故予發之。

### 10. 景岳全書<sup>25)</sup>

勞嗽 聲啞 聲不能出或喘息氣促者 此肺臟敗也 必死。

### 11. 編註醫學入門<sup>7)</sup>

雜病篇

五積六聚皆屬脾。... 肺積右脇下曰息賁 言喘息奔而上行也 令人咳嗽肺癰。

### 12. 證論治要結<sup>54)</sup>

肺積在右脇下大如復杯 氣逆背痛 或少氣喜忘 目瞋 膚寒 皮中時痛 如虱緣鍼刺 久則咳喘 名曰息賁 宜大七氣湯 加桑柏皮 半夏 杏仁 各半錢。

### 13. 歷代中醫腫瘍案論選粹<sup>8)</sup>

1) 外科正宗

久咳勞傷 咳吐痰血 寒熱往來 形體消削 咯吐瘀膿 聲啞咽痛 其候傳於肺癆 如此者百死一生之病也。治宜知母茯苓湯主之 人蔘五味子湯調之。

\* 知母茯苓湯

甘草 茯苓各一兩 知母 五味子 人蔘 薄荷 半夏 柴胡 白朮 款冬花 桔梗 麥門冬 黃芩各半兩 川芎二錢 阿膠三錢 加生薑三片 水煎服。

\* 人蔘五味子湯

人蔘 茯苓 麥門冬各一錢 白朮一錢五分 五味子五分 炙甘草八分 生薑三片 大棗三枚。

2) 外科百效全書

(肺癆)症經年久咳 熱極葉焦而為癆 猶草木亢甚則枝葉癯落也。

肺癆脈數而實咳 多寒熱自汗。治宜知母茯苓湯去麥門冬。

3) 青囊秘訣

人有久咳之後 肺管損傷 皮膚黃瘦 咽喉雌(編者注：應為嘶)啞 自汗盜汗 臥眠不得 口吐稠痰 腥臭難潤 惟聞喘急 毛悴急焦 喘嗽之時 必須忍氣須臾 輕輕吐痰 始覺膈上不通 否則大痛難堪 氣息奄奄 全無振興之狀者 人以爲肺中癰也 誰知是肺癯而生瘡乎？此

等之症 不易解救。

也有膏梁子弟 多食濃厚氣味 燻炙煎炒之物 時時吞嚼 或美醴香醪 乘興酣飲 遂至咽乾舌燥 吐痰吐血 喘息 膈痛 不得安眠者 人以為肺經火熱也 誰知是肺痿已成 瘡乎？夫肺痿五臟之蓋 最喜清氣熏蒸 最惡燥氣炎逼 今所飲所食 盡為辛熱之物 則五臟之中 全是一團火氣。火性炎上 而肺金在上 安得不受其害乎？肺既受刑 不能下生腎水 腎水無源 則腎益加燥 勢必取資于肺金 而肺金又病 能不已虛而益虛 已燥而益燥乎？況各經紛紛來逼 火烈金燥 肺間生癰 必然之勢也。

夫肺癰與肺痿不同 肺癰生于火者 治之宜速。肺痿成于勞傷 治之宜緩。大約火毒當補中而用瀉 勞傷宜補中而帶清。瀉與清不同 而補亦不同。惟時瀉中用補 可用大劑；清中用補 當用小劑 勿忘勿助 若有若無 始能奏功也。方用養肺去痿湯。

\* 養肺去痿湯

金銀花 麥門冬各三錢 生地黃 百合各二錢 紫菀 百部各五分 生甘草五錢 款冬花 貝母 白薇各三分 天門冬一錢。

4) 外證醫案匯編

肺癰肺痿 雖同一肺經 治法大異。……肺癰之症 咳必暴 來必速 膈中隱痛 氣粗 脈數洪實 吐痰膿血 膩厚如豆汁 臭穢不堪 肺痿之症 咳必漸 來必緩 膈中不痛 氣餒 脈數虛大 吐痰白膩 柔如米粥 雖臭不甚。肺痿者 萎而不振之象。痿屬氣虛而津少 如草卉之萎 烈火熏蒸而萎 寒凜凝結亦能萎。或汗 或吐 或利小便 或亡津液 肺燥則痿。

肺燥則痿 金匱麥門湯 千金甘草湯。如肺中冷多涎沫 上不能制 下焦陽氣不能上承 少蒸化之權 肺不能布精諸臟 下焦反不能蒸化津液上供于肺 肺冷故也 以甘草乾薑湯。如氣阻涎凝 千金桂枝芍藥加皂莢湯。肺中冷 津液極小者 千金炙甘草湯。氣虛欲痿 黃耆甘草湯。肺冷氣虛胃弱 千金生薑甘草湯。肺癰潰後 若不固正亦可成痿。痿症始起 若蠻補 亦可成癰。

\* 金匱麥門冬湯

麥門冬七升 半夏一升 人參 甘草各二兩 粳米三合 大棗十二枚 水煎 分六服 日三夜一服。

\* 千金甘草湯

甘草二兩 水煎分二次服。

\* 甘草乾薑湯

炙甘草四兩 乾薑二兩 水煎 去滓 分二次服。

\* 千金桂枝芍藥湯

桂枝半兩 芍藥三兩

為粗末 每服五錢匕 加生薑三片 大棗一枚水煎服。

\* 千金炙甘草湯

炙甘草四兩 生薑 桂枝各三兩 生地黃一斤 人參 阿膠各二兩 麥門冬 火麻仁各半升 大棗三十枚。

以清酒七升 水八升 先煮八味 取三升 內阿膠烱化消盡 每服一升 日三次。

\* 千金生薑甘草湯

生薑五兩 甘草四兩 人參三兩 大棗十二枚 為粗末 水煎分三次服。

5) 外科集腋

久嗽不已 汗出過多 重亡津液 便如爛瓜 下如豕膏 小便數而不渴 渴不欲飲 脈數而虛 多涎唾而無膿者 肺痿也。

治宜養血養氣 養神清金。

6) 活人錄匯編

肺痿……此症雖熱不至炎火焚灼 故止于干萎 若亢火熏蒸必致潰爛成癰 豈止于萎謝而已哉。外症自現 皮毛枯悴 肌膚皸裂 形羸神怯 內則音啞聲嘶 乾咳氣逆 皮寒骨熱等症 六脈沈澁細數不清。倘氣口皮膚枯燥 脈來急疾無神 飲食減少 息粗氣高者死。

萎者即如草木上無雨露 下失灌溉以至萎謝之萎。凡人百骸五臟皆可云萎 不專于肺。今言肺者一身七竅 本具葉形 若氣血均調則舒張翕閉自如 與腎一氣相相為呼吸之數 以應時刻 多因脾土有虧 母不能顧子 以來生我即腎氣不足 子盜母氣而為所竅則元氣為之不足 因而津精血液無所不虧 而有枯萎之象 其始必因金體自燥 絕寒水生化之源 繼而腎水枯涸 受龍火潛鉞之禍 猶之既失雨露之滋 反遭風日之炙 有不萎落者乎。

(肺痿) 治宜壯水滋金 潤燥清熱 兼補元氣。

7) 醫學舉要

肺痿因肺受火炎 久則肺竅俱閉 喉間或痒或瘡 嗽有血点 痰帶紅線 六葉遂日焦枯而成痿矣。

治養仲景復脈湯 千金生脈散 錢氏阿膠散 喻氏清燥救肺湯 皆可選用。

\* 千金生脈散

人參五錢 麥門冬 五味子各三錢

\* 喻氏清燥救肺湯

桑葉三錢 煨石膏二錢五分 炒杏仁 人參各七分 甘草 炒胡麻仁各一錢 阿膠八分 麥門冬一錢二分 枇杷葉一片 水煎頻服。

8) 張氏醫通

陰虛咳嗽 久之喉中痛者 必有肺花瘡 難治。

肺花瘡 難治。桔梗湯送都炷丸。切勿用水片吹点。證劇不勝湯藥者 日用鷄子生調米飲沖服 稍緩其疼。終亦必死而已。

\* 桔梗湯

桔梗一兩 甘草二兩

水煎服 分二次服.

\* 都炆丸

熟地黄 山茱萸 山藥 澤瀉 牡丹皮 茯苓 五味子  
爲細末 煉蜜爲丸

9) 瞻山醫案

始則咳嗽吐痰 繼而微嘶 漸至于瘖 乃聲瘖中最危之候也.

10) 醫門補要

表邪退伏于肺 失于宣散 并嗜烟酒 火毒上薰 久鬱熱熾 燥腐肺葉 則出穢氣 如臭蛋逼人. 雖遷延 終不治.

11) 醫門法律

論曰肺癰肺痿之證 誰秉內照 曠然洞悉 清以一得之遇 僭爲敷陳. 人身之氣稟命于肺 肺氣清肅 則周身之氣莫不服從而順行. 肺氣壅濁 則周身之氣易致橫逆而犯上. 故肺癰者 肺氣壅而不通也. 肺痿者 肺氣萎而不振也. .... 肺痿者 其積漸已非一日 其寒熱不止一端 總由胃中津液不輸于肺 肺失所養 轉枯轉燥 然後成之. 皆肺金之生水 精華四布者 全借胃土津液之富 上供罔缺. 但胃中津液暗傷之實最多 醫者粗率 不知愛護. 或腠理素消 無故而大發其汗. 或中氣素餒 頻吐以倒傾其囊. 或羶成消中 飲水而渴不解 泉竭自中. 或腸枯便秘 強利以求其快 漏卮難繼. 只此上供之津液 坐耗歧途 于是肺火日熾 肺熱日深 肺中小管日窒 咳聲以漸不揚 胸中脂膜日乾 痰咳難于上出 行動數武 氣即喘鳴 沖擊連聲 痰始一應. 金匱治法 非不彰明 然混在肺癰一門 況難解其精意. 大要緩而圖之 生胃津 潤肺燥 下逆氣 開積痰 止濁唾 補真氣以通肺之小管 散火熱以復肺之清肅. .... 肺癰屬在有形之血 血結宜驟攻. 肺痿屬在無形之氣 氣傷宜徐理. 肺癰爲實 誤以肺痿治之 是爲實實. 肺痿爲虛 誤以肺癰治之 是爲虛虛. 此病辨證用藥之大略也.

14. 症因脈治<sup>9)</sup>

肺熱腹脹

肺熱腹脹之症 喘息倚肩 不得仰臥 煩悶咳逆 腹脹胸痛 常脹不退 此肺熱腹脹之症也.

肺熱腹脹之因 或肺素有熱 又因膏粱厚味 酒濕辛辣之積熱 上蒸清道 肺熱焦滿 而腹脹之症作矣. 肺熱腹脹之脈 右寸洪大 肺經有熱 右關上溢 胃火熏蒸 左寸洪數 心火刑金 左關弦數 木中火發. 肺熱腹脹之治 喘息倚肩 不得仰臥 煩悶咳逆 葶藶瀉肺湯合瀉白散 胃火熏蒸腹脹作痛 大便結者 枳桔大黃湯 心火刑金 瀉心各半湯 水中火發 瀉青各半湯 以上三方家秘法也.

\* 葶藶瀉肺湯 : 葶藶子 大黃

\* 瀉白散 : 桑柏皮 地骨皮 甘草

\* 枳桔大黃湯 : 枳實 桔梗 大黃 大服皮 桑柏皮 廣皮 甘草

\* 瀉心各半湯 : 川黃連 甘草 桑柏皮 地骨皮

\* 瀉青各半湯 : 膽草 黃芩 青蘗 甘草 桑柏皮 地骨皮

15. 東醫腫瘍學<sup>10)</sup>

肺癌은 文獻의 으로 病名이 言及되지는 않았지만 肺積, 息賁, 咳嗽, 喘息, 胸痛, 勞咳, 痰飲 등의 病症이 肺癌의 範疇에 屬한다.

原因으로 正氣內虛 毒邪侵肺 痰濕內聚 등이 있다고 하였으며 主要症狀으로 咳嗽 胸痛 咯血 體重減少 發熱 胸悶 氣短 등이 나타나지만 특이성이 없기 때문에 症狀만으로 正確한 診斷을 내리기는 어렵다고 하였다. 辨證으로 肺脾氣虛, 肺陰虛, 肺腎兩虛, 痰濕蘊肺, 氣血瘀滯를 들 수 있으며 이에 따른 治法으로 健脾益肺, 滋陰清熱, 益氣養陰, 健脾化痰, 解毒清肺, 活血化瘀, 理氣止痛하고 治方으로는 六君子湯加減, 沙蔘麥門冬湯加減, 百合固金湯加減, 生麥散加減, 二陳湯加減, 血府逐瘀湯加減등을 使用한다고 하였다.

\* 六君子湯加減

黨蔘 白朮 茯苓 半夏 陳皮 薏苡仁 草河車 등

\* 沙蔘麥門冬湯加減

沙蔘 瓜蒌 半枝蓮 山海螺 白花蛇舌草 魚腥草 30 石見穿 徐長卿 20 生地 麥門冬 天門冬 地骨皮 鼈甲 15 貝母 前胡 桃仁 10

\* 生脈散加減

沙蔘 麥門冬 山海螺 鐵樹葉 夏枯草 白僵蠶 15 生地 貝母 12 南星 五味子 冬蟲夏草 破故紙 仙茅 炮薑 10 露蜂房 9

\* 六君子湯加減

貓爪草 半枝蓮 龍葵 薏苡仁 白花蛇舌草 30 黨蔘 15 白朮 茯苓 陳皮 半夏 南星 前胡 도인 杏仁 牙皂 馬兜鈴 10

\* 血府逐瘀湯加減

鐵樹葉 石見穿 白花蛇舌草 30 紫草 三稜 莪朮 丹蔘 15 桃仁 八月札 元胡 赤芍藥 五靈脂 枳殼 桔梗 鬱金 川芎 杏仁 穿山甲 乾蟾 10

<隨證加減>

口乾舌燥咽乾 : 沙蔘 天花粉 生地 玄蔘 石斛 天門冬 知母 등

咳嗽痰粘 : 桔梗 瓜蒌 前胡 葶藶子 滿山紅 杏仁 紫菀 馬兜鈴 款冬花 등

痰多難出 : 海浮石 寒水石 牙皂刺 蛇膽 陳皮末  
 痰中帶血 : 藕節 白茅根 仙鶴草 旱蓮草 三七根 白  
 及 花蕊石 露蜂房 地榆 雲南白芍  
 自汗氣短 : 人參 黃耆 冬蟲夏草 浮小脈 五味子 煨  
 龍骨牡蠣 山茱萸 等  
 高熱不退 : 大青葉 牡丹皮 寒水石 石膏 紫草 青蒿  
 羚羊角粉 水牛角 牛黃清熱散 紫雪散 等  
 胸背疼痛 : 玄胡索 防己 蘇木 乳香 沒藥 烏頭 全  
 蝎 罌粟殼 狼毒 細辛 花椒 白屈菜  
 大便秘結 : 大黃 生地 玄參 知母 火麻仁 鬱李仁  
 番瀉葉 肉蓯蓉 等  
 胸腔積液 : 葶藶子 芫花 澤漆 水紅花子 商陸 車前  
 子 猪苓 龍葵 蟻蛭 等  
 頸部腫核 : 猫爪草 山慈姑 夏枯草 貝母 蛤殼 穿山  
 甲 水蛭 白僵蠶 斑蝥 等

16. 實用腫瘤臨床<sup>12)</sup>

肺癌은 氣管支肺癌이라 稱하고 男女 發病比率은 4-8:1이며 發病年齡은 40歲以上 50-70歲사이에서 호발한다.

病因으로 吸煙 大氣污染과 職業性接觸을 肺癌의 發病 三因素로 보고 있다.

- \* 吸煙(일반적인 肺癌 發病率은 비흡연자의 10.8 배이고 長期 大量吸煙者의 發病比率은 20배정도로 보고 되고 있다).
- \* 職業性接觸(石棉 : 非接觸石棉者에 비해 70배 정도의 發病率을 보인다).  
 臨床表現으로는 全身症狀, 局部症狀, 癌腫局部侵犯 및 轉移症狀 등이 있다.
- \* 全身症狀: 全身乏力 骨關節肥大 오상지 帶狀包疹 瘙癢性피진 發熱등
- \* 局部症狀: 咳嗽 咯血 血痰 胸痛 氣急 或呼吸困難
- \* 癌腫局部浸潤과 轉移症狀: 상강척맥중합증(頭痛, 眩暈, 眼花, 胸悶, 頭頸部 및 上肢水腫), Pancoast綜合症(견상지및상흉부 극렬동통과 감각이상) 폐암침범격신경.

治療方法으로는 手術, 化學療法, 放射線療法 및 藥物療法 등을 綜合하여 사용함으로써 治療效果를 增加시키고 手術, 化學, 放射線療法の 副作用을 減少시킨다.

常用方劑

- \* 陰虛毒熱型 : 半枝蓮 鼈甲30 沙蔘20 地骨皮 百部15 枇杷葉12 前胡 麥冬 玉竹10
- \* 痰熱蘊肺型 : 魚腥草 白花蛇舌草 全蝎30 赤芍 15 白朮 云苓12

\* 氣血瘀滯型 : 全蕪30 茜草20 桔梗15 紫草 桃仁 川芎 杏仁 枳殼10 三七粉8

\* 氣血雙虧型 : 炙黃耆30 黃精20 白芍 熟地 葶藶子15 當歸12 西洋蔘 白朮 冬蟲夏草 陳皮10

17. 中醫內科學<sup>13)</sup>

肺癌의 病因은 久病肺虛 痰濁沮溜 感受外邪로 因하여 痰濁壅肺, 痰熱鬱肺, 痰蒙神竅, 肺腎氣虛 및 陽虛水泛 등의 病理機轉을 나타내며 主要症狀은 咳逆上氣, 痰多, 胸悶, 動則加劇, 甚則 鼻衄氣促 張口抬肩 目脹如脫 煩躁不安하고 甚하면 心慌動悸 面脣紫紺 肢體浮腫 吐血 便血 譫忘 昏睡 昏迷 抽蓄 厥脫 등의 症狀을 보인다. 治法으로는 化痰降氣, 健脾益肺, 清肺化痰, 降逆平喘, 滌痰開竅, 補肺納腎, 溫腎健脾을 爲主로 하여 蘇子降氣湯, 六君子湯加減, 越婢加半夏湯, 桑柏皮湯加減, 滌痰湯加減, 平喘古本湯, 眞武湯合五苓散加減 등을 使用한다.

18. 腫瘤臨證備要<sup>14)</sup>

肺癌의 病因病機로 風寒暑濕燥火 등의 外因이 肺臟을 쉽게 侵襲하여 日久不散하고 癆毒化熱하면 肺癌이 되고 동시에 病人의 正氣虛弱 內分泌失調 免疫機能低下 先天性缺損 營養不良 習慣性吸煙 環境污染 및 七情의 太過不及 등의 內因으로 肺癌이 發病한다고 하였으며 臨床上 肺毒 血熱 肺癆痰結 肺熱陰虛 등으로 辨證하여 小薊飲子加減 平胃散加減 清燥救肺湯加減 등의 治方을 사용하였다.

\* 小薊飲子加減

小薊 茅根 丹皮 仙鶴草 白英 龍葵30 紫河車 蛇莓 20 側柏炭15 紫草10 三七粉3 蟾酥酒20毫升

\* 平胃散加減

赭石 猪苓 龍葵 白英 蛇莓 瓜蔞 葶藶子 黛合散30 蒼白朮 川朴 清半夏 膽南星 蟾酥酒20毫升

\* 清燥救肺湯加減

沙蔘 玉竹 蘆根 黨蔘 石斛 花粉 魚腥草30 生地 女貞子 夏枯草20 麥冬15 杏仁10

<隨症加減>

- \* 咳血不止 : 仙鶴草30 地榆 血餘炭20 白及10.
- \* 咳嗽不減 : 瓜蔞30 杏仁 甘草15 薄荷 桔梗10 冰片3 蒸氣吸入.
- \* 喘息不寧 : 百果 冬花10 蛤蚧散2.
- \* 痰壅難出 : 海浮石 鵝管石30 礞石20 蛇膽陳皮末沖服.
- \* 高燒不退 : 地骨皮 牡丹皮30 青蒿15 牛黃清熱

散一瓶沖服.

- \* 胸疼不減 : 蒲黃 五靈脂 雲南白芍2.
  - \* 多汗氣短 : 猪苓30 麥冬15 人參 五味子 冬蟲夏草10.
  - \* 陣發虛脫 : 太子參 黨參 丹參30 苦參 沙參20 元參15.
  - \* 癰癤難消 : 猫爪草30 夏枯草20 山茨茹 黃藥子15
  - \* 胸水難消 : 冬瓜皮子50 赤小豆 石薺30 葶藶子 商陸10.
- 〈單偏驗方〉
- \* 羊膽或猪膽汁, 每日半只沖服 連服7天 休3天再服.
  - \* 清金散 : 北沙參60 灸鼈甲45 赤練蛇粉 天南星 白及 鳳凰衣 廣陳皮 瓜蒌30 制乳香 制沒藥20 西洋參15 辰砂12.
  - \* 蟾蜍膽 每次5只 每日2次 連服2月.
  - \* 消癌二號 : 紫草根 七葉一枝花60 前胡30 人工牛黃10.
  - \* 玳瑁 龜板 海藻15 露蜂房 鴉膽子10 蟾酥1.
  - \* 消癌性 胸水方 : 鮮龍葵30 水煎服.

19. 癌症效方240首<sup>15)</sup>

原發性 氣管支 肺癌은 肺癌으로 間稱하며 氣管支 粘膜과 肺胞에서 始發하는 癌腫으로 가장 흔한 惡性腫瘍中 하나이다. 本病은 咳嗽 胸痛 發熱 咯血 氣急 등의 症狀을 나타내며 中醫에서는 '肺積'咳嗽 '咯血' '喘症' 등의 範疇에 屬하고 吸煙過度 熱毒侵肺 痰濕內蘊 肺氣陰虧 등으로 因해 肺失肅降케하여 熱毒 瘀血 痰濕이 相互凝結하여 發生한다.

本 病의 治療는 手術 放射線療法과 化學療法 및 免役治療를 主로 하고 藥物을 병용하여 치료하면 그 效과를 증대시킬 수 있다.

\* 肺復方

百合 熟地 生地 玄參 當歸 麥冬 白芍 黃芩 各10g  
南沙參 北沙參 桑白皮各15g 牡丹 蚤休 白花蛇舌草各30g

\* 扶肺煎

生晒參 麥三七 玄參 百合 麥冬各10g 炙黃耆30g  
南沙參 北沙參 楮實子各12g 枸骨葉 蘆根 菝葜各15g 桔梗8g 陳皮6g 蜈蚣3條

\* 新症煎

生地 王不留行 北沙參 南沙參 麥冬 海藻 海帶 天花粉 丹參 炙山甲 炙鼈甲各12g 五味子6g 蒲公英 石見穿 徐長卿 地骨皮 望江南 野菊花 山藥 白花蛇舌草 煨牡蠣 蜀羊泉 魚腥草 紫花地丁各30g 百部 川貝 象貝 丹皮各9g 夏枯草 玄參各15g

\* 肺四號方

黃耆 蛇莓 八月札30g 半枝蓮 魚腥草 七葉一枝花 丹參15g 乾蟾皮12g 八角金盤10g

\* 金康合劑

金岩丸: 白花蛇50g 全蝎 僵蠶30g 壁虎20g 穿山甲 琥珀 羚羊粉15 大黃 青黛 藏紅花10g 血竭7 制馬錢子 制乳香 制沒藥6g 蜈蚣 雄黃 朱砂5g 麝香 冰片2g 天然牛黃1g 蟾酥0.5g

康復湯: 黃耆 薏苡仁30g 枸杞 桑柏皮15g 熟地 白朮 當歸12g 桔梗 人參 石斛 烏梅 川貝母 沙參10g 沈香6g

\* 解鬱救肺湯.

炙黃耆 柴胡 青半夏 各15g 西洋參 香附 神曲 各10g 瓜蒌 魚腥草 川貝母 各20g 白豆久 陳皮 升麻 白及 各6g 三七參 炙甘草 各4g 灯蕊 淡竹葉

\* 肺癆甲乙方

甲方: 黃耆 太子參 白朮 茯苓 各15g 陳皮 半夏 竹茹 枳殼 各12g 麥芽 鷄內金 當歸 白芍 川芎 枸杞子 女貞子 甘草 各10g

乙方: 黃耆 茯苓 白朮 各15g 當歸 白芍 生地 桔梗 桑柏皮 杏仁 沙參 麥門冬 玉竹 天花粉 各12g 枳殼 竹茹 川芎 甘草 各10g

\* 三草肺癆湯

白花蛇舌草 半枝蓮 魚腥草 夏枯草各30g 刺五加 生苡仁 三稜 核桃枝 菝葜 丹參各15g 生南星10g

\* 復方三草湯

魚腥草 仙鶴草 猫爪草 山海螺 蚤休各30g 天門冬20g 生半夏 浙貝母各15g 葶藶子12g.

\* 養陰清肺湯

南沙參 北沙參 天花粉 海蛤殼各15g 麥冬 白薇各12g 白花蛇舌草 半枝蓮各30g 川貝粉3g 生甘草6g.

\* 活血化癆湯

三稜 菝葜 王不留行各15-30g 大黃廣蟲丸 桃仁各12g 丹參 海藻各30g

\* 扶正養陰方

生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 玄參各12g 生黃耆 潞唐參各15g 漏蘆 土茯苓 魚腥草 升麻各30g

\* 葶苈菝葜湯

南北沙參 太子參 玄參各12g 麥冬 三稜 菝葜各9g 女貞子 象貝母各15g 生黃耆 山豆根各20g 蜈蚣3條.

\* 沙參二冬湯

葶藶子 魚腥草 生以仁 山海螺 銀花 白毛藤 白花蛇舌草 生牡蠣 八月札30g 夏枯草 苦參15g 南沙參 北沙參 百部12 天冬 麥冬 乾蟾皮9g

20. 臨床經驗治療腫瘤<sup>16)</sup>

肺癌은 곧 原發性 氣管支肺癌으로 氣管支 粘膜에서 起始하는 가장 흔한 肺部의 惡性腫瘤이다. 病因은 物理化學的 要素(石棉 鎳鉻酸鹽 鎳鉻放射物)와 大氣汚染과 吸煙 및 慢性呼吸器疾患이고 發生部位에 따라 中央型, 周圍型, 彌漫型으로, 形態에 따라 管內型, 管壁浸潤型, 結節型, 塊狀型, 彌漫浸潤型으로 組織學的으로 鱗狀細胞癌, 腺癌, 腺鱗癌, 未分化癌, 類癌, 氣管支腺癌으로 분류한다. 肺癌의 臨床表現은 臟腑學說中 肺臟의 病變과 有關하니 咳喘, 胸部滿悶, 咳血, 面色青白 등은 肺主氣하고 司呼吸機能의 失傷으로, 口脣紫紺, 胸痛徹背 등은 心血瘀滯로 나타난 것이다. 또한 肺癌後期에 나타나는 面目四肢浮腫과 小便不利는 肺氣가 肅降하지 못하여 通調水道下輸膀胱이 이루어지지 않으므로 발생하고 頸部 및 腋下淋巴結轉移疼痛은 肝臟의 疏泄機能이 失調되어 肺氣의 肅降機能과 相輔機能이 깨어져 나타나는 것이니 臨床治療에서는 肺, 心, 肝 등의 臟器의 病變과 風寒暑濕燥火의 六淫 및 七情傷 등을 參考하여 治療해야 한다.

〈臨床處方例〉

- \* 溫寒化癆 驅毒利水 : 葶藶子 赤小豆 猪苓 茯苓 黃耆 熟地 赭石 大棗 二丑30 白花蛇舌草 百部 乾薑 肉桂 附子20 茅根 天葵子 藤梨根 黨蔘15 薏米 核青皮 僵蠶 烏蛇 山甲 大戟 芫花 甘遂 竹茹 陳皮10 全蟲6 蜈蚣3條 斑蝥3個
- \* 辛熱溫寒 化癆攻毒 : 生芪 熟地30 百部 赭石 20 白花蛇舌草 二蘗炭 炮薑 肉桂 附子 黨蔘 山藥 大棗15 白茅根 杏仁 桔梗 枳殼 白及 蜂房 地龍 山甲 僵蠶 烏蛇 良薑 華芫 破故 扁豆 陳皮 川斷 竹茹 10 全蟲6 蜈蚣4條
- \* 辛熱化癆 瀉下攻毒 : 生芪 熟地 炮薑30 附子 25 百部20 白花蛇舌草 茅根 白及 二蘗炭 黨蔘 肉桂 烏賊骨 山藥 川芎 神曲 大棗15 血餘炭 僵蠶 蜂房 地龍 山甲 枳殼 桔梗 元明粉 陳皮10 全蟲 蟬蛻6 蜈蚣4條
- \* 辛熱化癆 攻毒利尿 : 赤小豆 生芪30 滑石 猪苓 葶藶子 乾薑 肉桂 附子 二丑20 白茅根 百部 薏米 茯苓 澤瀉 補骨脂 熟地 大棗 白花蛇舌草15 海藻 山甲 杏仁 木香 桔梗 枳殼 生牡蠣 陳皮10 斑蝥3個

21. 臨床腫瘤綜合治療大全<sup>17)</sup>

肺癌의 治療는 病所部位, 組織類形, TNM分類

및 心肺機能에 따라 手術, 放射, 藥物療法을 決定하여 綜合的으로 運用하는데 藥物治療는 末期 肺癌患者의 壽命을 延長시킬뿐 아니라 臨床症狀을 改善하는데 많은 도움을 준다. 辨證은 肺脾兩虛型, 肺腎兩虛型, 氣血瘀滯型, 痰濕蘊肺型 및 氣血兩虛型으로 分類하여 六味湯 桔梗湯加減, 麥味地黃湯 二母寧嗽湯加減, 桃紅四物湯 銀花甘草湯加減, 二陳湯 三子兩親湯加減, 十全大補湯合當歸補血湯加減 등을 使用하고 單方으로는 肺鱗癌方, 肺腺癌方 肺未分化癌方 등을 使用하며 放射線療法の 副作用인 消化障礙에는 脾胃不和로 辨證하여 健脾化胃하고 全身이 衰弱하면 補氣補血하며 血素板減少와 貧血症狀이 있으면 肝腎虧虛로 보아 滋補肝腎하고 炎症反應이 있으면 清熱解毒하며 津液虧損하면 清熱解毒, 滋陰潤燥生津하는 藥물들을 加減 運用한다. 또한 氣功과 心理治療가 藥物治療 못지 않게 患者의 症狀을 改善시키고 壽命을 延長하는데 重要하다고 보았다.

1) 辨證

- \* 肺脾兩虛型(六味湯, 桔梗湯加減) : 生黃耆 黨蔘 白朮 茯苓 清半夏 廣陳皮 桑柏皮 桔梗 生苡仁 葶藶 冬蟲夏草 草河車 石菖蒲.
- \* 肺腎兩虛型(麥味地黃湯, 二母寧嗽湯加減) : 麥冬 五味子 生地 丹皮 山茱肉 知母 貝母 瓜蒌 夏枯草 鐵樹葉 白英 白花蛇舌草.
- \* 氣血瘀滯型(桃紅四物湯, 銀花甘草湯加減) : 當歸尾 赤芍 桃仁 紅花 金銀花 忍冬藤 龍葵 劉寄奴 元胡 八月札 鬱金 三稜 莪朮 丹蔘 三七粉 花蕊石 仙鶴草.
- \* 痰濕蘊肺型(二陳湯, 三子養親湯加減) : 陳皮 半夏 蒼白朮 茯苓 黨蔘 生苡仁 制南星 前胡 桃杏仁 牙皂 貓爪草 半枝蓮 白花蛇舌草 龍葵 馬兜鈴 白芥子 炒蘿蔔子 黃芩 瓜蒌.
- \* 氣血兩虛型(十全大補湯合當歸補血湯加減) : 太子參 白朮 茯苓 當歸 杭芍 生地 熟地 生黃耆 肉桂 菖蒲 兒茶 冬蟲夏草 五味子 首烏.

2) 單方 및 驗方

- \* 肺鱗癌方 : 紫草根 山海螺30 土貝母20 山豆根 草河車 全休 馬兜鈴 夏枯草 海藻15 前胡10
- \* 肺腺癌方 : 蜀羊泉 龍葵 菝葜 山海螺 生苡仁 生牡蠣30 蛇每 山慈菇 夏枯草15 浙貝母10
- \* 肺未分化癌方 : 徐長卿 半枝蓮 白花蛇舌草 龍葵 土茯苓 仙鶴草30 野菊花15 黃藥子 全休 전호 馬兜鈴 桔梗10

22. 中醫治癌大成<sup>18)</sup>

1) 李岩：新醫藥學雜誌1974

高熱 咳嗽白痰帶血 胸痛氣短 咽乾口燥 不思飲食 二便不利 舌紅質暗 脈沈弦數 등을 主症으로 하는 肺癌을 氣陰兩傷 陰虛肺熱로 辨證하여 益氣養陰清肺하는 養陰清肺湯을 加減하여 사용하였다.

\* 養陰清肺湯：南沙蔘 石斛各 30g 玉竹 元蔘各15g 竹茹 瓜蒌 桃仁 杏仁 澤蘭 桔梗 銀柴胡各9g

2) 呂志連：浙江中醫雜誌

兩下肢浮腫하고 膝關節 發熱하여 行步가 不便한 肺癌患者를 腎不納氣 痰水鬱毒證型으로 分類하고 守宮 蜈蚣各5條 乾蟾皮 羊乳 徐長卿 玉竹 蛄萆薢各30g 茯苓皮 庵蘭子各5g 生甘草10g 蛤蚧1對를 加減 使用하였다.

3) 潘國賢等：浙江中醫學院學報

右肺上葉肺癌으로 咳嗽痰血하고 不眠한데 佛耳草 仙鶴草 白茅根 魚腥草 黃毛耳草 夜交藤各15g 炙百部 木賊草 合歡皮各9g를 사용하였다.

4) 史蘭陵等：上海中醫藥雜誌

火熱傷陰하고 肺燥痰留하여 咳嗽, 胸痛, 吐痰帶血하는 肺癌患者에게 清熱解毒, 潤肺化痰하는 犀黃丸, 神農丸加減을 使用하였다.

5) 陳銳深等：北京中醫

肺癌은 臨床上 痰毒瘀滯型和 氣陰兩虛型이 대부분인데 發病機轉을 分析해보면 邪毒이 內蘊하여 痰氣가 鬱結하면 肺絡이 阻滯되어 氣行이 不暢하고 瘀滯된 것이 塊를 形成하여 發病한다고 하여 肺鬱痰結型, 肺虛痰熱型, 痰毒瘀滯型, 氣陰兩虛型으로 辨證하여 治療하였다.

〈基本方藥〉

魚腥草 仙鶴草 貓爪草 小休 山海螺30 天門冬20 生半夏 浙貝母15 葶藶子12

\* 肺鬱痰結型：基本方合異功散加減.

\* 肺虛痰熱型：基本方合百合固金湯或瀉白散加減.

\* 痰毒瘀滯型：基本方合金葶藶湯或血府逐瘀湯加減.

\* 氣陰兩虛型：基本方合生麥散加減.

6) 馬吉福：浙江中醫雜誌

\* 肺四號方：黃耆 蛇莓 八月札30 半枝蓮 魚腥草 七葉一枝花 丹蔘15 乾蟾皮12 八角金盤10 加減) 脾虛痰濕 加黨蔘 白朮 茯苓 法半夏 陳皮 陰虛內熱 加南北沙蔘 生地 地骨皮 麥冬 氣滯血瘀 加桃仁 紅花 三稜 莪朮 皂角刺 赤芍

氣陰兩虛 加黨蔘 沙蔘 麥冬

嗽血 加阿膠 大小蘆炭 血餘炭 藕節 或加 雲南芍藥

胸水 加石上栢 葶藶子 冬瓜子

23. 抗癌中藥의 臨床應用<sup>21)</sup>

\* 二蔘二冬湯：上海中醫學院附屬龍華醫院方

八月札 葶藶子 魚腥草 生薏苡仁 山海螺 銀花 白毛藤 白花蛇舌草 生牡蠣30 夏枯草 苦蔘15 南沙蔘 北沙蔘 百部12 天門冬 麥門冬 乾蟾蜍皮9 天龍丸 15粒

\* 肺癌消湯：武漢醫學院附屬第二醫院方

① 蟾梨肺癌消：乾蟾蜍皮 藤梨根 魚腥草 銀花30 沙蔘 天門冬 麥門冬 百部 夏枯草15

② 芙蓉肺癌消：白茅根60 紫草根 蒲公英 昆布 海藻30 芙蓉花15 橘核9

③ 柏芷肺癌消：卷柏 生地黃 半枝蓮 蜂房30 地榆 熟地黃15 澤蘭 全蝎 五味子9

\* 扶正抗癌湯：上海市楊浦區中醫院腫瘤組方

① 生半夏 生南星 七葉一枝花 蛇六谷 羊蹄根 鐵樹葉 白花蛇舌草30 商陸 乾蟾蜍皮15 蜈蚣 壁虎 虎骨 地鱉蟲粉1.5

② 天花粉30 野百合 蒸百部 黃耆 黨蔘15 南沙蔘 北沙蔘 天門冬 麥門冬 白及 制紫菀12 杏仁 淮山藥9

③ 制龜板15 生地黃 熟地黃 制首烏 黃精 薏苡仁 12 鹿角片 茯苓 白朮9

\* 蓮英湯：浙江省嵊縣醫院方

半枝蓮 白英30

\* 二仙湯：上海中醫學院附屬龍華醫院腫瘤組方

黃精 牡蠣 鐵樹葉 芙蓉葉 右上栢 石打穿 山豆根 30 北沙蔘 夏枯草15 天門冬 赤芍12 仙茅 仙靈脾 兔絲子 鎖陽 三稜 莪朮 當歸9 留行子6

\* 肺癌方：武漢市商業職工醫院方

① 夏枯草30 昆布 海藻 蒲公英 海蛤粉 海帶15 橘紅9

② 龍葵 金剛刺30 蛇莓 白英15

③ 銀花 丹蔘 海浮石 瓜蒌皮 板藍根15 土茯苓 桃仁 紫草根9

\* 清肺抑癌湯：上海中醫學院附屬曙光醫院腫瘤組方

夏枯草 海藻 海帶 生牡蠣 石見穿 徐長卿 生地黃 野菊花 留行子 鐵樹葉 蜀羊泉 望江南 魚腥草 蒲公英30 瓜蒌15 牡丹皮9

\* 復方佛甲草湯：湖北省黃石市中醫院腫瘤組方

鮮佛甲草30-60 生石膏30 昆布 海藻 桑皮 夏枯草 15 銀花12 黃芩 山梔子 連翹9

\* 兩根湯：上海市徐匯區天平路地段醫院方  
夜蕎麥根 水楊梅根 千斤拔 魚腥草 山海螺30 雲母石15 方兒茶9

\* 榕木湯：江西省余幹縣人民醫院方

① 榕木 併頭草500

② 余弓石 牡蠣 30 貝母 麥門冬15 紫河車 生地黃 熟地黃 茯苓 澤蘭 猪苓 紫貝齒 何首烏 火龍骨 12 當歸 白芍 女貞子 公丁香 白朮 神曲 麥芽 山梔子 鷄內金 阿膠 生玳瑁末 蘆薈9 砂仁 人蔘 6 朱砂 琥珀 甘草3

\* 清毒利肺湯：北京市中醫醫院方

① 南沙蔘 北沙蔘 蛤殼 全瓜蒌 白花蛇舌草 半枝蓮 草河車 石斛30 天門冬 麥門冬 地骨皮 夏枯草 15 紫菀12 桃仁 杏仁 前胡 川貝母 浙貝母9

② 瓜蒌 魚腥草 生薏苡仁 夏枯草 半枝蓮 白花蛇舌草 30 桑柏皮15 膽南星 雲苓 半夏 馬兜鈴 前胡 白朮 黛合散 橘紅 厚朴9

\* 兩根三草湯：上海市南支區東新醫院方

藤梨根60 魚腥草 望江南 夏枯草 白花蛇舌草 紫草根 制穿山甲 制鼈甲15 南沙蔘9

24. 癌症秘方驗方偏方大全<sup>19)</sup>

\* 蓮藤白蛇湯：福州市第一人民醫院方

半枝蓮 白毛藤45 白花蛇舌草 麥芽 谷芽30 沙蔘 15 麥門冬 銀花 雲苓 黨蔘9 淮山藥 浙貝母6 甘草 4.5

\* 蛇根湯：天津市第二防治院東興市場防治所

白花蛇舌草 茅根 鋪地冕 薏苡仁 夏枯草30 麥門冬 海藻 昆布 百部 生牡蠣 芙蓉花 全休15 生地黃 元 蔘12 橘核9

\* 肺癌方：上海市腫瘤醫院

① 石見穿 半枝蓮60 蘆根30 陳皮 半夏12 銀花 薏苡仁 絲瓜絡 杏仁 焦谷芽 焦麥芽9 川貝母 大力子 甘草6

② 半枝蓮 魚腥草 生地黃 蘆根30 玄蔘 白及 蛇六 谷 北沙蔘 血餘炭 敗醬草15 銀花 天花粉 乾蟾 礞石 紅藤 太子參 天南星 天龍9

\* 核車湯：武漢醫學院附屬第二醫院方

核桃樹枝60 草河車 女貞子 白花蛇舌草 淡竹葉30

\* 復方鐵樹葉湯：上海市胸科醫院方

半枝蓮60 牡蠣 夏枯草 海藻 銀花 連翹 紫草根 白 毛藤 白花蛇舌草 蜀羊泉 鐵樹葉30 麥門冬 橘核 橘葉 北沙蔘 魚腥草 乾蟾皮 藤梨根 山豆根15 海帶 制鼈甲 炮甲珠 留行子 全瓜蒌12 五味子 川 貝母9

來源	構成藥物	主治
浙江中醫雜誌	沙蔘麥門冬湯加減：白花蛇舌草 半枝蓮30 南沙蔘 北沙蔘 天花粉 海蛤15 麥冬 白薇12 生甘草6 川貝母3	肺癌
	北沙蔘 黃芩 魚腥草 仙鶴草 貝母 當歸 苦杏仁 前胡 天冬 麥冬 橘紅 乾蟾皮 羊乳 徐長卿 玉竹 括亭藤30 茯苓皮 庵闌子15 生甘草10 守宮 蜈蚣5條 蛤蚧1對	
	陽和湯加減：熟地30 犀角霜 桑柏皮 茯苓皮 30 麻黃6 肉桂 乾薑 白芥子4.5	
天津中醫	百合固金湯：生地黃 熟地黃 麥冬 百合 芍藥 當歸 貝母 玄蔘 桔梗 生甘草 加減合用犀黃丸	肺癌
	千金葦莖湯：葦莖 薏苡仁 冬瓜仁 桃仁 加犀黃丸	
	生脈散：人蔘 麥冬 五味子 加犀黃丸	
浙江中醫學院學報	魚腥草 半枝蓮 白毛藤 黃毛耳草30 海浮石 佛耳草15 瓜蒌皮 桑柏皮 貝母 竹瀝 半夏 百部9	肺癌
新中醫	鶴蟾片：仙鶴草 蟾蜍 人蔘等	肺癌
	北沙蔘 象貝 天冬 五味子 麥冬 蒲公英 炒山梔 紫地丁 紫草根 魚腥草 生地 丹皮 生地 楡 百部	
	白茅根50 白花蛇舌草40 魚腥草 薏苡仁30 丹蔘 沙蔘20 鷄內金15 川象貝 甘草10	
中草藥驗方選編	509丸劑：瓜蒌150 冬瓜子 海浮石 生石膏 杏仁120 清半夏 毛菇 七爪紅 葶藶子 雙皮 蔞白 炙麻黃 紫菀 黃芩 荔子90 甘草60	肺癌
中草藥單方驗方選編	半枝蓮60 石燕30 漏蘆15 蜂房 北沙蔘12 枇杷葉 蒲黃 黃耆 杏仁9	肺癌
	半枝蓮 半邊蓮 白花蛇舌草 白英30	

來源	構成藥物	主治
中西醫結合雜誌	太子參 陳皮 代赭石 煨牡蠣30 紫河車 炒柴胡 麥冬 山查 炒白朮15 五味子12 甘草6	肺癌
腫瘤的辨證施治	肺形草 蒲公英30 石斛15 藕節 天冬 桑柏皮12 苦桔梗 生甘草6	原發性肺癌
	土茯苓30 生黃耆 黨參15 白芍 大麥冬 山慈姑12 象貝母9 當歸6	
	紫草根 山海螺 昆布30 夏枯草24 全休15前胡9	
	山海螺 生熟苡仁24 桑柏皮 茯苓15 肥知母 炙紫菀12 光杏仁 浙貝母9 生甘草 生晒麥6	
廣西中醫藥	薏苡仁30 白花蛇舌草 貓爪草 猪苓 大蓊 小蓊 玄胡索 黃耆 黨參 生半夏20 黃芩15 三七6 守宮2條	肺癌
	夏枯草 玄參 生牡蠣 茅根 蒲公英 北沙參 魚腥草 藕節 薏苡仁 黃耆30 靈百合 黃精 五味子20 生鱉甲 麥冬15	氣管支肺癌
四川中醫	生黃耆60 黨參 海藻 半枝蓮 七葉一枝花 白花蛇舌草30 茯苓25 山藥 黃精20 白朮 半夏 陳皮15 膽星 甘草5	肺癌
	黃耆 白朮 黃精 山藥 麥冬 沙參 陳皮 瓜蒌 白花蛇舌草 山豆根 太子參 半夏 丹麥 海藻 昆布	原發性肺癌
抗癌中草藥制劑	肺癌消湯：乾蟾皮 藤梨根 魚腥草 銀花30 沙參 天冬 麥冬 百部 夏枯草15	肺癌
	白茅根60 紫草根 蒲公英 昆布 海藻30 芙蓉花15 橘核9	
	卷柏 生地 半枝蓮 蜂房30 地榆 熟地15 澤蘭 全蝎 五味子9	
	槐木湯：槐木 并豆草1斤	
	貝母 麥冬 余糧石 牡蠣30 紫河車 生地 熟地 茯苓 澤蘭 猪苓 紫貝齒 首烏 花龍骨12 當歸 白芍 女貞子 公丁香 白朮 神曲 麥芽 山查 內金 阿膠 生玳瑁末 蘆薈9 砂仁 人參6 朱砂 琥珀 甘草3	
	清肺抗癌湯：夏枯草 海藻 海帶 生牡蠣 石見穿 徐長卿 生地 野菊花 留行子 鐵樹葉 蜀羊泉 望江南 魚腥草 蒲公英30 瓜蒌15 丹皮9	
	蛇根湯：白花蛇舌草 茅根 鋪地綿 苡仁 夏枯草30 麥冬 海藻 昆布 百部 生牡蠣 芙蓉花 全休15 生地 元參12 桔核 橘紅9	
勝利丹：雄黃 全蝎 大黃15 蝸牛 朱砂 冰片 蟾蜍 硼砂10 乳香 沒藥 甲珠 血竭7.5 石膏 白芷5 蜈蚣3條 輕粉2.5 麝香0.5		
扶正攻癆湯：生半夏 生南星 七葉一枝花 蛇六谷 羊蹄根 鐵樹葉 白花蛇舌草30 商陸 乾蟾皮15 蜈蚣粉 壁虎粉 地鱉蟲粉1.5	晚期肺癌	
天花粉30 野百合 蒸百部 黃耆 黨參15 南沙參 北沙參 天冬 麥冬 制紫菀12 杏仁 淮山藥9		
	制龜板15 生地 熟地 制首烏 黃精 苡仁12 鹿角片 茯苓 白朮9	
千家妙方	垂盆草 白英30	肺癌
抗癌本草	杏仁150 紫草 桑柏皮90 人參 茯苓 貝母60 知母30 蛤蚧1條	肺癌
	十大功勞藥15 蛇六谷 猪苓 石決明30 僵蠶 鈎藤9 全蝎6	肺癌腦轉移
江蘇中醫雜誌	1號方：懷牛膝135 半枝蓮 石打穿 側柏葉 仙鶴草 苦參75 蒲公英 龍膽草45 麥冬 澤瀉 制大黃25 桔梗 玄胡索 石膏24 葶藶子 炙百部 川棟子 炒枳殼 茯苓 赤芍20 全瓜蒌 北五味18 馬兜鈴 木通15	中央型肺癌
	2號方：龜板60 全蝎 白花蛇舌草 地鱉蟲45 蜈蚣16條 活腹蛇1條 蛤蚧4-6只 活甲魚1只	
	3號方：石見穿 半枝蓮 七葉蓮100 全休60 大麥冬 大貝母 玄參30 丹麥 冬蟲夏草15 制香附 陳皮 茯苓 秦艽 生熟苡仁10 降香屑6	
	生黃耆 山豆根20 女貞子 象貝母15 南北沙參 太子參 玄參12 辰麥冬 三棱 莪朮9 蜈蚣3條	
腫瘤病	玳瑁 龜板 海藻15 露蜂房 鴉膽子10 蟾酥1	肺癌
腫瘤的防治	桑葉 紫菀15 象貝母10	肺癌
	紫草根 七葉一枝花60 前胡30 人工牛黃10	
	藤梨根 蜀羊泉 鐵樹葉 半枝蓮 魚腥草30	
	半枝蓮60 牡蠣 夏枯草 海藻 銀花 連翹 紫草根 白毛藤 白花蛇舌草 蜀羊泉 鐵樹葉30 橘葉核 麥冬 北沙參 魚腥草 乾蟾皮 藤梨根 山豆根15 海帶 紫山甲 留行子 全瓜蒌12 五味子 川象貝母10	

來源	構成藥物	主治
中醫雜誌	新葷煎：生地 五味子 北沙參 留行子 麥冬 蒲公英 石見穿 百部 徐長卿 地骨皮 南沙參 望江南 野菊花 淮山藥 白花蛇舌草 煨牡蠣 夏枯草 海藻 海帶 元參 花粉 丹參 川貝 炙山甲 炙鼈甲 蜀羊泉 丹皮 魚腥草 紫地丁 象貝	原發性氣管支肺癌
北京中醫雜誌	百合 熟地 生地 玄參 當歸 麥冬 白芍 沙參 桑皮 黃芩 奧牡丹 全休 白花蛇舌草	原發性氣管支肺癌
中醫腫瘤學	徐長卿 半枝蓮 白花蛇舌草 龍葵 土茯苓 仙鶴草 黃藥子30 全休 野菊花 15 前胡 馬兜鈴 桔梗10	肺未分化癌
	制附子120 淫羊藿 仙茅 留行子30 全瓜蒌20 補骨脂 黨參 黃精 山藥 雲苓 白朮 菝葜 黃耆15 法半夏 杏仁12	肺癌
	紫草根 山海螺30 土貝母20 山豆根 草河車 全休 馬兜鈴 夏枯草 海藻15 前胡10	肺鱗癌
	蜀羊泉 龍葵 山海螺 生薏苡仁 生牡蠣 莢梨30 蛇莓 山慈姑 夏枯草15 浙貝母10	肺線癌
	太子參 龍葵 半枝蓮30 南北沙參 生芪 生地20 石斛 天冬 麥冬 玄參 七葉一枝花15 黃芩10	手術、化學、放射線治療後
癌症的治療與預防	黃耆 代精石30 百部20-30 白花蛇舌草 茅根 魚腥草 蛇莓草 苡米 藤梨根 天葵子 半夏 海藻 牡蠣15 乾蛤蚧 急脛子 黨參 陳皮 竹茹10 生薑5 片 大棗5個	肺癌
湖北中醫雜誌	白花蛇舌草 白蚤休 魚腥草 沙參 玉竹 百合 丹參 旱蓮草 全瓜蒌 杏仁 柏子仁 合歡皮	晚期肺癌(陰虛肺熱)
	白花蛇舌草 八月札 丹參 白芍 鬱金 黃芩沙參 麥冬 仙鶴草 太子參 杏仁 半枝蓮 蛇六谷 莢梨 法夏 茯苓 苡仁 白朮 桔梗 前胡 杏仁 陳皮 甘草	晚期肺癌(肝火犯肺)
	白花蛇舌草 蛇六谷 沙參 黨參 麥冬 女貞子 附片 鹿角霜 杏仁 淫羊藿 葶藶子 甘草	晚期肺癌(脾虛痰濕)
	白花蛇舌草 蛇六谷 沙參 黨參 麥冬 女貞子 附片 鹿角霜 杏仁 淫羊藿 葶藶子 甘草	晚期肺癌(腎肺兩虛)
中國醫藥學報	南沙參 北沙參 天冬 麥冬 元參 百合 生地 鼈甲	晚期原發性肺癌(陰虛型)
	人參 黃耆 黨參 太子參 白朮 茯苓	晚期原發性肺癌(氣陰兩虛型)
	補骨脂 仙靈脾 肉蓯蓉 兔絲子 鎖陽 壁荔果	晚期原發性肺癌(陰陽兩虛型)
	衛茅 貓爪草 桃仁 鼈甲 蘇木 瓜蒌皮 鬱金 西黨參 白朮 薏苡仁 紅棗	晚期原發性肺癌(瘀血阻肺方)
	貓爪草 黃藥子 葶藶子 浙貝母 天漿殼 海蛤殼 桃仁 土鱉蟲 生黃耆 西黨參 白朮 薏苡仁	晚期原發性肺癌(痰濁瘀結方)
	生黃耆 西黨參 茯苓 白朮 薏苡仁 法半夏 陳皮 貓爪草 天漿殼 牡荊子 衛茅 川芎	晚期原發性肺癌(脾氣虛方)
	孩兒參 生晒參 北沙參 天麥冬 百合 玉竹 淮山藥 黃精 丹皮 赤芍 桃仁 旱蓮草	晚期原發性肺癌(氣陰兩虛方)
福建中醫藥	天花粉30 生地黃 京玄參 天麥冬 南沙參 北沙參 野百合12 肥知母 肥玉竹 金石斛9 五味子6	晚期原發性氣管支肺癌(養陰潤肺方)
	生黃耆 生熟苡仁 淮山藥12 潞黨參 雲茯苓 炒扁豆 炒白朮 制黃精9	晚期原發性氣管支肺癌(益氣健脾方)
	熟地黃 炙鼈甲 炙龜板 制首烏 全當歸 杭白芍12 枸杞子 鹿角片 補骨脂9	晚期原發性氣管支肺癌(補精益腎方)
	魚腥草 漏蘆 土茯苓 升麻 七葉一枝花 芙蓉葉 羊蹄根 蛇舌草 山豆根30 苦參片12	晚期原發性氣管支肺癌(消腫解毒方)
	蛇六谷 生半夏 生南星 黃藥子 夏枯草 海藻 昆布30	晚期原發性氣管支肺癌(軟堅散結方)
石見穿30 王不留行 炙丹參 玄胡索12 赤芍藥 荊三稜 蓬莪朮9 蜈蚣粉 地鱉蟲粉 天龍粉1.5	晚期原發性氣管支肺癌(化瘀消滯方)	
江西中醫藥	小金丹合夏枯草 貓爪草50	肺線癌淋巴結轉移
遼寧中醫雜誌	馬兜鈴 瓜蒌 桑柏皮 半夏 前胡 桔梗 浙貝 杏仁	晚期肺癌 化學療法副作用

來源	構成藥物	主治
上海中醫雜誌	海藻30 三稜 莪朮 留行子15-30 大黃蟻蟲丸 桃仁12	原發性肺癌
	川象貝 魚腥草 蒲公英 七葉一枝花 徐長卿 蜀羊泉 鐵樹葉 石見穿 石打穿 留行子 丹皮 白花蛇舌草 澤瀉 豬苓 茯苓	原發性肺癌의 胸水
	夜蕎麥20 黨參 黃耆 茯苓 女貞子 補骨脂15 當歸 白朮 陳皮10 甘草6	放射線,化學療法의 副作用
	沙參 麥冬 元參 赤芍 女貞子 茜草根 生地 生黃耆15 五味子9	
	黃耆 雲苓 黨參 半夏 女貞子 補骨脂 當歸15 白朮 陳皮 生薑 甘草10	
生石膏 夜蕎麥30 魚腥草 丹參20 赤芍 生地15 甘草10		

\* 辨證分型에 따른 分類

辨證	藥物構成	來源
肺虛型	百合固金湯加味(陰虛內熱): 百合 生熟地 川貝 玄參 桔梗 寸冬 赤白芍 當歸 甘草 魚腥草 半枝蓮 白花蛇舌草	中醫藥信息
	生脈散合補肺湯加味(氣陰兩虛): 黨參 寸冬 五味子 黃耆 紫菀 桑柏皮 熟地 川貝 半枝蓮 魚腥草 白花蛇舌草	
	六君子湯合補肺湯(肺脾兩虛): 黨參 雲苓 白朮 甘草 姜半夏 陳皮 黃耆 紫菀 桑柏皮 五味子 熟地 魚腥草 白花蛇舌草	
氣血雙虧型	豬苓 菌靈芝 黃耆 半枝蓮 白花蛇舌草30 白朮 茯苓 天冬15 當歸 熟地12 人參6	百病良方
	八珍湯合當歸補血湯加減: 生黃耆30 當歸 白芍 生地 熟地15 太子參 白朮 茯苓 菖蒲 兒茶10 冬蟲夏草6	
肺腎兩虛型	麥味地黃湯合二母寧嗽湯加減: 生地 丹皮 瓜蒌 鐵樹葉15 五味子12 麥冬 山茱萸 知母 川貝母10	中西醫結合治療癌症
脾肺兩虛型	六君子湯合桔梗湯加減: 黨參 生薏苡仁 葶藶30 白朮 茯苓 清半夏 桑柏皮 草河車10 桔梗 冬蟲夏草6	<百病良方> 第二集
	半枝蓮 白花蛇舌草30 北沙參 豬苓24 茯苓 蟲草 山慈姑15 白朮 法半夏 五味子12 陳皮10	
肺腎兩虛 痰瘀互結 邪毒壅盛	化痰散結丸: 紅參 田七 穿山甲 浙貝母 淫羊藿 射干200 兔絲子 破故紙 龜板 黃耆 茯苓 巴戟天 威靈仙 金櫻子400 生半夏 生南星 七葉一枝花300 天竺黃 海馬 五味子 陳皮100	新中醫
脾虛氣弱型	白花蛇舌草 魚腥草 鐵樹葉30 茯苓 豬苓 生苡仁15 黨參 黃耆 白朮 陳皮9	千家妙方
肺陰不足 虛火上炎型	白茅根 白花蛇舌草 魚腥草30 百合 生地 銀花 鐵樹葉 生苡仁15 南沙參 北沙參12 天冬 麥冬 黃芩 陳皮9	
氣陰兩虛型	月華湯加減: 沙參 天冬 寸冬 茯苓 生地 山藥 川貝 知母 桑葉 三七 阿膠 甘草 魚腥草 半枝蓮 白花蛇舌草	黑龍江中醫藥
陰虛型	魚腥草60 北沙參 玄參 生地 蒲公英 金銀花 芙蓉葉30 天麥冬 炙龜甲 炙龜板 黃精 谷麥芽15 陳皮6	遼寧中醫雜誌
	青蒿鱉甲湯加減: 白花蛇舌草 魚腥草30 青蒿12 鱉甲 地骨皮 秦艽 茯苓 麥冬 百合 百部10	中西醫結合治療癌症
氣血瘀滯型	瓜蒌 石見穿30 鐵樹葉20 枳殼 桔梗 降香 紫菀 桃杏仁 遠志 乾蟾10	中醫腫瘤學
陰虛毒熱型	南北沙參 全瓜蒌 半枝蓮 白花蛇舌草 石見穿 山海螺30 徐長卿 地骨皮20 炙龜甲 生地 麥冬15 前胡 桃杏仁 貝母	
痰濕蘊肺型	生薏苡仁 貓爪草 半枝蓮 白花蛇舌草 龍葵30 黨參15 陳皮 蒼白朮 雲苓 半夏 制南星 前胡 桃杏仁 牙皂 馬兜鈴	
風熱犯肺型	敗醬草 半枝蓮 白花蛇舌草30 豬苓24 銀花 荊芥 大力子 全休12 蘆薈9	百病良方
痰涎阻肺 肺失肅降型	葶藶 冬瓜仁 苡仁 敗醬草 白英30 山慈姑豬苓24 茯苓 瓜蒌 莪朮15 桃仁 法半夏 12	
瘀血阻滯 熱毒內蘊型	夏枯草 敗醬草 黨參 昆布 海藻30 瓜蒌 山慈姑 豬苓24 黃藥子 甲珠15 莪朮12 天南星9	

辨證	藥物構成	來源
陰虛內熱型	百合固金湯合麻杏石甘湯加菝葜 魚腥草 三稜 白花蛇舌草 半枝蓮	實用腫瘤學雜誌
瘀毒型	桃紅四物湯合銀花甘草湯加減: 龍葵30 金銀花20 歸尾 夏枯草15 赤芍 桃仁 紅花 劉寄奴 元胡10	中西醫結合治療癌症
痰濁內阻 氣化失司型	二陳湯加味: 茯苓 滑石15 法夏 陳皮 南星 佩蘭 扁豆10 吳茱 黃連6 甘草3	湖南中醫學院學報

25. 腫瘤良方大全<sup>11)</sup>

肺癌은 또한 原發性 氣管支肺癌이라 稱하며 肺癰 肺積의 範疇에 屬한다. 長期 吸煙者의 發病率은 非吸煙者에 비해 20배가 높다. 初期에 特殊한 症狀이 없다가 X-선 檢査時에 發見되는 것이 一般의이다. 病情이 發展함에 따라서 咳嗽 咯血 胸痛 發熱 聲音嘶啞 消瘦 등의 呼吸器 및 全身症狀이 나타난다.

中醫에서는 肺癌의 原因을 肺腎陰虛內熱 및 脾虛 痰盛으로 보았으며 末期 肺癌의 治療는 虛損에 主眼點을 두어 扶正祛邪를 原則으로 삼았다. 肺腎陰

虛하고 痰熱于肺에는 養陰潤肺하고 清化痰熱하는 清燥救肺湯合葶苈湯加減을 使用하고 脾肺氣虛하고 痰瘀互結에는 益氣健脾하고 化痰活血하는 導痰湯 加味를 使用하며 氣陰兩虛에는 益氣養陰하는 生脈 飲加味를 使用하고 陰陽兩虛에는 補腎益肺하는 生脈 飲合二仙湯을 使用하였다. 肺癌의 治療에 常用 하는 抗癌藥으로는 毛茛 白花蛇舌草 白及 石上柏 全瓜蒌 半枝蓮 猫人蔘 菝葜 夏枯草 乾蟬皮 薏苡仁 生南星 소休 浙貝母 등이 있다. 肺癌의 手術後의 調理는 健脾益氣를 爲主로하여 四君子湯加味를 使用한다.

著者 및 書名	處方	構成 藥物	主治
外科醫學心鏡錄	一枝箭	金銀花5g 白及4.5g 穿山甲 當歸4g 天花粉 白芷 牙皂 乳香 半夏 川貝母3g 甘草1.5g	活血解毒化痰散結
上海中醫學院 附屬龍華醫院方	二仙湯	牡蠣 鐵樹葉 芙蓉葉 石上柏 石打穿 石見穿 山豆根 黃精30g 夏枯草15g 赤芍 天冬12g 仙茅 仙靈脾 兔絲子 鎖陽 三稜 菝葜 當歸9g 留行子6g	扶正抗癌
	二麥二冬湯	葶藶子 魚腥草 生以仁 山海螺 銀花 白毛藤 白花蛇舌草 生牡蠣 八月札30g 夏枯草 苦參15g 南沙參 北沙參 百部12g 天冬 麥冬 乾蟬皮9g 天龍丸15粒	養陰潤肺 清熱解毒
中醫癌瘤證治學	二蓮葶苓湯	半邊蓮 半枝蓮 全瓜蒌 車前草 夏枯草30 云茯苓15 葶藶子 蜂房9	瀉肺利水 解毒消腫
	艾蜂湯	生黃耆30 生艾葉18 清半夏15 蜂房 蛇蛻 全蝎 陳皮 山豆根 云茯苓 生薑9 生甘草3	鎮咳去痰 軟堅化痰
	加減艾補湯	黃耆60 黨參 補骨脂 茯苓 生地黃30 白朮 生艾葉20 骨碎補 15 五味子 重樓 生薑10 生甘草3	補肺益腎 納氣平喘
	加減葶腥湯	生地黃 魚腥草 葶根 大青葉30 生艾葉20 鬱金 杏仁15 蜂房 全蝎 山豆根 生薑10 生甘草3	解毒散結 滋陰清熱
	加減沙艾湯	生地黃 北沙參 山慈姑 魚腥草 瓦楞子30 生艾葉20 天門冬 麥門冬15 陳皮 生薑10 生甘草3 蜈蚣2條	解毒散結 滋陰養肺
	加減桃萎湯	仙鶴草 料薑石60 瓜蒌仁 瓦楞子30 香附子 川棟子15 土鱉 桃仁 重樓 蜂房 烏蛇 山豆根 馬兜鈴10	活血軟堅 理氣消腫
	豆蚣丸	生艾葉120 山豆根 陳皮 乾薑60 蜂房 蛇蛻 全蝎 生甘草30	消腫止痛 軟堅破積
	豆慈丹	山豆根 瓦楞子15 海藻 昆布 川貝母 百合 北沙參 橘絡12 山慈姑 蜂房 蛇蛻9 全蝎6	潤肺軟堅解毒消癆
	桔芪豆蜂丸	北沙參 白前 小薊 黃耆 山豆根 清半夏 蜂房 蛇蛻 全蝎 瓜蒌 各等分	清熱化痰 清癆止痛
	桔芪前橘湯	北沙參 黃耆 仙鶴草 瓜蒌 魚腥草30 天門冬 小薊15 紫草根 前胡12 馬兜鈴10 橘絡 桔梗9 松香3 白前2	止咳化痰清肺抗癌
蒜艾湯	大蒜20瓣 生艾葉18 木瓜 百部 陳皮 生薑 生甘草9	理氣去痰 解毒止咳	

著者吳書名	處方	構成藥物	主治
太平聖惠方	三稜丸	川大黃 訶黎皮60 鱉甲45 荊三稜 附子 檳榔 木香 桃仁30 吳茱萸15	活血化瘀 養陰軟堅
	枳實丸	杏仁30 枳實 木香 檳榔 訶黎勒皮 苝葶藶 赤茯苓 五味子 甘草15	潤肺化痰 行氣散結
	紫菀方	紫菀 鱉甲 郁李仁30 吳茱萸 白朮 當歸 桂心 檳榔 枳實15	活血散結 潤肺止咳
黑龍江中醫藥	月華湯	沙蔘 天冬 寸冬 茯苓 生地 山藥 川貝 知母 三七 阿膠 甘草 魚腥草 半枝蓮 白花蛇舌草	益氣養陰 解毒抗癌
賈堃方	平消方	淨火硝 白礬 仙鶴草 枳殼 鬱金18 五靈脂15 制馬錢子12 乾漆6	順氣活血 去痰通絡
陳銳琛方	仙魚湯	魚腥草 仙鶴草 貓爪草 全休30 天冬20 生半夏 浙貝母15 葶藶子12	清肺除痰 解毒散結
外科學	加味生脈湯	黨蔘 麥冬 山藥 熟地 川貝 沙蔘9 五味子6	益氣養陰 清熱化痰
許國華方	加味千金葶藶湯	萎莖 苡米 紫草 羊乳根 土茯苓30 白花蛇舌草 夜蕎麥 合歡皮20 冬瓜仁 丹蔘15 桃仁10	清肺解毒 化痰去瘀
劉炳凡方	加減蔘苓白朮散	白朮30 北沙蔘 冬瓜子15 淮山藥 苡仁 蛤粉12 茯苓 紫丹蔘 白朮 土貝母10 紫草 冬蟲草5 田三七3	益肺抗癌
鄭長松方	三蔘蓮苡湯	北沙蔘 元蔘 半枝蓮 薏苡仁 蒲公英 白花蛇舌草 魚腥草 藕節 貓爪草 黃耆 茅根 鱉甲 生牡蠣30 生百合 瓜蒌 夏枯草 玉竹20 麥冬 冬蟲夏草 旱蓮草 黨蔘15	壯水清金瀉火涼血
普濟方	五靈脂丸	五靈脂75 木香15 馬兜鈴 葶藶7.5	清肺解毒 化痰行氣
	牛蒡子散	鱉甲60 牛蒡子 木香 當歸 荊三稜 川大黃30 吳茱萸 檳榔15	化痰軟堅 行氣消積
	芫花煎丸	荊三稜90 芫花 鱉甲45 礞砂 青橘皮30	潤肺解毒 軟堅消積
	枳實木香丸	枳實60 木香 陳皮 人蔘 海藻 葶藶30 芍藥 丁香23	益氣養血 散結軟堅
	桃仁煎丸	桃仁90 礞砂45 鱉甲30 木香 檳榔23 川烏頭 紫苑 豬牙皂莢 防葵 乾薑15	化痰軟堅 解毒抗癌
	桑柏皮湯	桑柏皮 麥冬冬 桂45 眞橘皮 豬牙皂莢30 甘草15	清肺養陰 化痰解毒
	推氣散	枳殼 桂心 片子姜黃15 甘草6	活血行氣
	檳榔散	檳榔 郁李仁30 赤茯苓 赤芍藥 吳茱萸 荊三稜 訶黎勒皮 青橘皮23	化痰散結
黎月恒方	百合沙蔘湯	白花蛇舌草30 沙蔘 生地 全休 奧牧丹15 熟地 桑柏皮12 百合 麥冬 白芍 黃芩9	養陰潤肺 清熱解毒
上海市徐匯區天平路地段醫院方	兩根湯	夜蕎麥根 水楊梅根 千斤拔 魚腥草 山海螺30 雲母石15 孩兒茶9	解毒抗癌
上海市南市區東新醫院方	兩根三草湯	魚腥草 望江南 夏枯草 白花蛇舌草 紫草根 藤梨根30 南沙蔘 制山甲 制鱉甲15	養陰清肺解毒
中國醫藥學報	扶肺煎	灸黃耆30 枸骨葉 蘆根 菝葜15 南北沙蔘 楮實子12 生晒蔘 三七 女蔘 百合 麥冬10 桔梗8 陳皮6 蜈蚣3條	益氣養陰
劉嘉湘方	軟堅解毒湯	魚腥草 生苡仁 石上栢 石見穿 白花蛇舌草 生牡蠣30 瓜蒌皮 山豆根 夏枯草 龍葵15 赤芍12 八月札5	理氣活血 軟堅解毒
	養陰清肺消積湯	南沙蔘 北沙蔘 魚腥草 山海螺 生苡仁 石上栢 芙蓉葉 白花蛇舌草 白毛藤30 八月札 瓜蒌皮15 天冬 元蔘 百部 葶藶子 赤芍 苦蔘 夏枯草 海藻12 乾蟾皮9	養陰清肺 解毒散結
	破瘀散結湯	海藻30 三稜 菝葜 留行子15-30 丹蔘15 桃仁 大黃 土蟲丸12	破瘀散結
	益肺消積湯	生黃耆 石上栢 北沙蔘 石見穿 白花蛇舌草 生南星 生牡蠣30 金銀花 山豆根 夏枯草 海藻 瓜蒌皮15 生白朮 天冬 昆布12	益氣養陰 清熱解毒
武漢醫學院附屬第二醫院方	柏地肺癌消	卷柏 半枝蓮 生地 蜂房30 地榆 熟地15 澤蘭 全蝎 五味子9	清肺解毒 軟堅散結
	核車湯	核桃樹枝60 草河車 女貞子 白花蛇舌草 淡竹葉30	解毒清肺
	蟾梨肺癌消	乾蟾皮 藤梨根 魚腥草 金銀花30 沙蔘 麥冬 百部 夏枯草15	清肺解毒 軟堅散結

著者及書名	處方	構成藥物	主治
上海市胸科醫院方	復方鐵樹葉湯	半枝蓮60 牡蠣 夏枯草 海藻 銀花 連翹 紫草根 白毛藤 白花蛇舌草 蜀羊泉 鐵樹葉30 麥冬 橘核 橘葉 北沙參 魚腥草 乾腐皮 藤梨根 山豆根15 海帶 制鼈甲 炮甲珠 留行子 全瓜蒌12 五味子 川貝母9	清肺化痰 解毒抗癌
湖北黃石市中醫院方	復方佛甲草湯	鮮佛甲草30-60 生石膏30 昆布 海藻 桑皮 夏枯草15 銀花12 黃芩 山梔 連翹9	清肺解毒 止咳化痰
瑞竹堂經驗方	神仙墮痰丸	黑牽牛500 皂角48 白斑36	攻逐痰涎
三因極一病證方論	破飲丸	藜蘆 丁香 縮砂仁 胡椒 烏梅肉 青皮 巴豆 木香 蝎草 各等分	溫中破積
浙江嵊縣人民醫院方	蓮英湯	半枝蓮 白英30	解毒抗癌
福州市第一人民醫院方	蓮藤白蛇湯	半枝蓮 白毛藤45 白花蛇舌草30 沙參15 麥冬 銀花 雲苓 黨參9 淮山藥 浙貝6 甘草4.5	健脾益氣 潤肺解毒
太平惠民和劑局方	涼膈散	連翹120 大黃 朴硝 甘草60 山梔子 薄荷葉 黃芩30	清熱解毒 瀉火通便
腫瘤臨證備要	消癌二號	紫草根 七葉一枝花60 前胡30 人工牛黃10	清熱解毒 消腫抗癌
	清金散	北沙參60 炙鼈甲45 赤練蛇粉 天南星 白及 鳳凰衣 廣陳皮 瓜蒌 30 制乳沒20 西洋參15 辰砂12	益氣養陰 軟堅消腫
經驗方	益氣養陰解毒方	太子參 龍葵 半枝蓮30 南北沙參 生芪 生地20 石斛 天冬 麥冬 玄參 七葉一枝花15 黃芩10	益氣養陰 清熱解毒
山東中醫雜誌	軟堅膏	麝香0.5 大黃 乳香 沒藥10 白芥子8 血竭 水片6 雄黃4 蟾酥1	軟堅散結 解毒化癆
	金岩丸	白花蛇50 全蝎 僵蠶30 壁虎20 穿山甲 琥珀 羚羊粉15 大黃 青黛 藏紅花10 血竭7 制馬錢子 制乳香 制沒藥6 蜈蚣 雄黃 朱砂5 麝香 水片2 天然牛黃1 蟾酥0.5	軟堅散結 化痰通絡
	康復湯	黃耆 薏苡仁30 枸杞子 桑柏皮15 熟地 白朮 當歸12 桔梗 人參 石斛 烏梅 川貝母 沙參10 沉香6	培補脾胃 充養肺陰
上海市曙光醫院方	清肺抑癌湯	夏枯草 海藻 海帶 生牡蠣 石見穿 徐長卿 生地 野菊花 留行子 鐵樹葉 蜀羊泉 望江南 魚腥草 蒲公英30 瓜蒌15 牡丹皮9	清肺解毒抗癌
鮑嚴鍾方	清肺抗癌湯	魚腥草 半枝蓮 炒谷芽 炒山查 仙鶴草30 北沙參 黃芩 浙貝母12 當歸 制南星 橘紅9 蜈蚣3條	養陰清肺化痰抗癌
北京市中醫院方	清毒利肺湯	瓜蒌 魚腥草 生苡仁 夏枯草 半枝蓮 白花蛇舌草30 桑皮15 膽南星 雲苓 半夏 馬兜鈴 前胡 白朮 黛蛤散 橘紅9 厚朴6	去痰化濕 解毒散癆
	清毒利肺湯	南沙參 北沙參 全瓜蒌 白花蛇舌草 半枝蓮 草河車 石斛 蛤殼30 天冬 麥冬 地骨皮 夏枯草15 紫菀12 桃仁 杏仁 川貝 浙貝 前胡9	潤肺化痰 解毒化癆
羅本清方	溫化湯	制附片120 黃耆 桂枝 王不留行30 丹參 莪朮 炙甘草15 大棗12枚 乾薑6	溫補脾胃 活血化癆
江西余干縣人民醫院方	榕木湯	榕木 并頭草500	健脾潤肺 扶正抗癌
郭松云方	解毒瀉火湯	貓人參60 魚腥草 蒲公英 徐長卿 蜀羊泉 鐵樹葉 石見穿 白花蛇舌草 葶藶子30 七葉一枝花 澤瀉 猪苓 茯苓 桑柏皮15 王不留行 象貝母12 川貝母9 牡丹皮6	清熱解毒 活血利水
雷永仲方	新癥湯	望江南 野菊花 淮山藥 白花蛇舌草 蒲公英 石見穿 徐長卿 煨牡蠣 魚腥草 紫地丁 地骨皮30 元參 夏枯草15 生地 北沙參 南沙參 麥冬 天花粉 留行子 海藻 海帶 丹參 炙山甲 炙鼈甲12 百部 川貝 象貝 丹皮9 五味子6	養陰清熱 化痰軟堅
周岱翰方	鶴蟾片	仙鶴草 蟾蜍 人參	解毒除痰 涼血養血
高令山方	肺癌二號方	白茅根 白花蛇舌草 魚腥草 鐵樹葉30 百合 生地 銀花 生苡仁15 南沙參 北沙參12 天冬 麥冬 陳皮9	滋陰降火 清金抗癌
	腫瘤一號方	白花蛇舌草 魚腥草 鐵樹葉30 茯苓 猪苓 生苡仁15 黨參 黃耆 白朮 陳皮9	補脾益氣 化痰抗癌

著者及書名	處方	構成藥物	主治
王欄珍方	蔘冬白蓮湯	沙蔘 魚腥草 淮山藥 半枝蓮 白花蛇舌草30 生地15 茯苓12 天冬 麥冬 川貝 知母 桑葉 阿膠9 三七 甘草3	滋陰潤肺 消癥散結
成都軍區總醫院方	黃藥子甘油注射劑	黃藥子100	解毒抗癌
天津市第二防治院東興市場防治所方	蛇根湯	白花蛇舌草 茅根 鋪地綿 苡仁 夏枯草30 麥冬 海藻 昆布 百部 生牡蠣 芙蓉花 全休15 元蔘 生地12 橘核 橘紅9	清肺化痰解毒
上海市楊浦區中醫院方	扶正攻癥湯	生半夏 生南星 七葉一枝花 蛇六谷 羊蹄根 鐵樹葉 白花蛇舌草30 商陸 乾蟾皮15 蜈蚣粉 壁虎粉 地鱉蟲粉1.5	扶正抗癌
湖南中醫藥研究所方	抑癌散	砒石2 巴豆 大棗各7個 生蔥2莖	攻毒抑癌
浙江中醫雜誌	肺“四號”方	黃耆 蛇莓 八月札30 半枝蓮 魚腥草 七葉一枝花 丹蔘15 乾蟾皮12 八角金盤10	祛邪解毒 化癥散結

26. 腫瘤疾病千首妙方<sup>20)</sup>

來源	治方及藥物構成	辨證及主治
北京中醫雜誌	魚腥草 仙鶴草 貓爪草 七葉一枝花 山海螺30 天冬20 生半夏 浙貝母15 葶藶子12	
	百合 熟地 生地 元蔘 當歸 麥冬 白芍 沙蔘 桑柏皮 黃芩 奧牧丹 七葉一枝花 白花蛇舌草	
	肺癌逐水消腫膏：生軍 大戟 水片 參三七 血竭 山慈菇 月石 莪朮 思鄉	右上肺癌
上海中醫藥雜誌	麻黃附子細辛湯：生麻黃 熟附子 炙甘草6 北細辛2.4 法半夏 陳皮 苦杏仁9	
	枳實薤白桂枝湯：生晒蔘 薤白 枳實 川桂枝9 全瓜蒌30	
	金匱腎氣丸：熟附子 熟地 淮山藥 肉桂15 山茱萸9 澤瀉 丹皮6 肉桂心5	
	熟附子30 山茱萸 淮山藥12 牡丹皮6 肉桂5 熟地24 砂仁 乾薑3 鹿角霜 烏藥9 磁石30 懷牛膝12	
	丹蔘 北沙蔘 南沙蔘 前胡12 梔子 莪朮 王不留行 百合 生地15 天冬 麥冬 陳皮9 白花蛇舌草 魚腥草30	放射線療法과 동시치료
	北沙蔘 元蔘 天冬 麥冬 夏枯草 海浮石 杏仁 生苡仁 半枝蓮 白花蛇舌草 陳皮 象貝母 牛蒡子	
	黨蔘 黃耆 鷄血藤 虎杖 元蔘 天冬 麥冬 北沙蔘 百合 陳皮	扶正固本
	黃耆 黨蔘 白朮 茯苓 桂枝 大棗 杏仁 法半夏 陳皮 白花蛇舌草	脾虛濕痰型
	黨蔘 黃耆 茯苓 白朮 北沙蔘 天冬 麥冬 生地 鷄血藤 虎杖 何首烏	
	北沙蔘 石斛 南沙蔘12 川貝母 天冬 麥冬9 百合 瓜蒌皮 女貞子15 白花蛇舌草 鐵樹葉 魚腥草30	陰虛內熱型
川貝母 象貝母 魚腥草 蒲公英 七葉一枝花 徐長卿 蜀羊泉 鐵樹葉 石見穿 石打穿 王不留行 丹皮 白花蛇舌草 澤瀉 豬苓 茯苓	肺癌의 胸水(化痰止咳 清熱解毒 軟堅散結 平喘降逆爲主)	
新中醫	魚腥草 仙鶴草 貓爪草 七葉一枝花 山海螺30 天冬20 生半夏15 葶藶子12 浙貝母9	
廣西中醫藥	白花蛇舌草 貓爪草 豬苓 大薊 小薊 玄胡索 黃耆 黨蔘 苡仁 生半夏20 黃芩15 三七6 壁虎2條	濕熱毒邪鬱結肺胃
浙江中醫學院學報	六耳二百湯 加減一號方：佛耳草 仙鶴草 白茅根 魚腥草 黃毛耳草 夜交藤15 炙百部 木賊草 合歡皮9	
	六耳二百湯 加減二號方：黃毛耳草 半枝蓮30 佛耳草 仙鶴草 白茅根15 炙百部 木賊草 天葵子 桑柏皮9 黛合散12 生甘草6	
浙江中醫雜誌	炒竹茹 谷芽 麥芽 佛手 神曲 五味子 南沙蔘 北沙蔘 天冬 麥冬 生地 石斛 元蔘	
	三蔘生脈飲加味：太子蔘 南沙蔘 北沙蔘 丹蔘 麥冬 五味子 象貝母或川貝母 苡仁 魚腥草 七葉一枝花 白花蛇舌草	手術後 氣陰兩虛型
福建中醫藥	抗癌一號藥散：千斤朮 鷄骨哥 茶時哥 九節茶 牛黃 血竭 珍珠 水片等	氣陰兩虛 熱毒蘊肺
	抗癌二號加味：黃耆 魚腥草 茅根 紫草根 苡仁 葶藶子 紅棗	

來源	治方 吳 藥物構成	辨證吳主治
中醫雜誌	四君子湯加黃耆 沙蔘 麥冬 脫力草 隨症選用 生地 石斛 貝母 夏枯草 生半夏 魚腥草 敗醬草 狼毒	
孔海云經驗方	法半夏 南星 藿香 佩蘭 白扁豆10 陳皮 吳茱萸 黃連6 茯苓 滑石15 甘草3 法半夏 膽南星 鷄內金 百合 川貝母10 吳茱萸 黃連 麥須6 茯苓15 甘草3	痰濁內阻 氣化失司
中國醫藥報	新鮮蒲公英適量 搗碎直接敷于痛處皮膚	肺部腫瘍의 疼痛減少
四川中醫	瀉白散合麻仁丸加減: 桑柏皮 地骨皮 當歸 火麻仁 赤芍 生地 丹皮 茜草 側柏12 杏仁 酒軍 芒硝10 茅根60	肺熱鬱結로 肛門直腸 墜脹疼痛
實用中西醫結合雜誌	新鮮景天三七葉80 搗碎 用紗布濾汁20毫升	肺癌大量嗽血

(文獻에 나타난 肺癌의 277處方中 構成藥物 使用頻度數)

使用頻度	藥 物	使用頻度	藥 物
1	骨碎補 甘遂 桂皮 姜黃 乾漆 牽牛子 急性子 降香 藿香 輕粉 玄明粉 蛤粉 荊芥 胡椒 竹瀝 皂角 赤練 絲粉 全蟲 珍珠 射干 木瓜 木通 芒硝 大服皮 大蒜 澤漆 八角金盤 鋪地錦 蒲黃 朴硝 比石 佛甲草 柏子仁 千斤拔 小麥 松香 水楊梅根 蘇木 商陸 絲瓜絡 續斷 犀角 石決明 蟬退 五加皮 雲母石 瑞砂 烏藥 遠志 靈芝 肉苁蓉 苡米 活腹蛇 活甲魚 降香屑 漆葉連 忍冬 花藥石 蘿藦子 兒茶 毛茛 七爪紅 雙皮 荔子 石燕 肺形草 蝸牛 垂盆草 牡荊子 孩兒參 板藍根 九節茶 生軍 月石 佛手 脫力草 狼毒 金剛刺 紅藤	38	瓜蒌 夏枯草
2	梗米 橘絡 橘葉 橘紅 枸骨葉 血餘炭 合歡皮 海蛤 孩兒茶 虎杖根 滑石 紫丹參 赤小豆 楮實子 辰砂 地龍 紫花地丁 秦艽 大力子 鎖陽 仙靈脾 牙皂 芫花 鴉膽子 羚羊粉 羊蹄根 淫羊藿 牛膝 郁李仁 牛蒡子 大青葉 大戟 大薊 代赭石 土鱉 菟絲子 破故紙 佩蘭 華荻 薄荷 鳳凰衣 白芷 半邊蓮 白礬 礪砂 斑蝥 青黛 沈香 川棟子 劉寄奴 拔契 紫貝齒 衛茅 天漿殼 鷄血藤 薤白 天龍	39	黨參
3	款冬花 桂心 橘皮 卷柏 甲珠 漏蘆 蘆薈 香附子 旱蓮草 蛤殼 皂莢 赤茯苓 地榆 地鱉蟲 石菖蒲 山查 升麻 仙茅 五靈脂 雲苓 雄黃 瓦勞子 烏蛇 藕節 葶藶 羊乳根 木賊 麻仁 馬錢子 玳瑁 巴豆霜 白薇 白前 白豆久 枇杷葉 白芥子 側柏葉 青皮 天葵子 水宮	42	天門冬
4	訶黎勒 橘核 枸杞子 鷄內金 琥珀 丁香 竹葉 竹茹 磁石 桑葉 砂仁 西洋參 山菜英 蛇蛻 石上栝 石打穿 連翹 大蛤散 望江南 冬瓜仁 壁虎 川烏 佛耳草 黃毛二草 黃浮石 白扁豆 谷芽	43	薏苡仁
5	苦參 蘆根 厚朴 黃連 紅花 蛤蚧 枳實 朱砂 細辛 柴胡 麝香 蛇六谷 神曲 晒參 夜交麥 鬱金 野菊花 沒藥 敗醬草 梔子 川椒 鹿角	45	白朮
6	血竭 黃藥子 海帶 小蘗 吳茱萸 肉桂 艾葉 麥芽 澤瀉 澤蘭 八月札 水片	46	半枝蓮
7	龜板 玄胡索 蛇莓 牛黃 王不留行 乳香 木香 土茯苓 白殭蠶 芙蓉葉 白毛藤 補骨脂 川芎 何首烏	48	陳皮
8	知母 留行子 麻黃 藤梨根	50	生地黃
9	乾薑 桂枝 石膏 山慈姑 蟾蜍 阿膠 白芨 白英 附子	52	半夏
10	玉竹 冬蟲夏草 大黃	55	黃耆
11	昆布 黃精 地骨皮 枳殼 徐長卿 天花粉	56	茯苓
12	生薑 石斛 女貞子 太子參 蜀羊泉 紫河車	64	甘草
13	三七 馬兜鈴 穿山甲	65	魚腥草
14	乾蟾皮 赤芍藥	66	貝母
15	紫菀 三稜 蚤休 貓爪草 七葉一枝花	75	麥門冬
16	全蝎 石見穿 龍葵 蒲公英	77	白花蛇舌草
17	黃芩 白芍藥 山海螺 山豆根 蜈蚣 大棗 蜂房	93	沙蔘
18	菝葜 牡丹皮 丹參 白茅根 鐵樹葉		
19	南星 猪苓 仙鶴草 山藥 牡蠣		
20	金銀花 桃仁 鱉甲		
21	前胡		
22	紫草 百合		
23	人參		
25	百部		
27	海藻 玄參 當歸		
28	桔梗		
29	葶藶 生薑 熟地黃		
30	桑柏皮		
31	杏仁 五味子		

### III. 총괄 및 고찰

肺癌은 선진국에서 內臟癌 中 가장 頻發하는 癌이며 우리나라에서도 최근 그 發生 頻度가 급격히 增加하고 있다. 肺癌의 發生率은 年齡 및 性別과 相關 關係를 가지고 있어 40-70歲 사이에 最高의 發病率을 보이고 있으며 男女의 發病 比率은 과거에는 7:1정도로 男性에게 好發하여 高齡의 男性 死亡率의 대다수를 차지하였으나 최근에는 3-4:1로 女性의 發病率도 增加하는 趨勢에 있다.

肺癌의 原因은 분명치 않으나 흡연, 대기오염, 작업장오염, 유전적소인, 비타민 A결핍 등이 유인 으로 추정되고 있다. 그중에서도 흡연이 폐암증가 의 主因으로 여겨지고 있다. 1989년 미국 위생 교육후생성 조사에 의하면 폐암에 있어서 흡연자 의 사망률이 비흡연자에 비해 10.8배나 높다고 한다.

임상적 증상은 일반적으로 처음에는 무증상이지만 암의 進展과 더불어 기침, 가래, 혈담, 객혈, 흉통, 방산통이 나타나며 발열이 있는 경우도 있다. 또한 천식, 호흡곤란 등이 일어나고 결국에는 전신쇠약에 이르게 된다. 또 온몸 곳곳으로 전이하면서 국소증상이 나타나는데 뇌, 골, 부신 등으로 전이하는 수가 많다. 폐암이 흉막에 전이되면 암성 흉막염을 일으킨다. 손가락, 발가락에 곤봉 지가 나타나는 경우도 있으나 이같은 증상은 조직 형에 따라 약간의 차이가 있다.

진단에는 각각증상과 함께 흉부X선사진, 컴퓨터 단층촬영검사, gallium scintigram 등이 행 해진다. 또 확정진단에는 가래의 세포진단, 기관 지경검사에 의한 소견과 기관진찰과 세포진단, 경 기관지 폐생검 등을 실시하고 전사각근 림프절 검 사, 경피폐생검, 개흉폐생검을 실시하기도 한다.

치료는 외과적 절제가 우선이지만 연령, 심폐기 능, 암의 조직형, 전이의 유무 등을 고려하여 방 사선요법이나 항암제요법 등을 실시하며 또 폐암 면역요법도 시도되고 있다.

韓醫學의 으로 肺癌은 咳嗽, 胸痛, 咯血, 體重減 少, 發熱, 胸悶, 氣短 등의 症狀이 나타나는 肺脹 2), 肺咳<sup>3)</sup>, 肺積<sup>4)</sup>, 息賁<sup>4)</sup>, 肺痿<sup>13)</sup>, 勞嗽<sup>6)</sup>, 肺癰 4.11) 등의 範疇에 屬한다고 볼 수 있는데, 특히 金元時代 李東垣이 肺의 積을 治療했던 息賁丸과 宋代 陳無擇이 '肺之積'으로 因한 咳嗽를 治療했던 治方의 症狀이 現代 肺癌의 症狀과 類似함을 볼 수 있다. 또한 明代의 張<sup>25)</sup>은 "勞嗽 聲啞 聲不能 出或喘息氣促者 此肺臟敗也 必死"라 하여 現代 醫 學的의 으로 肺癌으로 인한 末期症狀의 豫後에 대하

여 言及하기도 하였다<sup>10,12)</sup>.

肺癌의 症狀에 立脚하여 韓醫學의 으로 病因 病 機를 살펴보면 張<sup>3)</sup>은 "肺痿之病 從何而得之? 師 曰: 或從汗出, 或從嘔吐, 或從消渴, 小便利數, 或 從便難 又被快藥下利, 重亡津液"이라하여 肺痿證 을 언급하면서 津液의 損傷을, 陳<sup>5)</sup>은 肺의 機能失 調로 인한 氣血이 紊亂을, 趙<sup>8)</sup>는 邪毒을 각각 病 因 病機로 보았고, 최근에 이르러 郁<sup>28)</sup>등은 邪毒 犯肺 외에도 肺氣의 宣降失司로 氣機不暢함을 因 하여 氣, 痰, 瘀 등이 서로 結合하여 肺積을 形成 한다고 하였으며, 余<sup>26)</sup> 등은 邪毒이 犯肺하여 肺 氣가 宣降을 失司하면 氣機가 不暢하여 津液이 不 布하고 積聚가 成痰하며 痰凝氣滯하고 血行受阻하 며 氣滯血瘀하고 絡脈阻滯하며 瘀血凝滯하고 積聚 成核하여 肺癌이 形成된다고 하였고, 周<sup>25)</sup>는 肺의 肅降機能 이상으로 氣가 上逆하면 喘咳를 이루고, 燥熱이 肺陰을 炸하면 火邪刑金하거나, 正氣先虛 로 邪毒犯肺하여 肺氣鬱滯로 絡脈을 阻塞케 하면 점차 氣滯血瘀, 瘀熱內結을 形成한다고 하였으며, 타장기의 영향으로는 脾虛失運으로 溫濕化痰하면 痰瘀鬱肺케 하거나, 腎陰虧損으로 腎水가 滋陰潤 肺할 수 없어 陰虛內熱하면 모두 肺熱葉焦를 造成 하는 氣陰兩虛의 病狀을 나타낸다고 하여 주로 肺, 脾, 腎 三臟이 오장중 폐암과 가장 밀접한 관 계가 있다고 언급하면서, 결국 이러한 三臟의 이 상으로 瘀熱內結, 痰濕鬱肺, 肺熱陰虛 등의 病理 變化가 진행됨으로써 癌類를 形成한다고 하였다. 이 밖에 崔<sup>12)</sup>는 正氣內虛, 毒邪侵肺, 痰濕內聚 등 을 病因으로 보아 人體正氣의 虛弱이 또한 疾病을 일으키는 原因이 됨을 言及하였다.

이를 정리하여 보면 肺의 고유 기능인 宣發肅降 機能失調로 熱毒, 濕, 痰 등의 邪氣가 相結하여 오 래되면 氣滯, 血滯의 病機를 걸치면서 결국 積을 이루며, 이 때 患者의 正氣 狀態에 따라 病症의 輕 重과 豫後가 相異하게 나타난다고 볼 수 있다.

肺癌의 대한 辨證施治를 살펴보면 周<sup>25)</sup> 등은 肺 鬱痰瘀型, 脾虛痰濕型, 氣陰兩虛型 등으로 區分하 여 宣肺理氣 化痰除痰, 滋腎清肺, 化痰散結, 益氣 養陰 扶正祛邪 등의 治法을 使用한다고 하였으며, 張<sup>56)</sup>은 肺癌의 正虛邪實에 根據하여 네가지 類型 으로 구분하였는데, 氣陰兩虛型은 益氣養陰 止咳 化痰하는 益氣清金湯을 사용하고, 脾肺兩虛型은 健脾益胃 潤肺化痰하는 健脾養陰潤肺湯을 사용하 며, 陰虛痰熱型은 滋陰潤肺 清熱化痰하는 二冬保 肺湯을 사용하고, 氣滯血瘀型은 行氣活血 化痰軟 堅하는 化痰軟堅湯을 사용하였으며, 崔<sup>12)</sup> 등은 痰 濕蘊肺 氣血瘀滯, 脾肺氣虛 肺腎兩虛 등으로 區分

하여 주로 脾肺腎 三臟의 虛弱과 痰濕氣血의 瘀滯를 健脾益肺 益氣養陰抗癌, 健脾化痰, 解毒清肺시키는 方法으로 治療한다고 하였다.

余<sup>26)</sup> 등은 臨床治療面에서 크게 祛邪爲主 兼顧扶正과 扶正爲主 佐以祛邪로 구분하여 祛邪爲主 兼顧扶正에 있어서 肺癌은 毒邪積聚가 蘊結하여 된 것이니 祛邪解毒 化痰散結하는 峻厲之藥인 馬<sup>18)</sup>의 肺四號方과 止咳平喘 化痰軟堅 活血化痰 清熱解毒 益氣養陰하는 雷<sup>43)</sup>의 復方新症煎을 使用한 것을 言及하였으며, 扶正爲主 佐以祛邪에 있어서 劉<sup>47)</sup>는 晚期肺癌은 대다수가 '正虛邪實'의 단계로 보아 患者의 正氣虛弱, 病程의 長短, 病理屬性에 따라 陰虛內熱型은 滋陰生津, 氣陰兩虛型은 益氣養陰, 脾虛痰濕型에는 益氣健脾, 陰陽兩虛型에는 滋陰溫陽, 氣滯血瘀型에는 行氣活血하는 辨證施治를 함으로써 滋陰生津, 益氣養陰, 益氣健脾, 滋陰溫陽 등의 扶正培本法을 爲主로 하여 化痰軟堅, 清熱解毒 등의 攻法을 兼用하였고, 陳<sup>27)</sup>도 除痰祛瘀를 爲主로 하되 治法을 初, 中, 末期로 區分하여 明現한 症狀이 없는 初期에는 除痰濕, 活血化痰하는 藥物로 治療하고 비교적 全形的 症狀이 나타나는 中期에는 除痰祛瘀를 爲主로 하고 末期에는 正氣虧虛가 甚하므로 扶正祛邪를 爲主로 하여 除痰祛瘀를 兼하는 治法을 使用하여야 한다고 主張하였다.

그 外 施<sup>29)</sup>는 溫陽補腎하는 治法으로 張仲景의 麻黃附子細辛湯을 使用하여 溫熱藥 治療後 體內 免疫機能의 強化시켜 肺癌을 治療한다고 하였고, 喻<sup>55)</sup>는 肺癌의 病機는 陽虛로 陰盛한 것으로 陰盛하면 寒하여 肺癆邪實의 主要 原因이 되니 溫化法을 위주로 하고 肺脾兩虛型과 肺腎兩虛型으로 變증하여 陽虛가 肺癌의 主 原因임을 언급하였으며, 屈<sup>26)</sup>은 現代 醫學에 準하여 肺癌의 病位와 腫瘤細胞의 分化類型에 따라 抗癌作用의 藥物을 選擇加味하여 辨病治療하였는데, 鱗癌에는 牛蒡子 廣豆根 牡荊葉或牡荊子 天冬 半枝蓮 등의 一方과 紫草根 山豆根 草河車 蚤休 前胡 馬兜鈴 夏枯草 海藻 山海螺 浙貝母 등의 二方을, 腺癌에는 烏骨藤 樹寄生 前胡 苦參 山慈菇 등의 一方과 蜀羊泉 龍葵 菝葜 山海螺 生苡仁 牡蠣 蛇莓 山慈菇 夏枯草 浙貝母 등의 二方을, 未分化癌은 龍葵 白英 白花蛇舌草 雷公藤 乾蟾皮 등의 一方과 徐長卿 半枝蓮 白花蛇舌草 龍葵 土茯苓 仙鶴草 黃藥子 蚤休 野菊花 前胡 馬兜鈴 桔梗 등의 二方을, 淋巴節에 轉移하면 昆布 海藻 山慈菇 등을, 骨에 轉移하면 川烏 漢防己 腫節風 등을, 腦에 轉移하면 蜈蚣 守宮 全蝎 등을, 胸水에는 檳榔 葶藶子를 加하여 使用하여야 한다고 하였다.

이는 肺癌의 治療에 있어 洋方의 治療와는 달리 初期와 末期肺癌에 따라 治法과 治方을 달리하여 應用한 것으로, 다른 癌 治療에서도 그러하듯이 初期에는 주로 祛邪爲主의 治法에 扶正을 兼하였고, 末期에는 扶正爲主의 治法에 祛邪를 兼한 것으로 볼 수 있다.

中國에서는 최근들어 肺癌 早期診斷의 어려움으로 外科 手術의 기회를 잃은 末期 患者의 內科의 治療에 現代醫學의 藥物, 手術, 化學, 放射線療法과 함께 韓藥을 並用 投與하여 임상적으로 확실한 效果가 報告되고 있는데, 劉<sup>47)</sup>는 原發性肺癌 310例를 辨證治療하여 1年 生存率이 43.23%, 2年 生存率이 11.29%, 3年 生存率이 5.16%, 4年 生存率이 1.61%, 5年 生存率이 0.67%라 하였고, 雷<sup>43)</sup>는 肺癌II期 263例中 1年 生存率이 55.89%, 2年 生存率이 28.33%, 3年 生存率이 14.97%, 4年 生存率이 9.55%, 5年 生存率이 6.47%라 하였고 III期 157例中 1年 生存率이 40.76%, 2年 生存率이 21.62%, 3年 生存率이 11.51%, 4年 生存率이 5%라 하였으며, 郭<sup>32)</sup>은 原發性肺癌으로 因한 胸水에 化痰止咳, 清熱解毒, 軟堅散結, 平喘降逆하는 中藥을 使用하여 31例中 3例의 胸水消失, 1例의 胸水減少, 9例의 胸水穩定效果를 보았고, 劉<sup>47)</sup> 등은 中藥으로 原發性 肺癌을 治療한 310例를 報告하여 1年 生存率이 43.2%, 2年 生存率이 11.29%, 3年 生存率이 5.16%, 4年 生存率이 1.61%, 5年 生存率이 0.64%로 平均 生存期間이 12.6個月이라 하였다.

肺癌에 이용된 單方藥에 대하여 劉<sup>47)</sup>는 活血, 止痛, 化痰, 消腫作用이 있는 蟾酥膏을 外用藥으로 使用하여 癌性疼痛을 治療해보려는 새로운 시도가 있었고, 蘇<sup>56)</sup>는 鴉膽子乳劑를 肺癌이 腦에 轉移한 21例에 使用하여 局部 및 全身症狀의 改善과 生存期間을 延長效果를, 楊<sup>59)</sup>은 清熱解毒化痰의 功效가 있는 魚腥草를 血位注射治療劑로 使用하여 末期肺癌患者의 咯血에 대한 치료효과를, 周<sup>25)</sup> 등은 解毒除痰, 涼血養陰, 消癥散結하는 鶴蟾片을 使用하여 抗腫瘍效果와 免疫機能을 上升效과를 각각 보고하였다.

이와 같은 結果는 肺癌에 대한 韓醫學의 治療或 洋方과의 併用 治療가 一定한 效果가 있음을 示唆하고 있어, 向後 早期 檢診과 더불어 多樣하고 效果的인 處方 및 藥物을 中心으로 適切한 治療가 이루어진다면 더 높은 生命延長率과 洋方 治療로 인한 副作用 減少를 이룰 수 있을 것으로 보인다.

本論文中에서 調查되어 收錄된 26種의 文獻中 重

複되지 않은 治方數는 總 277個이며, 治方 構成 藥物은 348種으로 그 中 20回 以上의 頻度를 나타내는 藥物을 살펴보면 沙蔘93回, 白花蛇舌草77回, 麥門冬75回, 貝母66回, 魚腥草65回, 甘草64回, 茯苓56回, 黃耆55回, 半夏52回, 生地黄50回, 陳皮48回, 半枝蓮46回, 白朮45回, 薏苡仁43回, 天門冬42回, 黨蔘39回, 瓜蒌, 夏枯草38回, 杏仁, 五味子31回, 桑柏皮30回, 葶藶, 生薑, 熟地黄29回, 桔梗28回, 海藻, 玄蔘, 當歸27回, 百部25回, 人蔘23回, 紫草, 百合22回, 前胡21回, 金銀花, 桃仁, 鼈甲20回 등의 순으로 나타났는데 이를 藥物은 氣味에 따라 분리하면 解表藥으로 辛溫解表劑 9種 56回, 辛涼解表劑 5種 14回, 瀉下攻下藥 6種 45回, 清熱藥으로 清熱瀉火劑 5種 65回, 清熱涼血劑 6種 231回, 清熱燥濕劑 3種 27回, 清熱解毒劑 11種 229回, 利水滲濕藥 7種 131回, 祛風濕藥 6種 18回, 溫裏祛藥 5種 29回, 芳香化濕藥 3種 9回, 理氣藥 8種 84回, 理血藥으로 止血劑 14種 90回, 活血劑 22種 156回, 補養藥으로 補氣劑 22種 302回, 補血劑 7種 93回, 補陰劑 10種 297回, 固澀藥 6種 40回, 安神藥으로 重鎮安神劑 4種 34回, 養心安神劑 3種 8回, 芳香開竅藥 2種 12回, 鎮痙熄風藥 4種 41回, 化痰止咳藥으로 清熱化痰劑 10種 154回, 溫化寒痰劑 6種 102回, 止咳平喘劑 6種 118回, 消導藥 4種 18回 驅蟲藥 2種 2回, 外用藥 5種 41回 등으로 分類되었다. 정리하여보면 약물에 있어서는 清熱解毒類인 白花蛇舌草, 貝母, 魚腥草와 肺陰을 補하는 沙蔘 麥門冬 및 脾胃를 補하는 黃芪 茯苓 甘草등이 多用되어, 攻法으로는 주로 清熱解毒法이, 補法으로는 滋陰生津法과 益氣健脾法이 多用되었고, 辨證에 따라 清熱化痰, 溫化寒痰, 止咳平喘, 活血, 解表藥, 利水滲濕藥, 止血藥 등이 併用되었음을 알 수 있다.

#### IV. 결 론

肺癌의 韓醫學의 治療에 대하여 歷代文獻를 중심으로 檢討한 결과 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 韓醫學의 肺癌은 臨床症狀上 肺脹, 肺咳, 肺積, 息賁, 肺痿, 勞嗽, 肺癰 등의 範疇에 屬한다고 볼 수 있다.

2. 肺癌의 病因病機는 人體의 正氣가 虛弱한 상태에서 濕, 痰, 瘀, 熱 등의 內聚로, 肺의 宣發 肅降機能이 失調되어 氣滯血瘀, 痰濕內聚함으로써 腫塊를 形成한다고 볼 수 있으며, 臟腑는 脾, 肺, 腎 三臟이 밀접한 관계가 있고, 患者의 正氣 狀態

에 따라 病症의 輕重과 預後가 相異하게 나타난다고 볼 수 있다.

3. 肺癌의 治法은 滋陰生津, 益氣養陰, 益氣健脾, 滋陰溫陽등 扶正培本을 爲主로 하고 化痰軟堅, 清熱解毒, 活血化瘀 등의 治法을 兼하는데, 肺癌의 初期에는 解毒祛邪, 中期에는 攻補兼施, 末期에는 補虛扶正的 治法을 主로 使用하였다.

4. 肺癌治療에 사용된 277種 治方에서 多用된 藥物은 清熱解毒祛痰하는 白花蛇舌草, 貝母, 魚腥草와 補肺陰하는 沙蔘 麥門冬 및 補益하는 黃芪 茯苓 甘草등으로 나타났다.

5. 肺癌治療 277種 治方中 10回 以上의 頻도가 있는 藥物의 本草學의 分類로는 補養藥 23種, 化痰止咳藥 14種, 清熱藥12種, 理血藥 8種, 利水滲濕藥 3種, 理氣藥 2種, 瀉下藥 2種, 安神藥 2種 등으로 나타났다.

6. 肺癌의 治療方은 脾肺兩虛型에 六君子湯合補肺湯加味, 六君子湯合桔梗湯加味등, 肺熱陰虛型에 沙蔘麥門冬湯加減, 百合固金湯加減 등, 痰濕瘀阻型에 千金葶苈湯加減 등, 氣血瘀滯型에 血府逐瘀湯加減, 桃紅四物湯合烏金散加減 등, 氣陰兩虛型에 月華湯加減, 四君子湯合清燥救肺湯加減, 生脈散合補肺湯加味 등, 肺腎兩虛에 麥味地黃湯合二母寧嗽湯加減 등이 사용되었다.

#### V. 참고 문헌

1. 王琦 : 素問今釋, 貴州人民出版社, pp.103, 121, 159, 184, 223, 1981.
2. 洪元植 : 精校黃帝內經素問, 서울, 東洋醫學研究員出版部, pp.38, 128, 178, 1995.
3. 楊向輝 : 金匱要略主釋, 國立編譯館出版, pp. 89-101, 1995.
4. 陳三良 : 難經譯釋, 昭人出版社, p.188,
5. 陳言 : 欽定四庫全書中 三因極一病證方論, 서울, 大星文化社, pp.338- 339, 1995.
6. 嚴用和 : 醫部全錄中 卷7 濟生方, 人民衛生出版社, p.2067, 2068, 1983.
7. 李挺 : 編註醫學入門 雜病編, 大成文化社, p. 144, 145, 1984.
8. 余桂清 : 歷代中醫腫瘤案論選粹, 서울, 北京出版社, pp.377-392, 1993.
9. 秦景明 : 症因脈治, 旋風出版社, p.30, 31, 1967.
10. 崔昇勳 : 東醫腫瘍學, 杏林出版社, pp.207- 218, 1995.
11. 張民慶 : 腫瘤良方大典, 安徽科學技術出版社, pp.54-71, 1994.

12. 王擘玉：實用腫瘤臨床，中國醫藥科技出版社，pp.94-102, 1995.
13. 張伯史：中醫內科學，上海，上海科學技術出版社，pp.71-75.
14. 李岩：腫瘤臨證備要，人民衛生出版社，pp.263-268, 1989.
15. 가신제：癌症效方240首，北京醫科大學，中國協和醫科大學聯合出版社，pp.10-25, 1993.
16. 孫秉嚴：臨床經驗治療腫瘤，辭學出版社，pp.113-123, 1993.
17. 張宗岐：臨床腫瘤綜合治療大典，奧林匹克出版社，pp.131-145, 1995.
18. 孟琳升：中醫治癌大成，北京科學技術出版社，pp.383-393, 1995.
19. 周國平：癌症秘方驗方偏方大全，中國醫藥科技出版社，pp.61-100, 1994.
20. 樊中州：腫瘤疾病千首妙方，中國人口出版社，pp.159-190, 1993.
21. 楊今祥：抗癌中藥의 臨床應用，人民衛生出版社，pp.208-216, 1981.
22. 牛孺子：癌症治驗錄，中醫古籍出版社，pp.72-106, 1994.
23. 湯鈞猷：現代腫瘤學，上海醫科大學出版社，pp.390-396, pp.611-617, 1993.
24. 李尚仁：漢藥臨床應用，서울, 成輔社, 1986.
25. 周岱輪外：鶴蟾片治療肺癌臨床研究報告，新中醫，第4期 p.34, 1986.
26. 余志强外：中醫藥治療原發性肺癌的近況，陝西中醫，第12卷，第1期，p.42, 43, 1991.
27. 陳玉琨外：除痰祛瘀法治肺癌的理論認識及臨床應用，新中醫，第1期，p.10, 11, 1993.
28. 郁仁存：中醫腫瘤學，科學出版社，pp.274-283, 1991.
29. 李家康外：中醫腫瘤防治大全，科學技術文獻出版社，pp.287-298, 1994.
30. 梁學強：楊少山老中醫治療肺癌驗案，福建中醫藥，第23卷，第4期，p.6, 1992.
31. 馬廷行：滋陰清熱解毒法治療肺癌240例療效比較，山東中醫雜誌，第11卷，第1期，p.31, 1992.
32. 郭松云外：52例原發性肺癌合并胸水的臨床分析，上海中醫藥雜誌，第10期，p.8, 1986.
33. 李文鎬：內科學上卷，博愛出版社，pp.1613-1619, 1976.
34. 大韓病理學會：病理學，高文社，pp.620-626, 1995.
35. 김문중：癌化學的療法，光州，서광의학서림，pp.241-143, 1991.
36. 韓鏞微：臨床呼吸器學，一湖閣，pp.278-293, 1990.
37. 瞿漱芬：420例肺癌中醫辨證分型與臨床病理分型的關係，中西醫結合雜誌，第11期，pp.21, 22, 1984.
38. 張倫：肺癌舌象的臨床研究，新中醫，第7期，pp.34-35, 1987.
39. 唐文秀外：391例晚期原發性肺癌中醫辨證分型與療效的關係，中西醫結合防治腫瘤抗癌中草藥學術會議論文集，p.9, 1987.
40. 李永光外：氣至病所治療肺癌的初步研究，中國鍼灸，第3期，p.24, 25, 1989.
41. 辛育齡：211例中晚期肺癌的臨床療效分析，中國中西醫結合雜誌，第13卷，第3期，p.135, 1993.
42. 周繼友外：中西醫結合治驗肺癌，四川中醫，第11期，p.16, 1990.
43. 雷永仲外：中醫藥治療肺癌的臨床觀察，中醫雜誌，第2期，p.25, 26, 1988.
44. 張倫外：肺癌237例的辨證論治，新中醫，第12期，p.24, 25, 1985.
45. 于德庭外：晚期肺癌辨治舉隅，江寧中醫雜誌，第5期，p.31, 1991.
46. 任華外：100例小細胞肺癌的治療分析，中華醫學雜誌，第69卷，第5期，p.300, 1989.
47. 劉嘉湘外：辨證治療原發性肺癌310例療效分析，上海中醫藥雜誌，第10期，p.3, 4, 1985.
48. 張倫外：肺癌舌狀的臨床研究，新中醫，第7期，p.34, 35, 1987.
49. 梁毫外：化痰散結丸治療周圍型肺癌一例，新中醫，第3期，p.36, 1990.
50. 朴炳奎外：肺癌平膏治療晚期原發性肺癌臨床觀察，中醫雜誌，第4期，pp.21-23, 1991.
51. 施志明：溫陽補腎治肺癌，上海中醫藥雜誌，第11期，p.14,15, 1990.
52. 李杲：醫部全錄中 卷7 東垣十書，人民衛生出版社，p.2083, 2084, 1983.
53. 張子和：醫部全錄中 卷7 儒門事親，人民衛生出版社，pp.2067-2069, 1983.
54. 載元禮：醫部全錄中 卷7 證治要訣，人民衛生出版社，p.2072, 1983.
55. 喻全翰：成都中醫學院學報，第3期，p.19, 1987.
56. 張書林：陝西中醫，第12期，p.536, 1988.
57. 蘇守元：中西醫結合雜誌，第2期，p.86, 1985.
58. 范忠澤：上海中醫藥雜誌，第11期，p.24, 1988.
59. 楊維泓外：血位注射治療肺癌咯血40例，遼寧中醫雜誌，第2期，p.30, 1992.