

가정에 국한된品行장애 1례

A CASE OF CONDUCT DISORDER CONFINED TO FAMILY CONTEXT

정 선 주* · 조 수 철*

Sun-Ju Chung, M.D.,* Soo-Churl Cho, M.D.*

요 약 : , ICD - 10
가
, 가 가

가 가 가

중심 단어 : 가 .

서 론

DSM - II (APA 1968)
(conduct disorder) 가 (unsocialized aggressive reaction), 가
(runaway reaction), (group delin-
quent reaction) . DSM - III
6 16%, 2 9%가 (APA 1980)
3.8% (1994) 4
. DSM - III - R (APA 1987)
가
가 DSM - III
(undersocialized - aggressive)
가 (socialized - aggressive)
(solitary aggressive),
DSM - I (APA (group type) (undifferentiate)
1952) ' (sociopathic personality) ' 가 DSM - IV (APA 1994)

Department of Child Psychiatry, Seoul National University Hospital, Seoul

disorder) (disruptive behavior disorder) ICD - 10 가 가
 . 가 가
 10 가 가
 (Childhood - onset) 가 가
 (Adolescent - onset) ICD 가 가
 (International Classification of Disease) 가 가
 (juvenile delinquent)(ICD - 7), 가 가
 (Juvenile truancy)(ICD - 8), 가 가
 (unsocialized conduct disorder) 가 가
 (ICD - 9 1978) ICD - 10(WHO 가 가
 1992) 6 가 가
 . 6 가 가 가 가
 (conduct disorder confined to the family context), 가 가
 (undersocialized conduct disorder), (socialized conduct disorder), (WHO 1992). 가 가
 order), (other conduct disorder) 가 가
 (unspecified conduct disorder) . DSM - IV ICD - 10 (nosological) ICD - 10
 15 가 가
 3 6 가 , 가
 가 증 례
 . DSM - III - R 1. 주소 5 가
 ICD - 10 8 1 가
 (socialized/unsocialized) 가 가
 DSM - IV 2. 발달력
 가 가
 가 가
 가 , 가 ,) (3.6kg .
 가 , 가 가
 가 (Loeber & Dishion 1983, APA 1994). 1

가 가 가 가 .
 가 가 .
 가 가 가 가 .
 가 가 가 가 가 .1
 가 가 .
 가 가 가 가 가 가 .
 , , 가 가 가 가 .
 가 가 가 가 가 가 가 가 1 1 .
 가 가 3 가 6 100 가 . 1
 가 가 가 가 2 3
 5 가 .2
 가 가 .
 6 가 가 .
 7 100 1 2 3 가 가 가 .
 100 가 100 1 가 가 가 가 .
 . 가 가 .
 가 가 .
 가 가 가 가 가 가 .
 가 가 .5 가 가

가 . 가 . 가 . (-)
가 가 , ,)

2

가

6

가

가

가

5. 정신상태검사 및 심리검사결과

6. 신체이학적 검사 및 검사실 검사소견

가

7. 치료 및 경과

4

3

가 가
가 가

가 가

가 가

가 가
가

KEDI - WISC

106,

102,

105

haloperidol 1mg .
가 가 가가 .
3 가 가 가 .
가 . halo -
peridol 가 Imipramine 25mg
5 .
가 가 .
가 가 . 2
가 가 . 8
가 가 가 가 .
가 가 .
4 가 .
가 가 가 가 .
가 가 가 .
가 가 가 가 .
가 .
10 Imipramine 25mg tegretol 400
mg 가 .
4 가 가 가 가 .
가 가 가 가 .
가 가 가 가 가 .

가 . Ativan 가 .

2mg 가 가 .

가 (Brown 1984 ; Farrington 1978 ; Patterson 1982 ; Voorhis, Cullen, Mathers, & Garner 1988)가

가

가 imipramine 가 (Turning a passive role into an active role)

50mg, tegretel 400mg

고 찰 가 (identification with aggressor)

가

가 가 (Lewis 1996).

가

6 ICD - 10 가 가 .

가 가

가 가 가

가 가 Halperin (1979)

가

가 / , . Green(1985)

가 . 가 가 가 가
가 . 가 가
. Holland(1993)
가 (Response
가 program)
6 가 가
가 가
가 (parent
management training)(Reid Patterson 1991 ;
Patterson 1982)
가 가 가
가 가 가
가 가 가 (stability)
가 가 가 가
가 가 (Functional family therapy)
(Kazdin 1987 ; Wells and Egan 1988) Hamdan - Allen (1989) /
가 가 / (pervasive/
가 situational) (aggressive)
가 ADHD 가

- Reid JB, Patterson GR** (1991) : Early prevention and intervention with conduct problems : A social interaction model for the integration of research and practice. In : Stoner G, Shinn MR, Walker HM (eds) : Interventions for Achievement and Behavior Problems. Silver Spring, MD, The National Association of School Psychologists, pp715
- Voorhis PV, Cullen FT, Mathers RA, Garner CC** (1988) : The impact of family structure and quality on delinquency : A comparative assessment of structural and functional factors. *Criminology* 26 : 235-248
- Wells KC, Egan J** (1988) : Social learning and systems family therapy for childhood oppositional disorder : Comparative treatment outcome. *Compr Psychiatry* 296 : 138-146
- World Health Organization** (1978) : Mental Disorders : Glossary and Guide to Their Classification in Accordance with the Ninth Revision of the International Classification of Diseases. World Health Organization, Geneva
- World Health Organization** (1992) : Mental Disorders : Glossary and Guide to Their Classification in Accordance with the Tenth Revision of the International Classification of Diseases. World Health Organization, Geneva

ABSTRACT

Korean J Child & Adol Psychiatr 8 : 287~297, 1997

A CASE OF CONDUCT DISORDER CONFINED TO FAMILY CONTEXT

Sun-Ju Chung, M.D., Soo-Churl Cho, M.D.

Department of Child Psychiatry, Seoul National University Hospital, Seoul

Conduct disorder has been subclassified by the symptom characteristics of socialization, aggression, or age of onset. In ICD-10, 'Conduct disorder confined to family context' has been developed as a distinct subtype. Which delineates the conduct problems which take place only in the family and related situation.

These authors experienced a case which presents a child who shows aggressive and violent behavior to his parent and brother, severe temper tantrum and destructiveness only in family. By through history taking, observation and treatment after admission, we could find that insecure and ambivalent attachment between parent and child due to chronic neglect and abuse, and inconsistent parental behavior contribute to many behavioral and emotional problems of this child. We reviewed the relationship between conduct disorder and family pathology and treatment strategy for conduct disorder with family problems.

KEY WORDS : Conduct disorder · Family · Attachment.