

盲腸炎의 治療要方

故) 崔容學
(釜山 홍산당 한약방)

1. 盲腸炎의 現代醫學的인 原因

盲腸炎의 原因은 여러가지 說이 있으나 二重球菌, 連鎖狀菌, 大腸菌과 같은 細菌의 錫染으로 發生한다. 곧 이것이 충양돌기에 附着 繁殖하여 發生하는 일이 가장 빈번하다. 元來 淋巴瀘泡가 많고 狹小한 空間과 弯曲傾向을 가진 忠樣突起에 便秘, 糞石, 異物(寄生蟲도 包含)等으로 腸內 客物의 停滯와 粘膜이 損傷된때 或은 大腸의 炎症이 蟲樣突起에 移行하여 細菌 感染이 된때에 發生하는 것이라고 본다. 感氣, 過飲, 過食, 激烈한 運動 等이 誘引이 되며 家族的 關係도 있는데 大概 便秘 傾向이 있는 사람에게 發生하기 쉽다고 보는것이 一般的 見解이다. 症狀은 一定하지 않으나 大概 急激한 腹痛을 隨伴하여 突發하는 것이 恒例인데 最初에는 疼痛이 臍部 胃部 等에 있고 惡心 嘔吐를 兼해서 胃痙攣 胃加答兒 等으로 誤認도가 쉬우나 次次 疼痛이 肝臟部에 局限되며 一定 部位에 壓痛과 腫脹을 發見한다. 또는 때때로 發熱을 兼하며 舌苔가 있고 便秘와 鼓腸 傾向이 있다. 以上이 代表的 症狀이나 盲腸炎의 危險한 것은 短時日에 繢發하는 穿孔性 腹膜炎이 發生함으로 手術을 施行하고 있다.

2. 漢方 治療法

漢方 痘名은 解剖學的 乃至 細菌學的 痘名이 아니고 症狀群인 痘의 指稱에 지나지 않기 때문에 盲腸炎의 漢方病名은 一定하지 않으나 腸癰, 血癰 等 名으로 取扱되고 있다. 그러나 腸癰이라고 모두 盲腸炎인 것이 아니고 盲腸炎이라고 또한 血癰症은 아니다. 盲腸炎의 漢方 治療法은 다른 諸般症에 對한 것과 마찬가지로 痘名에 對한 施治가 아니고 痘의 陰陽虛實에 依하여 一定치 않으나 特有한 痘이 整備된 痘이므로 治療가 比較的 簡單하고 慢性보다 急性이 더욱 效果가 顯著한 것이 特色이다. 筆者가 經驗한 盲腸炎 中에는 當場 手術을 要하는 急迫한 症勢일수록 韓藥 效力은 奇妙하여 一二貼으로 能히 危機를 免하는 일이 많다
(急性 盲腸炎)

急性 盲腸炎의 治療 原則은 停滯된 腸 內容物을 排泄시키고 炎症을 消散하는데 있으므로

다음 藥性 主劑로 쓴다.

- ① 寒性下劑 : 腸 內容物 排泄과 寒涼性으로 消炎作用을 한다.
- ② 寒性破血及 活血之劑 寒性으로 消炎作用을 하는 同時に 血循을 敏活하게 하여 局部的 充血 機轉을 抑壓하여 二次의으로 消炎作用을 招致한다
- ③ 利尿劑 : 利尿로 因하여 毒素 排泄을 促進시키며 따라서 消炎된다.
- ④ 清肝劑 : 盲腸의 部位가 側腹部이기 때문에 經路上 肝經에 屬하는 痘이라고 봄으로서 清肝하는 藥이 肝의 職分인 防禦와 解毒作用을 助長해서 清肝劑는 即清血, 破血, 活血과 相通하여 消炎作用을 呈한다고 볼 수 있다. 炎症이 회盲部에 局限되어 腸骨窩에 肿大를 觸知하고 自發的 腹痛과 特有의 厥痛이 있고 腹壁 聚張 舌苔, 乾燥, 口渴, 脈數 或 洪數, 有熱, 便秘等 症, 急性 盲腸炎이 定型的 初期 症狀일때는 (大黃, 牧丹皮 湯)

冬瓜子 三戈, 牧丹皮, 桃仁, 芒硝 各 二戈 大黃 一戈(或 二三戈) 上方을 二三貼 쓰면 粘液膿性下痢를 數次한 뒤에 診斷的 治癒 經過를 取하는 것이 通例이니 本方은 急性 盲腸炎의 代表的 方文인 同時に 實로 特效藥이라고 할만한 것이다. 여기에 注目할 것은 洋方에서는 急性 盲腸炎에 對하여 炎症을 周圍에 擴散시켜서 危險한 穿孔性 腹膜炎을 繼發할 念慮가 있다고 해서 泄瀉는 絶對 禁物로 되어 있으며 도리어 阿片等屬의 腸管 麻痺藥을 使用하는데 比하여 韓方에서는 이와 正反對인 通下를 治療手段으로 하는 것이다. 이 것이 洋方과 根本의으로 다른 點이니 洋方에서는 原因에 便秘, 糞石 等 腸內 停滯를 들고 治療에는 이와 反對의手段을 取하는 矛盾을 犯하고 있다. 洋方이거나 韓方이거나 炎症을 除去하려는 目的是 同一하나 前者는 腸을 刺戟하여 運動運動을 助長시키는手段은 絶對不可 하다하여 泄瀉는 禁하나 이것은 消極的 糊塗策에 不過하니 이런 方法으로 根治를 期하지 못하면 結局 非自然의 手術을 要하게 된다. 여기에 對하여 後者は 同一한 痘 除去를 為한手段이기는 하나 起炎 根源인 停滯物, 排泄을 徹底한 蕩滌을 加하여 恒常 診斷的 治癒를 收하니 洋方에 比較하면 積極的 拔本策이오 合理의 手法인 것이다. 그러면 盲腸炎을 덮어놓고 泄瀉藥만 쓰면 되느냐 하면 絶對로 그러한 것은 아니니 肾子油나 其他 下劑를 使用하면 洋方에서 보는 바와 같은 炎症擴散結果를 보기쉬운 것이다. 여기에 漢醫學의 獨特한 境地를 보이는 것이니 便秘하고 單純히 下劑를 쓴다든지 되는대로 쓰는 것이 아니고 時期와 症을 따라서 써야되는 것이다 大黃 牧丹皮湯과 類似한 處方으로 다음 方文이 있다

(玉燭湯)

當歸, 川芎, 白芍藥, 生地黃, 大黃, 芒硝, 甘草

(桃仁 承氣湯)

□ 학술

大黃, 三戈, 桂心, 芒硝, 各二戈, 甘草, 一戈, 桃仁 十枚

上三方의 禁忌症은 다음과 같다.

1. 汎發性 腸炎의 危險이 있을 때
2. 脈이 細弱, 頻數할 때
3. 高熱이 있고 元氣가 없을 때

大體로 化膿하여 汎發性 腹膜炎이 될 應慮가 있을 때는 大黃, 芒硝 等 下劑는 腸에 刺戟을 주어서 危險하기 때문에 上二味를 빼고 쓰든지 다음 方文을 쓰면 좋을 것이다.

(腸癰湯)

牧丹皮, 桃仁, 各 二戈, 冬瓜子, 蕃蕷 仁 各 三戈

上方에 或 加赤芍藥 三戈한다

本方은 盲腸炎의 比較的 輕症 또는 炎症이 廣範圍일때에 쓰면 좋을 것이다.

(甲子湯)

桂枝, 赤茯苓, 牧丹皮, 桃仁, 赤芍藥, 各一戈五分, 甘草 五分入于三

上方도 腸癰湯과 類似하니 比較的 輕症 또는 亞急性 或은 慢性 盲腸炎으로 回盲部 牽引痛이 있을때에 쓰는 藥이다. 小便이 赤澁 不利한 때는 다음 方文을 쓴다

(大分清飲)

赤茯苓, 澤瀉, 木通 各二戈, 猪苓, 茄子, 枳殼, 車前子, (依本方에 症을 따라서 草龍膽 大黃, 青皮, 紅花 等을 加用)

(龍膽瀉肝湯)

草龍膽, 紫胡, 澤瀉 各一戈, 木通, 車前子, 赤茯苓, 生地黃, 當歸, 山楂子, 黃芩, 甘草, 各五分

(慢性 盲腸炎)

慢性 盲腸炎은 當場 手術을 要하는 것은 아니다. 恒常 盲腸部에 肿瘤와 多少의 疼痛牽引感 等이 있으며 消化不良, 元氣 虛脫, 腹部無力感 等이 있어서 羊方에서는 適當한 時期를 擇하여 亦是 手術을 加함으로서 根治策을 삼는다. 그러나 漢方은 急性에 卓效가 있을뿐 아니라 慢性에 強力한 治癒作用을 하는 藥이 많으니 例示하면 다음과 같다

(薏苡仁附子敗醬散)

薏苡仁 二戈五分, 敗醬 一戈五分, 附子 五分

(敗醬湯)

敗醬 五戈, 蕃葵仁, 當歸 各二戈, 白芍藥, 川芎, 各一戈

以上列舉한 急性及 慢性 盲腸炎에 對한 方文 이외에도 體質과 症을 따라서 應用하는 藥이
限量 없이 많으나 너무 活煩함으로 大鋼 이만 그치고 다음 急性盲腸炎의 代表 方文인 大黃 牧
丹皮湯에 對한 現代醫學的 藥理作用을 暫間 檢討해 보기로 합니다.

大黃牧丹皮湯의 藥材成分及 作用

藥 材	主 成 分	作 用
冬 瓜 仁	우레이제(uneace) 히스터딘(Pistulin)	利 尿 血管收縮(消炎)
牧 丹 皮	安息香酸(Benyoescancn) 푸로스틸린(Phgloctelin)	殺 菌 利 尿
桃 仁	아미그달린(Amygealin)	殺 菌, 鎮 痛
芒 硝	硫酸曹達(Nalcinmbulkulcum) 안트라컨 配糖體(Antlagenglgkoxide)	瀉 下 瀉 下
大 黃	유酸(Gelance) 苦味質(Bitlbrokgr)	收 敛(消 炎) 健 胃

各 藥材의 成分이 아직 完全히 알려지지 않았으나 上表中 主成分만 보더라도 瀉下作用 以外에도 利尿, 殺菌, 消炎作用이 있어서 現代醫學의 見地로도 넉넉히 急性盲腸炎에 確實히 效果가 있을 것을 首肯할 것이다

