

## 痔瘡과 痔瘻에 對한 文獻的 考察

盧鉉贊 · 盧石善\*

### ABSTRACT

#### A Literatural study on the hemorrhoids and hemorrhoids complicated by anal fistula.

No Hyun- chan · Roh Sek-seon

A Literatural study on the etiological factors, classification, prescription of hemorrhoids and hemorrhoids complicated by anal fistula following results were obtained.

1. The cause of hemorrhoids are long time sit, long time gate, overfatigue, overeating, imbalance of stool( constipation or diarrhea), pregnant fertility(overfatigue after childbirth, insufficiency of middle warmer energy), uncontrol sexual excess, pathgenic factors of wetness, heat, wind, dry, genetic cause, excess of anxiety, pile up of heat poison, weakness of entrails and viscera.

The cause of hemorrhoid complicated by anal fistula are attack of external wind, heatness, dry, fire, wetness(pathgenic factors), inapporiate treatment and chronic disease, greasy diet, excess of anxiety, constipation, uncontrol sexual excess, obstacle of circulation of vital energy and blood on anal site.

2. Classification of hemorrhoids are female hemorrhoids, male hemorrhoids, pulse hemorrhoids, intestines hemorrhoids, vital energy hemorrhoids, wine hemorrhoids, blood hemorrhoids, flowing hemorrhoids.

Classification with other method are external hemorrhoids, internal hemorrhoids, mixed

---

\* 大田大學校 韓醫科大學 外官科學教室

hemorrhoids, excrescence hemorrhoids, nipple hemorrhoids. External hemorrhoids is classified of varicosis of hemorrhoidal vein, connective tissue form, thrombus form.

Classification of hemorrhoid complicated by anal fistula are simple lower hemorrhoid, lower mixed hemorrhoid, deep hemorrhoid, outer of one hole hemorrhoid, a horseshoe hemorrhoids.

Once more classified of four are space of sphincter muscle form, penetration sphincter muscle form, upper of sphincter muscle form, outer of sphincter muscle form.

3. Therapy method of hemorrhoid and hemorrhoid complicated by anal fistula are internal method, fumigation method method, ointment, method of close with medicine, necrotizing method, hot medicated compress (external method), injection, insertion, bind, (operation) and acupuncture therapy (the others method)

4. Herb medicine for many used of internal method are *Scutellaria baikalensis* George(黃芩), *Coptis japonica* Makino(黃連), *Rehmania glutinosa* Liboschitz ex Fischer & Meyer(生地黄), *Poncirus trifoliata* Refinesque(枳殼), *Sanguisorba officinalis* Linne(地榆), *Sophora japonica* L.(槐花), *Cnidium officinale* Makino(川芎), *Astragalus membranaceus* Bunge(黃芪), *Angelica gigas* Nakai(當歸).

5. Herb medicine for many used of fumigation are *Schlechtendalia Chinesis* J. Bell(五倍子), *Artemisia Vulgaris* L. var *indica* Maxim(艾葉), *Poncirus trifoliata* Refinesque(枳殼), *Nepeta japonica* Maximowicy(荊芥).

And herb medicine for many used of ointment are *Calomelas*(輕粉), *Alum*(白礬), *Boswellia carterii* Birdwood(乳香), *Os Draconis Fossilia Ossid Mastodi*(龍骨).

## I. 緒 論

痔라는 것은 痔瘡 혹은 痔核을 가리키는데, 《醫學綱目》<sup>1)</sup>에서 痔에 관한 설명을 볼 것 같으면 “如大澤中吸小山突出爲痔. 人于九竅中, 凡有小肉突出皆曰痔, 不獨于肛門邊也. 有鼻痔, 眼痔, 牙痔等.” 라 하여 痔는 肛門뿐만 아니라 九竅中에도 있는 것이나, 주로 痔瘡, 痔核이라 指稱하는 것은 肛門, 直腸에 生한 것이다. 痔의 典型的인 症狀으로는 肛門, 直腸에 血管瘤의 양상을 띤 痔核이 突出되는 것이다.

洋方<sup>3)</sup>에서의 痔核은 肛門관내의 점막하층에 혈관, 평활근, 탄력 및 결합조직을 함유한 배변시 충격완화조직이지만, 지주조직의 변성으로 점막하층의 분리성 종괴를 이루어 肛門관내층에서 하향 이동되며, 대개 출혈이나 탈홍의 증상을 보이며, 특히 배변시 힘쓰는 것과 괄약근, 특히 내괄약근의 기능부전 등으로 치정맥총 및 동맥세지, 주위의 지주조직에 자극을 줌으로 초래되는 것이라 하였다.

일찍이 《黃帝內經·素問生氣通天論》<sup>2)</sup>에서 “因以飽食, 筋脈橫解, 腸澀爲痔.” 라 하였고, 《黃帝內經·素問骨空論》<sup>2)</sup>에서 “督脈生病, 癰痔.” 라 하였으며, 《金匱要略·五臟風寒積聚病脈證篇》<sup>4)</sup>에서 “小腸有熱者, 必痔.” 라 하였다.

그리고 漏라는 것은 모든 瘡이 破壞된 후 孔竅가 不睦하여 안으로 管道를 이루어 膿水가 계속해서 나오는 것을 말한다.

특히 肛瘻라는 것은 肛漏, 痔瘻또는

痔漏라고도 칭하는데, 이는 肛門周圍의 癰疽가 潰爛된 後에 膿水淋漓하고 久不收斂하여 癰管을 이루는 것을 말한다. 《千金要方》<sup>5)</sup>에서 瘻가 癰疽의 後患으로 나타나는 疾患으로 指稱하여, “一切癰疽, 皆是瘡瘍本身所患. 癰之後膿汁不止, 得冷卽爲鼠瘻.” 라 하였고, 《奇效良方》<sup>6)</sup>에서는 漏는 가히 臂를 穿하고, 腸을 穿하고, 陰을 穿하며, 肛門中에도 生하여 다시 雜瘻를 形成한다 하였다.

양방<sup>3)</sup>에서의 치루는 육아조직으로 된 섬유성 관으로 항문관이나 직장내 내공(1차 누공)이 있고 항문주위피부에 1개 또는 그 이상의 외공(2차 누공)을 가지는 것으로, 내공이나 외공이 없이 한쪽 끝만 열린 누관은 동(sinus)이며, 자주 맹루라하여 치루에 포함시킨다.

이후 本論에서는 痔瘡과 痔漏에 대하여 文獻考察함에 있어 먼저 그 原因에 대한 여러 文獻을 綜合하여 結論을 얻고, 아울러 洋方에서의 原因을 서술하며, 다음은 痔瘡과 痔漏의 分類方法과 症狀를 韓方的, 洋方的으로 접근하고, 다음으로는 痔瘡과 痔漏의 治療法을 韓方的으로 간단히 소개하며 특히 痔瘡과 痔漏의 治療에 있어 요즘 많이 시행되는 手術療法의 古典治療法의 내용을 간단히 소개하겠다.

그리고, 本論에서 痔瘡과 痔漏의 治療法 중에서 內治法(內服方)과 外治法 중 熏洗法, 外敷法에 쓰이는 각 文獻의 處方들을 중점적으로 소개하고, 處方은 각주로 처리하여 그 處方 내용을 말하였다. 그리고, 기타 治療法인 鍼灸法도 소개하겠다.

## II. 資料調査 및 研究方法

### 1. 資料調査

韓醫學의 歷代文獻중 《黃帝內經》<sup>2)</sup> 으로부터 最近의 《方證新編》<sup>2)</sup> 및 洋方書籍인 《대장항문학》<sup>3)</sup> 에 이르기 까지 총 35種의 文獻을 選定하여 痔瘡과 痔漏의 原因, 分類方法 및 治療法, 그 중에서도 內治法, 外治法(熏洗法, 外敷法)을 중시하여 그에 대한 文獻의 여러 部分들을 拔萃하여 이를 研究대상으로 삼았다.

### 2. 研究方法

첫째, 痔瘡과 痔漏의 原因을 여러 文獻의 내용을 종합하여 韓,洋方的으로 定理하였다.

둘째, 痔瘡과 痔漏를 韓方(東醫寶鑑 및 近間書籍), 洋方(대장항문학)의으로 그 症狀에 따른 分類를 하였다.

셋째, 痔瘡과 痔漏의 治療方法에 대하여 언급하고, 그 중에서 특히 內治法, 外治法(熏洗法, 外敷法), 그리고 기타로 鍼灸法을 整理하였다.

각 文獻에 있는 痔瘡과 痔漏의 治療方을 內,外治方로 分類하고 外治方은 다시 熏洗法과 外敷法의 方으로 나누어 각 處方은 각주로 처리하여 그 處方의 構成과 主治, 服用法 및 熏洗나 外敷의 方法을 자세히 언급하였다.

그리고 總括 및 考察과 結論에서는 각 處方에서 많이 쓰이는 藥物의 頻度를 조사하여 많이 쓰이는 藥物의 主治 및 效能을 《新編中藥大辭典》과 《本草學》의 내용을 정리하여 언급하였다.

## III. 本 論

(本論 생략)

## IV. 總括 및 考察

本論에서 痔瘡과 痔漏의 原因, 治療法 중 內治法과 熏洗法, 外敷法 등의 外治法에 관하여 處方 爲主로 자세히 다루었다.

總括 및 考察에서는 痔瘡과 痔漏의 原因을 總括하고, 內治法에서 사용되는 處方의 藥物構成을 分析하여 많이 쓰이는 藥物을 조사하고, 外治法에서 熏洗法과 外敷法을 나누어 많이 쓰이는 藥物을 조사하며, 아울러 그 藥物을 效能과 主治에 관하여 뒤에 덧붙이기로 하겠다.

### < 痔瘡과 痔漏의 原因 >

#### ( 痔瘡의 韓方的 原因 )

1. 久坐, 久站, 久行 或은 勤苦勞役, 負重遠行, 以致氣血交錯, 生於肛門.

《外科正宗》<sup>7)</sup>에 “夫痔者,……或因久坐而血脈不行……担輕負重, 竭力遠行, 氣血縱橫, 經絡交錯……以致濁氣瘀血流注肛門內, 俱能發痔, 此患不論老幼男婦皆然.” 이라 하였고, 《醫宗金鑑》<sup>9)</sup>에 “……因勤苦勞役, 負重遠行, 以致氣血交錯而生痔者” 라 하였다.

2. 飲食不節, 大便失調(便秘或腹瀉)

《黃帝內經·素問 生氣通天論》<sup>2)</sup>에 “因而飽食, 筋脈橫解, 腸澀爲痔.” 라 하였고, 《外科正宗》<sup>7)</sup>에 “夫痔者, 乃

素積濕熱，過食炙煇，……又或酒色過度，腸胃受傷，以致濁氣瘀血流注肛門，俱能發痔。”라 하였으며, 《瘡瘍經驗全書》<sup>24)</sup>에 “臟腑所發，多由飲食不節，醉飽無時，……久忍大便，……內生五痔”라 하였고, 《醫宗金鑑》<sup>9)</sup>에서는 “有久瀉，久閏而生痔者”라 하였고, 《醫學入門》<sup>10)</sup>에서는 “蓋飲食則，脾不能運，食積停聚大腸，脾土一虛，肺金失養則，肝木寡畏，風邪乘虛下流，輕則腸風下血，重則變爲痔漏……”라 하였다.

3. 妊婦多産(産後用力太過，中氣下陷)

《外科啓玄》<sup>24)</sup>에 “痔曰腸痔是也，婦女因産難，久生或經行時，先怒受冷濕，餘血滲入肛邊而生。”라 하였고, 《醫宗金鑑》<sup>9)</sup>에서는 “有産後用力太過而生痔者，……”라 하였다.

4. 房事過度或忍精不瀉

《醫學入門》<sup>10)</sup>에 “醉飽入房，精氣脫泄，熱毒乘虛下流……”라 하였고, 그리고 房事를 하게 되면 會陰部가 充血이 되고, 房事가 過度하거나 射精을 참으면 直腸, 肛門部位의 充血을 惹起하니 痔瘡의 原因이 된다는 것이다.

5. 感受濕, 熱, 風, 燥邪氣

《寶氏外科全書》<sup>24)</sup>에서 “久忍大便，逐致陰陽不合，關格壅塞，風熱下沖，內生五痔。”라 하였고, 《醫學入門》<sup>10)</sup>에서는 “痔非外邪，乃藏內濕, 熱, 風, 燥四氣，相合而成，其腸頭成塊者，濕也，腸頭墜腫者，濕兼熱也，出膿血水者，熱勝血也，作大痛者，火熱也，痒者，風熱也，

大便秘者，燥熱也，小便澀者，肝藏濕熱也。”라 하였다.

6. 遺傳素因

《瘡瘍經驗全書》<sup>24)</sup>에서 “亦有父子相傳者”라 하였고, 《寶氏外科全書》<sup>24)</sup>에서는 “父子相傳者，母血父精而成。”이라 하였으며, 《薛氏醫案》<sup>11)</sup>에서는 “痔瘡之症或稟受胎毒……”이라 하였다.

7. 其他

《醫宗金鑑》<sup>9)</sup>에서 “憂思太過，蘊積熱毒……”이라 하여 七情의 原因을 말하였고, 《丹溪心法》<sup>24)</sup>에서 “痔者皆因臟腑本虛……”, 《醫宗金鑑》<sup>9)</sup>에서 “久病咳嗽而後生痔……”라 하여 體質虛弱이 痔瘡 發生의 基本原因이라 하였다.

( 痔瘡의 洋方의 原因 )

간경화, 간문맥혈전증, 복강내 종양, 임신, 변비, 힘쓰기 原因이고, 높은 연령층에서 많이 나타난다.

( 痔漏의 韓方의 原因 )

1. 外感風, 熱, 燥, 火, 濕邪

《河間六書》<sup>24)</sup>에 “蓋如風熱不散，谷氣流溢，傳于下部，故令肛門腫滿，結如梅李核，甚者乃變爲瘻也。”라 하였고, 《本草綱目》<sup>12)</sup>에 “漏屬虛與溫熱”이라 하였다.

2. 痔久不愈

《諸病源候論》<sup>13)</sup>에 “痔久不瘥，變爲瘻也。”라 하였다.

3. 飲食醇酒厚味, 勞傷優思, 便秘, 房勞過度

《千金要方》<sup>5)</sup>에 “肛門主肺, 肺熱應肛門, 熱則閉塞, 大行不通, 腫縮生瘡.” 이라 하였고, 《丹溪心法》<sup>20)</sup>에 “人唯坐臥風濕, 醉飽房勞, 生冷停寒, 酒面積熱, 以致榮血失道, 滲入大腸, 此腸風臟毒之所由作也.” 라 하였으며, 《外科正宗》<sup>7)</sup>에서 “夫臟毒者, 醇酒厚味, 勤勞辛苦, 蘊毒流注肛門結成腫塊.” 라 하였다.

4. 肛門局部氣血運行不足

《薛氏醫案》<sup>11)</sup>에 “腎, 膀胱經部分也, 居小腹之後, 此陰中之陰, 其道遠, 其位僻, 雖太陽多血, 氣運難及, 血亦罕到, 中年後尤慮此患.” 이라 하였다.

5. 其他

《千金要方》<sup>5)</sup>에서 “一切癰疽, 皆是瘡瘍本神所患, 癰之後膿汁不止, 得冷卽是鼠瘻.” 라 하여 瘻가 癰疽의 後에 생기는 疾患이라 하였고, 《奇效良方》<sup>6)</sup>에서는 漏는 가히 臂를 穿하고, 腸을 穿하고, 陰을 穿하며, 肛門中에도 生하여 다시 雜瘻를 形成한다 하였다.

### ( 痔漏의 洋方的 原因 )

痔漏는 항문선의 염증, 외상, 치열, 결핵, 방선균증, 비특이성 장염, 특히 크론병, 암 등의 原因을 生한다.

< 內服藥으로 쓰이는 本草의 頻度數 >

### 1. 解表藥

發散風寒藥	麻黃(3), 紫蘇葉(3), 蘇莖(1), 荊芥(24), 羌活(8), 白芷(19), 防風(29), 藁本(4), 細辛(1)
發散風熱藥	葛根(5), 葛花(1), 柴胡(9), 升麻(23), 蟬退(1), 木賊(5)

### 2. 清熱藥

清熱瀉火藥	知母(2), 梔子(7), 青箱子(1), 天花粉(3), 夏枯草(2), 槐角(22), 槐米(1), 槐實(3), 槐木耳(1), 槐莢(1)
清熱燥濕藥	黃芩(31), 黃連(31), 川連(1), 黃栢(23), 苦參(1)
清熱涼血藥	犀角(3), 生地黃(31), 乾地黃(1), 玄參(1), 牡丹皮(10), 赤芍藥(11)
清熱解毒藥	金銀花(7), 連翹(13), 牛黃(1), 白薇(2), 綠豆(1)
清虛熱藥	青蒿(1), 地骨皮(4), 胡黃連(2)

### 3. 瀉下藥

攻下藥	大黃(22)
潤下藥	麻仁(2), 郁李仁(6)
峻下逐水藥	芫花(1), 巴豆(2), 牽牛子(3)

4. 祛風濕藥

祛風濕止痛藥	獨活(3), 葳靈仙(3), 防己(3), 秦艽(18), 草烏(1)
舒筋活絡藥	木瓜(1), 烏蛇肉(2)

5. 芳香化濕藥

蒼朮(16), 厚朴(11), 砂仁(1)
-----------------------

6. 利水滲濕藥

利水退腫藥	茯苓(22), 豬苓(1), 澤瀉(17), 薏苡仁(4), 赤小豆(2)
利水通淋藥	車前子(1), 木通(2), 滑石(2), 通草(1), 瞿麥(1), 萹蓄(2)

7. 溫裏藥

附子(5), 乾薑(9), 肉桂(11), 小茴香(2), 萹澄茄(1), 胡椒(1), 川椒(1)
--

8. 理氣藥

陳皮(19), 青皮(3), 枳實(5), 枳殼(56), 木香(9), 香附子(7)
---

9. 消食藥

山楂(2), 神麩(9), 麥芽(1)
---------------------

10. 驅蟲藥

苦楝皮(5), 檳榔(16), 雷丸(6), 鶴虱(2), 蕪荑(1), 貫衆(4)
--

11. 止血藥

涼血止血藥	地榆(32), 槐花(37), 側柏葉(8)
化瘀止血藥	蒲黃(2)
溫經止血藥	艾葉(6), 伏龍肝(1)

12. 活血祛瘀藥

川芎(32), 乳香(14), 沒藥(7), 桃仁(14), 紅花(6), 五靈脂(2), 牛膝(1), 穿山甲(3), 蘇木(1), 乾漆(1), 皂角刺(21), 血竭(1), 卷柏(2), 蓬朮(1), 丹參(1)
--

13. 化痰止咳平喘藥

溫化寒痰藥	半夏(6), 天南星(3), 白附子(5), 皂莢(1)
清化熱痰藥	桔梗(4), 瓜蒌(3)
止咳平喘藥	杏仁(4), 葶藶子(2)

14. 安神藥

朱砂(2), 龍骨(2), 酸棗仁(1), 遠志(1)
-----------------------------

15. 平肝藥

平肝熄風藥	羚羊角(1), 白僵蠶(1), 地龍(1)
平肝潛陽藥	石決明(1), 牡蠣(3), 白蒺藜(3)

16. 開竅藥

麝香(7), 冰片(2), 蟾酥(1)
---------------------

17. 補益藥

補氣藥	人蔘(21), 黃芪(44), 白朮(28), 山藥(5), 白扁豆(2), 甘草(55), 蜂蜜(1)
補陽藥	杜仲(2), 續斷(1), 蛇床子(1), 鹿角(1), 益智仁(1)
補血藥	當歸(73), 熟地黃(12), 白芍藥(21), 何首烏(1), 阿膠(15), 元肉(1)
補陰藥	龜板(2), 鱉甲(6), 胡麻(7)

18. 收澀藥

止瀉藥	訶子(2), 赤石脂(2), 烏梅(12), 罌粟殼(1), 石榴皮(2), 椿皮(4), 五倍子(4)
澀精 縮尿 止帶藥	五味子(1), 蓮子肉(1), 蓮蕊(1), 蓮鬚(1), 山茶萸(4), 白礬(14), 綠礬(4)

19. 外用藥

雄黃(3), 露蜂房(7), 輕粉(1), 黃丹(1)
-----------------------------

20. 其他

猬皮(29), 亂髮(13), 豬懸蹄(10), 牛角腮(7), 鷄冠花(5), 蛇退(5), 百藥煎(4), 敗棕(4), 象牙(4), 白茯神(3), 黃蠟(3), 槿藤子(2), 鷄子(2), 阿魏(2), 黑豆(2), 白硝霜(2), 桑木耳(2), 京墨(1), 茄子(1), 訶勒皮(1), 木饅頭(1), 麻油(1), 木鱉子(1), 白膠香(1), 山棗果(1), 小白皮(1), 牛膽(1), 白薔薇根(1), 豬臟(1), 車荷鳴(1), 荷葉(1), 虎眉草(1), 陳細茶(1), 蠶退(1), 白靈砂(1), 芫青(1), 箬葉(1)
--

< 熏洗法에 쓰이는 本草 >



ㄱ	槐角(207), 槐花(211, 236, 239), 槐條(237, 246), 槐白皮(250), 苦參(207, 224, 229, 231, 236, 260), 甘草(207, 208, 229, 248, 253, 259), 葑葉(219), 葑汁(241), 苦練根(225), 蕨藿(231), 鷄冠花(232), 苦葫蘆(236), 金銀花(236), 茄子(236), 茄根(246, 255), 鏡面草(237), 蚶蚧草(237), 貫衆(243), 乾薑(243), 瓜萐根(248), 牽牛子(黑,白, 254)
ㄴ	癩蝦蟆草(206) 乾蝦蟆(238), 螺內水(229), 露蜂房(210, 224),
ㄷ	大黃(207, 229), 冬瓜藤(210, 226), 大腹皮(224), 大栢皮(243), 獨活(236) 冬青葉(243), 桃條(246), 蜣螂(247), 大肢(248), 桃葉(251)
ㄹ	馬齒莧(208, 220, 255, 259), 文蛤(208), 木鱉子(213, 318), 無花果葉(215), 麻黃(236), 牡蠣(236), 無名異(243), 鰻鱺魚(247), 馬兜鈴(339)
ㅁ	防風(207, 208, 217, 222, 245, 259), 朴硝(207, 210, 217, 223, 227), 薄荷(223), 白芷(224, 236), 白膠香(225), 鳳眼草(230, 232), 鼈甲(238), 半夏(242), 栢枝(243), 白鱈魚骨(244), 白礬(245, 249, 252), 草薺(248)
ㅂ	桑寄生(210), 細辛(230), 蛇床子(231, 237, 243), 小茴香(236), 麝香(238), 生薑(242), 桑條(246), 石菖蒲(260)
ㅅ	瓦松(208, 259), 五倍子(210, 212, 225, 239, 248, 255, 257, 259), 艾葉(211, 225, 238, 244, 246, 247, 255), 蓮蓬(乾, 223, 239), 柳根(228, 256), 柳條(246), 葳靈仙(230, 233, 236), 乳香(230), 芫菜子(236), 芥菜子(256), 連翹(236), 雄黃(238), 鹽湯(323)
ㅇ	枳殼(206, 208, 211, 221, 223, 229, 230, 233, 236, 243, 245, 259), 全蝎(218), 赤芍藥(229), 地榆(231, 239), 椿樹皮(236), 皂莢(238), 地骨皮(243), 皂礬(258), 知母(258)
ㅈ	梔子(207), 川椒(208, 236), 蒼朮(208, 259), 葱白(208, 248, 255, 258, 259), 側柏葉(208, 237, 259), 醋(216), 草麻子(222), 天南星(222), 草烏(238), 蒼耳子(241), 蒼耳根(243, 246)
ㅊ	土礬(213)
ㅋ	片腦(229), 皮椒(255, 257, 259), 貝母(258)
ㆁ	黃連(207, 229, 237, 243), 黃栢(207), 黃芩(207, 229, 237), 荊芥(207, 210, 211, 217, 223, 229, 231, 236, 237, 239, 243, 246), 荊芥穗(230, 253), 焰消(208), 黃芪(236), 薤頭(243), 黑豆(243), 萱草根(246), 花椒(255, 256, 259), 滑石(257)

< 外敷法에 쓰이는 本草 >

ㄱ	輕粉(246, 265, 266, 270, 272, 283, 288, 327, 328, 340, 341), 苦練根(267), 鷄蛋(270), 槐白皮(276, 314), 甘草(276, 341), 瓜蒂(284), 礪砂(285), 蝎砂(291), 槐枝(298), 苦參(298, 335), 瓜萐根(301, 305), 鷄胫脛(307), 景天(321), 羌活(328), 甘草(328), 金銀花(328), 鷄卵膏(336), 鷄卵油(336)
---	---

ㄴ	螺螄(220), 老杉枝(277), 露蜂房(288, 308), 綠礬(313), 南星(325), 爐甘石(334)
ㄷ	桃仁(276), 當歸(276, 298, 328, 333, 341), 大蒜(280), 銅綠(287), 頭髮(307, 328), 大黃(312, 328), 獨活(328)
ㄹ	木鱉子(217, 273, 298), 沒藥(257, 266, 292, 298, 325, 327, 328, 330), 密陀僧(257, 282, 284, 287, 342), 馬齒莧(267), 木香(288), 麻油(298, 333, 334, 341), 蜜(305), 馬牙草(321), 鱧鱔油(336)
ㅁ	冰片(262, 263, 264, 266, 268, 271, 294, 296, 300, 311, 334), 白礬(枯, 263, 265, 282, 285, 326, 332, 335, 336, 342), 明礬(269, 291, 292, 313), 白芨(264, 290, 298, 312, 328), 砒霜(265), 朴硝(267, 312, 313), 薄荷(268), 砒石(269), 白芷(276, 320, 326, 341), 白砒(292), 白蠟(341), 鼈甲(298), 白薇(298, 312, 328), 半夏(306, 325), 白鷄膽(311), 防風(328), 바셀린(334)
ㅂ	石榴皮(224), 食鹽(263), 麝香(246, 263, 264, 266, 275, 287, 296, 308, 325), 石膏(264, 312, 334, 340), 膽酥(265), 蘇柴(277), 蛇皮(289), 續斷(289), 信石(291), 水銀(295, 316, 323), 韶粉(316), 山烏(325), 生地黃(328, 333), 山慈姑(328), 石油(336), 石清蜜(338)
ㅅ	龍腦(217), 熊膽(217, 266, 271, 278, 294, 311, 330), 五倍子(246, 261, 273, 288, 289, 328, 335), 乳香(257, 266, 269, 270, 288, 292, 298, 325, 327, 328, 330), 獾皮(刺, 263), 龍骨(266, 270, 283, 289, 298, 308, 320, 327, 334, 342), 魚腥草(267), 瓦楞花(267), 人中白(268), 兒茶(268), 雄黃(269, 313, 314), 蝸牛(275, 296, 311), 芫花(279, 325), 人信(282), 胭脂(乾, 283, 342), 鬱金(290, 319), 牛黃(292, 330, 331), 羊膽(293, 300), 烏賊骨(298, 342), 柳枝(298), 鉛白霜(303), 人齒(307), 兒茶(325), 連翹(328)
ㅇ	田螺水(262, 311, 332), 赤石脂(266), 珍珠(266, 272), 枳實(276), 赤小豆(276), 辰砂(282, 284, 285), 枳殼(286), 棗肉(295, 316), 豬牙皂角(298), 豬膽汁(305), 豬脂(308), 鯽魚(317), 地骨皮(321), 豬懸蹄甲(323), 赤芍藥(328), 朱砂(334), 眞油(336), 紫草(341), 定粉(342)
ㅈ	草烏頭(263, 291, 298, 325), 天靈蓋(265), 青黛(268), 青缸花(272), 川芎(298), 穿山甲(308), 梔子(312, 328), 葱青(318), 臭椿皮(321), 鯀魚(336)
ㅊ	片腦(217, 284, 287, 293, 303, 325, 330), 蒲黃(281), 巴豆(286)
ㅋ	香白芷(246, 298), 黃丹(246, 266, 291, 298, 302, 320, 328), 黃栢(257, 268, 298, 312, 331, 340), 黃連(257, 264, 290, 298, 312, 319, 331), 滑石(257, 302, 342), 血竭(257, 266, 270, 281, 324, 325, 328, 330, 341), 荊芥(257, 328), 海螵蛸(266, 322, 327), 蕎麥(277), 荊柴(277), 寒水石(283, 320, 327, 342), 厚朴(298), 黃芩(298, 312, 328, 331), 活黃鱉(309), 黃蠟(325, 333), 香油(328), 黃芪(335), 河豚卵(336), 蟹醬(338)

<內治法에 많이 사용되는 本草><sup>3)34)</sup>

荊芥 炒炭하여 그 性味が 苦澀한 성격으로 변하여 血分에 들어가 止血(理血)시키는 作用이 있어 各種 出血證을 治療한다.

白芷 消腫排膿, 燥濕, 止痛의 效能으로 腸風痔漏를 治療한다.

防風 炒炭하여 止血시키는 效能이 있어 便血의 症狀에 表證이 있을때 마땅하다.

升麻 清熱解毒, 升舉陽氣의 效能으로 脫肛을 治療한다.

槐角 清熱瀉火, 涼血止血의 效能으로 腸風便血, 痔腫出血을 治療한다. 止血의 效能은 槐花가 우수하다.

黃芩 瀉實火, 除濕熱, 止血의 效能으로 癰腫疔瘡를 治療하는데, 黃連과 配伍하면 清心解毒의 效能으로 瘡癰을 治療한다.

黃連 清熱燥濕, 瀉火解毒의 效能으로 癰腫疔瘡, 濕疹, 濕瘡 등을 治療한다.

黃栢 清熱燥濕, 瀉火解毒의 效能으로 瘡瘍腫毒을 治療한다.

生地黄 清熱生津, 涼血止血의 效能으로 便血을 治療한다.

大黃 瀉熱毒, 破積滯, 行瘀血의 效能으로 痔에 동반된 大便秘結을 治療한다.

秦朮 祛風濕, 清虛熱의 效能이 있어 小便을 利하여 濕熱을 導下한다.

蒼朮 健脾, 燥濕, 解鬱, 關穢의 效能이 있고, 《本草綱目》에서는 “治濕痰留飲, 或挾瘀血成窠囊, … 滑瀉腸風.” 이라 하였고, 《本草求原》에 “… 脾濕下血” 이라 하였다.

茯苓 利水滲濕, 健脾寧心の 效能이 있어 人蔘, 白朮과 配伍하면 健脾의 作用을 하고, 茯苓, 澤瀉와 配伍하면 滲濕作用을 한다.

澤瀉 利水滲濕, 泄熱의 效能이 있다. 茯苓과 같은 역할로 作用한다.

陳皮 理氣, 調中, 燥濕, 化痰의 效能이 있다. 痔를 氣滯血瘀로 볼때 그의 作用을 한다.

枳殼 破氣, 行痰, 消積의 效能으로 …脫肛, 便秘…등을 治療한다. 痔의 治療에 가장 많이 활용된다.

檳榔 殺蟲, 破積, 下氣, 行水의 效能으로 結滯되고 뭉친 것을 풀어준다.

地榆 涼血止血, 解毒斂瘡의 效能으로 便血, 痔出血, 癰疽瘡毒 등을 治療한다.

槐花 涼血解毒, 清肝瀉火의 效能으로 便血, 痔出血 등을 治療한다.

川芎 活血行氣, 祛風止痛의 效能이 있다.

乳香 調氣活血, 定痛, 追毒의 效能으로 …癰瘡腫毒…등을 治療한다. 주로 痔瘡腫痛不可忍에 調氣活血止痛시킨다.

桃仁 破血行瘀, 潤燥滑腸의 效能으로 痔瘡의 治療하고, 아울러 血燥便秘에 活用된다

皂角刺 消腫排膿, 祛風殺蟲의 效能으로 癰疽腫毒을 治療한다.

人蔘 大補元氣, 固脫生津, 安神의 效能이 있어 氣血津液不足으로 인한 痔瘡과 痔漏를 治療한다.

黃芪 生用하면 益衛固表, 利水消腫, 托毒, 生肌의 效能이 있고, 炙用하면 補中益氣의 效能이 있어 …脫肛, …及一切氣衰血虛之證을 治療한다. 《神農

本草經》에서 “主癰疽，久敗瘡，排膿止痛，大風癩疾，五痔，鼠漏…”라 하였다.

白朮 補脾，益胃，燥濕，和中的 效能 이 있어 人蔘 등과 같은 補脾，補氣劑 를 活用할때 溫燥의 性으로 脾陽을 補하고，脾濕을 去한다.

當歸 補血和血，調經止痛，潤燥滑腸의 效能으로 腸燥便難，癰疽潰瘍의 治療에 活用된다.

白芍藥 養血柔肝，溫中止痛，斂陰收汗의 效能이 있고，清熱涼血，活血消腫의 作用으로는 赤芍藥을 活用한다. 痔瘡와 痔漏의 治療에 四物之劑 (熟地黃보다는 生地黃으로)가 많이 活用되어 理血의 效果를 기대한다.

阿膠 補血滋陰，潤燥，止血의 效能으로 便血을 治療한다.

烏梅 潤腸의 效能이 있다.

白礬 內服으로 止血止瀉，祛除風痰의 效能이 있어 便血을 治療한다.

猬皮(刺猬皮) 降氣定痛，涼血止血的 效能으로 …腸風痔漏…등을 治療한다.

《藥性論》에 “主腸風瀉血，痔病有頭，多年不瘥者，炙末白飲下方寸匕.”라 하였고，《簡要濟衆方》에서 腸痔下部如蟲嚙를 治療하는데 猬皮燒末을 生油에 和하여 敷하라 하였으며，《本草衍義》에 痔를 治療하는데 猬皮 穿山甲 等分을 燒存性하여 肉豆蔻를 半으로 하여 가루내어 空心에 熱飲으로 二錢을 服用한다고 하였다.

亂髮 止血의 作用으로 炒炭하여 使用한다.

< 熏洗, 外敷法에 많이 사용되는 本草 ><sup>34)</sup>

(7)—————

茄根 效能主治에는 痔의 治療에 관한 것이 없고，《分類草藥性》에 治風筋骨癱瘓，洗痔瘡한다 하였다.

茄子 清熱，活血，止痛，消腫의 效能으로 腸風下血，熱毒瘡癰 … 등을 治療한다.

甘草 和中緩急，潤肺，解毒，調和諸藥의 效能으로 癰疽瘡瘍 … 등을 治療한다.

蜣螂 풍뎡이과의 말뚝구리를 말하며，定驚，破瘀，通便，攻毒의 效能으로 … 痔漏，疔腫，惡瘡 … 등을 治療한다. 《本草權度》에 大腸風熱을 去한다 하였고，《本草綱目》에 痔漏出水를 治療하는데 蜣螂一枚를 陰乾하여 片腦를 조금 넣고 細末한 후 紙捻蕉末 入孔內하면 점점 生肉한다 하였다.

芥菜子 宣肺豁痰，溫中理氣의 效能 이 있고，《談野翁試驗方》을 보면 痔瘡腫痛을 治療하는데 芥葉을 搗餅하여 頻坐之하라 하였다.

乾薑 溫中逐寒，回陽通脈의 效能.

牽牛子 瀉水，下氣，殺蟲의 效能. 주로 痔의 治療에서 大便秘結을 治療한다.

輕粉 殺蟲，攻毒，利水，通便의 效能으로 諸瘡에 活用한다.

景天 평의 비름을 말하며，清熱，解毒，止血의 效能으로 熱瘡의 경우 搗汁塗하거나 煎湯洗한다.

鷄冠花 涼血，止血의 效能으로 痔漏下血 … 등을 治療한다.

鷄蛋花 痔를 治療하는 내용은 없다.

鷄子黃 滋陰潤燥，養血息風의 效能으로 … 熱瘡 … 등을 治療한다. 《千

金方》에 鼠漏를 治療하는데 鷄卵 一枚를 米下에서 蒸半日하여 노른지를 때서 흑색으로 熬하여 먼저 瘡上을 씻은 후 약을 瘡孔안에 넣는다고 하였다.

苦楝根(皮) 淸熱, 燥濕, 殺蟲의 效能으로 瘰癧 … 등을 治療한다.

苦參 淸熱, 燥濕, 殺蟲의 效能으로 熱毒血痢, 腸風下血, 痔漏, 脫肛, 皮膚瘙癢 … 등을 治療한다.

苦壺蘆 內服으로는 利水消腫의 效能이 있으나 外用하면 痔瘡腫痛을 治療한다. 《摘元方》에 이를 煎湯하여 先熏後洗한 후, 熊膽, 密陀僧, 白礬, 片腦末을 貼하라 하였다.

瓜蒞根(天花粉) 生津, 止渴, 降火, 潤燥, 排膿, 消腫의 效能으로 痔漏 … 등을 治療한다.

瓜蒂 吐風痰宿食, 瀉水濕停飲의 效能이 있고, 痔의 治療에 活用한다는 내용이 없다.

貫衆 殺蛔, 條, 蟻蟲, 淸熱, 解毒, 涼血, 止血的 效能으로 腸風便血, 血痢, 血崩, 帶下 … 등을 治療한다.

槐角 淸熱, 潤肝, 涼血, 止血的 效能으로 腸風瀉血과 痔血, 崩漏, 血淋, 血痢 … 등을 治療한다.

槐白皮 祛風除濕, 消腫止痛의 效能으로 腸風下血, 疽, 痔, 爛瘡 … 등을 治療한다.

槐條 槐花의 가지로, … 痔瘡 등을 治療한다. 《傳信方》에 痔核의 治療에 槐枝를 煎湯하여 洗한다 하였다.

槐花 淸熱, 涼血, 止血的 效能으로 腸風便血과 痔血, 尿血, 血淋, 崩漏, 衄血 … 등을 治療한다.

韭葉 溫中, 行氣, 散血, 解毒의 效能

으로 痔漏, 脫肛 … 등을 治療한다.

蕨菜 龍爪菜, 鋸菜라고도 하며 解瘡毒의 效能이 있다.

金銀花 淸熱, 解毒의 效能으로 痔漏, 瘡瘍, 腫毒, 癰癤 … 등을 治療한다.

(L)—————

螺獅 淸熱, 利水, 明目の 效能으로 … 痔瘡, 腫毒 등을 治療한다. 《本草綱目》에 “… 治反胃, 痢疾, 脫肛, 痔漏.” 라 하였다.

爐甘石 去腎退赤, 收濕斂瘡의 效能이 있고, 《玉楸藥解》에 “宜痔漏下疳.” 한다 하였고, 《雜病治例》에 漏瘡不습을 治療하는데 爐甘石(童尿製)과 牡蠣粉로 外塞하고, 滋補藥을 內服하라 하였다.

露蜂房 祛風, 攻毒, 殺蟲의 效能으로 … 痔漏 … 등을 治療한다. 《唐瑤經驗方》에 下部痔漏를 治療하는데 大露蜂房燒存性を 研하여 뿌리고, 乾하면 眞菜油로 調한다 하였고, 《補缺肘後方》에 風漏를 治療하는데 露蜂房一枚를 黃赤色이 되도록 炙하여, 研末한 후 一錢씩을 臘月猪脂로 勻調하여 瘡上에 敷하라 하였다.

綠礬 燥濕化痰, 消積殺蟲, 止血補血, 解毒斂瘡의 效能으로 … 腸風便血 … 등을 治療한다.

(C)—————

大腹皮 下氣寬中, 行水の 效能이 있고, 《仁濟直指方》에 瘰癧惡穢의 治療에 大腹皮煎湯으로 洗之한다 하였다.

大蒜 行滯氣, 暖脾胃, 消癥積, 解毒,

殺蟲의 效能이 있다.

大黃 瀉熱毒, 破積滯, 行瘀血의 效能으로 牽牛子와 마찬가지로 痔에 동반된 大便秘結을 治療한다.

桃葉 祛風濕, 清熱, 殺蟲의 效能으로 … 濕疹, 瘡瘍, 癬瘡 … 등을 治療한다. 《上海常用中草藥》을 보면 痔瘡을 治療하는데 桃葉適量을 煎湯熏洗한다 하였다.

桃仁 破血行瘀, 潤燥滑腸의 效能으로 痔瘡의 治療하고, 아울러 血燥便秘에 活用된다.

桃條(桃枝) 治心腹痛及蠶瘡. 《傷寒類要》에서 天行蠶下部生瘡을 治療하는데, 桃枝를 糖과 같은 濃度로 煎하여 下部를 通하게 한다 하였다.

獨活 祛風, 勝濕, 散寒, 止痛의 效能이 있고, 張元素는 “散癰疽敗血” 한다 하였다고, 《普濟方》의 獨活散을 보면 獨活, 黃芩, 莽草, 當歸, 川芎, 大黃, 赤芍藥 各一兩을 가루내어 먼저 豬蹄를 水二升을 넣어 끓인 후 豬蹄를 꺼내고 약을 넣어 다시 十餘沸를 끓인 후 찌꺼기를 제거하여 뜨거울때 瘡을 洗한다고 하였다.

冬瓜藤 肺熱痰火와 脫肛을 治療하는데, 《本草綱目》에 脫肛에 煎水洗한다 하였다.

銅綠 구리그릇에 생긴 녹을 긁어 모은 것으로, 退腎, 去腐, 斂瘡, 殺蟲, 吐風痰의 效能으로 … 疽, 痔惡瘡 … 등을 治療한다. 《玉楸藥解》에서 “療痔瘻, 生髮, 點痣.” 한다 하였다.

冬青葉 涼血止血의 效能으로 潰瘍久不愈合 … 등과 痔漏出血을 治한다.

(口)—————

馬兜鈴 清肺降氣, 化痰止咳의 效能이 있고, 外用으로는 痔漏腫痛을 治療한다. 《日華子本草》에 痔漏瘡을 治療하는데 病處를 熏洗하라 하였다.

馬齒莧 清熱解毒, 散血消腫의 效能으로 … 癰腫惡瘡, 丹毒, 癩癧 … 등을 治療한다. 《瀕湖集簡方》에 肛門腫痛을 治療하는데 馬齒莧葉, 三葉酸草 等分을 一日二次 煎湯熏洗한다 하였다.

麻黃 發汗, 平喘, 利水의 效能이 있고, 痔瘡을 治療하는 내용은 없다.

鰻鱺魚 뱀장어를 말하며, 補虛羸, 祛風濕, 殺蟲의 效能으로 … 腸風, 痔漏 … 등을 治療한다. 《食醫心鏡》에서는 五痔漏瘡殺蟲方으로 鰻鱺魚를 食餌療法으로 活用하였고, 孟詵은 熏痔하라 하였다.

牡蠣 斂陰, 潛陽, 止汗, 澀精, 化痰, 軟堅의 效能이 있고, 주로 癩癧, 癭瘤의 治療에 活用된다.

木鱉子 消腫散結, 去毒의 效能으로 … 痔瘡 … 을 治療한다. 《普濟方》에서 痔瘡을 治療하는데 荊芥, 木鱉子, 樸硝 各等分을 煎湯한 후 瓶안에 넣어 熏하고 이후 溫湯으로 洗한다 하였다.

沒藥 散血祛瘀, 消腫定痛의 效能으로 … 痔漏 … 등을 治療한다. 《開寶本草》에 “主破血止痛. …痔漏瘡下血, …” 라 하였다고, 《聖濟總錄》의 消毒沒藥散은 五痔를 治療하는데 沒藥(研)一兩, 黃礬 白礬 溺塗(火煨) 各半兩, 麝香 一錢(研)을 간 후 먼저 葱湯으로 瘡上을 깨끗히 씻은 후 藥末을 乾敷한다고 하였다.

無名異 祛痰止痛, 消腫生肌의 效能

으로 … 痔漏 … 등을 治療한다. 《簡便單方》에 無名異炭火煨紅을 米醋 淬七次한 후 細末한 것을 瘡口을 먼저 溫水로 洗한 후 瘡口에 넣는다고 하였다.

無花果葉 治痔瘡, 腫毒, 心痛하는데, 朱震亨이 “治五痔腫痛, 煎湯頻熏洗之” 라 하였다.

文蛤 清熱, 利濕, 化痰, 軟堅의 效能으로 … 痔核, 崩漏, 痔漏 … 등을 治療한다.

密陀僧 消腫殺蟲, 收斂防腐, 墜痰鎮驚의 效能으로 痔瘡, 腫毒, 潰瘍 … 등을 治療한다.

(日)—————

朴硝 瀉熱, 潤燥, 軟堅의 效能으로 … 癰腫 … 등을 治療하는데, 《楊氏家藏方》에 熱毒結成痔疾로 腫脹熱痛, 坐臥不安을 治療하는데 荊芥, 薄荷, 朴硝 各一兩과 白礬 二兩을 細切한 후 水五升으로 끓여 患處를 熏하고, 淋洗하라 하였고, 《鷄峰普濟方》의 朴硝散은 痔瘡를 治療하는데 朴硝, 五倍子 等分을 細末하여 每服三兩하고, 水三碗에 三四沸 煎한 후 淋洗한다 하였다.

薄荷 疎風, 散熱, 開穢, 害毒의 效能이 있고, … 瘡疥, 癩疹 … 등을 治療한다.

半夏 燥濕化痰, 降逆止嘔, 消痞散結의 效能이 있고, 外用하면 癰腫을 消하여 《外科小品》에서 諸癰五六孔相通을 治療하는데 生半夏末을 물에 調하여 孔內 一日二次 塗한다 하였다.

防風 發表, 祛風, 勝濕, 止痛의 效能이 있고, 《外科十法》의 防風湯은 癰

疽最難收口者를 治療하는데 防風, 白芷, 甘草, 赤芍藥, 川芎, 歸尾, 雄豬蹄, 連鬚, 葱白 등을 끓인 물에 洗한다 하였다.

白膠香 活血, 涼血, 解毒, 止痛의 效能으로 … 癰疽, 瘡疥, 癩疹, 瘰癧 … 등을 治療한다.

白芨 補肺, 止血, 消腫, 生肌, 斂瘡의 效能이 있고, 《神農本草經》에 “主癰疽惡瘡敗疽, 傷陰死肌, …” 라 하였다.

白薇 清熱, 解毒, 散結, 生肌, 止痛의 效能으로 … 腸風, 痔漏 등을 治療한다.

白礬 消痰, 燥濕, 止瀉, 止血, 解毒, 殺蟲의 效能으로 … 瘡痔疥癬 … 등을 治療한다. 《藥性論》에서 “治鼠瘻, 瘰癧…” 이라 하였고, 《本草蒙筌》에서는 “禁便瀉, 塞齒疼, 洗脫肛澁腸, 敷膿瘡收水” 라 하였다.

白芷 祛風, 燥濕, 消腫, 止痛의 效能으로 … 腸風痔漏 …를 治療한다. 《醫方摘要》에 痔瘡腫痛을 治療하는데 먼저 皂角을 烟熏한 후 鷄膽汁으로 白芷末을 調한 후 塗한다 하였다.

鼈甲 養陰清熱, 平肝熄風, 軟堅散結의 效能이 있고, 《聖惠方》에서는 痔, 肛邊生鼠乳, 氣壅疼痛을 治療하는데 鼈甲 三兩, 檳榔 二兩을 가루내어 食前에 粥飲으로 二錢을 복용한다 하였다.

鳳眼草 痔疾, 腸風便血…등을 治療한다. 《聖濟總錄》의 椿莢散은 腸風瀉血을 治療하는데 椿莢을 半은 生用, 半은 燒存性하여 一錢씩 服用한다 하였다. 《嘉祐本草》에서는 大便下血을 治療한다 하였다.

草薺 舉風, 利濕의 效能으로 …濕熱瘡毒 … 등을 治療한다. 孫用和는 腸風, 痔漏를 治療하는데 草薺, 貫衆을 等分하여 가루내어 二錢씩 食前 空心에 服用한다 하였다.

砒霜 祛痰截瘻, 殺蟲, 蝕惡肉의 效能으로 … 痔瘡 … 등을 治療한다. 《本草綱目》에 “蝕癰疽敗肉, 枯痔, 殺蟲.” 이라 하였다.

砒石 却痰截瘻, 殺蟲, 蝕惡肉의 效能으로 … 痔瘡 … 등을 治療한다. 砒霜과 마찬가지로 枯痔시킨다.

冰片 通諸竅, 散鬱火, 去翳明目, 消腫止痛의 效能으로 … 癰腫, 痔瘡 … 등을 治療한다. 《簡便單方》에 內外痔瘡를 治療하는데 片腦 一, 二分을 葱汁으로 化하여 搽한다 하였다.

(八) \_\_\_\_\_

蛇床子 溫腎助陽, 祛風, 燥濕, 殺蟲의 效能으로 … 疥癬濕瘡 … 등을 治療한다.

蛇脫 祛風, 定痙, 退翳, 消腫, 殺蟲의 效能으로 … 痔漏 … 등을 治療한다. 《丹溪心法》의 蛇脫散은 惡瘡血水 不止를 治療하는데 蛇皮(焙焦) 五倍子 龍骨 各一錢半, 續斷 五錢을 가루내어 麝香을 조금 넣어 津唾로 調敷한다 하였다.

麝香 開竅, 關穢, 通絡, 散瘀의 效能으로 … 癰疽腫毒 … 등을 治療한다. 《本草正》에 “除一切惡瘡痔漏腫痛, 膿水腐肉, …” 이라 하였다.

桑寄生 痔瘡, 痔漏를 治療한다는 내용이 없음.

桑條(桑枝) 祛風濕, 利關節, 行水氣의 效能이 있다.

生薑 發表, 散寒, 止嘔, 開痰의 效能이 있고, 《普濟方》에서 諸瘡痔漏, 久不結痂를 治療하는데 生薑連皮하여 크게 잘라 白礬末을 묻혀 炙炒한 후 細末하여 貼하라 하였다.

石膏 煨敷生肌斂瘡한다.(外治癰疽瘡瘍, 潰不收口, …)

石榴皮 澀腸, 止血, 驅蟲의 效能으로 … 脫肛 … 등을 治療한다. 《醫鈔類編》에서 脫肛을 治療하는데 石榴皮 陳壁土에 白礬을 조금 加하여 濃煎薰洗하고, 다시 五倍子炒 한 것을 갈아서 붙인다고 하였다.

石菖蒲 開竅, 豁痰, 理氣, 活血, 散風, 祛濕의 效能으로 … 癰疽腫毒 … 등을 治療한다.

鱈魚 補虛損하는데, 아울러 …痔漏, 臙瘡등도 治療한다. 《本草綱目》에 一切冷瘻, 痔漏, 臙瘡에 貼하라 하였다.

蟾酥 解毒, 消腫, 強心, 止痛의 效能이 있고, 外用하면 癰疽, 惡瘡등을 治療한다.

細辛 祛風, 散寒, 行水, 開竅의 效能이 있고, 《日華子本草》에 “治咳, 消死肌瘡肉, 胸中結聚.” 라 하였다.

小茴香 溫腎散寒, 和胃理氣의 效能으로 주로 冷漏를 治療한다.

水銀 殺蟲, 攻毒의 效能으로 …痔漏 등을 治療한다. 《梅師集驗方》에 痔, 谷道中蟲痒 不止를 治療하는데 水銀 棗肉 各二兩을 함께 갈아 敷하되 만약 痛症이 있으면 三分之一을 사용한다고 하였다.

食鹽 湧吐, 清火, 涼血, 解毒의 效能이 있고, 外用으로 洗瘡한다.

信石 砒石을 말한다.



(○)—————

艾葉 埋氣血, 逐寒濕, 溫經, 止血, 安胎의 效能이 있고, 《仁濟直指方》에 癰疽不合, 瘡口冷滯를 治療하는데 北艾煎湯으로 洗한 후 白膠로 熏之하라 하였다.

魚腥草 清熱解毒, 利尿消腫의 效能으로 … 痔瘡, 脫肛 … 등을 治療한다. 《滇南本草》에 痔瘡를 治療하는데 魚腥草를 煎湯하여 點水酒服을 이어서 三服하고, 그 찌꺼기로 熏洗하는데, 有膿者는 潰하고, 無膿者는 消한다 하였다.

連翹 清熱, 解毒, 散結, 消腫의 效能으로 … 癰瘍腫毒 … 등을 治療한다.

蓮房 消痰, 止血, 祛濕의 效能으로 … 痔瘡脫肛 … 등을 治療한다. 《瘍科選粹》의 蓮房枳殼湯은 痔瘡를 治療하는데 乾蓮房, 荊芥 各一兩, 枳殼 薄荷 朴硝 各五錢을 粗末하여 水三碗을 끓여 二碗이 되면 熏洗하라 하였다.

鉛白霜 墜痰, 鎮驚, 止衄, 斂瘡의 效能이 있고, 《嬰童百問》의 勝雪膏는 墮腸, 翻花, 鼠奶 등의 痔로 熱痛不可忍하고, 或已成瘡者를 治療하는데 鉛白霜 白片腦 各半字를 好酒 조금으로 膏를 만들어 塗之한다 하였다.

五倍子 斂肺, 澁腸, 止血, 解毒의 效能으로 … 便血, 脫肛, 腫毒, 瘡癤 … 등을 治療한다. 주로 脫肛不收에 活用한다.

烏賊骨 除濕, 制酸, 止血, 斂瘡의 效能으로 … 便血 … 등을 治療한다.

瓦松 清熱解毒, 止血, 利濕, 消腫의 效能으로 … 痔瘡 … 등을 治療한다.

《分類草藥性》에 “治一切痔瘡腫痛出血, 煎水熏洗” 라 하였다.

蝸牛 清熱, 消腫, 解毒의 效能으로 … 痔瘡, 脫肛 … 등을 治療한다. 《濟生方》에서 痔瘡를 治療하는데, 蝸牛一枚, 麝香三分을 瘡處에 바른다고 하였고, 《吉林中藥草》에는 脫肛의 治療에 蝸牛一兩, 訶子五錢을 猪油로 調하여 患處에 붙인다고 하였다.

龍骨 鎮驚安神, 斂汗固精, 止血澀腸, 生肌斂瘡의 效能으로 … 瀉痢脫肛, 潰瘍久不收口 등을 治療한다. 《日華子本草》에 腸風下血을 治療한다 하였고, 《本草綱目》에서는 脫肛을 治療한다 하였다.

龍腦 冰片을 말한다.

牛黃 清心, 化痰, 利膽, 鎮驚의 效能이 있고, 外用으로 癰疽, 疔毒을 治療한다.

鬱金 行氣解鬱, 涼血破瘀의 效能이 있고, 《醫方摘要》에 痔瘡腫痛을 治療하는데 鬱金末을 水로 調하여 塗之하라 하였다.

熊膽 清熱, 鎮驚, 明目, 殺蟲의 效能으로 … 疔痔, 惡瘡를 治療한다. 《千金方》에 五痔十年不瘥한데 熊膽을 塗하면 낫는다 하였다.

雄黃 燥濕, 祛風, 殺蟲, 解毒의 效能으로 … 痔漏 등을 治療한다. 《本草正》에 “治癰疽腐肉, 竝鼠漏, 疽, 痔等毒” 이라 하였다.

芫花 逐水, 滌痰의 效能이 있고, 《本草原始》에 “煎汁漬絲線, 繫痔亦落…” 이라 하였다.

葶靈仙 祛風濕, 通經絡, 消痰涎, 散癥積의 效能이 있고, 《本草衍義》에서 腸風을 治한다 하였고, 《外科精義》에

서 痔瘡腫痛을 治療하는데 葳靈仙 三兩을 水一斗에 煎湯하여 先熏後洗한다 하였다.

猬皮(刺猬皮) 降氣定痛, 涼血止血의 效能으로 … 腸風痔漏 … 등을 治療한다. 《藥性論》에 “主腸風瀉血, 痔病有頭, 多年不瘥者, 炙末白飲下方寸匕.” 라하였고, 《簡要濟衆方》에서 腸痔下部如蟲噬를 治療하는데 猬皮燒末을 生油에 和하여 敷하라 하였으며, 《本草衍義》에 痔를 治療하는데 猬皮 穿山甲 等分을 燒存性하여 肉豆蔻를 半으로 하여 가루내어 空心에 熱飲으로 二錢을 服用한다고 하였다.

柳根 利水, 通淋, 祛風, 除濕의 效能이 있고, 外用하면 痔瘡을 治療하는데, 《中醫藥實驗研究》에서 痔瘡의 治療에 水柳鬚 一二兩과 皮硝 三錢을 煎하여 熏洗하라 하였다.

柳條(柳枝) 祛風, 利尿, 止痛, 消腫의 效能이 있고, 《摘元方》에서 漏瘡腫痛의 治療에 楊柳條를 罐內에서 燒烟하여 熏하면 出水한다 하였다.

乳香 調氣活血, 定痛, 追毒의 效能으로 … 癰瘡腫毒 … 등을 治療한다. 주로 痔瘡腫痛不可忍에 調氣活血止痛시킨다.

人中白 清熱, 降火, 消瘀의 效能이 있고, 《本草正》에 “燒研爲末, 大治諸濕潰爛, 下疳惡瘡, 生肌長肉, 善解熱毒.” 한다 하였다.

(x)—————

赤石脂 澀腸, 止血, 收濕, 生肌의 效能으로 … 便血, 脫肛 … 등을 治療한다. 《聖濟總錄》의 赤石脂丸은 血痔로 下血이 지극히 많은 것을 治療하는데

赤石脂 白礬(燒令汁盡) 龍骨 各一兩半, 杏仁(湯浸, 去皮, 尖, 雙仁, 炒, 研) 一百枚를 가루내어 煉蜜로 梧子大丸을 만들어 空心에 棗湯으로 二十丸을 一日 二回 服用한다 하였다.

赤芍藥 行瘀, 止痛, 涼血, 消腫의 效能으로 … 腸風下血…등을 治療한다. 《名醫別錄》에 “通順血脈, 緩中, 散惡血, 逐賊血, 去水氣, 利膀胱大小腸, 消癰腫, …” 이라 하였다.

全蝎 祛風, 止癩, 通絡, 解毒의 效能이 있고, 《袖珍方》에 初發痔瘡을 治療하는데 全蝎 二, 三個를 燒熏하라 하였고, 《聖惠方》에서는 大腸風毒下血을 治療하는데 白礬(三) 二兩, 乾蝎 二兩(微炒)를 搗細하여 散으로 만든 후 食前에 溫粥으로 半錢을 먹으라 하였다.

田螺 우렁이를 말하며, 清熱, 利水の 效能이 있고, 外用하여 熱瘡(痔瘡)을 治療한다.

皂莢 潤燥通便, 祛風消腫의 效能으로 大便燥結, 腸風下血…등을 治療한다. 《本草綱目》에 “皂莢, 能通大腸陽明燥金, 乃辛以潤之之義, 非得濕則滑也.” 라 하였다.

鯽魚 健脾利濕의 效能이 있고, 外用으로 臍毒下血, 腸風을 治療한다.

枳殼 破氣, 行痰, 消積의 效能으로 … 脫肛, 便秘 … 등을 治療한다. 《日華子本草》에 “…痔腫可炙熨” 라 하였다.

地骨皮 清熱, 涼血의 效能이 있고, … 癰腫, 惡瘡을 治療한다. 《經驗方》에 地骨皮散은 腸風痔漏, 下血不止를 治療하는데 地骨皮, 鳳眼根皮 各等分(同炒, 微黃色)을 細末하여 每服三錢

하는데 空心에 溫酒로 한다.

知母 滋陰降火, 潤燥滑腸의 效能이 있고, 外治法으로는 잘 활용하지 않는다.

地榆 涼血止血, 清熱解毒의 效能으로 ... 腸風, 痔漏 ... 등을 治療한다.

《名醫別錄》에 “止膿血, 諸漏, 惡瘡, 消酒, ...”, “主內漏不止, 血不足” 이라 하였다.

珍珠 鎮心安神, 養陰熄風, 清熱墜痰, 去翳明目, 解毒生肌의 效能이 있고, 外用으로 瘡瘍久不收口한데 生肌의 效能이 있다.

(㉞)—————

蒼耳根 疔瘡, 癰疽, 纏喉風, 丹毒, ... 등을 治療한다.

蒼耳子 散風, 止痛, 祛濕, 殺蟲의 效能이 있고, 外用하면 주로 疔瘡惡毒, 疥癩 등을 治療한다.

蒼朮 健脾, 燥濕, 解鬱, 開穢의 效能이 있고, 《本草綱目》에서는 “治濕痰留飲, 或挾瘀血成窠囊, ... 消瀉腸風.” 이라 하였고, 《本草求原》에 “... 脾濕下血” 이라 하였다.

天南星 燥濕化痰, 祛風定痙의 效能이 있고, 外用하면 주로 癩癧, 癰腫, 跌撲折傷, 蛇蟲咬傷을 治療한다.

川椒 溫中散寒, 除濕止痛, 殺蟲, 解魚醒毒의 效能이 있고, 外用으로는 주로 煎湯하여 濕疹瘙痒을 治療한다.

草烏 搜風勝濕, 散寒止痛, 開痰, 消腫의 效能이 있고, 外用하면 주로 癰疽, 疔瘡, 癩癧을 治療한다.

葱白 發表, 通陽, 解毒의 效能이 있고, 《必效方》에 痔正發疼痛을 治療하는데 葱과 鬚를 濃煎湯으로 하여 盆

中에 坐하여 熏하라 하였다.

側柏葉 涼血, 止血, 祛風濕, 散腫毒의 效能으로 ... 腸風...등을 治療한다.

《百一選方》에서 痔, 腸風, 臟毒, 下血不止를 治療하는데 柏葉을 燒灰하여 調服하라 하였고, 《普濟方》의 側柏散은 腸風, 臟毒, 酒痢, 下血不止를 治療하는데 嫩柏葉(九蒸九曬) 二兩, 陳槐花 一兩(炒半黑色)을 가루내어 梧桐子大로 煉蜜丸을 만들어 四,五十丸을 空心에 溫酒로 服用하라 하였다.

梔子 清熱, 瀉火, 涼血의 效能이 있고, 《廣西中草藥》에서 瘡瘍腫痛을 治療하는데 山梔 蒲公英 金銀花 各四錢을 水煎하여 하루 세번 나누어 服用하고, 生銀花藤適量을 搗爛하여 患處에 敷하라 하였다.

(㉟)—————

貝母 清熱止咳, 止血定痛, 接骨의 效能이 있고, 外用하면 止血시킨다.

片腦 冰片을 말한다.

(㊱)—————

蝦蟆 蛙科 動物인 澤蛙의 전체를 말하며 清熱解毒, 健脾消積의 效能이 있고, 外用하여 癰腫, 癩癧, 熱癩, 瘡毒을 治療한다.

河豚卵 外用하여 주로 疥癬, 蟲瘡을 治療한다.

寒水石 清熱降火, 利竅, 消腫의 效能이 있고, 外用으로 주로 丹毒과 燙傷을 治療한다.

薤葉 《肘後方》에 “治疥瘡, 煮洗佳, 搗如泥敷亦得.” 이라 하였다.

血竭 散瘀定痛, 止血生肌의 效能이 있고, 《楊氏家藏方》의 血竭散은 痔漏

疼痛不可忍을 治療하는데 血竭을 細末하여 津唾로 자주 調塗하라 하였다.

荊芥 發表, 祛風, 理血의 效能으로 … 便血, 癰腫, 瘡疥, 癩癧 … 등을 治療한다. 《本草綱目》에 “散風熱, 清頭目, 利咽喉, 消癰腫, … 下血, … 痔漏.” 이라 하였고, 《簡便單方》에 痔漏腫痛을 治療하는데 荊芥煮湯으로 매일 洗하라 하였다.

荊芥穗 荊芥와 效能은 같으나 發散의 힘이 비교적 강하다.

滑石 清熱, 滲濕, 利竅의 效能이 있다.

黃芩 瀉實火, 除濕熱, 止血, 安胎의 效能이 있고, … 漏, 癰腫疔瘡… 등을 治療한다.

黃芪 生用하면 益衛固表, 利水消腫, 托毒, 生肌의 效能이 있고, 炙用하면 補中益氣의 效能이 있어 … 脫肛, … 及一切氣衰血虛之證을 治療한다. 《神農本草經》에서 “主癰疽, 久敗瘡, 排膿止痛, 大風癩疾, 五痔, 鼠漏…” 라 하였다.

黃連 瀉火, 燥濕, 解毒, 殺蟲의 效能이 있고, 外用하면 癰疽瘡毒, 濕疹 … 등을 治療한다.

黃栢 清熱, 燥濕, 瀉火, 解毒의 效能으로 … 痔瘡, 便血 … 등을 治療한다.

蒼草根 利水, 涼血의 效能으로 … 便血 … 등을 治療한다.

黑豆 活血, 利水, 祛風, 解毒의 效能으로 … 癰腫瘡毒 … 등을 治療한다.

1. 痔瘡의 原因으로는 久坐, 久站, 久行 或은 勤苦勞役, 負重遠行, 以致 氣血交錯, 生於肛門하는 것, 飲食不節, 大便失調(便秘或腹瀉)로 인한 것, 妊婦多産(産後用力太過, 中氣下陷)한 경우, 房事過度或忍精不瀉한 경우, 感受濕熱, 風燥邪氣한 경우, 遺傳素因으로 인한 경우와 其他로 憂思太過, 蘊積熱毒한 경우, 臟腑本虛한 경우 등이 있다.

痔漏의 原因은 外感風熱燥火濕邪한 경우와 痔久不愈한 경우, 飲食醇酒厚味, 勞傷優思, 便秘, 房勞過度한 경우, 肛門局部氣血運行不足한 경우, 그리고 기타로 一切癰疽, 皆是瘡瘍本神所患, 瘻之後膿汁不止, 得冷卽是鼠瘻라 하였다.

2. 痔瘡의 分類로는 牡痔, 牝痔, 脈痔, 腸痔, 氣痔, 酒痔, 血痔, 瘻痔 등으로 나누었고, 그리고 다른 방법으로 外痔(수치질), 混合痔, 內痔(암치질), 息肉痔, 乳頭痔로 나누며, 또 外痔에는 靜脈曲張型和 結體組織型, 血栓型등으로 나누었다.

痔漏의 分類로는 單純低位瘻와 低位重複性 痔瘻, 有外口 無內口瘻와 有內口 無外口瘻, 深部瘻, 單口外瘻, 馬蹄瘻 등으로 나누고, 또한 괞약근간형, 괞약근관통형, 괞약근상형, 괞약근외형 등 4형으로도 나누었다.

3. 痔瘡과 痔漏의 治療方法으로는 內治法, 그리고 熏洗法, 外敷法, 塞藥法, 枯痔法, 熨法 등의 外治法, 그리고 注射法, 插藥療法, 結札療法 등의 手

## V. 結論

術과 其他 療法으로 鍼灸法 등이 있다. 그 중 臨床에서 結札療法, 切開排膿法, 挂線療法 등이 많이 활용되고 있다.

4. 內治法에서 多用되는 藥物로는 荊芥(24), 白芷(19), 防風(29), 升麻(23), 槐角(22), 黃芩(31), 黃連(31), 黃栢(23), 生地黄(31), 大黃(22), 秦艽(18), 蒼朮(16), 茯苓(22), 澤瀉(17), 陳皮(19), 枳殼(56), 檳榔(16), 地榆(32), 槐花(37), 川芎(32), 乳香(14), 桃仁(14), 皂角刺(21), 人參(21), 黃芪(44), 白朮(28), 當歸(73), 白芍藥(21), 阿膠(15), 烏梅(12), 白礬(14), 猬皮(29), 亂髮(13) 등 이었다.

5. 外治法으로 熏洗法에 多用되는 藥物로는 苦參(6), 甘草(6), 防風(6), 五倍子(8), 艾葉(7), 枳殼(12), 葱白(5), 荊芥(14) 등 이었다.

그리고, 外敷法으로 多用되는 藥物로는 輕粉(11), 當歸(5), 沒藥(8), 密陀僧(5), 冰片(18), 白礬(13), 白芨(5), 麝香(9), 熊膽(7), 五倍子(7), 乳香(11), 龍骨(10), 黃丹(7), 黃栢(6), 黃連(7), 血竭(9) 등 이었다.

## 參考文獻

1. 樓全善 : 醫學綱目, 臺南, 臺南北一出版社, pp.60-78, 中華民國 六十二年七月.
2. 程士德 外2人 : 黃帝內經·素問, 北京, 人民衛生出版社, 上冊 p.47, 下冊 p.87, 1982.
3. 홍성국 박재갑 : 대장 항문학, 서울, pp.63-84, 91-111, 1991.
4. 李克光 主編 : 金匱要略, 北京, 人民衛生出版社, p.314, 1989.
5. 孫思邈 : 備急千金要方, 北京, 人民衛生出版社, pp.413-417, 1982.
6. 方賢 : 奇效良方, 香港, 商務印書館, pp.943-964, 1977.
7. 陳實功 : 外科正宗, 北京, 人民衛生出版社, pp.170-178, 1964.
8. 楊思澍 : 中國臨牀大全, 北京, 北京科學技術出版社, pp.929-938, 1991.
9. 吳謙 : 醫宗金鑑, 서울, 大成文化社, 下 pp.335-340, 1991.
10. 李梴 : 醫學入門, 서울, 大成文化社, 婦人, 小兒, 外科編 pp.368-373, 1982
11. 薛己 : 薛氏醫案, 서울, 鼎談出版社, 中國醫學大系32卷, pp.395-398.
12. 이시진 : 本草綱目, 서울, 鼎談出版社, 中國醫學大系40卷, p. 370.
13. 巢元方 : 諸病源候論, 서울, 大成文化社, pp.244-251, 1992.
14. 許浚 : 東醫寶鑑, 서울, 大成文化社, 外形編 pp.533 - 535, 1990.
15. 신중석 : 치질·치루 ……이렇게 치료한다, 서울, 상경사, pp.47-50, 179-180, 1994.
16. 조중권 : 치질, 치루, 탈항 완전비법, 서울, 세경미디어, pp.24-43, 1993.
17. 危亦林 : 世醫得效方, 서울, 鼎談出版社, 中國醫學大系14卷, pp.251-253.
18. 徐春甫 : 古今醫通大全, 北京, 人民衛生出版社, 下冊 p.444, 1991.
19. 張璠 : 張氏醫通, 上海, 上海科

- 學技術出版社, pp.862-865, 1963.
20. 朱震亨：丹溪心法附餘, 서울, 大成文化社, pp.420-436, 1990.
21. 羅天益：衛生寶鑑, 香港, 商務印書館, pp.273-286, 1981.
22. 林珮琴：類證治載, 臺北, 旋風出版社, pp.492-496, 中華民國六十七年四月.
23. 微宗敕：聖濟總錄纂要, 서울, 鼎談出版社, 中國醫學大系7卷, pp.455-459.
24. 國際韓醫學學生會：東洋醫學叢書, 서울, 일중사, 中醫外科學編 pp.165-181, 1990.
25. 龔廷賢：增補萬病回春, 서울, 일중사, 上卷 pp.252-258, 1991.
26. 申卿熙：蒼濟證方, 서울, 三藏苑, pp.569-575, 1990.
27. 朴炳昆：漢方臨床四十年, 서울, 大光文化社, pp.432-435, 1961.
28. 裴元植：漢方臨床學, 서울, 南山堂, pp.224-226, 1981.
29. 송병기：方證新編, 서울, 東園出版社, pp.80-83 p169, 172, 270, 271, 304, 307, 319, 338, 339, 360, 374, 383, 385, 400, 414, 450, 451, 469, 522, 525, 526, 1983.
30. 洪淳昇：洪家定診秘傳, 서울, 大成文化社, p.57, 1955.
31. 張介賓：景岳全書, 서울, 大成文化社, 下 pp.318-320, 813-887, 1988.
32. 陳師文：太平惠民和劑局方, 臺北, 旋風出版社, p.9, 11, 1994.
32. 신광호：漢方外用藥, 서울, 열린책들, pp.392-394, 1994.
33. 謝觀：東洋醫學大辭典, 서울, 高文社, pp.663-665, 1970.
34. 新文豐出版公司：新編中4藥大辭典, 臺北, 中華民國七十一年一月.
35. 全國韓醫科大學 本草學教授：本草學, 서울, 永林社, 1991.