

① 咳喘, ② 口眼歪斜, ③ 驚風(癇疾)驗方

副會長 金 兌 鎮
(南洋堂 韓藥房)



累代에 걸친 加傳秘方을 發表한다
治驗例는 不知其數여서 略한다

一. 咳嗽 喘息驗方

● 加味生麥君子湯

麥門冬 5.0 便香附子 人蔘 各 3.0 半夏 白朮 各 1.5 陳皮 白茯
苓 蘇子 杏仁 桑白皮 各 1.0 木香 빙랑 炙甘草 各 0.7 薑 3 藉 2

① 或加 五味子 桔梗 貝母 各 1.0

② 少陽人일 境遇 人蔘을 2.0으로 減量한다

③ 1劑有效 3~5劑정도로 完治.

二. 口眼歪斜(顏面神經麻痺) 驗方

● 加味升麻葛根湯

升麻 2.0 天麻 伍靈仙 甘草 各 1.5 白芷 牛膝 各 1.3 當歸身 葛根 蒼朮 麻黃 各 1.0 柴胡
藁本 羌活 黃柏酒洗 草豆蔻 各 0.7 蔓荊子 0.5 薑 3 藉 2 虛者 加 鹿茸.

① 1~2劑完治 重者 2~3劑

② 현대 의학에서는 口眼歪斜를 三叉神經炎으로 본다.

本 方을 胃風面腫에 使用하므로 方義가 一致한다고 볼 수 있을 것이다

三. 小兒驚風 및 癇疾驗方

● 加味寧神湯

(用量은 成人量이므로 小兒는 減量하여야 한다)

牛膽南星 1.5 半夏 陳皮 白茯神 土天麻 各 1.2 人蔘 酸棗仁炒 石菖蒲 遠志 枳實 竹茹 黃

■ 驗 方

連 甘草 各 07 薑 5, 辰砂3分 調服, 1日 3回 服用 但 辰砂는 朝夕으로 2回만 服用한다.

① 小兒 驚風 10~20貼 完治.

癇疾에는 1~3劑服用

② 成人도 心虛 热痰으로 發生하는 癇疾에 輕症이면 2~5劑, 重症이면 5~10劑로 完治된다. 오래 되지 않은 患者나 青年 小兒은 더 잘 낫는다.

(全州 完山區 中央洞 4街 T 88-2020)

상식메모

醫道는 好生의 精神에서

醫師된자 聲聞과 名譽를 얻고자 힘쓰지 않으며 財利를 交計하지 않으며 남의 知識과 才能을 嫉忌하지 않으며 남이 勝選하거나 倔慢한 것을 論評하지 않으며 오직 사람의 生命을 救濟하고 疾病을 治療한다는 心情이 있어야만 醫道를 紹明할 수 있고 行術할 수 있는 것이다

- 入門 -