

① 癇疾, ② 은疹, ③ 鼻瘡, ④ 下腹痛, ⑤ 百日咳,
⑥ 膽囊炎, ⑦ 頭痛, ⑧ 肋膜炎, ⑨ 목디스크, ⑩ 椎突出症 驗方

朴 東 喆
(第一 한약방)



筆者 나이 70에 이르러 자신있다고 내어놓을 만한 處方이 무엇일까하고 생각하였으나 100% 자신 있는 방문이 없구나 생각하니 허망하다는 생각을 어찌지 못하였다. 그래도 어떠한 질병을 많이 치료하였는가 하고 다시 곰곰이 생각하여 보니 그래도 다음에 소개하는 癇疾等 몇 가지 處方은 나의 特殊方이라고 생각되어 용기를 내어 여러 회원들께 發表하고자 한다.

一. 癇疾 驗方

發表 處方은 病院治療가 不可能한 상태의 患者에게 效가 있다는 특징이 있다. 筆者는 癇疾을 크게 두 가지로 分類한다.

(1) 先天性 癇疾

先天性 癇疾은 難治로서 그 症狀은 卒倒倒地 口금吐沫 咬牙作聲 須後便醒한다. 用藥은 九蒸靈砂를 細末하여 每 5인分重式 1日 2回 朝夕 服用한다. 限 30兩이면 完治된다.

(2) 後天性 癇疾

後天性 癇疾은 年齡25세 以上者의 發病患者를 말한다. 患者의 말이 發生時 手指가 저릿하면서 그 기운이 어깨까지 오는 것 같으면서 정신을 잃는다. 그리고는 얼굴과 입 눈 등이 痙攣이 온다. 몇 분 지나서 깨어나기는 하지만 後頭痛이 온다. 대부분의 이 患者들은 酒客으로 脫氣狀態에 있을 때 오는 경우가 많고 酒客이 아닌 患者도 氣血이 衰弱해졌을 때 발생하게 된다.

(3) 治癇疾 - 3劑 내지 4劑면 完治된다

土川芎 白芍藥 法熟地黃 各 1.5. 甘草 10 柴胡 半夏 黃芩 土南星薑製 白付子水浸 炒去香

荊芥穗 天麻 全蟲 白茯苓 獨活 細辛 白薑蠶 各 05. 竹葉 7片 薑3

二. 은疹 驗方

晝間에는 아무렇지 않다가 夜間에만 發生하는 두드러기 藥方이다 病院治療도 받고 韓藥 치료도 받았으나 效가 없을 때 特效方이다. 夜間에 發生하는 皮膚搔痒症이면 모두 效가 있다.

● 加味四物湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各1 2 知母(동동酒炒) 黃栢(동동酒炒) 梔子炒 柴胡 牡丹皮 甘草 各07.

• 知母 黃栢 동동酒炒는 동동주에 버무리 꼭 찌서 사용하여도 좋다

三. 鼻瘡 驗方

鼻瘡이라 하면 옛날에는 水銀劑를 많이 썼으나 副作用이 있었다. 紹介하는 處方은 瘡菌을 죽이는 좋은 處方이다. 病院에서 오래 治療하여도 無效일 때 잘 治療된다 1例로 든다면 鼻瘡으로 汁물이 나오고 米粒狀의 發疹이 생기어 가렵고 아프고 하여 참기 힘든 患者를 此方으로 治療한바 있었다 治療 限度는 1劑 乃至 2劑 甚者是 3劑면 完治된다

● 加味黃芩湯

黃芩 梔子炒 桔梗 赤芍藥 桑白皮 麥門冬 荊芥 薄荷 連翹 杏仁 天花粉 葛根 紅花 甘草 各 1 0

四. 下腹痛 驗方

(1) 男子 臍下腹痛

① 原因 · 夫婦 性關係로 因하여 發生

男子 元氣不足時 無理한 性關係로 因하여 臍下部가 틀어 오르듯이 痛症이 오는 症狀이다. 경우에 따라서는 關係後 3~4日後에 發生하는 境遇도 있다는 것을 留意한다. 옛날에는 兩感症이라고 부리기도 하였다. 服用 限度는 10~20貼程度면 된다.

● 加味雙和湯

雙和湯에 加味 小茴香炒 1.0 玄胡索 0.5

■ 驗 方

(2) 女子 臍下腹痛

① 原因 . 性關係時 男子의 精力이 強하여 長時間에 걸쳐 婦人이 無理가 오므로 子宮 機能이 損傷되어 發生된 症狀이다. 下腹底部(불-두덩)가 눌러 보면 痛症이 있다. 服用 限度는 20-40貼程度면 된다.

● 煖間煎

枸杞子 30 當歸 白茯苓 烏藥 小茴香 各 2.0 肉桂 1 0 木香 0 5

(3) 室女 臍下腹痛

23세의 處女, 下腹部痛으로 7일 동안 고생이 막심하였다 食則嘔吐로 病院치료를 받았는데 腸炎이라는 진단을 받았으나 效果가 없다. 아랫배를 눌러보니 양쪽 卵巢部位가 아프다고 한다. 喇叭管炎으로 보고 아래 처방으로 하였다. 女人은 양쪽 아랫배에 各其 나팔관이 있는데 處女들도 陰이 動하면 남자를 생각하게 되고 뜻을 못 이루게 되면 나팔관이 부어서 下腹部 痛症이 오게 되는 것으로 處女뿐만 아니라 젊은 寡婦도 妊娠期가 되면 이 部位가 부어서 아프게 된다 寡婦, 處女를 莫論하고 아랫배에 痛症이 오면 일단 喇叭管炎을 念頭에 두고 對應하는 것이 좋을 듯 싶다 服用 限度는 20貼 정도면 된다

● 柴胡抑肝湯

柴胡 2 0 青皮 1 5 赤芍藥 牡丹皮 甘草 各 1 0 地骨皮 香附子 梔子炒黑 蒼朮 各 0.7 川芎 神曲炒 各 0 5 生地黃 連翹 各 0 3.

五. 百日咳 驗方

10歲 未滿 小兒의 기침으로 發病 10日이 經過하여도 낫지 않고 持續되며 20日이 經過後에는 咳咳거리리는 기침으로 발전하면 百日咳증으로 보고 이 약을 쓴다

● 加味四物湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各 2 0 土桑白皮 土地骨皮 各 1 0 麻黃 杏仁 黃芩 甘草 各 0 5

· 用法 . 1日 1~2貼 午前 10時 午後 4時頃 服 限 10~20貼.

六. 膽囊炎 驗方

膽囊炎은 飲酒客과 神經性으로 오는 境遇가 많은데 心下右側腹에 發作性 痛症이 오고 惡

寒發熱 口苦等證이 오게 된다 按壓하면 膽部位에 痛症이 있다.

● 治膽囊湯

甘草 2.0 白芍藥 柴胡 當歸 草龍膽 各 1.0 金銀花 瓜蒌仁 各 0.8 青皮 黃連 梔子 牡丹皮 各 1.7 大黃酒蒸 0.5 木香 0.3

• 用法：20~40貼 限 完治.

× 膽石症 · 加味大柴胡湯 - 柴胡 白芍藥 各 3.0 黃芩 2.0 甘草 1.5 半夏 梔子炒 乳香微炒 玄胡索 各 1.0 限 2劑

七. 神經性 頭痛 驗方

男女神經性 頭痛 通治方

● 治頭痛方

當歸 川芎 白芍藥 陳皮 半夏 白茯苓 香附 蒼朮 蘇葉 梔子 牡丹皮 甘草 各 1.0 木香 檳榔 各 0.5

八. 濕性 肋膜炎 驗方

蒲公英 金銀花 各 3.0, 赤芍藥 白何首烏 丕角刺 木通 半夏 獨活 瓜蒌仁 天花粉 當歸 薏苡仁 枳殼 白芷 甘草 各 1.0 限 3劑

九. 목 디스크

羌活勝濕湯 本方 重量 割增도 可함

十. 腰脊骨突出症 驗方

● 三一腎氣湯 本方

老人子早 乃精髓不足而 督脈虛也 宜用 補腎益精髓之劑.

(全北 淳昌郡 淳昌邑 T 53-2495)