

## ① 頭痛, ② 高血壓 驗方

徐 龍 鉉  
(고려당 한약방)

1. 血虛, 風濕, 痰厥, 眉稜骨痛 通治. 正, 偏頭痛不問하고 包括方으로 使用

● 加減選奇散(頭痛 包括方)

半夏 天麻 當歸 川芎 白芍藥 白芷 荊芥 防風 陳皮 羌活 連翹 各 1.0 蘇葉 薄荷 甘草 各 0.5 薑 3

× 但 氣虛 頭痛은 加味 黃기蜜炙 2.0 藁本 1.0 升麻 柴胡 蔓荊子 各 0.3 細辛 0.2 陰火上衝이면 去 羌活 加 黃栢 0.7

• 治例 수척한 체질의 45歳の 婦人, 2년전부터 正頭痛, 或 全頭痛으로 脈 沈數하였다 病院과 韓方에서 治療받았으나 無效라 本方 1劑로 治療함

2. 高血壓 上氣症, 및 怔忡症 婦人이나 入試生 등의 노이로제, 精神異常, 衝擊으로 인하여 發生된 諸 神經症.

● 加減溫膽湯

香附子 2.4 生地黃 2.0 橘紅 1.2 黃芩 石菖蒲 甘草 各 1.0 半夏 枳實 竹茹 各 0.8 黃連 知母 黃栢(竝鹽炒) 梔子 各 0.7 白茯苓 柴胡 桔梗 麥門冬 各 0.6 薑 3 棗 2

本方證은 心膽虛怯 觸事易驚이다 痰涎이 氣와 相搏하여 諸症이 發生된 症狀에 쓴다고 되어 있다 本方은 心熱上昇을 抑制하고 下降作用의 特效方이다 血壓降下 作用과 心神을 安定시킨다 또는 面紅 上氣症을 解消하는 良方이다 84년 4월에 31歳の 高校教師가 陽症 精神病으로 數次 入院治療하였으나 再發을 거듭하여 本方 6劑로 完治되었고 그후 3년간은 매년 3劑式 服用시켰더니 再發없이 根治되었다 85년 7월에도 재수생이 심한 노이로제로 入試 포기狀態였으나 本方 6劑로 大學에 진학한 바 있었음

(광주 남구 월산동 T 361-6656)