

邊極 教授의  
韓方 名處方集

學術委員 蘇秉昌  
(東仁堂 韓藥房)



邊極 교수님은 원광대학교 한의과대학장을 역임하신 살아 있는 부처님이라는 별명을 얻을 만큼 다방면에 걸쳐 많은 업적을 남기신 분이다. 边教授는 全南 和順郡 二西面 永坪里 (1903년~1988년)出身으로서 醫師이시면서 한의학에도 능통하셨다. 일찍이 大儒學者이신 梁齋 田愚선생의 門下에서 漢文學을 修學하셨고 佛教材圓獎學金으로 上海 同濟大學校 醫科大學을 졸업하였는데 이때 학생의 신분으로 抗日獨立運動에 가담하게 되었으며 후에 臨時政府 국무위원까지 되셨다가 평양 감옥에서 3년간 옥고를 치렀는데 이때 옥중에서 한방 의학에 心醉하셨다고 한다. 이후에는 서울 정치 대학 강사로 시작하여 이리 농대, 광주 농대, 전남대 문리대의 강사, 부교수를 거쳐 원광대학교 초대 한의과대학장으로 취임하여 후학양성에 심혈을 기울이게 되었다. 그 뒤로 圓佛教에 입학하여 法恩事業會長, 또는 圓佛教中央療養院院長을 지내셨다. 壯年期에는 私財를 털어 초등학교를 설립하는 등 실천하는 教育者로서 또는 奉仕하는 의료인으로서의 평생을 바쳤으니 그의 일생은奉仕人 바로 그것이었다고 한다. 신분은 의사였으나 그의 祖父는 全北 고창에서 한약방을 하셨다. 하고 先生도 光州 계림동에서 한때 한약방을 운영하여 산부인과 방면에서의 명의라는 말씀을 들었다고 한다. 대학교수로, 의사로, 한약인으로, 종교인으로 그분의 눈부신 평생은 후학인 저희들의 웃깃을 여미게 하는 것이다.

여기 소개하는 边教授의 名處方은 边教授의 弟子로서 원광한의원을 經營하는 金春澤社長께서 생전에 边教授께서 아껴 쓰시던 처방들을 노트하여 놓았던 것을 10여년전에 저에게 주셨는데 筆者が 多年間 運用하여 본 결과 모두가 명방이라고 믿어 이번에 이것을 정리하여 소개한다. 適宜 選用하면 좋은 결과가 나오리라 믿으니 試用하여 보시기 勸하는 바이다.

■ 目 次

一. 婦人科

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1 月經不順(加敗散)        | 11 婦人下血 (全生活血湯)        |
| 2 不妊症 排卵障礙(加味種玉湯)  | 12 不妊症 腹中 有積(調經育子湯)    |
| 3 月經不止(加味止經湯)      | 13 胎中產母胎兒健康(無憂散)       |
| 4 月經 閉塞(加味通經湯)     | 14 流產防止 (膠艾四物湯)        |
| 5 月經數月不通(養血痛經湯)    | 15 惡疽流產豫防 (加味養胃湯)      |
| 6 子宮 積 月經不通(清熱通經湯) | 16 轉女為男 (轉男湯1號)        |
| 7 無以上 無月經(通經調氣湯)   | 17 轉女為男 (轉男湯2號)        |
| 8 經度不順 子宮有積(紅花當歸散) | 18 胎動流產憂慮 (加味安胎飲)      |
| 9 處女 月經不順(加味小溫經湯)  | 19 孕婦8~9回月健康 羊水過多(達生散) |
| 10. 婦人 月經不順(加減四物湯) | 20 臨產時順產(三合濟生湯)        |
|                    | 21 產母乳汁不足 (通乳湯)        |
|                    | 22 產後 腹痛 腰痛(起枕散)       |

- 23 產後諸症(歸丸保產湯)
- 24 胎中感氣(蓼蘇飲)
- 25 妊產婦 四肢浮腫(茯苓湯)
- 26 妊娠中 小便 頻數(茯苓湯)
- 27 陰部浮腫 痒症(白頭湯)
- 28 陰部痒症 (將軍散)
- 29 小便不利 오줌소태(八正散)
- 30 被任方1號(加味四物湯)
- 31 被任方2號(加味四物湯)
- 32 寡婦病(柴胡抑肝湯)

## 二. 小兒科

- 1 어린이 補藥(肥兒湯)
- 2 左癧 왼쪽 자래(淨府湯)
- 3 右癧 오른쪽 자래(抑肝扶脾湯)
- 4 小兒感氣咳嗽(蓼蘇飲)
- 5 感氣 消化不良 嘔吐(董正散)
- 6 紅疹 뒤 喘促(十仙湯1號)
- 7. 紅疹 뒤 咳嗽(十仙湯2號)
- 8 熱이 甚할 때(大連翹湯)
- 9 消化不良 嘔逆(香砂養胃湯)
- 10 吐乳 嘔吐(加味保和湯)
- 11 小兒 腦炎(甲己返魂湯)
- 12 癪疾風 特效(清心抑肝湯)
- 13 乳兒驚風(驚風敗毒散)
- 14 小兒 걸음이 늦을 때(鹿茸地黃丸)
- 15 小兒 말이 더딜 때(菖蒲丸)
- 16 小兒胎中 黃疸(加味地黃湯)
- 17 小兒 夜尿症(不禁湯)
- 18 小便 白濁 血尿(水火分消湯)
- 19 便閉 또는 便秘(沒藥散)
- 20 小兒癩瘻 初期(五瘻湯)
- 21 小兒癩瘻 脚膝癩瘻(增味五瘻湯)

## 三. 内科

- 1 各種 鬱症(六鬱湯)
- 2 諸般 鬱症(加味諸鬱湯)
- 3 心火 上衝(淸心調和湯)
- 4 장티브스 热甚(羌活沖和湯)
- 5 장티브스(神解散)
- 6 黃疸 初期 肝炎(茵陳五靈散)
- 7 黃疸 肝炎(茯苓湯)
- 8 腎虛 咳嗽(滋陰清火湯)
- 9 肺結核 二期(桔梗湯)
- 10. 肺結核 血(聖惠人蔴湯)
- 11 정충症 陰虛吐血(蓼苓白朮散)
- 12 정충 甚 不眠症(茯苓補心湯)
- 13 心臟性 喘息(蘇子降氣湯)
- 14 大便 下血(解毒四物湯)
- 15 小便 血尿(淸腸湯)
- 16 氣管支炎 咳嗽(淸咳湯1號)
- 17 肺炎性 咳嗽(淸咳湯2號)
- 18 肺浸潤 咳嗽(加減二陳湯)
- 19 陰虛火動 潮熱 盗汗(淸이滋坎湯)
- 20 肺지스토마 咳嗽 血(淸斗湯1號)
- 21 肺지스토마 咳嗽 血(淸斗湯2號)
- 22 感氣 몸살 無名熱(不換金正氣散)
- 23 外感 內傷(行氣香蘇散)
- 24 感氣 扁桃腺炎(必用方感桔湯)
- 25 冬月 風寒 咳嗽(九寶湯)
- 26 消化不良 胃潰瘍(人蔴養胃湯)
- 27 健脾 養胃 (加味蓼朮健脾湯)
- 28 常用 消化劑 (補胃散)
- 29 口苦 手術後 입이 쓰 때(理脾湯)
- 30 胃腸性 面體 四肢浮腫 (香砂和中湯)
- 31 大小便 不通(潤腸湯)
- 32 腎臟 結石(海金砂散)

## ■ 驗 方

- 33. 泄瀉 痢疾 大腸炎(正腸湯)
- 34 糖尿病 消渴症(千金文武湯)
- 35 糖尿病 精力不足(養血清火湯)
- 36 不眠症 勞心 心神不安(安神復睡湯)
- 37 心臟肥大 心臟瓣膜症(加味溫膽湯)
- 38 心臟血虛 不眠症(四物安神湯)
- 39 多睡 잠이 너무 많을 때(吳茱理中湯)
- 40 狹心症 糖尿(養血清火湯)
- 41 肝浮腫 盲腸 慢性腎臟炎(敗醬湯)
- 42 盲腸 吳 內腫(真人活命飲)
- 43 盲腸炎 神效(金銀淸腸湯)
- 44 肋膜炎 癰疽(托裏消毒飲)

## 四. 外科

- 1 瘀血豆 因한 中風(加味返魂湯)
- 2 腦溢血 中風(烏藥順氣散)
- 3 中風 面黑 平足不仁(疎風湯)
- 4 中風 大小便 不通 便秘(滋潤湯)
- 5 中風 熱이 甚할 때(防風痛聖散)
- 6 顏面神經 癱瘓 구안와사(復正湯)
- 7 中風에 手足 不仁(大羌活湯)
- 8 手足風 中風(加味萬金湯)
- 9 中風 오리약(鴨湯)
- 10 담결릴 때(淸濕化痰湯)
- 11 關節炎 腰痛(疎風活血湯)
- 12 頭痛 高血壓(淸上疎痛湯)
- 13 鼻 咯血(生地黃湯)
- 14 更年期 神經痛(加味地黃湯)
- 15 腎虛 腰痛(加味地黃湯)

- 16 風濕 肝腎虛 腰痛(獨活寄生湯)
- 17 水氣不足 高血壓 後頭痛(下元煎)
- 18 火傷 神藥(寒水石散)
- 19 折骨 碎骨(接骨散)
- 20 水蟲(무좀) 濕疹(硫黃膏)
- 21 打撲傷 內腫 瘀血(解瘀散)
- 22 寄生性 包行疹(加味四物湯)
- 23 大手術後 補藥(加味大補湯)
- 24 煉炭가스 中毒(加味大補湯)

## 五. 眼科

- 1 眼疾 目赤 腫痛(四物龍膽湯)
- 2 肝虛 晴疼 冷淚(補肝散)
- 3 眼球 紅 視力弱化(祛風淸熱湯)

## 六. 皮膚科

- 1 은疹 王두드러기(은疹敗毒散)
- 2 깨두드러기(加味十神湯)
- 3 全身이 가려울 때(祛風敗毒散)
- 4 乳兒두드러기 热 紅疹初(加味升葛湯)
- 5 腎臟炎 浮症(分心氣飲)
- 6 淋巴腺腫 耳下腺腫堅(淸毒化堅湯)
- 7 귀밑머리 腫氣(射干湯)
- 8 라력턱밑에 뭉을(天癸昆金湯)

## 七 小兒 及 大人泄瀉(蘇秉昌 驗方)

## 一. 婦人科

### 1. 加敗散

當歸 繢斷 牛膝酒洗 陳莉芥穗 元防風 元  
柴胡去蘆 獨活 羌活 赤茯苓去脈 大枳殼去  
穰半炒 草果去殼炒研 各 1錢 川芎去油 粳  
米 桔梗 前胡 各 7分 玄胡索醋浸炒 桃仁去  
雙仁 各5分 紅花 甘草 各 3分 生薑3 大棗2

- ① 治月經不順 腹痛 腰痛 不妊症
- ② 나팔관 閉塞 行經時 行經 日數대로  
밤에 初湯 아침에 再湯
- ③ 不感症 加 蔓茸 1~2錢

### 2. 加味種玉湯

當歸酒洗 2錢 熟地黃 便香附子 各1錢5  
分 吳茱萸湯泡 川芎 各 1錢 官桂去皮 白芍  
藥酒炒 白茯苓 陳皮 玄胡索醋炒 乾薑炒黑  
藥艾醋炒 各 7分 生薑 3片

### 3 加味止經湯

當歸酒洗 1錢3分 熟地黃 川芎 白朮 白芍  
藥酒炒 香附子 阿膠珠 黃芩 蒲黃炒 砂仁炒  
側柏葉鹽水炒 各 7分 甘草 3分 生薑 3

- ① 經度가 그치지 않고 繢續 여러날 나  
을 때
- ② 甚即 側柏葉 白茅根 各2錢

### 4. 加味通經湯

當歸 川芎 玄胡索炒 蘇木 三稜醋炒 蓬朮  
殼炒 桃仁 紅花 官桂 黃芩 厚朴薑炒 枳實  
半炒 枳殼半炒 赤芍 大黃酒炒 乾地黃 各 1

錢 烏梅1 生薑 3 大棗 2 服藥時 酒三匙

- ① 經閉 여러달 오지 않을 때
- ② 妊娠 2個月 이내 流產 目的

### 5 養血通經湯

當歸 牡丹皮 各1錢5分 白芍藥 陳皮 白朮  
香附子 生地黃 各1錢 柴胡 黃芩 川芎 各8  
分 甘草4分

- ① 婦女子 數月 經度 不通

### 6 清熱痛經湯

生地黃 1錢5分 當歸 川芎 白芍藥酒炒 枳  
殼 蘇木 黃芩 各 1錢 厚朴 8分 大黃 7分 紅  
花 5分 肉桂 4分 桃仁 10個 烏梅1 薑3

- ① 子宮에 積이 있고 經度不通

### 7. 通經調氣湯

當歸酒洗 川芎 白芍藥酒炒 生地黃 便香  
附子 桃仁 各1錢 牡丹皮 便知母 牛膝 各 8  
分 柴胡 黃柏 各 6分 紅花 5分

- ① 子宮에 異常이 없이 經度가 없을 때
- ② 血虛 身體虛弱

### 8. 紅花當歸散

當歸酒洗 8分 川芎 赤芍藥 熟地黃 黃芩  
香附子 各 6分 枳殼 玄胡索醋炒 各 5分 小  
茴香 厚朴 柴胡 陳皮 三稜醋炒 蓬朮醋炒  
牛膝酒洗 各 4分 紅花 3分 甘草 2分

- ① 經度不順으로 子宮에 積(몽울)이 있  
을 때

### 9. 加味小溫經湯

## ■ 驗 方

當歸酒洗 白芍藥炒 熟地黃 香附子 各 1  
錢 枳殼 黃芩 白朮 玄胡索 甘草 各 5分 白  
芷 羌活 柴胡 砂仁 小茴香 各 4分 于3

① 處女 月經不順

### 10. 加減四物湯

當歸 白芍藥酒洗 川芎 肉桂 白芷 牧丹  
玄胡醋炒 蒲黃 五靈脂炒 各1錢5分 紅花 7  
分 没藥 5分

① 婦人 月經不順

### 11. 全生活血湯

升麻 白藥 各 1錢 葛根 當歸 元方風 羌  
活 柴胡 甘草 各 7分 川芎 藁本 各 5分 生  
地黃 熟地黃 各 4分 蔓荊子 細辛 各 3分  
紅花 1分

① 婦人下血이 甚할 때

### 12. 調經育子湯

當歸酒洗 白芍藥酒炒 白朮 香附酒炒 黃  
芩酒炒 各1錢 陳皮 8分 川芎 7分 人蔘 5分  
甘草 砂仁 2分

① 不妊症 腹中 有積塊 加 玄胡索 牧丹  
皮 各1錢

② 月經 先期者는 熱이니 加 黃連 7分  
黃芩倍入

③ 後期者는 寒이며 血虛이니 加 黃기 1  
錢 當歸倍入

④ 婦人이 오랫동안 혼자 살다가 生產하  
기를 願할 때 2~3劑 連服

### 13. 無憂散

當歸酒洗 川芎 各1錢 5分 白芍藥酒炒 1  
錢2分 貝母薑炒 兔絲子酒蒸 各1錢 黃기 荊  
芥 各 8分 厚朴薑炒 藥艾燭炒 各 7分 枳殼  
旱炒 6分 羌活 甘草 各 5分 生薑 3

① 胎中에 隨月 加用하면 產母와 胎兒가  
健康

② 流產防止 加 阿膠 1錢

### 14. 膜艾四物湯

熟地黃 白朮炒 各 2錢 黃芩 1錢5分 當歸  
酒洗 白芍藥酒炒 香附子酒炒 砂仁 杜沖去  
絲 繢斷 各 1錢 川芎 阿膠珠 各 8分 陳皮 7  
分 炙甘草 4分 藥艾醋炒 3分 穀米一撮

① 胎中 流產의 憂慮가 있을 때

② 胎中の 下血

### 15. 加味陽胃湯

藿香 竹茹 陳皮 半夏薑炒 砂仁炒 神曲炒  
便香附子 白茯苓 白朮炒 白芍藥酒炒 當歸  
酒洗 各 1錢 白荳子炒 甘草 各 5分 生薑 3  
大棗 2

① 입덧이 심할 때

② 流產防止에 加 阿膠珠 1錢

### 16. 轉男湯 1號

地黃 3錢1分 山藥 山茱 各 1錢4分白芍  
牧丹皮 澤瀉 人蔘 各1錢

① 妊娠 50日 以內에 基數日字에만 7일  
간 服用

### 17. 轉男湯 2號

熟地黃 3錢 山茱萸 各2錢5分 白茯苓 澤

瀉各 15分 紅花 3分

① 妊娠 50日 以內 服用 아침 공복에 初湯 낮에 再湯 服用

### 18 加味安胎飲

白朮炒 2錢 黃芩 1錢5分 當歸酒洗 白芍藥酒炒 熟地黃 陳皮 砂仁 阿膠珠 枳殼 香附子醋炒 蒲黃炒 各1錢 蘇梗 川芎 各 8分 甘草 4分

① 胎動하여 流產의 憂慮가 있을 때

### 19. 達生散

大腹皮酒洗 2錢 甘草灸 1錢 5分 當歸 白朮 白芍酒炒 各 1錢 人蔘 陳皮 蘇葉 枳殼 旱炒 砂仁 各 5分

① 胎上 8~9個月에 產母 健康

② 羊水過多

③ 順產豫備

### 20. 三合濟生湯

便香附子 2錢5分 當歸 土川芎去油 枳殼 旱炒 各 2錢 大腹皮 酒洗 1錢 5分 蘇梗 8分 甘草 7分 虛加鹿草 1錢

① 臨產 順產目的으로 用 2~3貼

② 產後不用

### 21. 痛乳湯

通草 2錢 木通 瞿麥 柴胡 天花粉 各 1錢 5分 桔梗 青皮 白芷 赤芍藥 連翹 炙甘草 各 7分

① 乳汁不足 摩擦乳房

② 猪足 煎水 服

### 22. 起枕散

當歸 白芍藥 各 2錢 土川芎 1錢 5分 白芷 桂皮 蒲黃炒 牧丹皮 玄胡索醋炒 五靈脂炒 没藥 各 7分

① 產後腹痛

② 月經不順으로 腹痛이 심할 때

③ 腰痛이 있으면 繢斷2錢 午脊1錢

### 23. 歸朮保產湯

當歸酒洗 1錢 5分 土川芎去油 白芍藥酒炒 熟地黃 白朮炒 白茯苓 便香附子 各 1錢 陳皮 乾薑炒黑 各 8分 甘草灸 3分 生薑3大棗2

① 治 產後 諸症

② 消化不良 加 厚朴 枳實 砂仁 山楂 各 1錢

③ 面身浮腫 加澤蘭 木通 瞿麥 各1錢

④ 虛汗 加 黃耆蜜灸2錢

⑤ 口渴 加 麥門冬 葛根 各1錢

### 24. 蓼蘇飲

黃芩 前胡 麥門冬去心 各1錢 川芎 陳皮 白芍藥 白朮 各8分 蘇葉6分 葛根5分 甘草 3分 生薑3 蔥白2.

① 胎中 感氣

### 25. 茯苓湯

白茯苓 當歸 川芎 白芍 熟地黃 白朮炒澤瀉 黃芩 山梔子 厚朴 麥門冬 甘草 各1錢

① 子腫 妊娠中 四肢浮腫

### 26. 茯苓湯

## ■ 驗 方

赤茯苓 麥門冬 大腹皮 木通 各 2錢 甘草  
1錢 竹葉 10枚

① 妊娠中 小便을 자주 볼 때.

### 27. 白頭湯

白頭翁 3錢 五倍子 小麥 白礬 芒硝 各2  
錢 糖白2 煎湯 陰部洗滌

① 陰部가 붓고 가려울 때

### 28. 將軍散

大黃 黃芩酒炒 蜜黃耆 赤芍藥 玄蔴 山茱萸  
各5錢, 細末 每2錢 食前 溫酒服用

① 陰部 痒症

### 29. 八正散

滑石 3錢 瞿麥 大黃 各2錢 滾通 木通 山  
梔子 車前子 甘草 各1錢 燈心 小許

① 小便 不通 오줌소태

### 30. 避妊 方1號

四物湯 本方 加 丁力子 2錢

① 終經後日 夕飯後에 1貼 다음 날 朝飯  
前에 1貼 服用

### 31. 被任 方2號

四物湯 本方에서 熟地黃을 生乾地黃으  
로 하고 加 紫草 1兩

① 止經日 2貼을 再湯까지 하여 3回 空  
心服

### 32. 柴胡抑肝湯

柴胡 2錢5分 青皮2錢 牡丹皮 赤芍藥 各  
1錢5分 蒼朮炒 香附山梔子炒 地骨皮去骨

各 1錢 神曲炒 8分 川芎 7分 連堯 生地黃  
各 5分

① 寡婦가 寒熱이 甚하고 食慾이 없을  
때

② 相思病

## 二. 小兒科

### 1. 肥兒湯

胡黃連 5分 使君子 四分半 人蔘 黃連 神  
曲 麥芽 山鬱肉 各3分半 白朮 3分 赤茯苓  
2分半

① 어린이 補藥

### 2. 淨府湯

白茯苓 澤瀉 各2錢 柴胡 山鬱 各1錢 黃  
芩 半夏薑炒 白朮炒 各8分 三棱醋炒 蓬朮  
炙炒 各7分 猪苓 5分 人蔘 胡黃連 甘草 各  
3分 生薑3 大棗2

① 오른쪽 자래(右癖)

### 4. 蔘蘇飲

蘇葉 陳皮 桔梗 前胡 半夏 葛根 白茯苓  
枳殼 人蔘 木香 甘草 各5分 干3

① 小兒 一切 感氣 咳嗽

### 5. 蕁正散

藿香 1錢 蘇葉 8分 陳皮 半夏薑炒 厚朴  
薑炒 白芷 大腹皮酒洗 白朮 白朮炒 桔梗  
炎甘草 各 5分 生薑3 大棗2

① 어린이 感氣 寒熱

② 消化不良 泄瀉 腹痛

③ 嘔吐

### 6. 十仙湯1號

柴胡 葛根 玄蔴 黃芩 山梔子炒 陳皮 白茯苓 枳殼半炒 生地黃 黃連 各1錢 生薑3

① 어린이 紅疹뒤에 喘促

### 7. 十仙湯2號

黃連 黃芩 連翹 玄蔴 知母 桔梗 杏仁 白芍藥炒 麻黃 牛蒡子 葛根 陳皮 厚朴薑炒 甘草 各1錢

① 어린이 紅疹뒤에 咳嗽

### 8. 大連翹湯

柴胡 甘草 各1錢6分 黃芩 1錢1分 連翹 罂麥 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍藥 各8分 荊芥 蟬退 各5分 山梔子 木通 當歸 防風 各4分 燈心 10枚 竹葉 10片

① 어린이 熱이 甚할 때

### 9. 香砂養胃湯

白茯苓 便香附子 厚朴薑炒 各8分 白朮炒 人蔘 陳皮 白荳蔻炒 各7分 木香 5分 炙甘草 3分 干3棗2

① 간난이가 消化不順하고 嘔逆이 甚할 때

### 10. 加味保和湯

白朮 香附子 烏藥 橘紅 各2錢 人蔘 竹茹 甘草 各1錢干3

① 嘔吐症 有效

### 11. 甲己半魂湯

白芍藥 2錢5分 乾地黃 2錢 當歸 川芎 各1錢5分 半夏 防風 知母 荊芥 甘草 各1錢 生薑3

① 어린이 腦炎으로 잠만자고 말을 못할 때에

### 12. 清心抑肝湯

當歸酒洗 白芍藥炒 白朮炒 白茯苓 陳皮 半夏干炒 枳實 石菖蒲 日黃連干炒 竹茹 香附子干炒 麥門去心 遠志去心甘草水炒 人蔘 甘草 各4分 干3

① 痢疾風 特效

### 13. 驚風敗毒散

柴胡 前胡 羌活 獨活 桔梗 枳殼 川芎 赤茯苓 人蔘 天麻 地骨皮 白附子 白僵蠶 各5分 干3

① 乳兒 驚風

### 14. 鹿茸地黃丸

熟地黃 8錢 山藥 山茱萸 各4錢 白茯苓 牡丹皮 澤瀉 五加皮 各3錢 牛膝 鹿茸 各2錢 為末 蜜丸 粟米大 10丸凹

① 小兒 行步 遲遲

### 16. 加味地黃湯

生地黃 川芎 赤芍 當歸 天花 猪苓 澤瀉 赤茯苓 茵陳 甘草 各5分

① 小兒胎中 黃疸

② 產母가 服用時는 各1錢으로 增量

### 17. 不禁湯

## ■ 驗 方

麻黃 杏仁 各 5錢 桂皮 4錢 甘草 1錢5分

① 夜尿症

### 18. 水火分消飲

車前子 猪苓 各 3錢 澤瀉 陳皮 土茯苓  
各2錢 益智仁 白朮 各1錢 5分 石菖蒲 枳殼  
各1錢 甘草 8分 升麻 3分

① 어린이 小便이 뜨물처럼 어릴 때

② 어린이 小便에 피가 섞여 나올 때

### 19. 沒藥散

沒藥 大黃 枳殼 桔梗 各 1錢 木香 甘草  
各 5分

① 便閉 便秘

### 20. 五痺湯

羌活 白朮 薑黃 防己 各 2錢 甘草 1錢

① 小兒痺痺 初期

### 21. 增味五痺湯

羌活 防己 薑黃 白朮 海東皮 白芍 各 1  
錢 甘草 7分半

① 小兒痺痺 左脚膝 痛

## 三. 內 科

### 1. 六鬱湯

便香附炒 蒼朮 神曲 連翹 陳皮 川芎 貝母  
枳殼旱炒 白茯苓 蘇梗 各 1錢 甘草 5分

① 氣鬱 加 木香 檳榔 蘇葉 各 1錢

② 濕鬱 加 白朮 羌活 防氣 各 1錢

③ 热鬱 加 黃連 連翹 各 1錢

④ 痰鬱 加 南星 瓜蔞仁 海粉 各 1錢

⑤ 血鬱 加 牧丹 桃仁 子汁 各 1錢

⑥ 食鬱 加 山鬱 神曲 麥芽 各 1錢

⑦ 諸般 鬱症 火病

### 2 加味除鬱湯

便香附子炒 當歸 黃耆蜜灸 白朮蜜炒 尾  
蓼 龍眼肉 各2錢 白芍藥酒炒 白茯神 酸棗  
仁炒黑 蓮子 陳皮 甘草 各1錢 柴胡 山梔炒  
各 7分 木香 五味子 各 5分 生薑 3大棗 2

① 諸般 鬱症

### 3. 清心 調和湯

玄參 蓮子 麥門冬 半夏 琥珀 木香 黃連  
遠志 山梔子 竹茹 白芍藥 龍眼肉 車前子  
各 1錢 干 3棗 2

① 心火上衝 事業失敗 家庭不和

### 4. 羌活沖和湯

防風 川芎 各 1錢5分 蒼朮 羌活 白芷 黃  
芩 生地黃 各 1錢 甘草 3分 細辛 2分

① 장티브스(熱病)로 熱이 甚할 때

② 땀이 안나면 麻黃 1~2錢 加

### 5. 神解散

防風 川芎 各1錢半 羌活 白芷 黃芩 生地  
黃 白朮 桂枝 白芍 柴胡 各 1錢 甘草 3分  
細辛 2分 干 3棗 2

① 장티브스

### 6 茵陳五靈散

茵陳 3錢 白朮 赤茯苓 各 1錢5分 蒼朮

山梔子 滑石 猪苓 澤瀉 各 1錢 官桂 甘草  
各 2分

① 黃疸初期 肝炎

### 7. 茯苓湯

茵陳 2錢 白茯苓 猪苓 蒼朮 陳皮 枳殼半  
炒 日黃連炒 黃芩 山梔子炒 防己 木通 砂  
仁炒 神曲 麥芽 各 1錢 生薑 3

① 治 黃疸 肝炎

### 8. 滋陰清火湯

當歸 2錢 生地黃 1錢5分 麥門冬去心 黃  
柏炒 知母 牧丹皮 玄蔴 犀角 山梔子 各1錢  
赤芍藥 7分 川芎 阿膠珠 各 5分 甘草 3分

① 水氣가 不足하여 咳嗽가 甚할 때

### 9. 桔經湯

桔梗 麥門去心 各 2錢貝母 1錢6分 當歸  
瓜萎仁 各 1錢 桑白皮 枳殼 黃耆 防風 各  
7分 杏仁 百合 五味子 甘草 各 5分 干 5

① 肺結核 2기

### 10. 聖惠人蔘湯

黃耆 天門冬 白芍 桔梗 杏仁 鱗甲 各1錢  
柴胡 7分半 人蔘 砂仁 甘草 各 5分 牡礪粉  
5分臨服時 調服 食遠 日 再服 2~3劑 連服

① 肺結核 作血 加 阿膠珠 桑白皮 各1錢

② 咳嗽 加 五味 貝母 各1錢

③ 胃弱 加 白朮 白茯苓 陳皮 各1錢

### 11. 蔘苓白朮散

人蔘 白朮 白茯苓 山藥 炙甘草 各3錢 薏

苡仁 蓮子肉 桔梗 貢砂仁炒 白扁豆炒 各1  
錢5分

① 정충症이 있고 食慾不振

② 陰虛吐血 下血 日久 加 地榆 荊芥炒  
黑 乾薑炒黑 各一二錢

### 12. 茯苓補心湯

白芍藥 2錢 熟地黃 1錢5分 當歸 1錢2分  
川芎 白茯苓 人蔘 半夏干炒 陳皮 枳殼半炒  
桔梗 葛根 蘇葉 甘草 각5分

① 정충症이 甚하고 不眠일 때

### 13. 蘇子降氣湯

蘇子 半夏 各2錢 官桂 陳皮 各7分半 當  
歸 前胡 厚朴 蘇葉 竹茹 炙甘草 各5分 干3  
棗2

① 心臟性 喘促症

② 積熱 吐血 加 人蔘 3錢5分 麥門冬 2  
錢 五味子 1錢

### 14. 解毒四物湯

生地黃 黃連炒 各1錢 黃芩炒 地榆 各8分  
山梔子 黃柏炒 各7分 白芍 阿膠珠 側柏 各  
6分 當歸 川芎 槐花 各5分

① 大便에 피가 나올 때

### 15. 清腸湯

生地黃 2錢 當歸 山梔子 黃連 白芍藥 黃  
柏 知母 罂麥 木通 翴蓄 赤茯苓 麥門冬去  
心 各1錢 甘草 5分

① 小便에 피가 나올 때

## ■ 驗 方

### 16. 清咳湯1號

當歸 白芍藥 杏仁 貝母 各 1錢 白朮 牧丹皮 黃芩 山梔子 桔梗 各 5分 青皮 甘草 各 3分

①氣管支炎 咳嗽

### 17. 清咳湯2號

生地黃 天花粉 各1錢5分 貝母 1錢2分  
當歸 白芍藥炒 桔梗 麥門冬去心 知母 各1  
錢 白茯苓 8分 甘草 5分

①肺炎性 咳嗽

### 18. 加減二陳湯

白朮1錢6分 半夏 貝母 各1錢5分 黃芩 1  
錢1分 橘紅 白茯苓 香附子 各1錢 天花粉 7  
分 防風 連翹 各 5分 甘草3分 干 3

①肺浸潤으로 咳嗽가 甚할 때

### 19. 清肺滋坎湯

熟地黃 生乾地黃 天門 麥門 當歸 白芍  
山藥 白茯 白朮 各1錢 牧丹 澤瀉 黃柏蜜炒  
知母蜜炒 甘草 各7分

①治 陰虛火動 潮熱 盗汗 痰喘 空心服

### 20. 清嗽湯1號

桑白皮 1錢5分 陳皮 半夏 白茯苓 知母  
生地黃 各1錢 桔經 山梔子 各 7分 杏仁 阿  
膠珠 桂皮 甘草 各 5分

①기침하면서 피가 나올 때

②肺지스토마

### 21 清嗽湯2號

白朮 牧丹皮 各1錢5分 當歸 白芍藥 杏仁  
貝母 各 1錢 山梔子 黃芩 各 8分 桔梗 7分  
青皮 5分 甘草 3分

①肺지스토마 및 각혈

### 22. 不換金正氣散

蒼朮 2錢 陳皮 厚朴干炒 半夏干炒 薑香  
赤茯苓 羌活 各1錢 神曲炒 甘草 各7分干3  
棗2

①감기 몸살 無名熱

②寒熱 加 柴 荸 各1錢

③頭痛 加 萸 芷 各1錢

### 23. 行氣香蘇散

蘇葉 陳皮 蒼朮 香附子 烏藥 川芎 羌活  
枳殼 麻黃 甘草 各1錢 干3

①內傷生命 外感 風寒 又觸七情 飲食挾  
滯 胸痛 腹痛

②食滯腹痛 去 麻黃 加神曲 麥芽 砂仁  
山楂 檳榔 各1錢

### 24. 必用方甘桔湯

桔梗 2錢 甘草 蓮芥 防風 黃芩 薄荷 玄  
蔴 各1錢 白朮 5分

①감기 扁桃腺炎

### 25 九寶湯

薄荷 紫蘇葉 大腹皮 麻黃 桂枝 桑白皮  
陳皮 甘草 各 1錢 干3

①冬月 風寒 咳嗽 夜 不能睡眠

②小兒咳嗽 百日咳

## 26 人蔘養胃湯

山查 2錢  
蒼朮 1錢5分  
陳皮 厚朴干炒 各1錢2分半  
赤茯苓 蕁香 神曲 檳榔 各1錢  
枳實 7分  
人蔘 草果炒 炙甘草 各5分  
干3棗2

① 消化不良 吳 胃潰瘍

## 27. 加味蔘朮健脾湯

葛根 2錢  
人蔘 白朮 白茯苓 厚朴 陳皮  
山查 木香 蕁香 各1錢  
枳實 白芍 各8分  
砂仁 神曲 麥芽 甘草 各5分

① 健脾 養胃 運化飲食 解酒毒

## 28. 補胃散

蒼朮 白朮 厚朴干炒 砂仁炒 山查肉 神曲  
麥芽 枳實 蕁香 各4兩 半夏干炒 陳皮 草果  
炒 乾薑 桂皮 白荳子炒 人蔘 白茯苓 甘草  
各2兩 畢發 1兩5錢 苦蔴末 1兩 薄荷霜 2  
錢 為細末 1回 3分

① 消化不良 消化劑豆 常用則 有效

## 29. 理脾湯

蒼朮 陳皮 厚朴 神曲 麥芽 山查 各1錢  
乾薑炒黑 8分 砂仁 7分 炙甘草 3分 生薑3

① 口苦 입으로 쓴물이 올라 올 때 혹 手術患者에도 쓴다.

## 30. 香砂和中湯

蒼朮炒 白朮炒 各1錢5分 蕁香 砂仁炒 各  
1錢2分 厚朴干炒 陳皮 半夏干炒 白茯苓 神  
曲 枳實 青皮 山查 各1錢 甘草 3分 干3

① 胃腸性 浮症 面體 手足의 부을 때 加  
木通 瞿麥 各1錢

## 32 海金砂散

海金砂 7錢5分 滑石 5錢 생조기骨20尾  
分作末 1日 3回 1回 4~5分

① 腎臟 結石症

## 33. 正腸湯

蒼朮 3錢半 赤茯苓 陳皮 枳實 山查 各2  
錢半 檳榔 1錢

① 泄瀉 吳 痢疾 大腸炎

② 消化不良 加 神曲 砂仁 各1錢

③ 口乾 加 葛根 2錢 木香 1錢

## 34. 千金文武湯

葛根 4錢 黃芩 藥本 山藥 各2錢 柏子仁  
麥門 五味子 桔梗 升麻 白芷 各1錢

① 糖尿病 消渴症

## 35. 地黃苦蔴湯

熟地黃 4錢 苦蔴 山茱萸 葛根 各2錢 白  
茯苓澤瀉 各1錢半 知母 黃柏 各1錢

① 糖尿病

② 精力不足 小便不利 加 益智仁炒研 2  
錢

## 36. 安神復睡湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 益智仁 酸棗仁  
炒 遠志 山藥 龍眼肉 各2錢

① 不眠症 勒政 勞心 小睡 心神不安

## 37. 加味溫膽湯

香附子 2錢4分 橘紅 1錢6分 半夏干炒  
枳實 竹茹 各8分 人蔘 白茯苓 柴胡 麥門去

## ■ 驗 方

心 桔梗 각6分 甘草 4分 干3棗2  
① 정충증 心臟肥大 擴張 心房炎 心臟瓣膜症  
② 不眠症 加 當歸 2錢半 酸棗仁炒 2錢

### 38. 四物安神湯

當歸 白芍 生地 熟地黃 人蔘 白朮 酸棗仁 黃連干炒 山梔子 麥門 竹茹 各7分 米炒一撮 棗2枚1或은 紅靈砂 5分 調服

① 心臟에 피가 不足하여 잠을 자지 못할 때

### 39. 吳茱萸理中湯

吳茱萸 人蔘 白朮 乾薑灸 內桂 白芍 陳皮 灸甘草 小茴香 補骨脂 柴胡 各1錢

① 잠이 너무 많을 때

### 40. 養血清火湯

葛根 2錢 當歸 白芍酒炒 生地黃酒炒 麥門冬 知母 각1錢 黃連 川芎 各8分 天花粉 7分 蓮子肉 薄荷 黃柏 甘草 各5分 烏梅 3

① 狹心症 糖尿

### 41. 敗醬散

敗醬 5錢 金銀花 蒲公英 玄蔘 各3錢 小茴香 白芍 厚朴 蕙苡仁 甘草 各2錢 木香 没藥 玄胡索 各1錢

① 肝浮腫 盲腸炎 面浮 慢性腎臟炎

### 42. 眞人活命飲

金銀花 3錢 瓜萎仁 2錢 當歸尾 川山甲炒各1錢5分 白芷 天花 白芍蠶 木鼈子 侄角刺

赤芍 大黃 乳香 各1錢 没藥 甘草 各5分

① 盲腸炎 및 內腫

### 43. 金銀清腸湯

金銀花 3兩 當歸 2兩 地榆 麥門 玄蔘 各1兩 蕙苡仁 5錢 甘草 3錢 黃芩 2錢

① 盲腸炎 神效 一服則 止痛 二服則 足可伸 又二服則 毒盡

### 44. 托裏消毒飲

金銀花 陳皮 各3錢 黃耆鹽水炒 天花粉 각2錢 防風 當歸 川芎 白芷 桔梗 厚朴 川山甲炒 侄角子 人蔘 各1錢

① 肋膜炎 癰疽 등에 酒水相半 煎服

### 45. 當歸丹蔘湯

當歸 丹蔘 乳香 没藥 各5錢

① 肋膜炎 腹膜炎

## 四. 外科

### 1. 加味返魂湯

蒼朮炒 2錢 神曲炒 1錢5分 當歸 厚朴薑炒 白何首烏 草龍膽 檳榔 各7分 甘草 5分 川芎 3分 干3

① 中風이 打撲傷 또는 落傷으로 瘀血이甚할 때

② 酒合飲 當歸鬚散과 合方하여 落傷에有效

### 2. 烏藥順氣散

烏藥 陳皮 各2錢 麻黃 川芎 白芷 桔梗

枳殼半炒 各1錢 乾薑炒 白강蠶炒 各5分 干  
3棗2

- ① 中風(腦溢血)으로 左便이나 不仁하  
면 當歸 川麻 各1錢을 加하고
- ② 言語不能하면 荊芥 防風 黃連 각1錢  
을 加한다.

### 3. 疏風湯

當歸 川芎 白茯苓 半夏干炒 烏藥 香附子  
白芷 防風 各8分 麻黃 5分細辛 甘草 各6分  
生薑3

- ① 中風으로 面色이 검을 때
- ② 平足이 不仁할 때

### 4. 滋潤湯

當歸 厚朴干炒 枳殼半炒 杏仁去雙仁 生  
地黃 麻仁 大黃酒炒 檳榔 各2錢 羌活 7分  
紅花 3分

- ① 中風에 大小便이 不通하거나 便秘가  
甚할 때

### 5. 防風通聖散

滑石 甘草 石膏 桔梗 黃芩 各8分 防風  
當歸 川芎 連翹 麻黃 薄荷 白芍藥 大黃 芒  
硝 各4分 山梔子 白朮 荆芥 3分 生薑3

- ① 中風으로 热이 甚할 때

### 6. 復正湯

當歸酒洗 白茯苓 白강蠶 各3錢 天麻 烏  
藥 黃芩 半夏干炒 白芍藥 各2錢 川芎 白朮  
陳皮 荆芥 防風 枳殼 各1錢 桔梗 白芷 細

辛 甘草 各8分 生薑3

- ① 口眼이 떼트러진데

### 7. 大羌活湯

羌活 獨活 枳殼 青皮 陳皮 烏藥 南星 半  
夏 天麻 川芎 白芷 荆芥 防風 白芍藥 白附  
子 白강蠶 全蟲 各5分

- ① 中風으로 手足이 不仁

### 8. 加味萬金湯

熟地黃 川芎 秦艽 獨活 狗脊 蕺苡仁 杜  
沖 繢斷 元防風 白茯苓 牛膝 桑寄生 各2錢  
桂枝 1錢半 當歸 人蔘 細辛 甘草 各1錢

- ① 治 中風

### 9. 鴨湯

生 암 1首 忍冬 牛膝 金銀花 防風 桔梗  
金佛草 各1兩

- ① 中風에 酒水相半 煎服

### 10. 清濕化痰湯

白茯苓 白芥子炒 各3錢 白芷 羌活 半夏  
干炒 南星干炒 各2錢 陳皮 蒼朮炒 各1錢5  
分 竹茹 1錢 甘草 8分 木香 5分 生薑5片

- ① 痰이 걸릴 때
- ② 가슴이 걸릴 때 肉桂 青皮 各1錢을  
加함

### 11. 疏風活血湯

當歸 川芎 威靈仙 白芷 防己 桂皮 蒼朮  
黃柏 南星 各1錢 紅花 3分 干3

- ① 關節炎 上肢가 심하면 加 桂皮 蕺苡

## ■ 驗 方

仁 各1錢

② 關節炎 下肢가 甚하면 加 牛膝 木果  
各1錢

③ 腰痛에는 加 繢斷 1錢

### 12 淸上泄痛湯

黃芩酒炒 1錢5分 當歸酒洗 川芎 白芷 羌活 獨活 防風 蒼朮 麥門去心 各1錢 蔓荊子 甘菊 各5分 細辛 甘草 各3分 干3

① 頭痛이 甚할 때

② 高血壓(200~240) 加 木通 瞿麥 各1錢 黃連 3分

③ 貧血 加 黃耆 1錢 葛根 8分

### 13. 生地黃湯

生地黃 側柏葉鹽水炒 白朮根 各3錢 川芎 黃芩 山梔子炒 桔梗 蒲黃炒 阿膠珠炒 白芍藥 各1錢 甘草 3分

① 코피가 甚할 때

### 14 加味地黃湯

熟地黃 山茱 各3錢 白茯苓 車前子 澤瀉 兎絲子 各2錢 羌活 獨活 玄蔴 忍冬 薄荷 各1錢

① 更年期 神經痛

### 15 加味地黃湯

六味地黃湯 本方 加續斷 狗脊 各2錢

① 腎虛 腰痛

### 16 獨活寄生湯

獨活 當歸 白芍 桑寄生 各1錢 熟地黃 川

芎 人蔘 白茯苓 牛膝 杜沖 秦艽 細辛 防風 肉桂 各7分 甘草 5分

① 風濕 肝腎 虛弱 腰痛

### 17 下元煎

熟地黃 1兩 牛膝 5錢 白朮 3錢 牧丹皮 澤瀉 白茯苓 便香附子 各2錢 砂仁 陳皮 羌活 各1錢

① 水氣不足으로 高血壓 後頭 頸項痛

### 18. 寒水石散

當歸 大黃 各2兩 寒水石 赤石脂 各1兩 蜜陀鈔 5錢 為末

① 火傷에 患處에 渗에 뿌린다

### 19. 接骨散

當歸 白芷 大黃 各1兩 自然銅醋가七次 銅屑 各5錢 細末 梅2分 酒服下

① 折骨 碎骨

### 20 硫黃膏

石硫黃 1兩 黃丹 4錢 枯白礬 3錢 細末 바세린으로 作軟膏 患處를 生薑汁으로 洗滌後에 바른다

① 무좀(水蟲) 또는 濕疹

### 21 解瘀散

木黃 5兩 木香 3兩 川山甲 金銀花 牛膽 南星 各5錢 紅花 4錢 為末 1回 3分의 食後 服

① 內腫 打撲傷 落傷 기타 瘀血

### 22. 加味四物湯

當歸 川芎 白芍 熟地黃 柴胡 黃芩 浮萍  
草 金銀花 樟皮 蛇床子 各1錢 甘草5分

① 웃오른데(寄生性 包行疹)

### 23. 加味大補湯

十全大補湯 本方 加 鹿茸 蓮子肉 乾薑  
各1錢 金銀花 連翹 各5分 干3 袋2

① 大手術後에 補藥으로 用

### 24. 加味大補湯

人蔘 麥門 玄蔘 石菖蒲 各1錢半 熟地黃  
當歸 川芎 白芍 白朮 白茯苓 炙甘草 黃杞  
肉桂 白茯神 各1錢 遠志 五味子 各7分

① 煉炭가스 中毒 洋方治療와 並行則 有  
效

### 25 除濕丸

蒼朮 6兩 南星 半夏 各5兩 全蝎 三兩 寶  
豆 2兩 糊丸綠豆大 1回 7~8丸

① 肥滿症

## 5. 眼 科

### 1 四物龍膽湯

四物湯 本方 加 羌活 防風 各8分 草龍膽  
防己 各6分

① 眼疾 目赤 腫痛 暴作

### 2 補肝散

夏枯草 2兩 香附子 1兩 甘草 5分

① 肝虛 晴疼 冷淚

### 3 祥風清熱湯

生地黃 山梔子 連翹 各1錢半 當歸尾 赤  
芍 羌活 黃芩 各1錢 川芎 防風 各7分半 蒜  
芥 白芷稍 枳殼 各5分 桔梗 薄荷 甘草 各4  
分 黃連 3分 燈心 1分

① 眼球 紅

## 6. 皮膚科

### 1 은疹敗毒散

羌活 獨活 柴胡 前胡 桔梗 枳殼 當歸 川  
芎 赤茯苓 人蔘 各1錢 蒜芥 薄荷 防風 蒼  
朮 白朮 赤芍藥 生地黃 甘草 各5分 干3 袋  
2

① 王두드려기

② 妊娠婦는 禁忌

### 2. 加味十神湯

樟皮 忍冬 各2錢 玄蔘 香附子 蘇葉 麻黃  
升麻 葛根 陳皮 川芎 白芷 赤芍 甘草 各1  
錢 干3 異2

① 깨두드려기

### 3. 祥風敗毒散

川芎 羌活 各8分 白僵蠶 連翹 各7分 蒜  
芥 薄荷 牛蒡子 獨活 蒼朮 各6分 枳實 赤  
芍 前胡 各5分 蟬退 甘草 各3分 干3

① 全身이 가려울 때

### 4. 加味升葛湯

樟皮 忍冬 葛根 各2錢 升麻 白芍 玄參  
金銀花 連翹 甘草 各1錢 蘇葉 7分 干3 異2

① 乳兒두드려기

## ■ 驗 方

② 小兒 热症

③ 紅疫(癰瘍) 初期에

### 5 分心氣飲

蘇葉 1錢2分 茯苓皮 1錢 炙甘草 7分 半夏干炒 枳殼半炒 6分 桔梗 陳皮 青皮 大腹皮酒洗 桑白皮 桂皮 麥門去心 蓬朮 赤茯苓 蕁香 檳榔 木香 瞿麥 各5分 燈心十莖 干3棗2

① 腎臟炎 浮症

### 6. 清毒化堅湯

連翹 1錢5分 當歸 白芍藥 黃耆 桔梗 木通 瞿麥 金銀 柴胡 各1錢 陳皮 升麻 牛蒡子 羌活 昆布 各7分 玄蔴 天花粉 海石 各6分 黃芩 草龍膽 各5分 薄荷 甘草 各4分 木鼈子 3分 干3

① 全身이 들처럼 단단이 부었을 때.

### 7. 射干湯

射干 升麻 桔梗 昆布 連翹 甘草 各2錢

① 귀밑머리 등에 腫氣가 났을 때

### 8 天癸昆金湯

土茯苓 昆布 蒲公英 當歸 黃耆 砂仁 山藥 桔梗 麥門 半夏 枳實 金銀 桃仁 玄胡索

白茯 防己 蒼朮 石菖蒲 木通 牛膝酒洗 蕁  
苡仁 酸棗仁炒 白芥子炒 丁力子 没藥 五靈  
脂炒 黃柏 木香 瓜蔞仁 黃太 玄蔴 車前子  
各5分

① 라역

② 턱밑에 몽울이 많이 있을 때.

七. 小兒 呕 大仁泄瀉 (此方 筆者  
蘇秉昌 驗方)

#### ● 加味清寧散

葛根2錢 人蔴 白朮 白茯苓 木香 蕁香 濤  
瀉 車前子 詞子 炙甘草 各1錢

① 慢驚 加 天麻 細辛 白附子 各 1錢

② 泄瀉 加 山藥 白扁豆 各 1錢 肉荳蔻  
5錢

③ 痢疾 加 白芍藥炒 2錢 檳榔 1錢 5分

④ 氣脫無熱 加 人蔴 5錢 肉荳蔻 破古紙  
金櫻子 五茱萸 各 1錢

⑤ 慢性腸炎 또는 神經性 腸炎에도 有效  
함

用法 . 小兒 1日 1貼 數次 服用 大仁  
1日 2~3貼 每 食間服用

(학술위총무, 전북 익산시 남중동 T 856-8447)