

# 충청북도 에이즈 관리대책

이 승 우 / 충청북도 보건행정과



평소 AIDS는 극히 일부 특수 계층의 문제로 대부분 대도시에서만 발생된다고 생각했다.

그러나 감염 경로가 초기에는 외국인과의 성접촉, 동성 연애로 인한 감염이었지만 최근 들어 내국인과의 성접촉에 의한 감염률이 급속히 높아가는 추세로 내륙 지역인 우리도에서도 에이즈 감염자가 증가하는 추세에 있다.

더욱 안타까운 일은 배우자로 인한 감염으로 온가족이 불행을 맞이하게 되는 어처구니 없는 일이 발생되어 머지않아 우리 나라에서도 아프리카 사하라남부 지역의 나라들처럼 AIDS로 부모를 잃은 어린이들이 확산되지 않을까 하는 우려를 하면서 에이즈 관리 업무의 중요성을 깊이 인식하게 되었다.

이에 따라 우리도에서는 에이즈의 전파 방지를 위하여 에이즈 검사를 검사 대상자 뿐만 아니라 일반 검사 희망자에 대해 확대 실시하고 있으며, 에이즈에 대한 올바른 교육과 예방 홍보 등으로 에이즈 감염자를 미연에 방지하고 있다.

## 1. AIDS 감염경로 및 실태

우리도의 에이즈 감염자는 1989년부터 10명의 감염자를 관리하고 있다.

전국 발생 747명의 1.3%로 남자 8명 여자 2명으로 감염 경로를 보면 국내 불특정 이성간의 성접촉이 5명, 외국인과의 성접촉 2명, 동거인에 의해 감염된 경우가 2명, 동성간의 연애로 감염된 사람이 1명으로서 100%가 성접촉으로 인하여 감염되었다.

감염 당시의 직업을 보면 자영업 3명, 회사원 2명, 의향선원 1명, 학생 1명, 건축노동자 1명, 무직 1명, 가정주부도 1명으로 우리 주변 어느 곳에서나 발생될 우려가 높은 것으로 예방대책이 시급하다.

감염자 중 감염전 결혼을 한 사람은 6명이었으나 감염된 후 3명은 별거중에 있는 것으로 나타나 에이즈 감염의 충격이 날로 심각하여 가까이 있는 가족, 친지, 이웃, 직장 동료들과 멀리하게 되는 끔찍한 결과를 초래하고 있다.

또한 이들의 생활상을 보면 무직자가 4명, 재산 상태가 1,000만원 미만인 4명, 1,000만원~5,000만원 5명, 5,000만원 이상이 1명 뿐으로 일정한 직장이 없어 대부분 생활 형편이 어려운 실정이다.

그러나, 학력 수준은 감염자 중 대학졸업자가 4명이나 되어 학력이 높은 것으로 나타나 있다.

## 2. AIDS 감염자의 관리

우리도의 에이즈 감염자의 관리는 감염자에 대하여 면담과 면역 기능 검사 등은 물론 에이즈 발병 억제제 투약 대상자에 대한 전문 진료 기관인 충북대학교 병원에서 진료하도록 안내하고 있다.

97년도 에이즈 감염자 2명에 대하여 진료비도 도비 330만원을 집행하였으며, 98년도에는 400만원의 예산을 확보하고 있으나 앞으로 진료비의 지출이 증가할 것으로 예상되고 있다.

그러나 에이즈 감염자에 대한 관리에 가장 어려운 점이 있다면 희망을 줄 수 있는 상담 내용과 지원 대책이 없다는 것이 담당 공무원의 가장 어려운 일이 아닌가 싶다.

## 3. AIDS 예방 홍보 및 조기 발견

에이즈 예방을 위하여 중앙부처에서 제작한 홍보물 배부, 비디오 테이프 등 각종 홍보물을 이용하여 위생 관련 업소종사자, 직장인, 학생, 군인 등에 대한 각종 교육시 홍보를 강화하고 보건소별로 자체 홍보물 제작과 년 2회 이상 캠페인을 전개하고 있다.

에이즈 감염자의 확산을 미연에 방지하기 위한 조기 발견 사업으로 97년도에 청주시 2개 보건소에 1억 2천만원의 예산을 확보하여 ELISA법에 의한 검사기를 구입하여 검사를 실시한 결과 1명의 감염자를 발견하였다.

또한 98년도부터 일반 정기 검진자(식품위생업, 이·미용업, 공중 목욕장업 종사자)가 에이즈 검사 의무 대상에서 제외 되었으나 이들에 대하여는 예산 범위에서 무료 검사를 확대 실시할 계획이다.

## 4. 예방과 관리를 위한 개선 방안

그러나 근본적으로는 에이즈에 대한 올바른 인식과 감염 원인 등을 알고 그에 대한 예방적인 성문화에 대한 의식 개혁이 있어야 할 것이다.

더 나아가서 전세계의 학자들이 연구하는 에이즈 예

### 1. 발생연도별

구분	계	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97
감염자수	10	1	2	-	-	-	-	3	2	2

### 2. 감염 발견 당시 연령 분포

구분	계	20~25	26~30	31~35	36~40	41~45
감염자수	10	2	2	3	1	2

### 3. 감염요인별

구분	계	성 접촉				혈액제제
		국외	국내	동거인	동성연애	
감염자수	10	2	5	2	1	0

방 백신과 치료제의 개발 보급이 있기 전까지는 오로지 예방만이 없음을 인식하고 특정 분야의 홍보보다는 매스컴을 통한 대국민적 홍보에 주력하였으면 한다.

아울러 감염자들은 대부분 가정과 직장을 떠나려 하는 심리적 부담을 갖고 있기 때문에 그들을 위한 쉼터의 조속한 개원으로 삶의 희망을 주어야 할 것이다.

대구광역시에서 실시하고 있는 감염자의 생활 보조금 지원 등이 전국적으로 확대 실시 된다면 감염자의 관리 및 경제적 안정으로 희망과 용기를 줄 것으로 기대한다.

또한 감염자의 관리 체계를 정부의 지원하에 민간 단체로 위탁 관리하는 방안도 강구 되어야 할 것이다.

감염자에 대한 면담시 희망을 주기 위한 담당 공무원의 지식 보급과 상담요령에 대한 교육 계획이 있어야겠다. **A**