

二陳湯의 活用に 대한 方劑學的 考察

尹 用 甲*

I. 緒 論

二陳湯은 半夏, 陳皮, 茯苓, 甘草, 生薑으로 구성된 方劑이며 太平愚民和劑局方의 痰飲門에 처음 수록된 方劑로서 二陳湯의 母方은 金匱要略의 嘔吐에 활용된 小半夏湯(半夏, 生薑)이나 小半夏加茯苓湯(半夏, 生薑, 茯苓)으로 볼 수 있다.¹⁾²⁾

한편 二陳湯의 효능에 대해서는 痰飲으로 인한 모든 질환에 사용할 수 있으며, 그증상들을 살펴보면 嘔吐, 惡心, 頭眩, 驚悸, 中脘不快 成發爲寒熱 하거나 生冷之物을 먹어서 脾胃가 不和할 때 사용한다고³⁾ 하였다.

二陳湯의 구성약물의 작용을 살펴보면 君藥인 半夏는 辛溫하고 燥性이 강하며, 燥濕祛痰하고, 陳皮는 理氣化痰하므로 臣藥으로 하였고 茯苓은 滲濕利水하므로 利水行痰하는 효능이 있어 佐藥으로 하였으며 甘草는 和中補土하므로 健脾化痰하며 生薑은 半夏의 독을 없애주고 開胃하고 緩和作用이 있으므로 甘草 生薑을 使藥으로 하였으며 半夏와 陳皮는 오래된 것일수록 過燥한 폐단을 없게 할 수 있으므로 二陳湯이라고 하는 처방병을⁴⁾ 갖게 되었다고 하였다.

이와같이 二陳湯은 痰飲病의 通治方으로 알려져 있으며 燥濕化痰(祛痰)의 基本方이며,⁵⁾⁶⁾⁷⁾⁸⁾⁹⁾ 이는 곧 痰飲의 病理에 관계되는 모든 질환에 二陳湯을 활용할 수 있음을 示唆한다.

즉 痰飲은 인체의 기능 중 津液 대사에 영향

을 미쳐서 생기는 병리적인 副產物로 이것이 조직, 장기, 체강등에 저류되거나 혈류를 따라서 이동하면서 여러가지 病證을 일으키는데 대표적인 것으로는 咯痰, 神經痛, 精神神經症, 胃腸障礙, 關節炎 류마티스 末梢神經麻痺 皮膚皸裂 胸膜炎, 咳嗽喘息, 水便不利, 大便泄, 脚氣 帶下 遺精 脹滿 등이 있으며 이러한 誘因에 대한 疾患이나 病症에 二陳湯을 활용하고 있다.¹⁰⁾¹¹⁾

이에 저자는 東醫寶鑑에 수록된 二陳湯의 連係方¹²⁾ 및 관련 方劑의 활용에 대하여 연구하기 위하여 二陳湯이 사용된 범위와 病證, 病理 등을 조사하고 여기에 關聯된 二陳湯의 連係方에 대한 약물의 方劑의 구성변화와 구성약물의 配伍 관계, 連係方의 主治 및 효능 등 方劑學的 관찰을 試圖한 결과 다음과 같이 보고합니다.

II. 本 論

1. 東醫寶鑑에 收錄된 二陳湯 連係方의 活用 범위, 病症 및 方劑名 調査

1) 咳嗽門

(1) 《寒嗽》

㉠가미이중탕[加味理中湯]

㉡반하온폐탕[半夏溫肺湯]

※ 본 논문은 1999년도 원광대학교 교비지원으로 연구된 것임.

* 원광대학교 한의과대학 방제학교실

- (2) 《勞嗽》
 - ㉠가미인삼자완산[加味人參紫菀散]
 - ㉡대영수탕[大寧嗽湯]
- (3) 《鬱嗽》
 - 청금강화탕[淸金降火湯]
- (4) 《氣喘》
 - ㉠가미백출산[加味白朮散]
 - ㉡조강탕[調降湯]
 - ㉢청금탕[淸金湯]
 - ㉣행인반하탕[杏仁半夏湯]
- (5) 《火喘》
 - 맥문동탕[麥門冬湯]
- (6) 《風寒喘》
 - 삼소온폐탕[參蘇溫肺湯]
- (7) 《痰喘》
 - ㉠소자도담강기탕[蘇子導痰降氣湯]
 - ㉡천민도담탕[千縉導痰湯]
- (8) 《陰虛喘》
 - 윤폐활담영수탕[潤肺豁痰寧嗽湯]
- (9) 《哮證》
 - 오호이진탕[五虎二陳湯]

2) 痰飲門

- (1) 《氣痰》
 - ㉠가미이진탕[加味二陳湯]
 - ㉡전호반하탕[前胡半夏湯]
- (2) 《痰病有似邪祟》
 - 도씨도담탕[陶氏導痰湯]
- (3) 《熱痰》
 - ㉠청기화담환[淸氣化痰丸]
 - ㉡청열도담탕[淸熱導痰湯]
 - ㉢이중활담탕[理中豁痰湯]
- (4) 《痰厥》
 - ㉠청화화담탕[淸火化痰湯]
 - ㉡가미이진탕[加味二陳湯]
- (5) 《喜唾痰》
 - 반하온폐탕[半夏溫肺湯]
- (6) 《痰塊》
 - 죽력달담환[竹瀝達痰丸]
- (7) 《鬱痰》

청화활담환[淸火豁痰丸]

- (8) 《痰飲治法》
 - ㉠순기도담탕[順氣導痰湯]
 - ㉡육군자탕[六君子湯]
- (9) 《痰飲通治藥》
 - ㉠궁하탕[芎夏湯]
 - ㉡오음탕[五飲湯]
 - ㉢청기화담환[淸氣化痰丸]
 - ㉣복령반하탕[茯苓半夏湯]

3) 風門

- (1) 《痰涎壅盛》
 - ㉠가감도담탕[加減導痰湯]
 - ㉡척담탕[滌痰湯]
- (2) 《手足癱瘓》
 - ㉠가감윤조탕[加減潤燥湯]
 - ㉡거풍제습탕[祛風除濕湯]
- (3) 《風有中血脉中腑中臟之異》
 - ㉠소풍탕[疎風湯]
 - ㉡양영탕[養榮湯]
- (4) 《中風熱證》
 - 청기선풍산[淸氣宣風散]
- (5) 《暴瘡》
 - 청신해어탕[淸神解語湯]
- (6) 《諸風通治》
 - 비전순기산[秘傳順氣散]
- (7) 《歷節風治法》
 - 반하금출탕[半夏芩朮湯]

4) 積聚門

- (1) 《痞塊證治》
 - 개회산[開懷散]
- (2) 《食鬱》
 - 승발이진탕[升發二陳湯]
- (3) 《六鬱爲積聚癥瘕疝癖之本》
 - 육울탕[六鬱湯]入門
- (4) 《蟲積》
 - 과적도음환[破積導飲丸]
- (5) 《積聚治法》

산취탕[散聚湯]

5) 內傷門

(1) 《嘈雜》

소식청울탕[消食淸鬱湯]

(2) 《吞酸吐酸》

㉠증미이진탕[增味二陳湯]

㉡창련탕[蒼連湯]

㉢평간순기보중환[平肝順氣保中丸]

(3) 《內傷脾胃則不思食不嗜食》

㉠향사양위탕[香砂養胃湯]

㉡향사육군자탕[香砂六君子湯]

(4) 《內傷調補藥》

㉠삼령백출환[參苓白朮丸]

㉡태화환[太和丸]

6) 脹滿門

(1) 《濁氣在上則生脹》

목향순기탕[木香順氣湯]

(2) 《蠱脹》

소창음자[消脹飲子]

(3) 《熱脹》

중만분소환[中滿分消丸]

(4) 《脹滿通治藥》

반하후박탕[半夏厚朴湯]

7) 神門

(1) 《健忘》

가미복령탕[加味茯苓湯]

(2) 《驚悸》

가미온담탕[加味溫膽湯]

(3) 《怔忡》

복령음자[茯苓飲子]

(4) 《癩癩》

청심온담탕[淸心溫膽湯]

8) 痰瘡門

(1) 《痰瘡》

㉠노강양위탕[露薑養胃湯]

㉡노학음[老瘡飲]

㉢사수음[四獸飲]

㉣시진탕[柴陳湯]

㉤양위단[養胃丹]

㉥평진탕[平陳湯]

(2) 《六經瘡》

마황백출탕[麻黃白朮湯]

(3) 《瘡疾治法》

㉠가감청비탕[加減淸脾湯]

㉡구학탕[驅瘡湯]

9) 嘔吐門

(1) 《嘔吐治法》

㉠가미이진탕[加味二陳湯]

㉡보중탕[保中湯]

㉢복령반하탕[茯苓半夏湯]

㉣청열이진탕[淸熱二陳湯]

(2) 《噎膈反胃治法》

㉠순기화중탕[順氣和中湯]

㉡신기산[神奇散]

㉢안위탕[安胃湯]

㉣정향투격탕[丁香透膈湯]

(3) 《食痺吐食》(東垣)

복령반하탕[茯苓半夏湯]

10) 寒門

(1) 《傷寒陰證》

㉠곽향정기산[藿香正氣散]

㉡오적산[五積散]

㉢인삼양위탕[人參養胃湯]

(2) 《傷寒表證》

삼소음[參蘇飲]

(3) 《傷寒陰毒》

회양구급탕[廻陽救急湯]

11) 胸門

(1) 《胃心痛》

㉠가미지출환[加味枳朮丸]

- ⊙청울산[淸鬱散]
- (2) 《支結》
 - 시진탕[柴陳湯]
- (3) 《胸痞》
 - ㉠해울화중탕[解鬱和中湯]
 - ⊙향사양위탕[香砂養胃湯]

12) 婦人門

- (1) 《惡阻》
 - ㉠귀원산[歸原散]
 - ⊙금련반하탕[芩連半夏湯]
- (2) 《求嗣》
 - 선천귀일탕[先天歸一湯]
- (3) 《婦人雜病》
 - 삼합탕[三合湯]

13) 頭門

- (1) 《痰厥頭痛》
 - 궁신도담탕[芎辛導痰湯]
- (2) 《虛暈》
 - ㉠자음건비탕[滋陰健脾湯]
 - ⊙향귤음[香橘飲]
- (3) 《痰暈》
 - 청혼화담탕[淸暈化痰湯]

14) 小兒門

- (1) 《泄瀉》
 - 목향산[木香散]
- (2) 《急驚風》
 - 방풍온담탕[防風溫膽湯]
- (3) 《慢脾風》
 - ㉠보비익진탕[補脾益眞湯]
 - ⊙보비탕[補脾湯]
 - ⊙삼출반하탕[參朮半夏湯]

15) 氣門

- (1) 《氣痛》
 - ㉠목향유기음[木香流氣飲]

- ⊙유기음자[流氣飲子]
- (2) 《少氣》
 - 인삼황기탕[人參黃芪湯]
- (3) 《氣逆》
 - 퇴열청기탕[退熱淸氣湯]

16) 便門

- (1) 《濕痢》
 - 가미제습탕[加味除濕湯]
- (2) 《痰泄》
 - 만병이진탕[萬病二陳湯]

17) 霍亂門

- (1) 《霍亂後煩渴》
 - 맥문동탕[麥門冬湯]
- (2) 《濕霍亂治法》
 - 이향황련산[二香黃連散]

18) 癰疽門

- (1) 《癰疽五發證》
 - 이향산[二香散]
- (2) 《癰疽排膿生肌法》
 - 탁리화중탕[托裏和中湯]

19) 血門

- (1) 《嘔血吐血》
 - 복령보심탕[茯苓補心湯]
- (2) 《咳血嗽血唾血咯血》
 - 청각탕[淸咯湯]

20) 浮腫門

- (1) 《水腫治法》
 - 분기음[分氣飲]

21) 黃疸門

- (1) 《黃疸》
 - 가감위령탕[加減胃苓湯]

(2) 《女勞疸》
진교음자[秦茺飮子]

22) 精門

(1) 《濕痰滲爲遺精》
가미이진탕[加味二陳湯]

23) 夢門

(1) 《虛煩不睡》
㉠가미온담탕[加味溫膽湯]
㉡고침무우산[高枕無憂散]
㉢온담탕[溫膽湯]

24) 津液門

(1) 《盜汗》
삼기탕[參芪湯]

25) 手門

(1) 《痰飲多爲臂痛》
㉠가감복령환[加減茯苓丸]
㉡반하금출탕[半夏芩朮湯]

26) 濕門

(1) 《濕病治法及通治藥》
삼습탕[滲濕湯]

27) 暑門

(1) 《暑病吐瀉》
향박음자[香朴飮子]

28) 咽喉門

《梅核氣》
가미이진탕[加味二陳湯]

29) 耳門

《耳鳴》

복총탕[復聰湯]

30) 腹門

《痰飲腹痛》
사합탕[四合湯]

31) 背門

《背痛》
삼합탕[三合湯]

32) 鼻門

《鼻鼈》
승마탕[升麻湯]

33) 諸瘡門

《疥癬》
승마화기음[升麻和氣飮]

34) 瘟疫門

《瘟疫治法》
십미궁소산[十味芎蘇散]

35) 皮門

《麻木》
쌍합탕[雙合湯]

36) 眼門

《眼昏》
억청명목탕[抑靑明目湯]

37) 蟲門

《治諸蟲藥》
연심산[蓮心散]

38) 聲音門

《因雜病失音》

인삼청폐산[人參淸肺散]

39) 脈門

《濕痢藥餌》

인삼황기탕[人參黃芪湯]

2. 病症에 따른 二陳湯 連係方의 方劑構成 및 主治調査

1) 咳嗽

(1) 《寒嗽》

- ㉠ 가미이중탕(加味理中湯) ◆ 治痼冷積寒
附子炮 人參 白朮 乾薑炒 肉桂 陳皮 白茯苓 甘草 灸各一錢
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服.(回春)
- ㉡ 반하온폐탕[半夏溫肺湯] ◆ 治中脘有痰水心
下注洋嘈雜 多唾吐清水 不欲食此胃虛冷也 其脉沈弦細遲
半夏 陳皮 旋覆花 人參 細辛 桂心 桔梗 白芍藥 赤茯苓 甘草各一錢
右剉作一貼薑五片煎服

(2) 《勞嗽》

- ㉠ 가미인삼자완산[加味人參紫菀散] ◆ 治虛勞咳嗽
人參 五味子 紫菀茸 陳皮 紫蘇葉 貝母 桑白皮 白茯苓各一錢 杏仁 甘草 各七分半 加川芎 半夏麴各一錢 阿膠珠五分右剉作一貼薑五棗二梅一水煎服.(直指)
- ㉡ 대영수탕[大寧嗽湯] ◆ 治勞嗽神效
半夏二錢 五味子 赤茯苓 桑白皮 紫蘇葉 陳皮 枳殼 杏仁 阿膠珠 罌粟殼蜜炒各一錢 細辛 甘草各五分
右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服.(丹心)

(3) 《鬱嗽》

- ㉠ 청금강화탕[淸金降火湯] ◆ 治熱嗽 能瀉肺胃之火 火降則痰消嗽止
陳皮 杏仁各一錢半 赤茯苓 半夏 桔梗 貝母 前胡 瓜蒌仁 黃芩 石膏 各一錢 枳

殼八分 甘草三分

右剉作一貼入生薑三片水煎服食後.(醫鑑)

(4) 《氣喘》

- ㉠ 가미백출산[加味白朮散] ◆ 治氣虛喘急飲食不進又治喘嗽飲酒必發者卽
參苓白朮散加 陳皮 半夏各一錢
右作一服入薑三片桑白皮七寸同煎服.(得效)
- ㉡ 조강탕[調降湯] ◆ 治喘嗽上氣
枳殼一錢三分 甘草一錢 半夏 桔梗 赤茯苓 青皮 陳皮 蘇子 檳榔 葶藶子炒各七分 白豆蔻 木香 縮砂紫蘇葉各五分
右剉作一貼薑五水煎服.(直指)
- ㉢ 청금탕[淸金湯] ◆ 治咳嗽喘急 胸滿氣逆坐臥不安
陳皮 赤茯苓 杏仁 阿膠珠 五味子桑白皮 薏苡仁 紫蘇葉 百合 貝母 半夏麴 款冬花各七分 罌粟殼 人參 甘草各三分
右剉作一貼入薑三棗二梅一箇同煎服.(綱目)
- ㉣ 행인반하탕[杏仁半夏湯] ◆ 治肺氣不足 喘嗽
杏仁 半夏 桔梗 陳皮 赤茯苓 防己桑白皮 白礬各一錢 皂角 薄荷各分 甘草一寸五
右末作一貼薑三水煎服.(丹心)

(5) 《火喘》

- ㉠ 맥문동탕[麥門冬湯] ◆ 治火喘
麥門冬三錢 半夏二錢 人參一錢 甘草五分 粳米一合 大棗三枚
右剉作一貼水煎服日二.(仲景)

(6) 《風寒喘》

- ㉠ 삼소온폐탕[參蘇溫肺湯] ◆ 治形寒飲冷則傷肺 喘喝煩心胸滿短氣
人參 紫蘇葉 肉桂 木香 五味子 陳皮 半夏 桑白皮 白朮 白茯苓各一錢 甘草五分
右剉作一貼薑三水煎服.(東垣)

(7) 《痰喘》

- ㉠ 소자도담강기탕[蘇子導痰降氣湯] ◆ 治痰喘上氣

蘇子二錢 半夏 當歸各一錢半 南星 陳皮 各一錢 前胡 厚朴 枳實 赤茯苓 各七分 甘草五分

右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(必用)

- ㉠ 천민도담탕[千緡導痰湯] ◆ 治痰喘. 不能臥 一服即安

半夏 七枚炮 切作四片 南星 陳皮 赤茯苓 枳殼各一錢 皂角 甘草各一寸 並灸 右剉作一貼入生薑五片水煎服。(醫鑑)

(8) 《陰虛喘》

- ㉡ 윤폐활담영수탕[潤肺豁痰寧嗽湯] ◆ 治陰虛 喘急及痰嗽

陳皮 半夏 熟地黃 黃栢 知母 二味並酒炒 各八分 白茯苓七分 黃芩 酒洗 貝母 天門冬 麥門冬 紫菀酒洗 款冬花酒洗 桔梗 當歸 甘草各六分

右剉作一貼入薑三水煎服。(醫鑑)

(9) 《哮喘》

- ㉢ 오호이진탕[五虎二陳湯] ◆ 治哮喘喘急痰盛 石膏二錢 麻黃 杏仁 陳皮 半夏 赤茯苓 各一錢 人參八分 甘草五分 木香 沉香各五分 水磨 取汁 右剉作一貼入薑三葱二蜜少許水煎後入二香汁調和服。(醫鑑)

2. 痰飲

(1) 《氣痰》

- ㉣ 가미이진탕[加味二陳湯] ◆ 治氣痰 窒碍咽喉 成梅核氣

半夏 陳皮 赤茯苓 枳殼 桔梗各一錢 片芩 梔子炒各七分 紫蘇子 白豆 薏仁 甘草各五分

右剉作一貼薑三片同煎服。(醫鑑)

- ㉤ 전호반하탕[前胡半夏湯] ◆ 治氣痰壅盛

前胡 半夏 赤茯苓各一錢 陳皮 紫蘇葉 枳殼各七分 木香 甘草各五分

右剉作一貼薑五片烏梅一箇水煎服。(直指)

(2) 《痰病有似邪祟》

- ㉥ 도씨도담탕[陶氏導痰湯] ◆ 治痰迷心竅或似 鬼祟

半夏一錢 赤茯苓 天南星 枳實各八分 陳皮 黃芩 黃連 白朮 瓜蒌仁各五分 桔梗 四分 人參三分 甘草二分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎臨臥入竹瀝薑汁調服先吐去痰次服此藥。(入門)

(3) 《熱痰》

- ㉦ 청기화담환[清氣化痰丸] ◆ 治熱痰

半夏製二兩 陳皮 赤茯苓各一兩半 黃芩 連翹 梔子 桔梗 甘草各一兩 薄荷 荊芥 各五錢

右爲末薑汁糊和丸梧子大薑湯下五十九丸此方乃二陳湯合涼膈散也。(丹心)

- ㉧ 청열도담탕[清熱導痰湯] ◆ 治憎寒壯熱 頭目昏沈 氣上喘急 口出涎沫 此因內傷七情 以致痰迷心竅 神不守舍 神出則舍空 舍空則痰自生也

黃連 黃芩 瓜蒌仁 南星炮 半夏製陳皮 赤茯苓 桔梗 白朮 人參各七分 枳實 甘草各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚同煎和竹瀝薑汁服。(醫鑑)

- ㉨ 이중활담탕[理中豁痰湯] ◆ 治膈上胃中熱痰 最妙

白朮 白芍藥各一錢 人參 白茯苓 半夏製 瓜蒌仁 陳皮 天門冬 麥芽炒各七分 黃芩 酒炒 香附子 鹽水炒 黃連薑汁炒 桔梗 各五分 枳實 甘草各三分

右剉作一貼水煎去滓入薑汁二匙竹瀝六匙調服。(必用方)

(4) 《痰厥》

- ㉩ 청화화담탕[清火化痰湯] ◆ 治熱痰結在胸膈 咯吐不出 滿悶作痛名痰結

半夏製 陳皮 赤茯苓各一錢 桔梗 枳殼 瓜蒌仁各七分 黃連 黃芩 梔子 貝母 蘇子 桑白皮 杏仁 芒硝各五分 木香 甘草各三分

右剉作一貼薑三片同煎至半納芒硝溶化去滓又入竹瀝薑汁調服。(回春)

- ㉪ 가미이진탕[加味二陳湯] ◆ 治痰厥

半夏製 陳皮 白茯苓 當歸 枳實 桔梗 杏

仁各一錢 良薑 縮砂各五分 木香 桂皮
甘草各三分

右剉作一貼薑五片水煎服.(回春)

(5) 《喜唾痰》

㉠ 반하온폐탕[半夏溫肺湯] ◆ 治中脘有痰水心
下注洋嘈雜 多唾吐清水 不飲食 此胃虛冷
也其脉沈弦細遲

半夏 陳皮 旋覆花 人參 細辛 桂心 桔梗
白芍藥 赤茯苓 甘草各一錢

右剉作一貼薑五片煎服

(6) 《痰塊》

㉡ 죽력담담환[竹瀝達痰丸] ◆ 能運痰從大便出
不損元氣妙 丹溪曰痰在四肢非竹瀝不開此
藥是也

半夏薑製 陳皮去白 白朮微炒 白茯苓 大
黃 酒浸蒸晒乾 黃芩酒炒各二兩 人參 甘
草灸各 一兩半 青礞石碎二兩 焰硝一兩
同 火煨如金色 沈香五錢

右爲末以竹瀝一大碗半 薑汁三匙拌 勻晒
乾 如此五六度 因以竹瀝薑汁和丸 小豆
大 每百丸 臨臥時

以米飲或 薑湯吞下.(入門)○一名竹瀝運
痰丸

(7) 《鬱痰》

㉢ 청화활담환[清火豁痰丸] ◆ 治上焦鬱火 痰
涎壅盛 胸膈不利 咽喉煩燥 噎塞如有所硬
吐不出嚥不下

大黃 酒拌九蒸 九晒二兩半 白朮炒 枳實
麩炒 陳皮鹽水炒各二兩 黃芩酒炒 黃連
酒炒 梔子炒 南星 半夏 二味以 白礬 皂
角生薑各一兩 浸七日 各一兩半 貝母炒
一兩三錢 連翹 天花粉 白茯苓 神麩炒
白芥子炒各一兩 玄明粉七錢 青礞石以焰
硝一兩同煨如金色 青黛 甘草各五錢 沉
香 二錢

右爲末竹瀝和丸梧子大茶清下六七十丸
(醫鑑).

(8) 《痰飲治法》

㉣ 순기도담탕[順氣導痰湯] ◆ 治痰 順氣爲先
分導次之

半夏 南星 茯苓 枳實 陳皮 香附子 烏藥
各一錢木香 沈香 甘草各五分

右剉作一貼薑五片煎服.(入門)

㉤ 육군자탕[六君子湯] ◆ 治氣虛痰盛

半夏 白朮各一錢半 陳皮 白茯苓 人參各
一錢 甘草灸五分

右剉作一貼薑三片棗二枚煎服.(正傳)

○一方六味各一錢等分

(9) 《痰飲通治藥》

㉦ 궁하탕[芎夏湯] ◆ 逐水利飲通用

川芎 半夏製 赤茯苓各一錢 陳皮 青皮
枳殼各五分 白朮 甘草 灸各二分半

右剉作一貼薑五片水煎服.(直指)

㉧ 오음탕[五飲湯] ◆ 治五飲 一曰留飲 二曰癖
飲 三曰痰飲 四曰溢飲 五曰流飲

旋覆花 人參 陳皮 枳實 白朮 茯苓 厚朴
半夏 澤瀉 猪苓 前胡 桂心 白芍藥 甘草
各七分

右剉作一貼薑十片水煎服最效.(海藏)

㉨ 청기화담환[清氣化痰丸] ◆ 治一切痰飲及食
積酒積成痰壅盛

南星 半夏 以白礬 皂角 生薑 各二 兩
同水浸 一宿 並剉作片同煮至 南星 無白
點晒乾各二兩 神麩炒 麥芽炒各一兩半
陳皮 枳實 白朮 白茯苓 蘇子 蘿藦子炒
瓜蒌仁 香附米 山查肉 白豆蔻各一兩 青
皮 乾葛 黃連各五錢 黃芩八錢 海粉七錢
右爲末以竹瀝薑汁泡蒸餅和丸梧子大薑湯
或茶清下五七十丸.(醫鑑)

㉩ 복령반하탕[茯苓半夏湯] ◆ 通治停痰留飲發
爲諸病

半夏製三錢 赤茯苓二錢

右剉作一貼薑七片煎服.(宣明)○直指方小
半夏茯苓湯同

3) 風

(1) 《痰涎壅盛》

㉪ 가감도담탕[加減導痰湯] ◆ 治中風痰盛不能
言語熱者宜服

南星 半夏 以皂角 白礬 生薑 同煎湯浸

透炒乾 白茯苓 陳皮 白朮 桔梗 枳殼各一錢 黃芩 黃連 瓜蒌仁 人參 當歸 木香各五分 甘草三分
右剉作一貼入薑三片水煎入竹瀝薑汁調服。(回春)

㉠ 척담탕[滌痰湯] ◆ 治中風痰迷心竅 舌強不能言

半夏 南星 並薑製各二錢 枳實一錢半 茯苓 陳皮各一錢 石菖蒲 人參 竹茹各五分 甘草三分
右剉作一貼入薑五水煎服。(丹心)○此藥治中風不語 豁痰 清熱 利氣 補虛可謂簡而當也。(丹心)

(2) 《手足癱瘓》

㉡ 가감윤조탕[加減潤燥湯] ◆ 治左半身不遂屬血虛與死血

白芍藥 酒炒二錢 當歸一錢二分 川芎 白茯苓 白朮 南星 半夏 天麻各一錢 生地黃 酒炒 熟地黃薑汁炒 陳皮鹽水洗 牛膝酒洗 黃芩酒炒 酸棗仁炒各八分 桃仁 羌活 防風 薄桂各六分 紅花酒洗 甘草灸各四分 黃柏 酒炒三分
右剉作二貼水煎入竹瀝薑汁調服。(回春)○一名愈風潤燥湯。(醫鑑)

㉢ 거풍제습탕[祛風除濕湯] ◆ 治右半身不遂屬氣虛與濕痰

白朮一錢二分 白茯苓 當歸酒洗 陳皮 赤芍藥 半夏 蒼朮 烏藥 枳殼 羌活 黃連 黃芩 並酒炒各一錢 人參 川芎 桔梗 防風各八分 白芷七分 甘草灸五分
右剉二分貼入薑五片水煎服。(回春)

(3) 《風有中血脉中腑中臟之異》

㉣ 소풍탕[疎風湯] ◆ 治風中府手足不仁先宜解表後用愈風湯調理

羌活 防風 當歸 川芎 赤茯苓 陳皮 半夏 烏藥 白芷 香附子各八分 桂枝 細辛 甘草各三分
右剉作一貼入薑三片水煎服。(回春)

㉤ 양영탕[養榮湯] ◆ 治風中血脈外無六經之形證 內無便溺之阻隔 但肢不能舉 口不能

言 或痰迷不省

當歸 川芎 白芍藥 生地黃 麥門冬 遠志 石菖蒲 陳皮 烏藥 白茯苓 枳實 黃連 防風 羌活 秦艽 半夏 南星 甘草各六分
右剉作一貼入薑三片 竹茹一塊水煎服。(回春)

(4) 《中風熱證》

㉥ 청기선풍산[清氣宣風散] ◆ 治風熱

當歸 白朮 白芍藥各一錢 川芎 羌活 半夏 生地黃 白僵蠶各八分 蟬殼 赤茯苓各六分 防風 甘菊 枳殼 陣皮 荊芥 升麻 黃連 梔子各五分 甘草三分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服。(醫林)

(5) 《暴瘡》

㉦ 청신해어탕[清神解語湯] ◆ 治中風痰迷心竅言語蹇澁或不省人事

南星 半夏 二味同 白礬 生薑 皂角 水浸三日曬乾各一錢 當歸 川芎 白芍藥 生地黃 麥門冬 遠志 石菖蒲 陳皮 白茯苓 烏藥 枳實 黃連 防風 羌活 甘草各五分
右剉作一貼入薑三片竹茹一團水煎入童便薑汁竹瀝調服。(醫鑑)

(6) 《諸風通治》

㉧ 비전순기산[秘傳順氣散] ◆ 治中風喎斜癱瘓一切風疾

青皮 陳皮 枳殼 桔梗 烏藥 人參 白朮 白茯苓 半夏 川芎 白芷 細辛 麻黃 防風 乾薑 白僵蠶 甘草各六分
右剉作一貼入薑五片水煎服。(醫鑑)

(7) 《歷節風治法》

㉨ 반하금출탕[半夏芩朮湯] ◆ 治濕痰流注肩臂痛

蒼朮二錢 白朮一錢半 半夏 南星 香附子 片芩酒炒各一錢 陳皮 赤茯苓 各五分 威靈仙三分 甘草二分
右剉作一貼入薑三片水煎服一方有羌活。(丹心)

4) 積聚

(1) 《痞塊證治》

① 개회산[開懷散] ◆ 治心下積塊痞悶或發熱
柴胡 草豆蔻各一錢 三稜 蓬朮並醋炒 青
皮 陳皮 半夏 白茯苓 香附子 檳榔 枳實
紅花 甘草各七分
右剉作一貼薑三煎服。(醫鑑)

(2) 《食鬱》

① 승발이진탕[升發二陳湯] ◆ 治痰鬱
半夏二錢 陳皮 蕪芎 赤茯苓各一錢 半
柴胡 防風 升麻 甘草各一錢
右剉作一貼入薑三片煎服。(入門)

(3) 《六鬱爲積聚癥瘕痞癖之本》

① 육울탕[六鬱湯]入門 ◆ 通治六鬱
香附子二錢 川芎 蒼朮各一錢半 陳皮 半
夏製各一錢 赤茯苓 梔子仁各七分 縮砂
甘草各五分
右剉作一貼薑三水煎服。(丹心)○氣鬱加木
香檳榔烏藥紫蘇葉○濕鬱加白朮 羌活防
己○熱鬱加黃連連翹 ○痰鬱加南星瓜
仁海粉○血鬱加桃 仁牡丹皮韭汁○食鬱
加山楂子神麴麥芽。(入門)

(4) 《蟲積》

① 파적도음환[破積導飲丸] ◆ 治水積痰飲積
木香 檳榔 陳皮 青皮 枳實 枳殼 蓬朮
三稜 半夏 神麴 麥芽 茯苓 乾薑 白丑頭
末六錢 巴豆三十粒去皮心膜油
右爲末薑汁糊和丸梧子大薑湯下三五
丸。(綱目)

(5) 《積聚治法》

① 산취탕[散聚湯] ◆ 治六聚及癥瘕 隨氣上下
心腹刺痛 二便不利
厚朴 吳茱萸 枳殼一錢半 陳皮 杏仁 桂
心 赤茯苓各一錢 川芎 附子炮 甘草灸各
五分 半夏 檳榔 當歸各四分
右剉作一貼薑三水煎服。(入門)

5) 內傷

(1) 《嘈雜》

① 소식청울탕[消食清鬱湯] ◆ 治嘈雜
半夏 陳皮 白茯苓 山楂肉 枳殼 香附子
川芎 神麴炒 麥芽炒 黃連 梔子炒 薑

汁炒 蒼朮 藿香 甘草各七分
右剉作一貼薑三水煎服。(回春)

(2) 《吞酸吐酸》

① 증미이진탕[增味二陳湯] ◆ 治吞酸
半夏 陳皮 茯苓 梔子炒 黃連炒 香附子
各一錢 枳實 川芎 蒼朮各八分 白芍藥七
分 神麴炒五分 甘草三分
右剉作一貼入薑三水煎服。(集略)

② 창련탕[蒼連湯] ◆ 治吞酸
蒼朮 黃連 薑汁炒 陳皮 半夏 赤茯苓 神
麴各一錢 吳茱萸炒 縮砂各五分 甘草三
分
右剉作一貼薑三水煎服。(回春)

③ 평간순기보중환[平肝順氣保中丸] ◆ 治脾胃
中伏火鬱積生痰 致令嘔吐吞酸嘈雜 常服健
脾開胃化痰滯滯 清火抑肝

白朮土炒四兩 香附童便浸三日炒三兩 陳
皮二兩半 川芎 枳實 黃連薑炒 神麴炒
山楂肉各二兩 半夏製一兩半 梔子 薑汁
炒 蘿蔔子炒 白茯苓 乾生 澤瀉 甘草各
五錢薑 吳茱萸各一兩 麥芽炒七錢 青皮
香油炒六錢 縮砂炒 甘草灸各四錢 木香
三錢
右爲末竹瀝打神麴爲糊和丸菉豆大白湯下
百丸 此方治吞酸吐酸嘈雜噯氣兼治之劑
也。(醫鑑)

(3) 《內傷脾胃則不思食不嗜食》

① 향사양위탕[香砂養胃湯] ◆ 治飲食不思痞悶
不舒此胃寒也
白朮一錢 縮砂 蒼朮 厚朴 陳皮 白茯苓
各八分 白豆蔻七分 人參 木香 甘草各五
分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(醫鑑)

② 향사육군자탕[香砂六君子湯] ◆ 治不思飲食
不化 食後倒飽者脾虛也
香附子 白朮 白茯苓 半夏 陳皮 白豆蔻
厚朴各一錢 縮砂 人參 木香 益智仁 甘
草各五分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(醫鑑)

(4) 《內傷調補藥》

㉑ 삼령백출환(參苓白朮丸) ◆ 治病後元氣虛弱

此藥養元氣補脾胃 進美飲食清火化痰解鬱
白朮土炒 二兩半 蓮肉 桔梗 薏苡仁 各二兩 人參 白茯苓 山藥炒 陳皮 半夏製 白扁豆 黃連二味 並薑汁炒 當歸 香附子 遠志 甘草 各一兩 縮砂 石菖蒲 各五錢 右爲末薑棗煎湯打 神麴末 一兩 煮糊和 丸梧子大白湯 下百丸。(醫鑑)

㉒ 태화환[太和丸] ◆ 治內傷脾胃虛損不思飲食 肌體羸瘦面色萎黃 開胸快膈 清鬱化痰 消食調理之劑也

白朮土炒四兩 白茯苓 白芍藥 神麴炒 麥芽炒各二兩半 香附便炒 當歸 枳實各二兩 龍眼肉(無則益智代之) 白豆蔻各一兩三錢 半夏一兩二錢 陳皮 黃連 薑汁炒 山查肉各一兩 甘草灸七錢 人參 木香各五錢 右爲末荷葉煎湯打陳米爲糊和丸梧子大米 飲下百丸。(回春)

6) 脹滿

(1) 《濁氣在上則生脹》

㉑ 목향순기탕[木香順氣湯]

厚朴 白茯苓 澤瀉 半夏各一錢 蒼朮八分 青皮 陳皮各六分 草豆蔻 人參 當歸 各五分 益智仁 吳茱萸各三分 木香 乾生薑 升麻 柴胡 甘草各四分 右剉作一貼入薑三水煎服。(寶鑑)

(2) 《蠱脹》

㉑ 소창음자[消脹飲子] ◆ 治蠱脹 單腹脹

豬苓 澤瀉 人參 白朮 赤茯苓 半夏 陳皮 青皮 厚朴 紫蘇葉 香附子 縮砂 木香 檳榔 大腹皮 木通 蘿菔子 甘草各五分 右剉作一貼薑五棗二水煎服。(醫鑑)

(3) 《熱脹》

㉑ 중만분소환[中滿分消丸] ◆ 治中滿鼓脹 及氣脹 水脹然只治熱脹 不治寒脹

厚朴一兩 人參 白朮 薑黃 黃芩 黃連 枳實 半夏各五錢 知母四錢 澤瀉 陳皮各三錢 白茯苓 縮砂 乾生薑各二錢 豬苓 甘

草各一錢

右爲末水浸蒸餅和丸梧子大熱湯下百丸。(丹心)

(4) 《脹滿通治藥》

㉑ 반하후박탕[半夏厚朴湯] ◆ 通治脹滿諸證

半夏一錢 厚朴八分 神麴六分 蘇木 紅花 各五分 三稜 當歸梢 豬苓 升麻各四分 肉桂 蒼朮 白茯苓 澤瀉 柴胡 陳皮 生黃芩 草豆蔻 生甘草各三分 木香 青皮各二分 吳茱萸 黃連生薑各一分 桃仁七箇 昆布少許 右剉作一貼水煎服。(東垣)

7) 神

(1) 《健忘》

㉑ 가미복령탕[加味茯苓湯] ◆ 治痰迷心包 健忘失事 言語如痴

人參 半夏製 陳皮各一錢半 白茯苓 香附子 益智仁各一錢 甘草五分 右剉作一貼薑三片烏梅一箇同煎服。

(2) 《驚悸》

㉑ 가미온담탕[加味溫膽湯] ◆ 治心膽虛怯 觸事易驚 涎與氣搏變生諸證

香附子二錢四分 橘紅一錢二分 半夏 枳實 竹茹各八分 人參 白茯苓 柴胡 麥門冬 桔梗各六分 甘草四分 右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服。(經驗方) ○入門名參胡溫膽湯

(3) 《怔忡》

㉑ 복령음자[茯苓飲子] ◆ 治痰飲蓄于心胃 怔忡不已

半夏製 赤茯苓 茯神 麥門冬 陳皮去白各一兩 沈香屑 檳榔 甘草各五錢 右剉每七錢薑五片水煎服。(得效)

(4) 《癩癩》

㉑ 청심온담탕[清心溫膽湯] ◆ 治諸癩平肝解鬱 清火化痰益心血

陳皮 半夏 茯苓 枳實 竹茹 白朮 石菖蒲 黃連 薑汁炒 香附子 當歸 白芍藥各一錢 麥門冬八分 川芎 遠志 人參各六分 甘草

四分

右剉二分貼薑三片水煎服。(醫鑑)○回春一名清心抑膽湯

8) 痰瘡

(1) 《痰瘡》

㉠ 노강양위탕[露薑養胃湯] ◆ 治久瘡三五日一發者

先以生薑四兩搗取自然汁露一宿 次早將人參養胃湯一貼

入棗二梅一同煎去滓 和薑汁空心溫服。(醫鑑)

㉡ 노학음[老瘡飲] ◆ 治老瘡結成癥癖在服脇諸藥不愈

蒼朮 草果 桔梗 青皮 陳皮 良薑各七分 白芷 赤茯苓 半夏 枳殼 桂心 乾薑 甘草各五分 紫蘇葉 川芎各四分

右剉作一貼入鹽少許水煎空心服。(入門)○一名痰瘡飲。(醫鑑)

㉢ 사수음[四獸飲] ◆ 治七情聚痰五藏氣虛瘡久不已

人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 草果 甘草 烏梅 生薑 大棗各一錢

右剉作一貼拌鹽少許淹食頃以皮紙包裹水浸濕 慢火煨香熟取出水煎服 未發前連進數貼即效。(得效)

㉣ 시진탕[柴陳湯] ◆ 治痰瘡

柴胡 半夏各二錢 人參 黃芩 陳皮 赤茯苓各一錢 甘草五分

右剉作一貼薑三棗二水煎服。(入門)

㉤ 양위단[養胃丹] ◆ 治久瘡二三年不愈者

蒼朮 常山酒蒸各二兩 半夏 陳皮 厚朴各一兩半 赤茯苓 藿香 草果各一兩 甘草炙五錢 烏梅 四十九箇取肉

右爲末淡薑湯打糊和丸梧子大薑湯下五七十丸。(醫鑑)

㉥ 평진탕[平陳湯] ◆ 治食瘡

蒼朮 半夏各二錢 厚朴 陳皮 赤茯苓各一錢二分 半甘草七分

右剉作一貼薑三棗二水煎服。(入門)

(2) 《六經瘡》

㉦ 마황백출탕[麻黃白朮湯] ◆ 治風瘡

麻黃 桂皮 青皮 陳皮 川芎 白芷 半夏 紫蘇葉 赤茯苓 白朮 桔梗 細辛 檳榔 甘草各七分

右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(直指)

(3) 《瘡疾治法》

㉧ 가감청비탕[加減淸脾湯] ◆ 治諸瘡 卽小柴

胡湯與人參養胃湯合和也 寒多熱少多用養胃湯熱 多寒少多用小柴胡湯(二方並見寒門)

寒熱勻則平用每貼入薑五棗二桃柳枝各三寸水煎空心服。(得效)

㉨ 구학탕[驅瘡湯] ◆ 治諸瘡久瘡

草果 青皮 陳皮 人參 赤茯苓 半夏 厚朴 蒼朮 白朮 檳榔各一錢 良薑 甘草各五分

右剉作一貼入薑五棗二梅一水煎服。(直指)

9) 嘔吐

(1) 《嘔吐治法》 丹心

㉩ 가미이진탕[加味二陳湯] ◆ 治胃冷嘔吐

二陳湯一貼加縮砂一錢丁香五分也。(丹心)

㉪ 보중탕[保中湯] ◆ 因痰火致嘔吐 不下飲食

白朮土炒二錢 黃芩 黃連 並土炒 藿香 梔子 薑汁炒各一錢 半夏 陳皮 赤茯苓各八分 縮砂三分 甘草二分

右剉作一貼入薑三片以長流水 和黃泥澄淸取水煎之去滓稍冷頻服。(醫鑑)

㉫ 북령반하탕[茯苓半夏湯] ◆ 治痰飲停胃 嘔吐不止

半夏二錢 赤茯苓 陳皮 蒼朮 厚朴各一錢 藿香八分 縮砂 乾薑 甘草炙各五分

右剉作一貼入薑三梅一水煎服。(回春)

㉬ 청열이진탕[淸熱二陳湯] ◆ 治痰火 嘔吐出涎沫

半夏 陳皮 赤茯苓 甘草 人參 白朮 竹茹 砂仁 梔子 麥門冬各一錢

右剉作一貼入薑三棗二梅一水煎服。(回春)

(2) 《噎膈反胃治法》

㉭ 순기화중탕[順氣和中湯] ◆ 治嘔吐反胃噎雜 吞酸噎膈吐 痰水心腹刺痛

陳皮 鹽水炒 香附子 醋炒 梔子 薑汁炒
黑各一錢 白朮土炒八分 白茯苓七分 半
夏 神麴 黃連薑汁 浸晒乾 豬膽汁 拌炒
各六分 枳實五分 縮砂三分 甘草灸二分
右剉作一貼入薑三 長流水入黃土泥攪澄
清水煎入竹瀝童便薑汁溫服。(醫鑑)

㉔ 신기산[神奇散] ◆ 治噎膈反胃 血虛有火三
陽枯竭

當歸 川芎 白芍藥 生地黃 並酒炒 陳皮
縮砂 半夏 白茯苓 白朮土炒 香附子 枳
實 烏梅肉 藿香 赤茯苓 檳榔 木通 豬苓
黃芩炒 黃栢 人乳炒 知母 人乳炒 赤芍
藥 天門冬 麥門冬 甘草各五分

右剉作一貼水煎服。(醫鑑)

㉕ 안위탕[安胃湯] ◆ 治反胃

白朮 白茯苓 山藥炒 當歸 陳皮 半夏 藿
香各一錢 黃連 薑汁炒 蓮肉各八分 人參
縮砂各五分 甘草三分

右剉作一貼入薑三棗二烏梅一水煎服。(回
春)

㉖ 정향투격탕[丁香透膈湯] ◆ 治五噎十膈 鼻
塞不通

白朮一錢三分 甘草九分 人參 白茯苓 縮
砂 香附子各七分 沈香 藿香 陳皮 厚朴
各五分 丁香

木香 麥芽 青皮 肉豆蔻 白豆蔻各三分
草果 神麴 半夏各二分

右剉作一貼薑三棗二水煎服。(入門)

(3) 《食痺吐食》

㉗ 복령반하탕[茯苓半夏湯] ◆ 治風痰霸絆於脾
胃之間 惡心欲吐 宜實脾土

麥芽炒一錢半 白朮 白茯苓 半夏 神麴炒
各一錢三分 橘紅 天麻各一錢

右剉作一貼爲 末薑五水煎服

10) 寒

(1) 《傷寒陰證》

㉘ 광향정기산[藿香正氣散] ◆ 治傷寒陰證 頭
痛身疼 如不分表裏證 以此導引經絡不致變
動

藿香一錢半 紫蘇葉一錢 白芷 大腹皮 白
茯苓 厚朴 白朮 陳皮 半夏 製桔梗 甘草
灸各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服。(醫鑑)

㉙ 오적산[五積散] ◆ 治感傷風寒 頭痛身疼 四
肢逆冷 胸腹作痛 嘔吐泄瀉或 內傷生冷外
感風冷並皆主之

蒼朮二錢 麻黃 陳皮各一錢 厚朴 桔梗
枳殼 當歸 乾薑 白芍藥 白茯苓各八分
白芷 川芎 半夏 桂皮各七分 甘草六分

右剉作一貼入薑三片葱白三莖水煎服。(入
門)

㉚ 인삼양위탕[人參養胃湯] ◆ 治傷寒陰證及外
傷風寒內傷生冷憎寒壯熱頭痛身疼

蒼朮一錢半 陳皮 厚朴 半夏製各一錢二
分半 茯苓 藿香各一錢 人參 草果 甘草
灸各五分

右剉作一貼入薑三片棗二枚烏梅一箇水煎
服 令微汗濺濺然自然解散 若有餘熱以參
蘇飲欬欬調之。(入門)

(2) 《傷寒表證》

㉛ 삼소음[參蘇飲] ◆ 治感傷風寒 頭痛發熱咳
嗽及內因七情 痰盛胸滿潮熱

人參 紫蘇葉 前胡 半夏 乾葛 赤茯苓各
一錢 陳皮 桔梗 枳殼 甘草各七分半

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服。(易簡)

(3) 《傷寒陰毒》

㉜ 회양구급탕[迴陽救急湯] ◆ 治傷寒陰證及陰
毒 四肢厥冷脉沈細脣青面黑

人參 白朮 白茯苓 陳皮 半夏 乾薑炮 肉
桂 附子炮 五味子 甘草灸各一錢

右剉作一貼入薑七片水煎服。(醫鑑)

11) 胸

(1) 《胃心痛》

㉝ 가미지출환[加味枳朮丸] ◆ 治清痰 食積酒
積茶積肉積在胃脘當心而痛 及痞滿惡心 嘈
雜噯氣 吞酸嘔吐脾疼等證

白朮三兩 枳實 蒼朮 豬苓 麥芽炒 神麴
炒 半夏各一兩 澤瀉 赤茯苓 川芎 黃連

東壁土同炒白螺 螻殼煨各七錢 縮砂 草
豆蔻 黃芩 東壁土炒 青皮 蘿菥子炒 乾
生薑各五錢 陳皮去白 便香附 瓜蒌仁 厚
朴 檳榔各三錢 木香 甘草各二錢
右爲末青荷葉泡湯浸梗米粉作糊和丸梧子
大清米飲下百丸。(正傳)

- ㉔ 청울산[淸鬱散] ◆ 治胃中有伏火 膈上有稠
痰 胃口作痛 及嘔吐酸水 惡心煩悶
半夏 陳皮 白茯苓 蒼朮 便香附 神麴 黃
連 薑汁炒 梔子 薑汁炒各一錢 川芎六分
乾薑炒黑五分 甘草灸二分
右剉作一貼入薑三片水煎服。(醫鑑)

(2) 《支結》

- ㉕ 시진탕[柴陳湯] ◆ 治痰熱胸痞滿
柴胡二錢 黃芩 半夏 赤茯苓 陳皮各一錢
人參七分 甘草五分
右剉作一貼如上法煎服。(入門)

(3) 《胸痞》

- ㉖ 해울화중탕[解鬱和中湯] ◆ 治痞滿內熱 夜
不安臥 臥則愈悶
陳皮去白一錢二分 便香附 赤茯苓 枳殼
梔子炒各一錢 半夏 前胡各七分 黃連 薑
汁炒 神麴炒 厚朴 青皮 蘇子炒各五分
甘草四分
右剉作一貼薑五片水煎服。(回春)

- ㉗ 향사양위탕[香砂養胃湯] ◆ 治陰伏陽蓄而爲
痞滿 能調養脾胃 升降陰陽 成天地交之泰
白朮 陳皮 半夏 白茯苓各一錢 香附子
縮砂 木香 枳實 藿香 厚朴 白豆蔻各七
分 甘草三分
右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服加味枳朮
丸同功。(回春)

12) 婦人

(1) 《惡阻》

- ㉘ 귀원산[歸原散] ◆ 治惡阻 全不入食
白朮 白茯苓 陳皮各一錢半 半夏一錢 人
參 川芎 當歸 白芍藥 丁香 甘草各五分
桔梗 枳殼各二分半
右剉作一貼入薑五棗二水煎服。(綱目)○一

名復元湯。(醫鑑)

- ㉙ 금련반하탕[芩連半夏湯] ◆ 治惡阻 病胸背
滿痛
黃芩一錢二分半 白朮 半夏各一錢 赤茯
苓七分半 黃連 陳皮 當歸 梔子 枳殼 香
附 人參 蒼朮 縮砂 甘草各五分
右剉作一貼入薑七片水煎服。(永類)

(2) 《求嗣》

- ㉚ 선천귀일탕[先天歸一湯] ◆ 經調脉和即當有
孕矣
當歸酒洗一兩二錢 白朮麩炒 白茯苓 生
地黃酒洗 川芎各一兩 人參 白芍藥 牛膝
酒洗各八錢 縮砂炒 香附子 牡丹皮 半夏
各七錢 陳皮六錢 甘草四錢
右剉分作十貼薑三水煎空心服渣再煎臨臥
服經未行先服五貼經行後服五貼藥盡即效
經調脉和即當有孕矣。(醫鑑)

(3) 《婦人雜病》

- ㉛ 삼합탕[三合湯] ◆ 治婦人虛勞 鍼灸不效者
白朮 當歸 白芍藥 黃芪 白茯苓 熟地黃
川芎各一錢 柴胡 人參各七分半 黃芩 半
夏 甘草各五分半
右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(保命)○即
八物湯合小柴胡湯三方合劑也一名三分
散。(入門)

13) 頭

(1) 《痰厥頭痛》

- ㉜ 궁신도담탕[芎辛導痰湯] ◆ 治痰厥頭痛
半夏製二錢 川芎 細辛 南星炮 陳皮 赤
茯苓各一錢 枳殼 甘草 各五分
右剉作一貼薑七片水煎服。(寄效)

(2) 《虛暈》

- ㉝ 자음건비탕[滋陰健脾湯] ◆ 治臨事不寧 眩
暈嘈雜 此心脾虛怯也 此治氣血虛損 有痰
飲作眩暈之仙劑
白朮一錢半 陳皮 鹽水洗去白 半夏製白
茯苓各一錢 當歸 白芍藥 生乾地黃各七
分 人參 白茯苓 麥門冬 遠志製各五分
川芎 甘草各三分

右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服。(回春)

㉠ 향골음[香橘飲] ◆ 治氣虛眩暈

半夏製二錢 陳皮 白茯苓 白朮各一錢 木香 丁香 縮砂研 甘草灸各五分
右剉作一貼入薑五片水煎服。(丹心)

(3) 《痰暈》

㉠ 청훈화담탕[清暈化痰湯] ◆ 治風火痰 眩暈

陳皮 半夏製 白茯苓各一錢 枳實 白朮各七分 川芎 黃芩 白芷 羌活 人參 南星炮 防風各五分 細辛 黃連 甘草各三分
右剉作一貼入薑三片水煎服或爲末薑汁打麪糊和丸服之亦佳。(醫鑑)

14) 小兒.

(1) 《泄瀉》

㉠ 목향산[木香散] ◆ 治痘瘡 腹脹 渴瀉

木香 丁香 桂枝 陳皮 半夏 赤茯苓 人參 訶子皮 大腹皮 前胡 甘草各三分
右剉作一貼薑三片水煎服○冷證可用有熱則不可用。(綱目)

(2) 《急驚風》

㉠ 방풍온담탕[防風溫膽湯] ◆ 治驚風 消痰疎風順氣

半夏 枳殼 赤茯苓各五分 陳皮 防風各二分半 人參二分 甘草一分半
右剉作一貼入生薑一片紫蘇二葉煎水調下大驚元 小驚元服之。(得效)

(3) 《慢脾風》

㉠ 보비익진탕[補脾益眞湯] ◆ 治慢脾風

丁香 木香 訶子皮 陳皮 厚朴 草果 肉豆蔻 白茯苓 人參 白朮 桂枝 半夏 附子炮 甘草灸各二分 全蝎炒一枚
右剉入薑二棗一水煎灌服服訖令揉心下以助藥力。(綱目)

㉠ 보비탕[補脾湯] ◆ 治慢驚風

白朮一錢三分 白芍藥酒炒一錢 白茯苓 半夏各七分 陳皮 黃芪蜜水炒 人參 當歸 川芎 肉豆蔻煨 乾葛 神麴炒各五分 黃連炒 甘草灸各三分
右剉作一貼水煎稍稍服。(醫鑑)

㉠ 삼출반하탕[參朮半夏湯] ◆ 治慢驚風子母俱服

人參 白朮各二錢 半夏 天麻各七分 白茯苓 陳皮各五分 細辛 薄荷 甘草各二分 全蝎炒一枚
右剉作一貼薑三水煎服。(正傳)

15) 氣

(1) 《氣痛》

㉠ 목향유기음[木香流氣飲] ◆ 治諸氣痞痛或腫脹

陳皮一錢 藿香 木香 厚朴 青皮 香附子 麥門冬 白芷 沈香各七分半 白朮 肉桂 通檳榔 紫蘇葉各六分 草果 甘草各五分 大腹皮 木瓜 人參 蓬朮 丁香皮 半夏製 赤茯苓 石菖蒲各三分
右剉分二貼薑三片棗二枚水煎服。(正傳)

㉠ 유기음자[流氣飲子] ◆ 治氣注疼痛 或腫脹

大腹子一錢 陳皮 赤茯苓 當歸 白芍藥 川芎 黃芪 枳實 半夏製 防風 甘草各七分半 紫蘇葉 烏藥 青皮 桔梗各五分 木香二分半
右剉薑三片棗二枚水煎服。(入門)

(2) 《少氣》

㉠ 인삼황기탕[人參黃芪湯] ◆ 治虛損少氣

人參二錢 黃芪 白朮 陳皮各一錢 當歸 白茯苓 甘草灸各五分
右剉薑三片棗二枚水煎空心服。(易老)

(3) 《氣逆》

㉠ 퇴열청기탕[退熱清氣湯] ◆ 治氣逆

柴胡 陳皮 赤茯苓各一錢 半夏製 枳殼各八分 便香附七分 川芎五分 縮砂七粒研 木香 甘草灸各三分
右剉薑三片水煎服。(入門)

16) 便

(1) 《濕痢》

㉠ 가미제습탕[加味除濕湯] ◆ 治傷濕下痢如黑豆汁

半夏 厚朴 蒼朮各一錢二分 藿香 陳皮
赤茯苓各七分 木香 桂皮 甘草各五分
右剉作一貼薑三片棗二枚空心水煎服。(丹
心)

(2) 《痰泄》

- ① 만병이진탕[萬病二陳湯] ◆ 治痰濕泄瀉
半夏 陳皮 赤茯苓 白朮 蒼朮 山藥各一
錢 縮砂 厚朴 木通 車前子炒 甘草灸各
五分
右剉作一貼入薑三片烏梅一箇燈心一團水
煎服。(回春)

17) 霍亂

(1) 《霍亂後煩渴》

- ① 맥문동탕[麥門冬湯] ◆ 治霍亂後煩渴
麥門冬二錢 陳皮 半夏 白朮 白茯苓各一
錢 小麥半合 人參 甘草各五分
右剉作一貼入薑三片烏梅一箇水煎服。(入
門)○一名九君子湯。(入門)

(2) 《濕霍亂治法》

- ① 이향황련산[二香黃連散] ◆ 治伏暑 霍亂腹
痛躁悶脉沈 手足冷
藿香 厚朴 半夏 赤茯苓 陳皮 白扁豆 香
薷各一錢 黃連 澤瀉各八分 甘草三分
右剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服。(入門)

18) 癰疽

(1) 《癰疽五發證》

- ① 이향산[二香散] ◆ 治癰疽因風氣食三證而生
通用此調暢胃氣
益智仁 縮砂仁各三錢 木香 藿香 白豆蔻
白茯苓 半夏麴 厚朴 陳皮 蒼朮 甘草各
一錢半 丁香七分半
右爲末每服三錢薑五片棗二枚同水煎服。
(直指)

(2) 《癰疽排膿生肌法》

- ① 탁리화중탕[托裏和中湯] ◆ 治癰疽 潰後氣
虛飲食少思 或嘔吐泄瀉久不收斂
人參 白朮各一錢半 黃芪 白茯苓 乾薑炮

陳皮 半夏各一錢 木香 甘草灸各五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服。(入門)

19) 血

(1) 《嘔血吐血》

- ① 복령보심탕[茯苓補心湯] ◆ 治勞心吐血白
芍藥二錢 熟地黃一錢半 當歸一錢三分
川芎 白茯苓 人參 前胡 半夏各七分 陳
皮 枳殼 桔梗 乾葛 紫蘇葉 甘草各五分
右剉作一貼薑五片棗二枚煎服。(三因)

(2) 《咳血嗽血唾血咯血》

- ① 청각탕[淸咯湯] ◆ 治咯血
陳皮 半夏 茯苓 知母 貝母 生地黃各一
錢 桔梗 梔子炒黑各七分 杏仁 阿膠珠各
五分 桑白皮一錢半 甘草五分 薄桂二分
右剉作一貼薑三片水煎服。(回春)

20) 浮腫

(1) 《水腫治法》

- ① 분기음[分氣飲] ◆ 治腫脹喘急
桔梗 赤茯苓 陳皮 桑白皮 大腹皮 枳殼
半夏 麴蘇子炒 蘇葉各一錢 草果 甘草各
五分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(得效)

21) 黃疸

(1) 《黃疸》

- ① 가감위령탕[加減胃苓湯] ◆ 治黃疸 飲食無
味 行步倦怠 脉澹而濡
胃苓湯去桂 加藿香 半夏 大腹皮 山楂子
蘿菔子 三稜 蓬朮 青皮各五分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(醫鑑)

(2) 《女勞疸》

- ① 진교음자[秦芫飲子] ◆ 治女勞疸
秦芫 當歸 芍藥 白朮 桂皮 赤茯苓 陳皮
熟地黃 川芎 小草(遠志)各一錢 半夏 甘
草各五
右剉作一貼薑五片水煎服。(得效)

22) 精

(1) 《濕痰滲爲遺精》

㉠ 가미이진탕[加味二陳湯]

半夏薑製 赤茯苓鹽水炒 梔子炒黑各一錢
半 陳皮 白朮 桔梗 升麻酒炒 柴胡酒炒
甘草各一錢
石菖蒲七分 黃栢 知母各三分
右剉作一服薑三片水煎空心服

23) 夢

(1) 《虛煩不睡》

㉠ 가미온담탕[加味溫膽湯] ◆ 治法同上

半夏三錢半 陳皮二錢二分 竹茹 枳實各
一錢半 酸棗仁炒 遠志 五味子 人參 熟
地黃 白茯苓 甘草各一錢
右剉分作二貼薑五片棗二枚水煎服。(回春)

㉡ 고침우우산[高枕無憂散] ◆ 治心膽虛怯晝夜不睡 百方不效服此如神

人參五錢 石膏三錢 陳皮 半夏 白茯苓
枳實 竹茹 麥門冬 龍眼肉 甘草各一錢半
酸棗仁炒一錢
右剉分作二貼水煎服。(醫鑑)

㉢ 온담탕[溫膽湯] ◆ 治心膽虛怯 觸事易驚 夢寐不祥 虛煩不得睡

半夏 陳皮 白茯苓 枳實各二錢 青竹茹一
錢 甘草五分
右剉作一貼薑五片棗二枚水煎服。(醫鑑)

24) 津液

(1) 《盜汗》

㉠ 삼기탕[參芪湯] ◆ 治虛人 盜汗

人參 黃芪 白朮 白茯苓 扁豆 山藥 陳皮
乾葛 半夏麴 甘草各一錢
右剉作一貼水煎服。(丹心)

25) 手

(1) 《痰飲多爲臂痛》

㉠ 가감복령환[加減茯苓丸] ◆ 治濕痰壅滯 經

絡不通 兩臂作痛 不能梳洗

半夏三兩 以白礬皂角生薑各一煎湯浸七
日取用 陳皮鹽水炒 白芍藥酒炒 黃芪鹽
水炒各二兩 白茯苓一兩半 朴硝一兩三錢
海桐皮酒洗 薑黃 木瓜各一兩 薄桂 甘草
各五錢
右爲末薑汁竹瀝糊和丸梧子大白湯下百
丸。(醫鑑)

㉡ 반하금출탕[半夏芩朮湯] ◆ 治痰飲臂痛不能舉

半夏 蒼朮各一錢半 片芩酒炒 白朮 南星
炮 香附子各七分 陳皮 赤茯苓各五分 威
靈仙 甘草各三分
右剉作一貼薑五片水煎服。(正傳)

26) 濕

(1) 《濕病治法及通治藥》

㉠ 삼습탕[滲濕湯] ◆ 治一切濕證

蒼朮 白朮 赤茯苓各一錢半 陳皮 澤瀉
猪苓各一錢 香附子 川芎 縮砂 厚朴各七
分 甘草三分
右剉作一貼入薑三片燈心一撮水煎服。(回
春)

27) 暑

(1) 《暑病吐瀉》

㉠ 향박음자[香朴飲子] ◆ 治傷暑吐瀉煩亂

香薷一錢半 厚朴 白扁豆 澤瀉 赤茯苓
陳皮 木瓜 半夏 人參 紫蘇葉 烏梅肉各
七分 甘草五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚煎服。(丹心)

28) 咽喉

(1) 《梅核氣》

㉠ 가미이진탕[加味二陳湯] ◆ 治同上二陳湯加
枳殼 桔梗 黃芩 梔子 蘇子 白豆蔻各七
分
右剉作一貼入薑三片水煎服。(醫鑑)

29) 耳

(1) 《耳鳴》

- ㉠ 복총탕[復聰湯] ◆ 治痰火上攻 耳鳴耳聾
半夏 赤茯苓 陳皮 甘草 藜蘆 木通 瞿麥
黃栢鹽炒各一錢
右剉作一貼入薑三片水煎服。(丹心)

30) 腹

(1) 《痰飲腹痛》

- ㉠ 사합탕[四合湯] ◆ 治痰積氣滯 腹痛
陳皮 半夏各一錢半 厚朴 枳殼 赤茯苓
紫蘇葉 香附子 鬱金各七分 甘草五分
右剉作一貼薑五片水煎服。(醫鑑)

31) 背

(1) 《背痛》

- ㉠ 삼합탕[三合湯] ◆ 治背心一點痛 烏藥順氣
散合二陳湯 香蘇散加羌活蒼朮水煎服。(醫鑑)

32) 鼻

(1) 《鼻鼈》

- ㉠ 승마탕[升麻湯] ◆ 治肺風瘡
陳皮 甘草各一錢 蒼朮 乾葛 桔梗 升麻
各七分 赤芍藥 大黃酒蒸各五分 半夏 赤
茯苓 白芷 當歸各三分 枳殼 乾薑各二分
右剉作一貼入薑三片燈心一撮同煎服。(丹
心)

33) 諸瘡

(1) 《疥癬》

- ㉠ 승마화기음[升麻和氣飲] ◆ 治疥瘡痛痒
乾葛二錢 陳皮 甘草各一錢半 升麻 蒼朮
桔梗各一錢 赤芍藥七分半 大黃五分 半
夏 當歸 茯苓 白芷各三分 乾薑 枳殼各
二分
右剉作一貼入薑五片燈心十五莖水煎服。
(入門)

34) 瘟疫

(1) 《瘟疫治法》

- ㉠ 십미궁소산[十味芎蘇散] ◆ 治溫熱 瘟疫病
川芎一錢半 半夏一錢二分 赤茯苓 紫蘇
葉 柴胡 乾葛各一錢 陳皮 枳殼 甘草各
七分 桔梗五分
右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服。(丹心)

35) 皮

(1) 《麻木》

- ㉠ 쌍합탕[雙合湯] ◆ 治濕痰死血 作麻木
當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 陳皮 半夏
白茯苓 白芥子各一錢 桃仁八分 酒紅花
甘草各三分
右剉作一貼水煎入竹瀝薑汁調服。(醫鑑)

36) 眼

(1) 《眼昏》

- ㉠ 억청명목탕[抑青明目湯] ◆ 治婦人怒氣傷肝
眼目昏暗 如雲霧中
當歸 白芍藥 生乾地黃 白朮 赤茯苓 陳
皮 半夏 草龍膽 柴胡 黃連 梔子 牡丹皮
白豆蔻甘草各七分
右剉作一貼入薑三棗二水煎服。(醫鑑)

37) 蟲

(1) 《治諸蟲藥》

- ㉠ 연심산[蓮心散] ◆ 治勞瘵
當歸 黃芪 甘草 鱉甲醋炙 前胡 柴胡 獨
活 羌活 防風 防己 茯苓 半夏 黃芩 陳
皮 阿膠珠 官桂 芍藥 麻黃不去根節 杏
仁 蓮花藥 南星 川芎 枳殼各五分 芫花
醋炒黑色一撮
右剉作一貼薑三片棗二枚水煎服 須待吐
有異物芫花漸減少
蓋芫花反甘草所以殺蟲炒
之所以斷熱去寒妙在此處。(丹心)

38) 聲音

(1) 《因雜病失音》

① 인삼청폐산[人參清肺散] ◆ 治痰嗽 咽乾 聲不出

人參 陳皮 貝母炒各一錢半 半夏 桔梗 茯苓 桑白皮 知母 枳殼 杏仁 黃連各一錢 款冬花七分 麥門冬地骨皮 甘草各五分 五味子二十箇
右剉分作二貼每服薑三片水煎服.(丹心)

39) 脈

(1) 《脉病藥餌》

① 인삼황기탕[人參黃芪湯] ◆ 滋養血氣 調和榮衛 和順三焦 通行血脉 治雜病脉代
陳皮二錢 黃芪 白芍藥 桔梗 天門冬 半夏 當歸各一錢 人參 白茯苓 熟地黃 地骨皮 甘草各五分
右剉作一貼薑七片煎服.(脉訣)

3. 二陳湯의 連係方에 活用된 痰의 病理에 關한 調査

1) 咳嗽

(1) 《寒嗽》

中脘有痰水

(2) 《鬱嗽》

火降則痰消嗽止

(3) 《痰喘》

痰喘上氣

(4) 《哮證》

哮吼喘急痰盛

2) 痰飲

(1) 《氣痰》

氣痰 窒碍咽喉 成梅核氣

(2) 《痰病有似邪祟》

痰迷心竅或似鬼祟

(3) 《熱痰》

① 此因內傷七情 以致痰迷心竅 神不守舍 神出則舍空 舍空則痰自生也

② 膈上胃中熱痰

(4) 《痰厥》

熱痰結在胸膈 咯吐不出 滿悶作痛名痰結

(5) 《痰塊》

能運痰從大便出不損元氣

(6) 《鬱痰》

上焦鬱火 痰涎壅盛 胸膈不利 咽喉煩燥 噎塞如有所硬 吐不出嚥不下

(7) 《痰飲治法》

治氣虛痰盛

(8) 《痰飲通治藥》

① 一切痰飲及食積酒積成痰壅盛

② 通治停痰留飲發爲諸病

3) 風

(1) 《痰涎壅盛》

① 中風痰盛不能言語熱者宜服

② 中風痰迷心竅 舌強不能言

(2) 《手足癱瘓》

右半身不遂屬氣虛與濕痰

(3) 《暴瘖》

中風痰迷心竅 言語蹇澁或不省人事

(4) 《歷節風治法》

濕痰流注肩臂痛

4) 積聚

《蟲積》

水積痰飲積

5) 內傷

《吞酸吐酸》

治脾胃中伏火鬱積生痰 致令嘔吐吞酸嘈雜

6) 神

- (1) 《健忘》
痰迷心包健忘失事言語如痴
- (2) 《驚悸》
心膽虛怯觸事易驚涎與氣搏變生諸證
- (3) 《怔忡》
痰飲蓄于心胃怔忡不已
- 7) 嘔吐
- (1) 《嘔吐治法》丹心
①因痰火致嘔吐 不下飲食
②治痰飲停胃 嘔吐不止
③痰火 嘔吐出涎沫
- (2) 《噎膈反胃治法》
治嘔吐反胃嘈雜吞酸噎膈吐 痰水心腹刺痛
- (3) 《食痺吐食》(東垣)
治風痰霸絆於脾胃之間 惡心欲吐 宜實脾土

8) 胸

- (1) 《胃心痛》
①清痰
②胃中有伏火膈上有稠痰 胃口作痛 及嘔吐
酸水 惡心煩悶
- (2) 《支結》
痰熱胸痞滿

9) 頭

- (1) 《痰厥頭痛》
痰厥頭痛
- (2) 《虛暈》
此治氣血虛損 有痰飲作眩暈之仙劑
- (3) 《痰暈》
風火痰 眩暈

10) 小兒

- (1) 《急驚風》
驚風消痰疎風順氣

11) 手

- (1) 《痰飲多爲臂痛》
①濕痰壅滯 經絡不通 兩臂作痛 不能梳洗
②痰飲臂痛不能舉

12) 耳

- (1) 《耳鳴》
痰火上攻 耳鳴耳聾

13) 腹

- (1) 《痰飲腹痛》
痰積氣滯 腹痛

14) 皮

- (1) 《麻木》
濕痰死血 作麻木

15) 聲音

- (1) 《因雜病失音》
痰嗽 咽乾 聲不出

Ⅲ. 考 察

1. 二陳湯의 連係方 活用 범위에 대한 考察

二陳湯의 連係方이 活用된 각 범위의 病症을 조사해보면 다음과 같다. 즉 活用범위는 咳嗽 痰飲 中風 積聚 內傷 脹滿 神 痰瘡 嘔吐 寒胸 氣 婦人 小兒 便 婦人 頭 霍亂 癰疽 血 浮腫 黃疸 精 夢 津液 手 濕 暑 咽喉 耳 腹 背 鼻 諸瘡 溫疫 皮 眼 蟲 聲音 脈等 39門에서 二陳湯의 연계방을 活用하고 있다.

咳嗽門에서는 寒嗽 勞嗽 鬱嗽 氣喘 火喘 風寒喘 痰喘 陰虛喘, 痰飲門에서는 氣痰 熱痰 痰喘 邪祟 喜唾痰 痰塊 鬱痰, 中風門에서는 痰涎

壅盛 手足癱瘓 中風血脈 中風熱症 暴痞 歷節風, 積聚門에서는 食鬱 痞塊 蟲積 積聚治法, 內傷門에서는 嘈雜 吞酸 吐酸 不思食, 脹滿門에서는 膈脹 蟲脹 熱脹, 神門에서는 健忘 驚悸 怔忡 癩癩, 痰瘧門에서는 諸痰瘧症, 嘔吐門에서는 噎膈 反胃 食痺吐食症, 傷寒門에서는 傷寒陰證 傷寒表證 傷寒陰毒證, 胸門에서는 胃心痛 支結 胸痞症 등에 活用된 方劑들이 二陳湯의 連係方으로 構成되어 있다.

婦人門에서는 惡阻 求嗣 婦人雜病, 頭痛門에서는 痰厥頭痛 虛暈 痰暈症, 小兒門에서는 泄瀉 急驚風 慢脾風, 氣門에서는 氣痛 少氣 氣逆證, 大便門에서는 濕痢, 霍亂門에서는 霍亂後煩渴, 濕霍亂, 癰疽門에서는 癰疽五發證 癰疽排膿生氣法, 血門에서는 吐血 嘔血 咳嗽咯血, 浮腫門에서는 浮腫治法, 黃疸門에서는 黃疸 女勞疸, 精門에서는 遺精, 夢門에서는 虛煩不睡, 津液門에서는 盜汗, 手門에서는 痰飲臂痛, 濕門에서는 濕病治法 및 通治 등을 치료하는 方劑들의 構成이 二陳湯의 連係方으로 되어 있어 痰飲 病理와 깊은 連關性이 있는 것으로 생각된다.

그밖에도 暑病의 吐瀉, 咽喉의 梅核氣, 耳鳴, 背痛, 鼻鼾, 疥癬, 瘟疫, 麻木, 眼昏, 諸蟲病, 失音, 代脈症 등에 活用된 方劑들이 二陳湯과 일정한 相關關係를 갖고 있음을 알 수 있다.

2. 二陳湯의 連係方의 構成 및 主治에 關한 考察

咳嗽門에 活用된 二陳湯의 連係方의 方劑構成을 살펴보면 寒嗽에서는 二陳湯에 理中湯을 合方하여 加味理中湯로 活用하거나 二陳湯에 人蔘 細辛 肉桂 等 溫性藥을 配伍한 半夏溫肺湯을 活用하고 있으며, 勞嗽에서는 二陳湯에 潤肺作用이 있는 五味子 紫菀 阿膠珠 등과 祛痰止咳를 降火하는 桑白皮 貝母 杏仁 蘇葉 등을 配伍한 加味人蔘紫菀湯, 大寧嗽湯을 사용하고 있다.

鬱嗽에서는 二陳湯에 石膏 黃芩 등 清熱之劑와 前胡 瓜蒌仁 貝母 등을 配伍하여 降火와 化痰作用을 兼하고 桔梗枳殼湯을 합하여 胸痞 胸滿을 治하도록한 清金降火湯을 사용하고 있다. 喘證에서는 病의 原因에 따라 氣虛일 때는 蘇苓白朮散을, 上氣할 경우에는 桔梗枳殼湯에 蘇子, 葶藶子, 蘇葉 등을 胸滿 氣逆한 경우에는 阿膠珠 五味子 罌粟殼 款冬花 百合 등을 二陳湯에 配伍하여 活用하고 있으며 그밖에도 蘇子, 皂角, 石膏, 知柏四物湯 등을 二陳湯에 配合하여 사용하기도 하였다.

痰飲門에서 氣痰에 活用한 方劑들의 構成을 살펴보면 二陳湯에 桔梗 枳殼 五味子 蘇葉 등의 理氣之劑를 配伍 하였고, 熱痰에는 黃芩 梔子 薄荷 瓜蒌仁 등을 公同적으로 配伍하고 있으며 痰塊에는 調胃承氣湯類와 青礞石, 竹瀝 등을 合方하거나 配伍하고 있다.

鬱嗽에 使用한 清火化痰丸은 清熱導痰湯, 三黃瀉心湯, 調胃承氣湯, 千縲導痰湯類가 合方되어 있고 白芥子, 玄明粉, 青礞石, 竹瀝 등이 配伍되어 있어 實證의 上焦痰飲에 모두 活用할 수 있을 것으로 생각된다.

中風門에서 痰涎壅盛한 경우에는 導痰湯, 清熱導痰湯, 導痰君子湯, 桔梗枳殼湯 等이 合方된 加減導痰湯 혹은 溫膽湯에 人蔘, 石菖蒲를 加味한 滌痰湯을 사용하고 있다.

手足癱瘓일 경우에는 二陳湯에 桃紅四物湯, 清熱導痰湯, 古防風湯 등이 合方된 加減潤燥湯을 活用하고, 대부분의 風症에는 二陳湯과 더불어 羌活 防風이 公同적으로 配伍되었으며, 血虛일 때는 四物之劑, 氣不行일 때는 烏藥順氣散類, 言語蹇澁일 때는 麥門冬 遠志 石菖蒲, 風熱일 때는 荊芥, 黃連, 梔子, 仙退 등을 配伍하여 사용하고 있다.

積聚門에서는 二陳湯에 越鞠丸을 合方한 六鬱湯을 기본으로 하여 破氣之劑인 蓬朮 三稜, 理氣之劑인 木香 檳榔 등 많이 活用하였고 경우에 따라서 厚朴 吳茱萸, 柴胡, 青皮, 枳實 등도 配伍하기도 한다.

內傷門에서 吞酸, 嘈雜 症狀에 사용하는 連係

方들은 二陳湯에 越鞠丸과 山楂, 神曲, 麥芽 등 消導之劑와 黃連, 梔子 등 配合하므로써 胃의 濕熱을 積滯를 제거하고, 不思食이나 內傷의 調理藥의 連係方들을 二陳湯에 香砂平胃散, 四君子湯, 異功散 등의 處方은 君臣으로 合方하고 砂仁 白豆久 薏苡仁 蓮子肉 黃連등을 佐使로 配伍한 方劑들을 많이 활용하고 있다.

脹滿門에서는 二陳湯에 五積散, 平胃散, 厚朴湯 등이 合方하고 경우에 따라서 升麻 柴胡 등의 升學之劑로 하는 下氣之劑을 配伍하여 升降清濁을 정상화시키는 한 方劑를 활용하고 있다.

神門의 健忘症에서는 二陳湯에 開鬱, 安神益智하는 香附子 人蔘 益智仁을 配伍한 加味茯苓湯을 사용하였고 驚悸症에는 溫膽湯에 香附子 人蔘 柴胡 麥門冬 桔梗을 配伍한 加味溫膽湯을 사용하고 있어 痰과 氣가 鬱結된 病理를 治療함을 알 수 있다.

癥癩에 사용한 清心溫膽湯은 溫膽湯에 定志小丸, 熟地黃을 去한 四物湯, 四君子湯을 合하고 香附子 黃連을 配伍한 方劑로 볼 수 있다.

痰瘡에 活用된 方劑들의 특징을 관찰해 보면, 二陳湯을 基本方으로 하고, 草果 常山柴胡 麻黃 蒼朮 등을 공통적으로 配伍한 것이며, 合方된 處方으로서는 原因에 따라 平胃散, 桔梗枳殼湯, 四君子湯, 小柴胡湯, 人蔘養胃湯을 사용하고 있음을 알 수 있다.

嘔吐門에서 活用한 二陳湯의 連係方을 관찰하여 보면 二陳湯을 主方으로 하고 胃가 冷하면 砂仁 丁香을, 痰火가 있으면 竹茹 梔子 黃連 黃芩을, 痰飲이 있으면 平胃散을 配合하고 있기 때문에, 二陳湯으로 脾胃의 濕을 燥하고 胃熱을 降火하므로써 嘔吐를 治療함을 알 수 있다.

反胃에 使用한 方劑 가운데 血虛有火 할 때는 枳朮丸, 回生散, 知柏四物湯과 二陳湯을 合方하고 黃芩, 天門冬 麥門冬 木通 豬苓 檳榔 등을 配伍하므로써 濕痰火를 清하게 하거나 水道을 通하게 하는 작용있는 神奇散이 있고 또한 二陳湯에 四君子湯, 回生散을 합하고 山藥 當歸 黃連 蓮子肉 砂仁을 配伍한 安胃湯이 있으며,

香附子 枳殼 陳皮 및 越鞠丸은 君으로 하고 枳朮丸은 臣으로 하며 二陳湯을 佐하고 梔子 黃連 砂仁 등은 配伍한 順氣和中湯이 있다. 한편 四君子湯을 君으로하고 回生散, 神香散을 合方한 다음 砂仁 香附子 沈香 丁香 草豆久 草果 등이 芳香性 理氣之劑와 二陳湯을 佐使로 配伍한 丁香透膈湯이 있다.

寒門의 傷寒陰證에 사용한 藿香正氣散, 五積散, 人蔘養胃湯에는 모두 二陳湯이 合方되어 있어 健脾燥濕 作用에 도움을 줄 수 있는 한편, 外感의 發散作用도 兼하고 있다. 또한 藜蘇飲은 二陳湯과 桔梗枳殼湯을 合方하고 葛根 蘇葉 前胡 人蔘 등을 配伍하고 있어 二陳湯이 祛痰止咳作用을 하고 있음을 알 수 있다. 回陽救急湯에서는 附子理中湯과 二陳湯을 合方하므로써 溫中回陽하는 作用을 강화한다고 볼 수 있다.

胸門의 胃心痛에서 사용한 加味枳朮丸은 枳朮丸을 君으로 하고 二陳湯 및 越鞠丸 養胃湯을 臣으로 합한 다음 清熱하는 黃芩 黃連, 理氣하는 青皮 草豆久 砂仁, 下氣하는 木香 檳榔 등을 配伍한 方劑로 볼 수 있다. 清鬱湯은 內傷의 嘈雜에 사용한 消食清鬱湯에서 山查 枳角 藿香 대신 乾薑을 配伍한 方劑이며 支結에 사용한 柴陳湯은 小柴胡湯을 君으로 하고 二陳湯에 臣으로 合方한 것이며, 解鬱和中湯은 二陳湯에 香附子 枳殼 厚朴 青皮 黃連 梔子 蘇子 前胡 등을 配伍한 方劑이며, 香砂養胃湯은 二陳湯에 枳朮丸 回生散등을 合하고 香附子 砂仁 草豆久 木香 등은 芳香性 理氣之劑를 配伍한 方劑로 보여진다.

婦人門에서는 妊娠 惡阻에 二陳湯의 連係方을 사용하고 있으므로 半夏가 임신에 禁忌藥으로 되어 있으나 有故無損의 원칙에 따라 惡阻가 심할 경우에는 半夏가 君약인 二陳湯을 활용하고 있다.

또한 八珍湯類에 二陳湯을 合方하고 牛膝 牡丹皮 香附子 砂仁 등을 配伍하여 不妊에 사용하였고, 八珍湯에 柴陳湯을 合方하여 婦人虛勞 雜病에 사용하고 있다.

頭門에서 頭痛, 眩暈에 二陳湯이 君藥으로 사

용하고 있어 頭部疾患의 치료에 祛痰작용이 중요한 역할을 하고 있음을 알 수 있다. 즉 芎辛導痰湯은 導痰湯에 川芎 細辛을 配伍한 것이고, 虛暈에 사용하는 滋陰健脾湯은 二陳湯에 八珍湯 및 定志小丸을 合方한 方劑이고 淸暈化痰湯은 淸熱導痰湯, 祛風導痰湯 및 芎辛導痰湯 등 導痰湯類을 合方한다고 볼 수 있다.

小兒門의 急驚風에 사용한 防風溫膽湯은 二陳湯에 防風 人蔘을 配伍한 方劑이며, 慢驚風에 사용한 補脾益眞湯 補脾湯 蔘朮半夏湯은 四君子湯을 爲主로한 補脾之劑에 二陳湯과 全蝎, 天麻 등의 鎮痙藥과 淸熱之劑인 黃連, 薄荷등을 小量으로 配伍한 方劑이다.

氣病門 腫脹에 사용한 木香流氣飲은 二陳湯에 理氣 行氣 下氣之劑를 加味하였고, 流氣飲子是 大腹皮를 君으로 하고 二陳湯에 四物之劑(去熟地黃)와 理氣之劑를 配伍한 方劑이다.

大便門에서는 二陳湯에 平胃散, 回生散등을 配合하여 腸內的 濕邪를 제거하거나, 小便을 통하여 濕邪를 배설하므로써 濕痢나 痰泄를 치료하는 加味除濕湯, 萬病二陳湯을 사용하고 있다.

霍亂門에서는 二陳湯에 香薷散을 合方하고 黃連 澤瀉를 配伍한 二香黃連散을 사용하고 霍亂後 煩渴症이 있을 때는 二陳湯에 麥門冬을 君藥으로 하고 四君子湯을 佐로 배합한 다음 小麥을 配伍한 麥門冬湯을 사용하고 있다.

癰疽에 사용한 二香散은 益智仁, 砂仁을 君으로 하고 木香 藿香 白豆蔻, 二陳湯, 平胃散을 臣으로 합방한 것이며 托裏和中湯은 異功散, 理中湯에 二陳湯을 합하고 黃芪를 加味한 方劑로 볼 수 있다.

血門의 吐血에서는 四物湯과 蔘蘇飲을 合方한 茯苓補心湯을 사용하고 咯血에는 祛痰止咳하는 桑白皮를 君으로하고 二陳湯, 桔梗 知母 貝母를 臣으로 한다음 潤肺 止血 涼血 하는 杏仁 阿膠珠, 生地黃, 梔子를 配伍한 淸咯湯을 사용하고 있다.

浮腫門의 腫脹 喘急에서는 二陳湯에 桔梗枳殼湯을 合方하고 大腹皮 桑白皮 蘇子 蘇葉 草果를 配伍한 分氣散을 사용하고, 黃疸門에서 加

減胃芎湯은 平胃散, 五苓散, 二陳湯, 回生散에 大腹皮 山楂 蘿藦子 三稜 蓬朮 青皮를 配伍하므로써 中·下焦에서 濕熱痰을 제거하고 이와 같은 기전으로 黃疸를 치료하는 方劑이고, 秦芫飲子是 四物湯에 黃芪 飴糖을 去한 小建中湯을 合하고 秦芫 白朮 遠志를 配伍한 다음 二陳湯類를 佐使로 方劑로써 過勞로 인한 黃疸에 활용한다.

精門의 遺精에 사용한 加味二陳湯은 二陳湯을 君으로 하여 濕痰을 없애주고, 二妙散 梔子를 配合하여 濕熱을 내려주며, 桔梗 升麻 柴胡로 升提하고 石菖蒲로 安神 開竅하는 方劑로 볼 수 있다.

夢門에서 虛煩不眠이나 心胆虛怯 觸事易驚할 때 사용한 溫膽湯이나 加味溫膽湯은 모두 二陳湯의 變方으로 痰迷心竅할 때 사용하는 方劑이며, 高枕無憂散은 溫膽湯에 安神하는 人蔘, 酸棗仁, 龍眼肉과 淸熱하는 石膏 麥門冬은 配伍하였으며 특히 人蔘과 石膏를 君臣으로 配伍한 것이 특징이다.

津液門의 盜汗에 사용한 蔘芪湯은 二陳湯에 四君子湯과 黃芪 白扁豆 山藥 葛根을 配伍하여 虛弱人的 盜汗에 사용한 方劑이며, 手門에서 痰飲 臂痛에 사용한 加減茯苓丸은 二陳湯을 君으로 하고 舒筋活絡하는 薑黃 海桐皮 木瓜 桂枝를 配伍하고 黃芪 芍藥 芒硝를 加味한 것이 특징이다. 半夏芎芩湯은 二陳湯에 南星 黃芩 蒼朮을 配伍하여 濕熱痰을 治하고 香附子 威靈仙를 配伍하여 行氣 止痛케 하는 方劑로 볼 수 있다.

濕門의 滲濕湯을 二陳湯에 四苓散과 平胃散, 香附子, 川芎, 砂仁을 配合한 方劑이고, 暑門의 香朴飲子是 香薷散에 二陳湯을 合方하고 澤瀉 木瓜 人蔘 蘇葉 烏梅를 配伍하여 暑病으로 인한 吐瀉 霍亂을 치료하는 方劑이다.

咽喉門의 梅核氣에 사용하는 加味二陳湯은 二陳湯에 桔梗枳殼湯을 合方하고 黃芩 梔子 蘇子 白豆久를 配伍한 方劑이며, 耳鳴에 사용하는 復聰湯은 二陳湯에 蕭蓄 瞿麥 木通 黃柏을 配伍하여 痰火의 上攻을 下行케 하는 方劑이며, 痰飲腹痛에 사용한 四合湯은 二陳湯에 厚朴, 枳

殼, 蘇葉, 香附子, 鬱金 등 理氣之劑를 加味한 方劑로 볼 수 있다.

鼻臄에 사용한 升麻湯은 陳皮, 甘草를 君으로 하고 蒼朮, 升麻, 葛根湯을 臣으로 한다음 二陳湯, 桔梗枳殼湯과 大黃 當歸 乾薑 白芷를 配合한 方劑를 볼 수 있고, 疥癬에 사용한 升麻 和氣飲도 鼻臄에 活用한 升麻湯과 구성내용은 동일하지만 升麻葛根湯을 君으로 한 것만 다르다.

瘟疫에 사용한 十味芎蘇散은 川芎을 君으로 하고 藜蘆飲類를 合方한 方劑이며, 麻木에 사용한 雙合湯은 桃紅四物湯에 二陳湯을 合方하고 白芥子를 가미한 方劑이고, 眼昏에 사용한 抑青明目湯은 四物湯과 二陳湯을 合方하고 瀉肝하는 柴胡 草龍膽 牡丹皮, 清熱하는 梔子 黃連, 健脾하는 白朮 白豆久를 加味한 方劑이다.

勞瘵에 사용한 蓮心散은 二陳湯에 敗毒散, 麻黃湯, 導痰湯 小續命湯類등이 合方하고, 蓮蕊, 堯花를 加味한 것이 특징이며 방제구성과 主治로 보아 結核균 활동을 억제하는 方劑로 생각된다.

失音에 사용한 人蔘清肺散은 人蔘, 陳皮, 貝母를 君으로 하고 二陳湯 桔梗枳殼湯 瀉白散을 合方하고 知母, 杏仁, 黃連, 款冬花, 麥門冬, 五味子を 加味한 方劑로 볼 수 있으며, 代脈에 사용한 人蔘黃芪湯은 陳皮를 君으로 하고 二陳湯에 補氣之劑인 黃芪 人蔘, 補血劑인 熟地黃 當歸 白芍, 潤肺之劑인 麥門冬, 瀉肺之劑인 地骨皮 桔梗등을 配伍한 方劑로 볼 수 있다.

3. 二陳湯 連係方의 痰飲 病理에 關한 考察

二陳湯의 연계방에 직접적으로 언급된 痰飲의 病理에 關한 고찰을 해보면 다음과 같다.

咳嗽門에서는 中脘有痰水, 火降則痰消, 痰喘上氣, 哮喘喘急 痰盛 등의 病理적인 表現이 記錄되어 있으므로 咳嗽 喘急이 痰飲 病理에 밀접한 상관성이 있음을 보여주고 있다.

梅核氣 鬼崇등은 氣痰의 病理 機轉으로 발생

하며, 膈上 胃中の 熱痰 경우나 熱痰이 胸膈에 結한 痰結 경우 痰을 大便으로 出하는 境遇, 上焦鬱火로 痰涎이 壅盛하거나 食積 滯積 停飲 留飲경우, 氣症 痰盛한 경우에서 痰飲病理과 關聯이 있는 內容들이 언급되어 있다.

中風門에서는 痰迷心竅 舌強不能言의 病理逆推論, 手足癱瘓에서는 氣虛와 濕痰의 病理, 暴瘖에서는 痰迷心竅로 因한 言語장애와 人事不省의 病理, 歷節風에서는 濕痰이 流注한 病理 등이 질병의 發生기전을 설명하고 있다.

積聚門에서는 痰飲積의 病理가 蟲積이 되며, 吞酸과 吐酸은 脾胃火가 鬱結한 病理 때문에 發生한다고 보았으며, 神門의 健忘은 痰迷心包 때문이고 驚悸는 涎과 氣가 相博하므로, 怔忡은 痰이 心胃에 蓄한 病理 때문이라고 설명하고 있다.

嘔吐는 痰火 혹은 痰飲이 停胃하거나 痰水가 心腹則痛하므로 發生하고, 胸門의 胃心痛은 胃의 伏火와 膈上의 調痰이 胃口를 자극하여 아프게하고 酸水를 嘔吐하게하여 惡心과 煩悶을 일으키기 때문이며, 支結은 痰熱 때문에 胸이 痞滿한 것을 말하며, 頭門에서의 痰厥頭痛 虛暈 痰暈 小兒문의 急驚風은 모두 痰의 病理에 기인한 것으로 보고 있다.

手의 臂痛과 不舉는 모두 濕痰이 經絡에 壅滯된 것이며 耳鳴은 痰火이 上攻한 것이고, 痰飲腹痛은 痰積과 氣滯에 기인한 것이며, 麻木은 濕痰과 死血 때문이며, 失音은 痰嗽로 咽乾하기 때문이라 하고 있다.

한편 이와같이 痰飲의 病理에 關한 內容들이 언급되어 있는 것도 있지만 대부분의 二陳湯 連係方에서는 痰飲 病理에 關한 직접적 언급이 기록되지 않고 있기 때문에 二陳湯에 대한 方劑構成을 관찰하거나 구성약물의 내용을 검토하므로써 痰飲에 關한 病理를 逆推論하는 方劑學의 方法도 검토해야 할 것으로 생각한다.

IV. 總括 및 結論

1. 二陳湯의 連係方이 사용된 病門은 咳嗽門 痰飲門, 中風門 등 39門에 이른다.
2. 二陳湯의 連係方은 寒嗽, 手足癱瘓, 食鬱, 健忘, 梅核氣, 失音 등 80여종의 病症에 사용되고 있다.
3. 各種 病證에 活用된 二陳湯 連係方의 方劑學的 관찰을 통하여, 連係方에서의 二陳湯의 역할, 合方된 처방 내용, 配伍된 藥物 등을 파악해 볼 수 있다.
4. 二陳湯 連係方의 방제학적 觀察를 통하여 病因, 病理, 病症에 따른 方劑構成 및 藥物의 配伍 關係에 대한 보다 客觀性이 있는 理論的 근거를 제시 할 수 있다.

〈參考文獻〉

1. 신재용 ; 方藥合編處方解說, 1998, 정보사, p 154
2. 失數道明 새한방처방해설, 1985, 보건신보, p 454
3. 陳師文 ; 太平惠民和劑局方, 1988, 선풍출판사 p 126
4. 汪昂 ; 醫方集解, 1984, 대성문화사, p.p 332~333
5. 양유걸 ; 實用中醫方劑學, 1987, 낙군출판공사 p.p 473~476
6. 尹用甲 ; 東醫方劑와 處方解說, 1998, 醫聖堂 p 229
7. 장호량 ; 동의방제정화사전, 1994, 천진과학기술출판사, p 115
8. 강극명 ; 교정방제 대사전, 1991, 의성당, p 11
9. 구포연 ; 중의역대명방집성, 1994, 상해사서출판사, p 172
10. 윤길영 ; 東醫臨床方劑學, 1985, 명보출판사 p.p 85~86
11. 정우열 ; 韓方臨床病理學, 1988, 영림사 p 234
12. 許浚 ; 東醫寶鑑, 1975, 남산당 p.p 467~485, p.p 127~136, p.p 359~377, p.p 486~495 p.p 428~442, p.p 501~505 p.p 94~105, p.p 517~524 p.p 460~446, p.p 378~408 p.p 262~270, p.p 603~631 p.p 201~208, p.p 632~671 p.p 73~86, p.p 170~200 p.p 457~459, p.p 533~555 p.p 106~114, p.p 496~500 p.p 511~516, p.p 81~85 p.p 115~117, p.p 123~126 p.p 298~299, p 412~415 p.p 409~411, p.p 252~237 p 274~276, p.p 260~261 p.p 238~240, p 556~575 p.p 525~529, p.p 284~288 p 213~232, p.p 163~169 p.p 290~293, p.p 290~293