

## 1998-1999년 절기에 부산지역에서 유행한 인플루엔자 바이러스의 분리

조경순<sup>†</sup> · 김만수 · 김지희\* · 안정배\* · 이주연\* · 정명주\*\* · 정영기\*\*

부산광역시 보건환경연구원

\*국립보건원

\*\*동의대학교 미생물학과

## Isolation and Identification of Influenza Virus from Pusan, 1998-1999

Kyung-Soon Cho<sup>†</sup>, Man-Soo Kim, Jee-Hee Kim\*, Jeong-Bae Ahn\*,  
Joo-Yeon Lee\*, Myung-Ju Jung\*\* and Yong-Kee Jeong\*\*

Institute of Health & Environment, Pusan 614-103, Korea

\*National Institute of Health, Seoul 122-701, Korea

\*\*Department of Microbiology Dongeui University, Pusan 614-714, Korea

### Abstract

Investigate the epidemics for influenza outbreaks. The outbreak pattern of the internal and external patients housed in the 10 designated hospitals was monitored to investigate and the characteristics of the virus isolates are as follows. 232 strains of influenza virus was isolated from the oral specimen of 1,320 respiratory disease patients in Pusan from Oct. 1998 to Jun. 1999. Among these isolates, 222 strains were A-type and the rest were B-type. The outbreak pattern for sex- and age-groups is as follows. The male outbreak was similar to the female outbreak: male outbreak, 47.4% and female outbreak, 52.5%. Most of the patients were less than 10 years old. The monthly influenza outbreak was consistent from Dec. 1998 to Apr. 1999. and The 113 strains from the A-type isolates were A/Sydney/05/97(H3N2)-like, the 109 strains were A/Beijing/262/95(H1N1)-like, and all of the 10 B-type isolates were B/Harbin/07/94-like.

**Key words** – Respiratory disease, Influenza, Virus

### 서 론

급성호흡기 질환을 일으키는 인플루엔자 바이러스는 Orthomyxoviridae에 속하며[5,7], 인플루엔자 A와 B 바이러스, C 바이러스의 두 개의 속을 갖는다. A형은 가장 유행 빈도가 높으며 항원변이도 자주 일어나며 범세계적 대유행의 주역이 되고 있고, B형은 일반적으로 국지적인 유

행에 한정되며 항원변이도 A형 보다 적게 일어나고 그 기간도 다소 늦다. 그리고 C형은 현재까지 별로 문제가 되지 않으며 산발적인 소규모 발생에 국한되고 있다. A와 B 바이러스는 3개의 RNA 중합효소(PB1, PB2, PA), hemagglutinin(HA), nucleoprotein(NP), neuraminidase(NA), matrix proteins(M1, M2) 그리고 nonstructural protein(NS1, NS2)을 합성하는 각각 8개 분절의 단일가닥 RNA

<sup>†</sup>Corresponding author

를 가지는 반면, C 바이러스는 구조적으로는 A, B 바이러스와 유사하나 7개 분절의 RNA를 갖는다[4,9]. 인플루엔자 A 바이러스는 HA와 NA의 항원변이에 의해 아형이 결정되며, 현재 HA에는 14종의 아형(H1~H14)이 있고, NA에는 9종의 아형(N1~N9)이 알려져 있지만, 사람 감염과 관련된 인플루엔자 A형 바이러스는 H1N1, H2N2 및 H3N2가 있다. H1N1은 1977년에 출현하였으며, 보통 소련형 인플루엔자로 알려져 있고, H2N2는 1957년 처음 나타나서 1968년까지 유행되었으며 보통 아시아 인플루엔자라고 불렸으며, H3N2는 1968년에 출현하여 현재까지 변이 바이러스가 유행하고 있으며 홍콩 인플루엔자라고 부르고 있다[3,6,10].

인플루엔자 바이러스 감염은 기침이나 쟁쟁기를 할 때 나오는 포말에 의해 가장 잘 전파되고 사람에서 사람으로 직접 접촉도 중요한 요인이 된다. 인플루엔자 A 바이러스는 무증상에서부터 치명적인 결과를 가져오는 원발성 바이러스성 폐렴까지 다양한 임상상을 나타내며 잠복기는 24시간에서 4~5일이며, 갑작스런 두통, 오한, 마른 기침으로 시작하여 발열, 근육통, 쇠약, 식욕부진으로 이어진다. 특히 소아의 경우 열성경련이 일어날 수 있으며, 구토, 복통과 같은 위장관 증상을 나타내며, 호흡기 증상과 관련된 발열의 14%가 인플루엔자 바이러스에 의한 것이다. 위마성 후두염(croup), 인두염, 기관지염 등과 같은 합병증, 세균감염과 복합된 폐렴 및 중추신경계 증상도 나타나기도 한다[2,11].

본 연구는 인플루엔자 바이러스의 분리 및 항원 분석을 통하여 미래의 유행에 대처하기 위한 역학적 기초자료를 제공하고자 1998년 10월부터 1999년 6월까지 부산광역시의 10개 감시지정병원의 외래 또는 입원한 급성호흡기 감염증 환자를 대상으로 월별 및 연령별 발생추이를 조사하고 환자 가검물로부터 인플루엔자 바이러스를 분리하여 그 특성을 살펴보고자 한다.

## 재료 및 방법

### 공시재료

1998년 10월부터 1999년 6월까지 부산광역시의 10개 감시지정병원의 외래 또는 입원한 급성호흡기 감염증 환자로부터 1320건의 인후가검물을 채취하였다. 채취한 가검

물은 바이러스 수송용배지(virus transport medium, Difco)에 넣어 냉장온도를 유지하면서 실험실로 운반하여 바이러스 분리에 사용하였다.

### 세포주

국립보건원 호흡기계 바이러스로부터 분양받은 mardin-darby canine kidney(MDCK) 세포주를 penicillin(0.05 units/ml)/streptomycin(0.05 µg/ml)과 10% fetal bovine serum(FBS)이 첨가된 Eagle's minimum essential medium (EMEM)을 기본배지로 하여 5% CO<sub>2</sub> 농도를 유지하면서 37°C로 조정된 CO<sub>2</sub> incubator에서 배양하였다.

### 바이러스의 분리 및 동정

검체를 전처리하기 위하여 실험실로 옮긴 인후가검물에 penicillin(5 units/ml)/streptomycin(5 µg/ml) 및 nystatin(1000 units/ml)을 첨가하여 4°C에서 1시간 방치한 후, 3000 rpm으로 20분간 저온 원심분리하여 상청액을 접종가검물로 사용하였다. 미리 준비해 둔 24-well 배양용기에 단층배양시켜 놓은 MDCK 세포주에 3-well 당 각 well에 접종용 배양액 0.5 ml를 넣은 후 전처리된 가검물 0.3 ml씩 다중접종하고 5% CO<sub>2</sub> 37°C로 조정된 CO<sub>2</sub> incubator에서 10일간 배양하면서, 매일 현미경하에서 세포병변효과(cytopathic effect, CPE)를 관찰하였다. 세포병변효과를 나타내는 검체는 2~3회 연속계대배양하여 역가를 증가시킨 후 바이러스를 분리하여 동정을 위한 배양액 및 감염세포를 확보하였다. 11일간 발육시킨 계태아의 장뇌막과 양막에 가검물을 각각 0.2 ml씩 접종하여 34°C에서 3일간 배양한 후 계태아를 4°C 냉장고에 하루동안 넣어 둔 다음 양막액과 요막액을 채취하고, 0.5% 기나아피그 적혈구로 혈구응집시험(hemagglutination test, HA test)을 하여 1:8 이상의 역가를 나타내는 검체에 대하여 2~3회 연속 난계대배양하여 역가가 높은 바이러스 항원을 준비하였다. 바이러스의 동정은 국립보건원 호흡기 바이러스과에 의뢰하여 FITC-conjugated anti-mouse immunoglobulin을 사용한 간접면역형광법(indirect fluorescent antibody test, IFA)으로 동정하고 HA 및 혈구응집억제시험(hemagglutination inhibition test, HI test)으로 아형과 항원특성을 검사한 후 일부는 미국 CDC(centers for disease control and prevention)에 의뢰하여 재확인하였다.

### 바이러스의 형태학적 특성

분리된 바이러스를 연속적으로 2~3회 계대하여 4% uranyl acetate에 약 1분간 negative stain한 다음, 전자현미경(JEM 1200 EX2, JEOL, TEM)으로 80 KV( $\times 120$  K)에서 관찰하였다.

### 결과 및 고찰

#### 인플루엔자 환자의 발생양상

1998년 10월부터 1999년 6월까지 급성호흡기 환자 1320명의 인후 가검물에서 바이러스를 분리한 결과 Table 1과 같이, 232주의 인플루엔자 바이러스가 분리되었으며, 인플루엔자 바이러스 중 222주는 A형, 10주는 B형으로 나타났다. 이 등[13]이 1996년에서 1997년까지의 국내 급성 호흡기 환자의 바이러스를 분리하여 보고한 결과 A형 및 B형 바이러스의 분리율이 비슷한 경향을 나타내었으나, 본 연구 결과 A형이 현저하게 높은 비율로 분리되어 차이가 있었다.

#### 성별, 연령별 및 월별 인플루엔자 환자의 발생양상

인플루엔자 환자의 성별 및 연령별 발생분포는 Fig. 1과 같이 성별로는 총 232명의 환자 중 110명(47.4%)의 남성 환자 및 122명(52.5%)의 여성 환자가 발생하여 비슷한 양상을 나타내었으나, 10세 이하의 어린이의 경우 남성 환자가 67명으로 42명의 여성 환자 보다 비교적 높은 발병률을 나타내었으며, 10대 이후부터는 여성의 경우 2배 이상의 발병률을 나타내었다. 연령별로는 0~10세에서 109명(46.9%)으로 대부분을 차지하였으며 10대 이상의 경우 각

Table 1. Number of influenza virus isolates from patient with respiratory disease in Pusan(1998. 10~1999. 6)

| virus                                     | No. of patient |        | Total |
|---|----------------|--------|-------|
|   | male           | female |       |
| Influenza A/Sydney/05/97<br>(H3N2)-like   | 46             | 67     | 113   |
| Influenza A/Beijing/262/95<br>(H1N1)-like | 61             | 48     | 109   |
| Influenza B/Harbin/07/94-like             | 3              | 7      | 10    |
| Total                                     | 110            | 122    | 232   |




Fig. 1. Outbreak ratio of influenza patients by age and sex groups.

각 5~10% 범위내로 비교적 낮은 발병률을 나타내었다. 특히 71~80세 사이에서는 0.43%로 거의 발병되지 않았으나 경제적인 부담 때문에 중세가 가벼운 환자들이 병원 진료를 기피하는 현상으로 발병률이 감소하였는지 여부는 확실하지 않다. 1998년 10월부터 1999년 6월까지의 월별 발병율(Fig. 2)은 98년 12월 한차례 높았다가 서서히 감소하였으나 다시 1999년 2월부터 증가 추세를 보이면서 4월에 가장 높은 발병율을 나타내었다. 특히 Influenza A/Beijing/262/95(H1N1) 유사주의 경우 5월에 집중적으로 발생하는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 1997년의 월별 발생율[1]과 유사한 경향을 나타내었으므로 이러한 계절에 호흡기 질환의 예방에 특히 많은 주의를 기울여야




Fig. 2. Outbreak ratio of influenza patients by month.

할 것으로 사료된다.

#### 인플루엔자 바이러스 분리주의 전자현미경적 특징

환자의 인후가검물을 전처리하여 단층 배양한 MDCK 세포주에 접종한 결과 뚜렷한 세포병변효과를 나타내었으므로(Fig. 3) 이 바이러스를 증식·배양 및 분리하여 전자현미경으로 관찰한 결과Fig. 4와 같이 인플루엔자 A형(H1N1 및 H3N2, 4-A,B)과 B형(4-C)은 모두 구형을 나타내었으며, 또한 A형은 바이러스 표면의 지질 이중층이 뚜렷하게 관찰되었고, B형은 바이러스 표면에 일정한 간격의 틈이 관찰되었는데, 이것은 neuraminidase, hemagglutinin 및 ion channel 등이 위치해 있었던 것으로 추측된다.

#### 바이러스의 항원 특성

분리한 인플루엔자 바이러스의 아형 결정을 위하여 혈구응집 억제시험 및 간접면역형광법을 실시한 결과 222주




Fig. 3. Micrographs of CPE in the virus-infected cells. MDCK cells infected with no virus(A), influenza A virus(H1N1)(B), influenza A virus(H3N2)(C), influenza B virus(D), Magnification  $\times 100$ .




Fig. 4. Transmission electron micrographs of virus isolates.  
Influenza A virus(H1N1)(A), Influenza A virus(H3N2)(B), Influenza B virus(C).

의 A형 바이러스 중 113주는 A/Sydney/05/97(H3N2) 유사주였으며, 109주는 A/Beijing/262/95(H1N1) 유사주로 확인되었다. B형으로 확인된 10주는 모두 B/Harbin/07/94 유사주로 판정되었다. WHO 보고[12] 결과 아시아에서는 A형보다 B형이 많이 분리되었으나 일본에서는 A형이 대다수로 나타났다. 이와 같이 인플루엔자 유행양상은 대차이를 보이고 있으나 본 연구 결과는 일본에서의 발생양상과 유사하게 나타났다. 인플루엔자 바이러스 감염에 따른 호흡기 질환은 폐렴증상이 가장 심하고 모세기관지염과 croup이 중요한 원인 질환이라고 보고[8,14]되었으며, 선행질환을 가지고 있으면서 인플루엔자 A형에 감염된 환자의 9.3%가 사망하였다[13]. 본 연구에서는 환자 개개인의 임상증상 및 경과에 관하여 조사하지 못하였으므로 환자의 병력에 관해서는 자료화 할 수 없을 뿐 만 아니라 부산지역만을 대상으로 조사되었으므로 일차적으로 부산 지역에서의 호흡기 감염 양상을 이해하는데는 무리가 없다고 하겠으나 본격적으로 이용되기까지에는 앞으로 상당 기간에 걸쳐 자료의 축적이 이루어져야 할 것으로 생각된다. 인플루엔자와 같이 항원성의 변이가 심한 병원체의 경우 해마다 빈번한 유행을 일으키고 있어 이로 인한 경제적 손실이 적지 않다. 항원 대변이에 의한 인플루엔자 A 바이러스의 유행주기는 10~15년이며, 인플루엔자 B 바이러스는 3년을 유행주기로 보고 있기 때문에 인플루엔자 유행에 대한 신속한 정보수집, 병원체 변화의 예측, 예방 접종의 효율성 평가 등을 통하여 그 피해를 최소화할 수

있는 적절한 방역 대책의 수립이 요구되므로 인플루엔자 유행예측을 신속히 파악하고 역학조사를 함으로써 인플루엔자 독감의 유행을 연구하는 기초적인 자료로서의 의미는 클 것으로 기대된다.

## 요 약

인플루엔자에 대한 역학적 기초자료로 이용하고자 1998년 10월부터 1999년 6월까지 부산지역 10개소 지정병원의 외래 또는 입원한 환자의 발생양상과 분리된 바이러스의 특성을 조사한 결과는 다음과 같다.

1. 1998년 10월부터 1999년 6월까지 부산지역 호흡기 환자 1320명의 인후 가검물로부터 232주의 인플루엔자 바이러스가 분리되었으며, 이 중 222주는 A형, 10주는 B형으로 나타났다.
2. 인플루엔자 환자의 성별 및 연령별 발생분포는 남성이 47.4%, 여성이 52.5%로 거의 비슷한 양상을 나타내었으며, 10세 이하의 환자가 46.9%로 대부분을 차지하였다. 또한 월별 발생양상은 1998년 12월부터 1999년 4월까지 지속적인 발생율을 나타내었다.
3. 분리한 A형 바이러스 중 113주는 A/Sydney/05/97(H3N2) 유사주였으며, 109주는 A/Beijing/262/95(H1N1) 유사주로 확인되었으며, B형으로 확인된 10주는 모두 B/Harbin/07/94 유사주로 판정되었다.

## 참 고 문 헌

1. Cho, K. S., K. Y. Jeong, I. H. Cha, 1998, Isolation of influenza Virus form patients with respiratory disease in Pusan, 1997. *K. J. Life Sci.*, **8**, 667-672.
2. Kilbourne, E. D. 1987. Influenza. Plenum Medical Book, New York.
3. Kim, J. K. Y. B. Cho, and S. B. Paik. 1983. Studies on

- the antigenicity of influenza virus isolated from patients in 1982. *Report NIH Kor.*, **20**, 141-145.
4. Lamb, R. A. 1983. The influenza virus RNA segments and their encoded proteins. pp.21-69. In P. Palese and D. W. Kingsbury(eds.), *Genetics of influenza viruses*. Springer-Verlag, New York.
  5. Leland, D. S. 1992. Concepts of clinical diagnostic virology. pp. 3-43. In Lennette E.H.(ed.). *Laboratory diagnosis of viral infections(2nd ed.)*. New York. Marcel Dekker, Inc.
  6. Lindstrom, S., S. Sugita, A. Endo, M. Ishida, P. Huang, S. H. Xi and K. Nerome. 1996. Evolutionary characterization of recent human H3N2 influenza A isolates from Japan and China: novel changes in the receptor binding domain. *Arch. virol.*, **141**, 1349-1355.
  7. Mäkelä, M., T. Puhakka, O. Ruuskanen, M. Leinonen, P. Saikku, M. Kimpimaki, S. Blomqvist, T. Hyypia, and P. Arstila. 1998. Viruses and bacteria in the etiology of the common cold. *J. Clin. Microbiol.*, **36**, 539-542.
  8. Martin, W. 1994. Influenza diagnosis, management, and prophylaxis. *B. M. J.*, **308**, 1341-1345.
  9. Richey, M. B., P. Palese, and E. D. Kilbourne. 1976. RNAs of influenza A, B and C viruses. *J. Virol.*, **18**, 738-744.
  10. Scholtissek, C., W. Rohde, V. von Hoynigen, and R. Rott. 1978. On the origin of the human influenza virus subtype H2N2 and H3N2. *Virology*, **87**, 13-20.
  11. Sweet, C. and J. Smith. 1980. Pathogenicity of influenza virus. *Microbiol. Rev.*, **44**, 303-330.
  12. WHC Influenza weekly epidemiological record. 1997. **7**, 130-131
  13. 이남용, 기창석, 김수정, 이용화, 정규영, 이상렬, 김지희. 1997. 1996-1997년 겨울철에 유행한 인플루엔자: 임상역학적 분석 및 원인 바이러스의 분리. *감염*, **2**, 263-270.
  14. 이환종, 윤보영, 김미란, 윤종구. 1995. 소아급성하기 감염의 원인 바이러스 및 이의 유행양상. *감염*, **2**, 319-332.