

平生驗方

許 瑗

- 目 次 -



- | | | |
|----------|---------|----------|
| 1 中風 | 2 頭面眼 | 3 血部 |
| 4. 前陰 後陰 | 5 痔疾 脫肛 | 6 骨折 骨多孔 |
| 7 九種心痛 | 8 蛇鱗皮膚 | 9. 婦人 |

● 編輯者註 許先生은 1906년생으로 1945년 韓藥業士試驗에 合格하여 잠간 民選面長으로 外道한 때도 있었지만 55년 동안 한결같이 한약업계에서 인술을 베풀어왔다 여기 소개하는 驗方은 平生동안 애용한 經驗方으로 後輩에게 傳授하겠다는 一念으로 手振症을 不拘하고 正성들여 써보내 주신 것이다 그 일부를 拔取하여 「東醫驗方新纂」에 編載하였지만 다시 그 全部를 여기에 揭載한다

1. 中風部

(1) 中臟風 先治 中惡 中氣 - 加味正氣散

藿香正氣散 本方에 加 防風 當歸 各4g

(2) 治風 補血 行榮衛 壯筋骨 及 豫防에 - 天麻丸

乾地黃 160g 羌活 140g 當歸 100g 天麻 牛膝 草薺 玄蔘 杜沖 獨活 各60g 附子 20g

(3) 中臟風 精神昏蒙 生命危急 - 二蔘丹

丹蔘 熟地黃 天門冬 麥門冬 白茯苓 甘草 各40g 人蔘 遠志 石菖蒲 朱砂 各20g

× 爲末 蜜丸 梧子大 每40~50丸 空心服.

(4) 左 半身不遂 血虛有痰 - 補血湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各10g 桃仁 白芥子 各4g 紅花 1g

(5) 中腑風 右 半身不遂 氣虛痰火 流注於右 - 補氣湯

人蔘 白朮 白茯苓 半夏 陳皮 各10g 赤茯苓 6g 白芥子 甘草 各4g

(6) 中血脈風 口眼喎斜 - 加味祛風湯

白附子 白僵蠶 全蝎 羌活 獨活 枳殼 青皮 陳皮 烏藥 桔梗 南星 半夏天麻 川芎 白芷 荊芥 防風 白芍藥 各4g 甘草 2g 薑三 或 鹿角 12g 加入.

① 兼治 . 施鍼 地倉 俠車 相接 程度에 따라 單1次

② 參考 . 右喎는 左針, 左喎는 右針이 可也

(7) 中風 手足不仁 言語不正 - 加減萬金湯

當歸身 12g 鎖陽 8g 鹿茸 仙茅 補骨脂 楮實子 杜沖 續斷 防風 白茯苓 烏藥 益智仁 杏仁 貝母 五味子 麥門冬 桂枝 各 4g 細辛 3.3g 獨活 甘草 各 2g.

× 治驗例 . 68세 老人으로 普通體質, 中風 左半身不遂 咳嗽 小便數 腎縮症을 完治 시킴

(8) 中風 手足不仁2 言語不正 - 加味萬金湯

白附子 石菖蒲 各8g 五味子 遠志 全蝎 羌活 天麻 南星 白僵蠶 杜沖 續斷 防風 白茯苓 牛膝 人蔘 各4g 細辛 3 3g 桂枝 當歸 甘草 各3g 川芎 獨活 秦艽 熟地黃 各2g

× 治驗例 : 68歲 老人 本方으로 健康回復

(9) 虎咬歷節風 - 舒筋立安湯

防風 羌活 獨活 各8g 白茯苓 川芎 白芷 生地黃 蒼朮 桃仁 半夏 陳皮 南星 白芍藥 牛膝 各4g 葳靈仙 木果 黃芩 連翹 木通 草龍膽 防己 各3.3g 紅花 附子 甘草 各2g

① 活套 . 痛甚하면 加 乳香 沒藥末 調服한다.

2. 頭面眼部

(1) 右頭痛 - 加味二陳湯

半夏 8g 陳皮 赤茯苓 各6g 川芎 白芷 防風 荊芥 薄荷 升麻 各4g 甘草 2g

(2) 左頭痛 - 加味四物湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 半夏 陳皮 赤茯苓 各6g 防風 荊芥 黃芩酒炒 薄荷 柴胡 蔓荊子 各4g 細辛 甘草 各2g

(3) 頭痛 嘔吐 作眩 - 滋陰健脾湯

■ 평생험방

白朮 6g 陳皮 半夏 白茯苓 各4g 當歸 白芍藥 乾地黃 人蔘 白茯苓 麥門冬 遠志 各2g
川芎 甘草 各1g 薑三 棗二

① 活套：頭風 加 天麻 荊芥 防風

(4) 上焦熱 頭面生瘡癩 風熱毒 - 清上防風湯

白附子 8g 防風 4g 連翹 白芷 桔梗 各3.3g 梔子 黃連酒炒 枳殼 薄荷 各2g 甘草 1g

(5) 眼赤暴痛 不能開眼 - 加味四物湯

當歸 白芍藥 熟地黃 川芎 各10g 枸杞子 甘菊花 各4g 用 3~4貼 效

3. 血部

(1) 咳嗽咯血 - 清火滋陰湯

天門冬 麥門冬 生地黃 牡丹皮 赤芍藥 梔子 黃連 山藥 山茱萸 澤瀉 赤茯苓 甘草 各3g.

(2) 婦人尿血 - 當歸散

生地黃 10g 小薊 8g 羚羊角屑 赤芍藥 當歸 各6g.

(3) 小兒尿血 - 立效散

蒲黃 生地黃 赤茯苓 甘草 各4g.

(4) 婦人膈中出血 - 加味補益湯

黃芪 6g 人蔘 白朮 地榆根 側柏葉 甘草 各4g 當歸 陳皮 各2g 升麻 柴胡 各1g.

(5) 大便下血 - 芍藥黃連湯

白芍藥 黃連 當歸 各6g 炙甘草 4g 大黃 2g 桂心 1g

4. 咳喘部

(1) 急喉閉 呼吸不通危急 名曰 지후테리症 - 射干湯

射干 40g 油(들기름) 煎灌口 卽通

(2) 風寒喘 及 老人喘息 - 加味三拗湯

麻黃 8g 陳皮 6g 杏仁 五味子 各5g 桂皮 4g 甘草 2g

(3) 火喘必發 夏節三伏時 - 白虎湯

石膏 20g 知母 五味子 各8g 瓜蒌仁 枳殼 黃芩 麥門冬 各4g 甘草 3g 黃連 2g 粳米 1合.

5. 大小便部

(1) 小便不禁 - 加味縮喘散

家韭子 80g 烏藥 益智仁 各40g × 爲末 糊丸 梧子大 每50丸 鹽湯下 空心

(2) 赤白痢 不問新舊 - 白龍湯

白芍藥 黃連 各8g 當歸 玄胡索 黃芩 木香 各6g 肉荳蔻煨 訶子煨 白片豆 檳榔 藜朮 滑石 枳殼 藿香 香薷 甘草 各4g 百用百效.

6. 前後陰部

(1) 每夜遺精 夢泄太甚 而幾至死境者 - 金蓮湯

芡仁 金櫻子 韭子 蓮子肉 山茱萸 各8g 蓮花藥 烏藥 益智仁 杜沖 土續斷 白蒺藜 各4g

(2) 狐疝은 卽 脫腸症也 - 加味二陳湯

半夏 8g 陳皮 赤茯苓 青皮 蒼朮 香附子 各4g 甘草 2g

(3) 痔疾特方

五倍子 枯白礬 各20g 爲末水丸 梧子大 每 7丸飲下.

(4) 脫肛特方(男女老少 同治)

龍骨 訶子 各20g 罌粟殼 赤石脂 各16g 沒石子 大4個 × 爲末 每 8g 空心 米飲下

7. 骨折傷 骨多孔 及 腰痛

• 補骨丹 - 土紅花子 80g 杜沖 土續斷 骨碎補 各40g

8. 九種心痛 遇冷作引入背 不可忍

• 服之根絕 神效散 - 木香 青皮 陳皮 麥芽 枳殼 三稜 蓮朮 神曲 白芍藥 白芷 肉桂 玄胡索 破故紙 甘草 各3g 萹澄茄 丁香 各0 7g 薑三 棗二.

9. 人身如蛇鱗

• 調氣解鱗湯 - 人蔘 黃芪 各12g 當歸 官桂 各8g 蒼朮 6g × 煎湯에 石雄黃末 2g 調服한다.

10. 婦人部

(1) 婦人 虛勞百損 勞困無力 寒熱瘦瘠 - 滋陰至補湯

當歸 白朮 各 4g 白茯苓 陳皮 知母 貝母 便香附子 地骨皮 麥門冬 白芍藥 菟絲子 各 3g 柴胡 薄荷 甘草 各2g 薑三.

(2) 婦人 胎氣不固 常時小産에 以此固胎한다. - 安榮湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 阿膠珠 香附子 續斷 白朮 黃芩 砂仁 各4g 糯米 100粒.

× 膠艾四物湯에 去 艾葉하고 續斷을 加하였음

(3) 轉女爲男 - 加味地黃湯

熟地黃 16g 人蔘 12g 山藥 山茱萸 白芍藥 各8g 白茯苓 澤瀉 杜沖 砂仁 各4g 阿膠珠 2g

(충북 제천시 의림동 172 蒼海韓藥房 ☎ 0443-643-3050)

상식메모

전부터 내려오는 養性長壽藥은 그 性質이 치우친 것 보다는 中正하고 平和한 것이 效力이 더욱 長久하게 가는 것이다. - 入門 -