


# 梅核證 外 12 驗方

金錫哲



## - 目 次 -

- |        |        |        |       |        |
|--------|--------|--------|-------|--------|
| ① 梅核證  | ② 虛淋   | ③ 瘀血   | ④ 胃病  | ⑤ 血脚   |
| ⑥ 不食   | ⑦ 傷暑   | ⑧ 傷寒喘促 |       | ⑨ 傷寒熱多 |
| ⑩ 傷寒寒多 | ⑪ 產後百補 |        | ⑫ 手掌熱 | ⑬ 忍劫不眠 |

### ① 梅核證(痰氣咽喉間不出)

• 加味四七湯 · 射干 8g 陳皮 半夏 桔梗 枳殼 赤茯苓 各4g 神曲 枳實 黃芩 南星炮  
梔子炒 各3g 青皮 厚朴 蘇葉 檳榔 砂仁 益智仁 白荳蔻 甘草 各2g 薑五

- (1) 用法 · 日3, 食後 1時間 服用
- (2) 驗例 · 發病 15年 百藥不效 本方 5劑至 完治
- (3) 禁忌 : 鷄 猪

### ② 膀胱虛弱 男女不問 虛淋證

• 加味八珍湯 : 人蔘 白朮 白茯苓 白芍藥 當歸 川芎 熟地黃 黃芪 虎杖根 琥珀 牛膝  
甘草 各4g 限 20貼 空心服

### ③ 新舊瘀血 打撲傷

- 紅花蘇木酒 - 紅花 蘇木 桃仁 各40g 生薑 20g 白芥子 12g 雞卵 3個
- (1) 製法 · 燒酒 1升沈漬, 春秋冬節 溫房 7日 浸漬, 夏節 5日 浸漬.
- (2) 用法 : 體質 酒量 強弱에 따라 若干의 酒氣가 있을 정도로 1日 3回服用하면 完全 破血되고 治療된다.

#### ④ 神經性胃病

- 加味歸脾湯 - 龍眼肉 16g 香附子 10g 蒼朮 6g 當歸 遠志 酸棗仁炒 黃芪 白朮 白茯苓 山楂肉 神曲 檳榔 陳皮 半夏 各4g 枳實 黃連 各3g 木香 麥芽 甘草 各2g
- 活套 有熱則 加 柴胡 桀子 各2g 心煩 惡心則 加 竹茹 黃連 各4g 胃炎則 加 赤石脂4g 日3 食後 1時服

#### ⑤ 血脚證(쥐가 내려 일어나는 병)

- 加味解毒散 - 大黃 蒼朮 獨活 各8g 柴胡 前胡 桔梗 枳殼 羌活 川芎 赤茯苓 人蔘 牛膝 薑黃 甘草 各4g
- 活套 : 脚浮腫則 加 大腹皮 4g. 空心服 限 10貼

#### ⑥ 無氣力 無食慾 小食

- 加味人蔘養榮湯 - 白芍藥酒炒 8g 當歸 人蔘 白朮 黃芪蜜炙 肉桂 陳皮 甘草 各4g 熟地黃 五味子 防風 各3g 遠志 2g 柴胡 升麻 各1g
- 用法 食後 1時間 日3, 限 20貼

#### ⑦ 傷暑煩渴 喘促

- 加味清肺湯 - 黃芪 8g 當歸 生地黃 人蔘 桑白皮 各4g 木香 3g 五味子 2g 限 5貼

#### ⑧ 傷寒喘促

- 加味五味湯 - 五味子 12g 人蔘 麥門冬 杏仁 桑白皮 陳皮 各8g 薑三 棗二 5貼 可治

#### ⑨ 傷寒熱多證

- 加味熱多寒少湯 - 柴胡 半夏 各8g 川芎 前胡 人蔘 黃芩 陳皮 赤茯苓 各4g 甘草 2g 薑三 棗二
- 活套 先熱者 柴胡 8g 先寒者 桂枝 8g 4貼 可治

#### ⑩ 傷寒寒多證

- 加味寒多熱少湯 - 柴胡 半夏 各8g 川芎 草果 黃芩 人蔘 赤茯苓 陳皮 各4g 甘草

2g 薑三 藉二 4貼 可治

- 活套 热多者 川芎增, 加 前胡 各4g 寒多者 川芎 草果 各4g 渴者 加 天花粉 4g

## ⑪ 產後百補 產後骨病豫防

• 百節治療湯 - 柴胡 12g 熟地黃 桂枝 薑黃 黃芪 當歸 各8g 人蔘 川芎 羌活 陳皮 蔚靈仙 防風 藜艽 紅花子 甘草 各6g 海蔘 木果 各4g 食前 30分 服用

• 參考 · 本方 使用前 先投 加味起枕散 6貼服用後에 此方을 服用한다. 不然이면 害가 있을 수 있다. 產後調理 及 回復劑로 좋다.

## ⑫ 手掌熱 丹毒

• 加味逍遙散 - 桐子炒 12g 半夏 白芥子 各8g 當歸 白芍藥 柴胡 白朮 白茯苓 麥門冬 人蔘 甘草 各4g 薄荷 2g 限 10貼

## ⑬ 心虛恐劫 不眠 胸部異狀(들로 누른것 같다)

• 加味溫膽湯 - 半夏 枳實 陳皮 白茯苓 各8g 香附子 6g 當歸 白朮 遠志 酸棗仁炒 黃芪 石菖蒲 麥門冬 枳殼 桐子 竹茹 各4g 黃連 3g 木香 甘草 各2g 限 20貼

• 禁忌 . 鷄 猪

(전남 해남군 옥천면 성산리 70 구제당한약방 ☎ 0634-532-1156)