

大韓方劑學會誌 : 제8권 1호
KOMP Vol. 8. No. 1. 2000.

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用範圍, 病理, 主治分類 및 構成內容 調查

(東醫寶鑑을 중심으로)

- 이기옥, 황기명, 윤용갑 -

(원광대학교 한의과대학 방제학교실)

I. 緒 論

香附子는 莎草科(Cyperaceae)에 屬하는 多年生 宿根草本인 香附子(莎草)*Cyperus rotundus* L.의 塊經을 말하며 味는 辛 微甘. 微苦하고 性은 平하며 歸經은 肝·脾·三焦經에 속하는 藥物로 알려져 있다.^{3,7,8,12,13)}

香附子의 效能은 疏肝 理氣 解鬱, 調經止痛으로 肝鬱氣滯證, 肝胃不和, 瘰氣痛症, 月經不調, 通經, 胸腹脇脹痛, 乳房脹痛, 消飲食積聚, 痰飲痞滿, 霽亂, 吐瀉, 腹痛, 脚氣, 止心腹·肢體·頭·目·齒·耳諸痛, 癰疽瘡瘍, 吐血, 下血, 尿血, 婦人崩漏 帶下, 胎前 產後百病等 多양한 痘症을 治療하는 것으로 알려져 있다.^{3,7~13)}

即 香附子는 行氣·開鬱·調經의 良品이요, 女科의 聖藥이 되며 神經性胸悶·慢性胃氣能衰弱·消化不良·食慾減退·胃痛·腹痛에 사용하고, 肝癌·胃癌·腸癌·子宮癌·頸癌·膀胱癌·淋巴腺癌·直腸癌等證의 己潰未潰와 己痛未痛의 癌腫을 治療하고, 精神鬱結所致의 月經不調·月經痛·經閉·慢性子宮炎等證을 治療한다고 하였다.⁸⁾

또한 現代의 藥理研究에 의하면 子宮筋肉의 弛緩作用과 鎮痛, 强心 利尿效果, 真菌을 抑制하는 抗菌作用等이 밝혀졌고 自律神經不調를 正常化하여 全身의 神經障礙로 인한 여러가지 痘증을 회복시키는 效果가 있고 卵巢機能과 排卵의 促進效果가 優秀하여 여자의 月經不調나 不妊症에 效力을 發揮하는 것으로 보고되고 있다.^{1,10,12)}

한편, 香附子는 配伍되는 藥劑에 따라 開鬱調經, 疏肝理氣, 寛中和胃, 行氣解鬱, 理氣止痛, 健脾燥濕, 發散風寒, 活血通經, 升降諸氣의 多樣한 效能을 發揮하게 되므로 이러한 配伍原理를 임상에 활용하고 있다.^(2~6,8)

이에 저자는 東醫寶鑑에 수록된 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑 111種에 대한 香附子의 活用범위, 香附子가 配伍된 方劑의 主治에 대한 系統的 分類 및 構成內容 調查와 香附子가 主藥으로 活用된 方劑에 대한 病理조사를 통하여 몇 가지 特징적인 견지를 얻었기에 보고하는 바입니다.

II. 本 論

1. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用범위 調査

活用門	病證	處方名
婦人	求嗣 胎漏胎動 惡阻 血崩 半產 產後心腹脇脹痛 婦人雜病 產後浮腫	百子附歸丸, 玉鑰啓榮丸, 調經養血元, 調經種玉湯, 錫斯丸, 琥珀調經丸 膠艾四物湯, 桑寄生散 保生湯 補氣養血湯 安榮湯 養血佐肝丸, 推氣養血丸 抑氣散, 異香四神散, 滋陰百補丸 正脾散

活用門	病證	處方名
胞	崩漏 血結成瘕 調血 帶下 通血	備金散 歸朮破癥湯，四物調經湯，立效散，香附散 墨附丸，煮附丸，清熱調血湯 四神丸，蒼柏樗皮丸 烏藥湯
內傷	消導 食厥 噫氣 嘈雜 吞酸 內傷脾胃不思食	穀神元，內消散，丁香爛飯丸，七香元 加味六君子湯 破鬱丹 消食清鬱湯 增味二陳湯 香砂六君子湯
氣	氣鬱 氣痛 中氣 七氣 通治 九氣 上氣	降氣湯，交感丹 木香破氣散，小烏沈湯 木香順氣散 香橘湯 蘇合香丸 神仙九氣湯，正氣天香湯 快氣湯

積聚	通治	寬中丸，真人化鐵湯
	積聚	潰堅湯，大七氣湯
	食鬱	木香調氣散，順氣丸，香砂平胃散
	痞塊	化塊丸
	腸覃石瘕血蟲	桃奴散
	蟲積	勝紅元，阿魏丸
	六鬱	六鬱湯①②

《 章 1 》

活用門	病證	處方名
脹滿	脹滿通治	撞關飲子
	穀脹	大異香散
	血脹	桃奴丸
	蠱脹	消脹飲子
胸門	熱心痛	莎芎散
	心腹並痛	二炒香良散
	胃心痛	清鬱散
	積心痛	行氣香蘇散
前陰	陰囊偏墜	加減香苓散，茴香安腎湯
	諸疝通治	十味蒼朮散，烏附通氣湯
	狐疝	二香丸
咳嗽	鬱嗽	訶黎勒丸
	酒嗽	蜂薑丸
	火嗽	海清丸
傷寒	傷寒表證	十神湯，香葛湯，芎芷香蘇散，香蘇散
	痼冷通治	衝寒散
腹	腹痛通治	開鬱導氣湯
	痰飲腹痛	芎朮散

嘔吐	胃弱 噎膈反胃	加減四君子湯 順氣導痰湯
痰飲	痰塊 痰飲治法	開氣消痰湯 順氣導痰湯
神門	驚悸 癲癇	加味溫膽湯 清心溫膽湯
風門	歷節風 中風	趁痛散 消風散
血門	衄血 齒衄	莎芎散, 清衄湯 小薊散
黃疸	穀疸 通治	大溫中丸 褪金丸
小兒	積癬 孕婦痘瘡	消食丸 安胎散
後陰	腸風臟毒	香附散

《 二 》

活用門	病證	處方名
皮	麻木	開結舒經湯
諸瘡	結核	開氣消痰湯②
牙齒	風冷齒痛	開笑散
諸傷	杖傷	補氣生血湯
癰疽	癰疽五發	獨勝散
虛勞	腎虛	小安腎丸

瘟疫	瘟疫治法	神授太乙散, 人中黃丸
暑	暑風	二香散
脇	風寒脇痛	芍藥散
小便	氣淋	通秘散
鼻門	鼻塞	葷撥餅

《 丑 3 》

2. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 主治에 대한 系統別 分類調査

區分	病症	主治分類	處方	비고
1. 婦人病	1.不妊	ㄱ)月經不調 ㄴ)七情損傷月經不調 ㄷ)胞冷	白子附歸丸, 調經養血元, 鑿斯丸, 墨附丸 調經種玉湯 琥珀調經丸	
	2.月經病	ㄱ)經閉有積 疼痛 ㄴ)經不調 脣腹痛 ㄷ)月經痛 (氣血俱實) ㄹ)婦人血海 疼痛	歸朮破癥湯, 四物調經湯, 立效散 煮附丸 清熱調血湯 烏藥湯	
	3.帶下	ㄱ)肥人帶下(濕痰) ㄴ)白帶下	蒼柏樗皮丸 四神丸	
	4.胎漏	ㄱ)胎漏腹痛 ㄴ)胎漏哭 經行妄行	膠艾四物湯 桑寄生散	
	5.惡阻		保生湯	
	6.小產	ㄱ)胎氣不固小產 ㄴ)小產下血	安榮湯 補氣養血湯	
	7.產後病	ㄱ)產後浮腫 ㄴ)產後脇痛	正脾散 養血佐肝丸, 推氣養血丸	
	8.婦人雜病	ㄱ)婦人雜病 ㄴ)乍寒熱 不思食(氣血不足)	抑氣散, 異香四神散 滋陰百補丸	

2. 氣病	1.諸氣鬱滯		交感丹, 降氣湯
	2.氣鬱		木香調氣散
	3.氣痰		開氣消痰湯
	4.氣痛		木香破氣散
	5.九氣	作痛	神仙九氣湯, 正氣天香湯
	6.諸氣	心腹刺痛	小烏沈湯
	7.胸腹脹痛	七情損傷	香橘湯
	8.中氣		木香順氣散
	9.一切氣疾		蘇合香丸
	10.上氣喘促	氣不升降	快氣湯
	11.手足麻痺	(七情六鬱 氣滯經絡)	開結舒經湯
	12.驚悸	(心膽虛怯 涎與氣博)	加味溫膽湯
3.諸般痛症	1.胃脘痛(熱物致)	莎芎散	
	2.胃口作痛(胃中伏火)	清鬱散	
	3.胸腹脹痛(外感內傷, 及七情惱怒)	行氣香蘇散	
	4.婦人冷症脇痛(風寒)	芍藥散	
	5.腹痛(痰積)	芎朮散	
	6.腹痛通治	開鬱導氣湯	
	7.齒痛(風冷)	開笑散	
	8.氣淋痛	通秘散	
	9.腹痛泄瀉飲食減少(瘤 冷)	衝寒散	
	10.痛風(血虛血污)	趁痛散	
	11.婦人血海疼痛	烏藥散	

《 亞 4 》

區分	病證 哭 主治	處方	비고
4.內傷病	1.飲食傷	丁香爛飯丸	
	2.宿食不消 健脾益氣	穀神元, 加味六君子湯	
	3.痞滿脹痛(生冷硬物)	內消散, 七香丸	
	4.消 乳積 食積	消食丸	
	5.飲食不化 不思食 食後倒飽 (脾虛)	香砂六君子湯	
	6.食鬱	香砂平胃散	
	7.嗳氣(胃有痰火)	祛痰火丸, 破鬱丹	

	8. 嘴囁	消食清鬱湯	
	9. 吞酸	增味二陳湯	
5. 積聚病	1. 積聚通治方	寬中丸，潰堅湯，大七氣湯，真人化鐵湯	
	2. 血鬱	順氣丸，化塊丸	
	3. 血積，酒積，婦人脾血積氣	勝紅元	
	4. 肉食積	阿魏丸	
	5. 血瘀 瘀血積 經水不通	桃奴散	
	6. 六鬱通治	六鬱湯①②	
6. 脹滿病	1. 脹滿通治	撞關飲子	
	2. 氣脹，穀脹	大異香散	
	3. 血脹	桃奴丸	
	4. 蟲脹，單腹脹	消脹飲子	
7. 嘔吐病	1. 胃弱嘔吐	加減四君子湯	
	2. 噫膈反胃(血虛有火)	神奇散	
	3. 反胃(痰氣)	安中調氣丸	
	4. 食不下	五膈寬中散	
8. 咳嗽病	1. 勞嗽 乾嗽 肺脹喘	訶黎勒丸	
	2. 酒嗽 痰積久嗽	蜂蠻丸	
	3. 火鬱嗽 肺脹氣絕	海青丸	
9. 瘡病	1. 濕熱 瘡痛	十味蒼柏散	
	2. 瘡病(四氣，七情，新久)	烏附通氣湯	
	3. 狐瘡	三香丸	
10. 傷寒 傷暑 溫疫	1. 傷寒傷風表證	香蘇散，芎芷香蘇散，十神湯，香葛湯	
	2. 感冒暑風	二香散	
	3. 瘧疫	神授太乙散，人中黃丸	
11. 出血病	1. 齏血	莎芎散②，清衄湯	
	2. 齒衄	小蘗散	
	3. 腸風	香附散	
12. 其他疾患	1. 陰囊偏墜	加減香連散，茴香安腎湯	
	2. 中風手足不仁	疎風湯	
	3. 癲癇	清心溫膽湯	

4. 孕婦痘瘡	安胎散	
5. 淚濁 面黑 瘦 耳鳴 齒痛 目暗 (虛勞 腎氣冷憊)	小安腎丸	

《 丑 5 》

3. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑에 대한 病理調査

1) 病理와 症狀이 모두 나타난 경우

區分	病理	症狀	處方	비 고
七情氣傷	1. 七情所傷	中脘 腹脇 脹痛	香橘湯	
	2. 七情所傷 諸氣鬱滯 抑鬱煩惱	不思飲食, 面黃形羸 胸膈痞悶	交感丹	
	3. 七情六鬱 氣滯經絡	手足癱痺	開結舒經湯	
	4. 七情損傷 經水不調	不妊	調經種玉湯	
	5. 七情四氣	新久疝病	烏附通氣湯	
	6. 諸氣	心腹刺痛	小烏沈湯	
	7. 九氣	作痛	神仙九氣湯	
	8. 婦人氣	痛	正氣天香湯	
	9. 上氣	氣不升降喘促	快氣湯	
	10. 氣	痛	木香破氣散	
	11. 氣	淋痛(不可忍)	通秘散	
	12. 氣	痰	開氣消痰湯	
	13. 怒氣得之	癰疽硬結 聚毒作痛	獨勝散	
	14. 涎與氣博 心膽虛怯	驚悸	加味溫膽湯	
外感	1. 傷寒傷風	頭項強 百節痛	芎芷香蘇散	
	2. 兩感傷寒	頭痛 寒熱 無汗	十神湯	
		頭痛 寒熱	香葛湯	
	3. 四時傷寒 時氣瘟疫	頭痛 身疼 發熱惡寒	香蘇散	
	4. 感冒暑風	身熱, 頭痛, 泄瀉溝通	二香散	
飲食傷	1. 傷食生冷 硬物	痞滿脹痛	內消散	
	2. 曾服熱藥 热物致	胃脘痛	莎芎散	
外感 内傷 七情傷	內傷生冷外感風寒	胸腹 脹滿	行氣香蘇散	
	七情惱怒飲食墳滯			

痰 呕 濕	1.痰積	腹痛	芎朮散	
	2.積痰 呕 酒痰	久嗽	蜂薑丸	
	3.痰氣	反胃	安中調氣丸	
	4.濕痰	肥人帶下	蒼柏樗皮丸	
	5.濕熱	疝痛	十味蒼柏散	
火	1.胃中有伏火	胃作痛 脐上有稠痰	清鬱散	
	2.血虛有火 三陽枯渴	噎膈反胃	神奇散	
	3.胃有痰火	噫氣	祛痰火丸	
	4.火鬱	嗽及肺脹氣急息重	海清丸	
瘀血 呕 月後 不調	1.少產	下血不止	補氣養血湯	
	2.血鬱 瘀血 停積	經水不通	桃奴散	
	3.經年 血積	腹中常痛	立效散	
	4.經候不調	臍腹痛	煮附丸	
	5.月經不通腹中有積塊	疼痛	歸朮破癥湯	
	6.月經不通 呕 血脹	漸成脹滿	桃奴丸	
	7.經閉有積塊	瘀痛	四物調經湯	
	8.經脈不調	久不受孕	調經養血元	
氣血	1.氣血俱實	經水將來 腹中陣痛	清熱調血湯	
	2.血虛血污	痛風	趁痛散	
	3.氣血不足	作寒 作熱 不思飲食	抑氣散	
	4.血虛有火	噎膈反胃	神奇散	
虛冷	1.久病 胃弱	嘔吐	加減四君子湯	
	2.脾虛	食後倒飽不思飲食不化	香砂六君子湯	
	3.虛勞，腎氣冷痺	漩濁漸覺羸瘦面黑目暗 耳鳴牙齒蛀痛	小安腎丸	
	4.婦人胞冷	無子	琥珀調經丸	
	5.胎氣不固	時常小產	安榮湯	
	6.痼冷	腹痛泄瀉 飲食減少	衝寒散	
其他	1.風冷	齒痛	開笑散	
	2.風中腑	手足不仁	消風散	

2) 病理만 記錄한 경우

分野	病理	處方	비고
氣病	1.氣鬱	降氣湯, 木香調氣散	
	2.氣痰(氣塊)	開氣消痰湯	
	3.中氣	木香順氣散	
鬱病	1.諸鬱火	六鬱湯	
	2.血鬱	順氣丸	
	3.食鬱	香砂平胃散	
積病	1.肉積 吳食積	阿魏丸	
	2.婦人脾血 積氣(血積病積)	勝紅元	
	3.乳積食積	消食丸	
脹病	1.氣脹 吳穀脹	大異香散	
	2.蟲脹單腹脹	消脹飲子	
飲食傷	食厥	加味六君子湯	
	飲食傷	丁香爛飯丸	

《 亞 7 》

4. 香附子가 主藥으로 配伍된 方 劑의 主治別 處方 構成內容 調査

1). 婦人病

(1). 不妊

ㄱ) 月經不調

[白子附歸丸]

◆久服 有孕及 治月水參差不調

四製香附末 十二兩(製法見胞門), 川芎 白芍藥 當歸 熟地黃 阿膠珠 陳艾葉 各二兩

右爲末用 石榴一枚 連皮 捣碎煎打 糊和丸 梧子大 每百丸 空心醋湯下.(廣嗣)

○一名 百子建中丸 無石榴一味 終始忌鐵.
(廣嗣)

[調經養血丸]

◆治經脈不調 久不受孕

香附子 十二兩 酒醋鹽湯童便 各浸三日焙
當歸酒洗 白芍藥酒炒 生乾地黃酒沈 牧丹皮酒
洗 各二兩, 川芎 白茯苓 白芷 乾薑炒 肉桂
紅花 桃仁 没藥 半夏油炒 阿膠珠 各一兩,
玄胡索 六錢, 蓬朮 煥醋 炒 甘草灸 各五
錢, 茴香炒 二錢

右爲末 醋糊和丸 梧子大 空心白湯 或溫酒
下 百丸 有孕勿服.(回春)

[蠶斯丸]

◆經調受補者 服七日即 交合 孕後勿服

香附子 白薇 半夏 白茯苓 杜沖 厚朴 當歸
秦艽 各二兩, 防風 肉桂 乾薑 牛膝 沙參 各一
兩半, 細辛 人參 各二錢三分

右爲末 煉蜜和丸 梧子大 空心 酒下 五七十
丸.(入門),

[墨附丸]

◆治婦人經水不調 久無子

四製香附子 一斤 淨熟艾 四兩 用醋一椀煮
至乾入石臼內搗爛搘作餅子於新瓦上焙乾入 白
茯苓 當 歸 人參 川芎 熟地黃 京墨火煅
紅醋淬 各一兩 木香五錢

右爲末 醋糊和丸 梧子大 溫酒吞下 七八十
丸.(入門)

ㄴ) 七情損傷月經不調

[調經種玉湯]

◆治婦人無子 多因七情所傷 致經水不調 不能受孕

熟地黃 香附子炒 各六錢, 當歸身酒洗 吳茱萸
川芎 各四錢, 白芍藥 白茯苓 陳皮 玄胡索,
牡丹皮 乾 薑炒 各三錢, 官桂 熟艾 各二錢
右剉分作 四貼 每一貼 入薑 三 水煎 空心服
待經至之日服起 一日一貼 藥盡交媾 必成孕矣
此藥百 發百中.(醫鑑)

○回春 無薑桂艾三味

ㄷ) 胞冷

[琥珀調經丸]

◆治婦人胞冷 無子能令經正

香附米 一斤 分作二包 用童便米醋 各浸九
日和 淨熟艾 四兩拌勻 再加醋五椀 入砂鍋內
同煮乾爲度入 川芎 當歸 白芍藥 熟芍 生
芻 没藥 各二兩, 琥珀一兩

右爲末 醋糊和丸 梧子大 每百丸 空心以 艾
醋湯 吞下.(入門)

(2). 月經病

ㄱ) 經閉乳積疼痛:

[歸朮破癥湯]

◆治月經不通 腹中有積塊 疼痛

香附子醋炒 一錢半, 三稜 蓬朮並醋煮, 赤芍藥
白芍藥 當歸尾 青皮 各一錢, 烏藥 七分 紅
花 蘇木 官桂 各五分

右剉作一貼 入酒少許 水煎服.(集略),

[四物調經湯]

◆治經閉 有積塊動痛

香附醋炒 一錢, 當歸 川芎 白芍藥酒炒 柴胡
黃芩 枳殼 各七分, 熟地黃 陳皮 白朮 三稜 蓬
朮並醋 炒, 白芷 茴香鹽水炒 玄胡索 各
五分, 青皮 縮砂 紅花 甘草 各三分

右剉作一貼 入生薑 三片 葱白 三莖 水煎
服.(回春),

[立效散]

◆治經年 積血 腹中常痛

青皮 陳皮 烏藥 乾薑 香附子 蓬朮 三棱 各等分

右剉醋煮焙乾爲末 空心 陳皮煎湯 調下 二錢。(濟陰)

（一）經不調臍腹痛

【煮附丸】

◆治經候不調 脘腹痛 面色萎黃 飲食減少或崩漏帶下

香附子擦去毛好醋煮半日焙爲末

醋糊和丸 梧子大 米飲下 五七十九。(綱目)

○一名香附丸 又名醋附丸 治婢妾氣鬱 經多不調

香附米 八兩以酒 醋 鹽水 童便 各浸二兩過三日乃出炒，蒼朮 四兩米泔浸，牡蠣粉炒 縮砂炒 檳榔 白皮蜜水炒 各二兩

右爲末 以黃米煮 飯和丸 梧子大 空心酒下五七十九丸。(醫鑑)

(4). 胎漏

（一）胎漏腹痛

【膠艾四物湯】

◆治胎漏腹痛

熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 阿膠珠 條芩 白朮 縮砂 艾葉 香附子炒 各一錢

右剉作一貼 入糯米一撮 水煎空心服。(回春)

（二）月經痛(氣血俱實)

【清熱調血湯】

◆治經水將來 腹中陣痛 乃氣血俱實也

當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 黃連 香附子 桃仁 紅花 蓬朮 玄胡索 牡丹皮 各七分

右剉作一貼 水煎服。(醫鑑)

（一）胎漏墮 經行妄行

【桑寄生散】

◆治胎漏及 經血妄行

桑寄生 繢斷 川芎 當歸 白朮 香附子 阿膠珠 茯神 各一錢，人參 甘草 各五分

右剉作一貼 入薑三片 水煎服。(入門)

（三）婦人血海疼痛

【烏藥湯】

◆治婦人 血海疼痛

香附子 二錢，烏藥 一錢半，當歸 一錢，木香 甘草 各五分

右剉 水煎服。(東垣)

(5). 惡阻

【保生湯】

◆治婦人 月經不行 身無病 似病 脈滑大而六脉 俱勻乃孕婦之脉也

精神如故 惡聞食氣 或但嗜一物 或大吐 或時吐清水 此名惡阻 宜服此

白朮 香附子 烏藥 橘紅 各二錢，人參 甘草 各一錢

右剉作一貼 薑三煎服。(良方)

(3). 帶下

（一）肥人帶下(濕痰)

【蒼柏樗皮丸】

◆治肥人白帶 是濕痰

蒼朮 黃柏 檵根白皮 海石 半夏製 南星炮川芎 香附子 乾薑 各等分

右爲末醋糊和丸 梧子大 白湯下 五七十九夏月 去乾薑 代滑石。(入門)

（一）白帶下

【四神丸】

◆治白帶

(6). 小產

（一）胎氣不固小產

【安榮湯】

◆治胎氣不固 時常小產 宜以此 預防固胎
熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 阿膠珠 香附子
桑寄生 白朮 黃芩 縮砂 各一錢，糯米百粒

右剉作一貼 水煎服。(正傳)

（一）小產下血

[補氣養血湯]

◆治小產後 下血不止

人參 黃芪 當歸 白朮 白芍藥酒炒 艾葉 阿膠 川芎 青皮 香附子炒 縮砂研 甘草灸 各一錢

右剝作一貼 水煎服。(回春)

(7). 產後病

1) 產後浮腫

[正脾散]

◆治產後 通身浮腫

蓬朮炮 便香附子 陳皮 苗香 甘草灸 各等分
右爲末 每二錢 燈心 木通 煎湯 調下。(正傳)

2) 產後脹痛

[養血佐肝丸]

◆治產後 左脹悶 一塊痛 臥不着席

香附醋炒 二兩，當歸 川芎 白芍藥酒炒 陳皮
半夏油炒 白朮炒 青皮油炒 神麴炒 蘿蔔子炒
牡丹皮 紅花 白茯苓 各一兩，柴胡酒炒
桃仁炒 各八錢，草龍膽酒洗 六錢，三稜 蓬朮
並醋炒 各五錢

右爲末酒糊和丸 梧大子空心 白湯下 百丸。
(醫鑑)

[推氣養血丸]

◆治產後 右脹膨脹 有塊如堅弦一條 着冷便疼

便香附 二兩，當歸 川芎 白芍藥酒炒 白朮土
炒 青皮油炒 陳皮 枳實 烏藥 厚朴 神麴 乾薑
炒黑，白 芥子炒 各一兩，三稜 蓬朮並醋
炒 各八錢，麥芽炒 肉桂 各六錢，木香 三錢

右爲末 醋糊和丸 梧子大 空心以米飲吞下
百丸。(醫鑑)

8) 婦人雜病

1) 婦人雜病

[抑氣散]

香附子 四兩，陳皮 二兩，茯神 甘草 各一兩
右爲末 每二錢 沸湯點服。(入門)

[異香四神散]

香附子 四錢，陳皮 三錢，烏藥 二錢，甘草
一錢

右剝作一貼 入薑三片 棗二枚 水煎服。(濟陰)

2) 氣血不足 乍寒乍熱

[滋陰百補丸]

◆治氣血不足 乍寒乍熱 不思飲食 底羸無力

四製香附末 八兩(四製法詳見胞門)，益母草
末 四兩，當歸 三兩，川芎 熟地黃 白朮 各二
兩，白芍藥 一 兩半，白茯苓 人參 玄胡索
各一兩，甘草 五錢

右爲末蜜丸 梧子大 或酒 或醋湯 或白湯下
五七十九丸。(入門)

2). 氣病

(1). 諸氣鬱滯

[交感丹]

◆治諸氣鬱滯 一切公私 情名利失志 抑鬱煩
惱 七情所傷 不思飲食 面黃 形羸 胸膈
悶諸證 神效大 能升降水火

香附子 一斤 長流水浸 三日 取炒，茯神 四
兩

右搗爲末 蜜丸 彈子大 每一丸 細嚼以 降氣
湯 送下。(回樁)

[降氣湯]

香附子製 茯神 甘草 各一錢

右水煎服

(2). 氣鬱

[木香調氣散]

◆治氣鬱

烏藥 香附 枳殼 青皮 陳皮 厚朴 蕪蕡 蒼朮
各一錢，木香 縮砂 各五分，桂皮 甘草 各三分

右剝作一貼 薑三片 水煎服。(回春)

(3). 氣痰

[開氣消痰湯]

◆治胸中胃脘 至咽門 窄挾如線 痛痛 及手
足俱有 核如胡桃者

桔梗 便香附子 白僵蠶炒 各一錢，陳皮 片芩
枳殼 各七分，前胡 半夏 枳實 羌活 荆芥 檳榔
射 干 威靈仙 各五分，木香 甘草 各三分
右剉作一貼 薑三片 水煎服。(醫鑑)

(4). 氣痛

[木香破氣散]

◆治氣痛

香附子 四兩，烏藥 薑黃 各二兩，木香 甘草
灸 各五錢
右細末 每二錢 鹽湯點服。(心法)

(5). 九氣作痛

[神仙九氣湯]

◆治九氣作痛

香附子 片子 薑黃 甘草灸 各等分
右爲末 每服二錢 鹽湯點服。(得效)

[正氣天香湯]

◆治九氣作痛 亦治婦人 氣痛

香附子 三錢，烏藥 陳皮 紫蘇葉 各一錢，乾
薑 甘草 各五分
右剉水煎服 或爲末 鹽湯點服 二錢亦佳。(丹
溪)

(6). 諸氣心腹刺痛

[小烏沈湯]

◆治諸氣 心腹刺痛

香附子 二兩，烏藥 一兩，沈香 甘草 各二錢
半
右爲末 每一錢 沸鹽湯點服。(局方)

(7). 七情損傷胸部脹痛

[香橘湯]

◆治七情所傷 中脘腹脅 脹滿

香附米炒 半夏製 橘皮 各一錢半，甘草灸 五
分
右剉 薑五片 藜二枚 煎服。(直指)

(8). 中氣

[木香順氣散]

◆治中氣

香附子 烏藥 青皮 陳皮 半夏製 厚朴 枳殼
各一錢，木香 緩砂 各五分，桂皮 乾薑 甘草灸
各三分

右剉 薑 三片 水煎服。(回春)

(9). 一切氣疾通治

[蘇合香元]

◆治一切氣疾及 中氣 上氣 氣逆 氣鬱 氣痛
白朮 木香 沈香 穀香 丁香 安息香 白檀香
朱砂(水飛半爲衣) 犀角 虎子皮 香附子 蕤撥
各二兩， 蘇合油(入安息香膏內) 乳香 龍
腦 各一兩

右細末用 安息香膏 井煉蜜搜和千擣 每一兩
分作 四十九 每取 二三丸 井華水 或溫水 溫
酒 薑湯 化服。(局方) 有龍腦 則謂之 龍
腦蘇合元 無龍腦則 謂之 穀香蘇合元

(10). 上氣喘促 氣不升降

[快氣湯]

◆治氣不升降 上氣 喘促

香附子 三兩半，縮砂 八錢，甘草灸 四錢
右細末 每一錢 鹽湯點服。(得效)

(11). 手足麻痺(七情六鬱 氣滯經絡)

[開結舒經湯]

◆治婦人 七情六鬱 氣滯經絡 手足麻痺

紫蘇葉 陳皮 香附子 烏藥 川芎 蒼朮 羌活
南星 半夏 當歸 各八分，桂枝 甘草 各四分
右剉作一貼 薑三片煎 入竹瀝 薑汁 調服。(醫
鑑)

(12). 警惕(心膽虛怯 涕與氣搏)

[加味溫膽湯]

◆治心膽虛怯 觸事易驚 涕與氣搏 變生諸證

香附子 二錢四分，橘紅 一錢二分，半夏 枳
實 竹茹 各八分，人參 白茯苓 柴胡 麥門冬 桔
梗 各六分， 甘草四分

右剉作一貼 薑 三片 藜 二枚 水煎服。(經驗)

方)

○入門 名參胡溫膽湯

3). 諸般痛症

(1). 胃脘痛(熱物致)

[莎芎散]

◆治曾服熱藥 热物 致胃脘痛 久成痼疾

香附子 川芎 各五錢，黃連 桀子 各二錢半，
木香 乾薑 各一錢半，檳榔 酒黃芩 芒硝 各一
錢

右爲末 每二錢 热薑湯調痛時服。(入門)

(2). 胃口作痛(胃中伏火)

[清鬱散]

◆治胃中有伏火 脐上有稠痰 胃口作痛及 嘴
吐酸水 惡心煩悶

半夏 陳皮 白茯苓 蒼朮 便香附 神麴 黃連
薑汁炒 桀子薑汁炒 各一錢，川芎 六分，乾薑
炒黑 五分 甘草灸二分

右剉作一貼 入薑三片 水煎服。(醫鑑)

(3). 胸腹脹痛(外感內傷，及七情惱怒)

[行氣香蘇散]

◆治內傷生冷 外感風寒 又觸七情 惱怒 飲
食墳滯 胸腹脹痛

紫蘇葉 陳皮 蒼朮 香附子 烏藥 川芎 羌活
枳殼 麻黃 甘草 各一錢

右剉作一貼 薑三片 水煎 不拘時 溫服。(回
春)

(4). 婦人冷症脹痛(風寒)

[芍藥散]

◆治婦人 冷證 脹痛 諸藥不效

香附子 四兩以 醋二升 鹽一兩 同煮 乾爲度
肉桂 玄胡索炒 白芍藥酒炒 各一兩

右爲末 每二錢 沸湯調下。(得效)。

(5). 腹痛(痰積)

[芍朮散]

◆治痰積腹痛

川芎 蒼朮 香附 白芷 各等分

右爲末 薑汁 磨木香 點熱湯 調下 二錢。(入
門)

(6). 腹痛通治

[開鬱導氣湯]

◆治諸般腹痛 一服立止

蒼朮 香附便炒 白芷 川芎 赤茯苓 滑石 桔
子炒 神麴炒 各一錢，乾薑炮 陳皮 各五分 甘
草灸 三分

右剉作 一貼 水煎服。(醫鑑)。

(7). 齒痛(風冷)

[開笑散]

◆治風冷齒痛

白芷 細辛 良薑 藁撥 川椒 香附子 露蜂房
各等分

右爲末 每三錢 水煎 含漱或擦之。(直指)

(8). 氣淋痛

[通秘散]

◆治氣淋 痛不可忍

香附子 陳皮 赤茯苓 各等分

右剉五錢 空心 水煎服。(得效)

(9). 腹痛泄瀉 飲食減少(痛冷)

[衝寒散]

◆治痛冷 腹痛泄瀉 飲食減少

香附子 陳皮 草果 各一錢半，縮砂 白薑 肉
豆蔻 各七分，藿香 白茯苓 木通 吳茱萸 各三
分

右爲末 每二錢 溫酒 或薑湯 調下 或剉作一
貼 水煎服。(入門)。

(10). 痛風(血虛血污)

[趁痛散]

◆治痛風 多屬 血虛 血污 宜調血 行血

桃仁 紅花 當歸 地龍 五靈脂 牛膝酒浸 羌
活酒浸 香附子童便浸 甘草生 各二錢，乳香 沒

藥各 一錢

右爲末 每二錢 溫酒調下。(丹心)。

4). 內傷病

(1). 飲食傷

[丁香爛飯丸]

◆治飲食傷

香附子 一兩，益智仁 丁香皮 縮砂 甘松 甘草 各六錢，丁香 木香 三稜 蓬朮 各二錢
右爲末 蒸餅和丸 荸豆大 白湯下 三五十丸。
(東垣)

(2). 宿食不消 健脾益氣

[穀神元]

◆治宿食不消 健脾益氣

人參 縮砂 香附子 三稜 蓬朮並煨 青皮 陳皮 神麴炒 麥芽炒 枳殼 各等分
右爲末 米糊和丸 梧子大 米飲下 三五十丸。
(得效)

[加味六君子湯]

香附子 一錢半，白朮 白茯苓 陳皮 半夏 各一錢，人參 七分，木香 縮砂 各五分，甘草 三分

右剷作一貼 入薑三 穀二 紫蘇葉七片 同煎服。(回春)

(3). 痘滿脹痛(生冷硬物)

[內消散]

◆治傷食 生冷 硬物 痘滿 脹痛

陳皮 半夏 白茯苓 枳實 山楂肉 神麴 縮砂
香附子 三稜 蓬朮 乾生薑 各一錢

右剷作一貼 水煎服。(回春)

[七香元]

◆消食快膈 和胃止痛

香附子二兩半，三稜 蓬朮並醋煮焙 木香 丁香 白檀香 甘松香 丁香皮 沈香 橘紅 縮砂 白豆蔻 各五錢

右爲末 米糊和丸 荸豆大 薑湯下 三四十丸。
(直指)

(4). 消乳積 食積

[消食丸]

◆治宿食不消 消乳積 食積

香附子炒 五錢，縮砂 陳皮 三稜 蓬朮 神麴
麥芽 各二錢半
右爲末 神麴糊和丸 麻子大 依上法服之。(湯氏)

○一名 消乳丸。(回春)

(5). 飲食不化 不思食 食後倒飽(脾虛)

[香砂六君子湯]

◆治不思飲 食不化 食後倒飽者 脾虛也

香附子 白朮 白茯苓 半夏 陳皮 白豆蔻 厚朴 各一錢，縮砂 人參 木香 益智仁 甘草 各五分

右剷作 一貼 入薑三 穀二 水煎服。(醫鑑)

(6). 食鬱

[香砂平胃散]

◆治食鬱

蒼朮 厚朴 陳皮 便香附 各一錢 山楂肉 縮砂 枳殼 麥芽 神麴 乾薑 木香 各五分，甘草灸三分

右剷作 一貼 入薑三 蘿蔔子炒研 一撮 煎服。(回春)。

(7). 暢氣(胃有痰火)

[祛痰火丸]

◆治胃有痰火 噁氣

便香附一兩，軟石膏七錢，半夏製 南星炮 桀子炒 各五錢

右爲末 薑汁浸 蒸餅和丸 梧子大 薑湯下 五十九。(入門)

○一名 軟石膏丸 治嘈雜。(醫鑑)

[破鬱丹]

◆治婦人 噋氣 胸緊 連十餘聲 不盡嘔出氣
心頭略寬 不嘔即緊

香附子醋煮 桀子仁炒 各四兩，黃連薑汁炒
二兩，枳實 檳榔 蓬朮 青皮 瓜蔞仁 蘇子 各一

兩

右爲末 水丸 梧子大 滾水下 三十九.(回春)

(8). 嘴囉

[消食清鬱湯]

◆治嘴雜

半夏 陳皮 白茯苓 神麴炒 山楂肉 香附子
川芎 麥芽炒 枳殼 桀子炒 黃連薑汁炒 蒼朮
藿香 甘 草 各七分

右剝作一貼 薑三 水煎服.(回春)

(9). 吞酸

[增味二陳湯]

◆治吞酸

半夏 陳皮 茯苓 桀子炒 黃連炒 香附子 各一錢, 枳實 川芎 蒼朮 各八分, 白芍藥 七分
神麴炒 五 分, 甘草 三分

右剝作一貼 入薑三 水煎服.(集略)

5). 積聚病

(1). 積聚通治方

[寬中丸]

◆治七癥 八瘕 五積 六聚 痰癬 氣塊 胸腹
脹痛 面黃 肌瘦 一切沈滯之疾

蒼朮炒 烏藥 香附子 各二兩, 三稜 蓬朮 並
醋煮焙 青皮 陳皮 乾薑炮 良薑炮 茵香炒 神
麴炒 麥 芽炒 各一兩

右爲末 醋糊和丸 梧子大 薑湯下 五十九.(類
聚)

[瀆堅湯]

◆治五積 六聚 諸般 痞塊

當歸 白朮 半夏 陳皮 枳實 山楂肉 香附子
厚朴 縮砂 各一錢, 木香 五分 水磨取汁

右剝作一貼 水煎調木香汁服之.(回春)

[大七氣湯]

◆治五積六聚 心腹痛脹 二便不利

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 桔梗 蕁香 益智仁 香
附子 肉桂 甘草 各一錢

右剝作一貼 薑三 薏二 水煎服

[真人化鐵湯]

◆治五積六聚 痰癬 癪瘕

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 山楂肉 神麴 香附子
枳實 厚朴 黃連 當歸 川芎 桃仁 檳榔 各五分,
紅花 木香 甘草 各三分

右剝作一貼 薑二 薏一 煎服.(回春)

(2). 血鬱

[順氣丸]

◆治血鬱

香附子 八兩 以童便浸晒乾爲末 以粟米糊和
丸服.(綱目)

[化塊丸]

◆治痞塊及血塊

海粉酒煮 三稜 蓬朮並醋煮 紅花 桃仁 五靈
脂 香附子 各一兩, 石碌 五錢

右爲末 醋 糊和丸 梧子大 白朮湯下 三十九
(丹心)

(3). 血積, 酒積, 婦人脾血積氣

[勝紅元]

◆治血積 酒積 及婦人 脾血 積氣

三稜 蓬朮並醋炒 青皮 陳皮 乾薑炮 良薑炒
各一兩, 香附子醋炒 二兩

右爲末 醋糊和丸 梧子大 薑湯下 三十九.
(丹心)

(4). 肉食積

[阿魏丸]

◆治肉積 及食積成塊

阿魏 一兩醋煮軟, 山楂子 蘿蔔子 神麴 麥芽
陳皮 青皮 香附子 各二兩

右爲末炊 餅和丸服.(丹心)

(5). 血蠱 瘀血積 經水不通

[桃奴散]

◆治血蠱及瘀血停積 經水不通 桃奴 猥鼠糞
玄胡索 肉桂 五靈脂 香附子 各炒過 縮砂
桃仁 各等分

右爲末 每三錢 以溫酒調下。(入門).

(6). 六鬱通治

[六鬱湯]①

◆開諸鬱火

便香附 蒼朮 神麴 梔子 連翹 陳皮 川芎 赤茯苓 貝母 枳殼 紫蘇葉 各一錢，甘草 五分
右剗作一貼 薑三片 水煎服。(醫鑑)

[六鬱湯]②

◆通治六鬱

香附子二錢 川芎 蒼朮 各一錢半，陳皮 半夏
製 各一錢，赤茯苓 梶子仁 各七分，縮砂 甘草
各五分

右剗作一貼 薑三 水煎服。(丹心)

○氣鬱 加 木香 檳榔 烏藥 紫蘇葉

○濕鬱 加 白朮 羌活 防己

○熱鬱 加 黃連 連翹

○痰鬱 加 南星 瓜蔞仁 海粉

○血鬱 加 桃仁 牡丹皮 韭汁

○食鬱 加 山楂子 神麴 麥芽。(入門)

6). 脹滿病

(1). 脹滿通治

[撞關飲子]

◆治脹滿 用此 衝開關格 使脹 自消

香附子 二錢，烏藥 一錢二分，厚朴 一錢，縮
砂 八分，三稜 白豆蔻 甘草 各五分，丁香 沉
香 各三分

右剗作 一貼 入薑三 水煎服

○又爲末 紫蘇湯 調下 二錢。(入門)

(2). 氣脹，穀脹

[大異香散]

◆治穀脹 亦治氣脹

三稜 蓬朮 青皮 陳皮 霽香 半夏翹 桔梗 益
智仁 香附子 枳殼 各一錢，甘草 二分半
右剗作一貼 入薑五 棗二 水煎服。(入門).

(3). 血脹

[桃奴丸]

◆治血脹及 婦人月經不通 漸成脹滿 與男子
血蠱病同

桃奴 猴鼠糞 玄胡索 肉桂 香附子 五靈脂
縮砂 桃仁 各等分

右爲末 每三錢 溫酒 調下。(正傳)

○或醋糊和丸 梧子大 醋湯下 三五十丸。(俗
方)

(4). 蠕脹，單腹脹

[消脹飲子]

◆治蠶脹 單腹脹

豬苓 澤瀉 人參 白朮 赤茯苓 半夏 陳皮 青
皮 厚朴 紫蘇葉 香附子 縮砂 木香 檳榔 大腹
皮 木通 蘿蔔子 甘草 各五分

右剗作一貼 薑五 棗二 水煎服。(醫鑑)

7). 嘔吐病

(1). 胃弱嘔吐

[加減四君子湯]

◆治久病胃弱 全不納食 聞食氣即嘔

四君子湯去茯苓加人參 黃芪 香附子 各一錢
右剗作一貼 入生薑三片 水煎服。(入門).

(2). 噋膈反胃(血虛有火)

[神奇散]

◆治噎膈反胃 血虛有火 三陽枯竭

當歸 川芎 白芍藥 生地黃並酒炒 陳皮 縮砂
半夏 白茯苓 白朮土炒 香附子 枳實 烏梅肉
藿香 赤茯苓 檳榔 木通 豐茶 黃芩炒
黃柏人乳炒 知母人乳炒 赤芍藥 天門冬 麥門
冬 甘草 各五分

右剗作 一貼 水煎服。(醫鑑).

(3). 反胃(痰氣)

[安中調氣丸]

◆治反胃及痰氣

白朮土炒，香附子 長流水浸三日炒黃 各三
兩，陳皮 二兩，半夏製油炒，白茯神 枳實 神麴

炒 黃連薑 汁浸 猪膽汁拌炒 各一兩, 白芍藥 八錢, 蘇子炒 蘿蔔子炒 各六錢, 川芎 當歸 酒洗 白豆蔻炒 各五 錢, 甘草灸 三錢, 木香 一錢

右爲末以竹瀝 薑汁 打神麴爲糊和丸 菟豆大白湯下 一百丸.(醫鑑).

(4). 食不下

[五膈寬中散]

◆治五膈 食不下

厚朴 香附子 各一錢半, 甘草 五分, 青皮 陳皮 丁香 縮砂 各四分, 木香 三分, 白豆蔻 二分

右爲末 入薑三片 鹽少許水煎服.(綱目).

8). 咳嗽病

(1). 勞嗽乾嗽肺脹喘

[訶黎勒丸]

◆治勞嗽 乾嗽 及肺脹 喘急

訶子皮 五錢, 海粉 瓜蔞仁 青黛 杏仁 貝母 便香附 各二錢半

右爲末 薑汁和蜜爲丸 櫻桃大 含化徐徐嚥下.(入門)

(2). 酒嗽痰積久嗽

[蜂薑丸]

◆治酒痰嗽 及積痰 久嗽 留肺院 粘滯如膠氣不升降

便香附 白殼蠶炒 海蛤粉 瓜蔞仁 蜂房 杏仁 神麴 各等分

右爲末 以薑汁 竹瀝 入蜜和丸 櫻桃大 含化嚥下.(丹心)

○一方 無香附 有茜根.(入門)

(3). 火鬱嗽 肺脹氣絕

[海清丸]

◆治火鬱嗽 及肺脹 氣急息重

訶子皮 海蛤粉 瓜蔞仁 青黛 半夏製 便香附 各一兩

右爲末 以薑汁浸蒸 餅和丸 菟豆大 薑湯下 三五十丸.(丹心).

9). 痘病

(1). 濕熱酸痛

[十味蒼柏散]

◆通治濕熱 痘痛

蒼朮 黃柏 香附子 各一錢, 青皮 玄胡索 益智仁 桃仁 各七分, 茴香炒 附子炮 甘草 各五分

右剉作一貼 空心 水煎服.(入門)

(2). 四氣七情 新久痘病

[烏附通氣湯]

◆治新久痘病 四氣七情 痘皆效

烏藥 香附子 當歸 白芍藥 山楂肉 橘皮 各一錢, 白朮 七分, 赤茯苓 澤鴉 各五分, 猪苓 木香 甘草 各 三分

右剉作一貼 水煎空心服.(入門)

(3). 狐瘍

[二香丸]

◆治狐瘍 上下出入作痛 或痘痛作則 腹內塊痛止 痘痛止則腹內塊痛復作

木香 香附子 各三兩, 山楂肉 二兩, 三棱 蓬朮並醋煮 神麴 薑黃 南星 各一兩, 黃連與吳茱萸同炒 蘿蔔子 桃仁 桔子仁 橘核炒 各五錢

右爲末 薑汁浸蒸餅和丸 梧子大 白湯下 五十七丸.(丹心)

10). 傷寒病 傷暑病 溫疫

(1). 傷寒傷風表證

[香蘇散]

◆治四時傷寒 頭痛 身疼 發熱 惡寒 及傷風傷濕 傷寒 時氣瘟疫

香附子 紫蘇葉 各二錢, 蒼朮一錢半, 陳皮一

錢，甘草灸五分

右剗作一貼 入薑三片 葱白二莖 水煎服。(入門)

[芎芷香蘇散]

◆治傷寒 傷風 表證 頭項強 百節痛 陰陽未分 皆可服

香附子 紫蘇葉 各二錢，蒼朮一錢半，陳皮 川芎 白芷 各一錢，甘草 五分

右剗作一貼 入薑三片 棗二枚 水煎服。(得效)

[十神湯]

◆治兩感風寒 頭痛 寒熱 無汗

香附子 紫蘇葉 升麻 赤芍藥 麻黃 陳皮 川芎 乾葛 白芷 甘草 各一錢

右剗作一貼 入薑三片 葱白二莖 水煎服。(入門)

[香葛湯]

◆治傷寒 不問陰陽兩感 頭痛 寒熱

蒼朮 紫蘇葉 白芍藥 香附子 升麻 乾葛 陳皮 各一錢，川芎 白芷 甘草 各五分

右剗作一貼 入薑三片 葱白二莖 敲七粒 水煎服。(得效)。

(2). 感冒暑風

[二香散]

◆治感冒 暑風 身熱 頭痛 或泄瀉 嘔吐

香附子 香薷 各二錢，紫蘇葉 陳皮 蒼朮 各一錢，厚朴 白扁豆 甘草 各五分

右剗作一貼 入薑三片 木瓜二片 葱白二莖 水煎服

○凡暑月 傷風 傷寒悉以此藥 解表 發散。(醫鑑)

(3). 瘡瘍

[神授太乙散]

◆治瘧疫 流行 不問 陰陽兩感 頭痛 寒熱

赤芍藥 羌活 藿香 細辛 青皮 川芎 白芷 桔梗 枳殼 柴胡 陳皮 香附子 蒼朮 防風 藁本 甘草 各 七分，乾葛 升麻 紫蘇葉 各三分

右剗作一貼 入薑七 棗七 葱七 水煎服。(類

聚)

[人中黃丸]

◆治四時疫癘

大黃 黃連 黃芩 人參 桔梗 蒼朮 防風 滑石 香附子 人中黃 各等分

右爲末 神麴糊和丸 梧子大 每七十丸 氣虛 四君子湯 血虛 四物湯 痰多 二陳湯

作湯送下 如無人中黃 用糞缸岸代之 或以朱砂 雄黃 爲衣亦好。(入門)。

11). 出血病

(1). 齧血

[莎芎散]

◆治衄血

香附子 四兩 川芎 二兩

右爲末 每二錢 茶清調下 不以時

○丹溪心法 莎附飲同 香附 開鬱行氣 使邪火 散於經絡 川芎 和血通肝 使血歸於肝藏 血歸火散 其 血立止。(入門)

[清衄湯]

◆治衄血

當歸 赤芍藥 生地黃 香附子 黃芩 梔子 側柏葉 各一錢，黃連 七分，赤茯苓 桔梗 各五分，生甘草 三分 藕節 五箇

右剗作一貼 水煎 入童便調服。(回春)

(2). 齒衄

[小蘊散]

◆治牙宣出血

百草霜 小蘆 香附子 蒲黃炒 各五錢

右爲末 常揩牙齒上立止。(得效)。

(3). 腸風

[香附散]

◆治腸風

香附子炒 一兩，枳殼 七錢半，當歸 川芎 各五錢，槐花炒 甘草 各二錢半

右末 每三錢 薑三片 棗二枚 水煎服。(本事)。

12). 其他疾患

(1). 陰囊偏墜

[加減香苓散]

◆治偏墜氣 初起壯熱 憎寒 乃發表分利藥也
一服而愈

枳殼 陳皮 香附子 蒼朮 麻黃 猪苓 澤瀉 木通 滑石 車前子 三棱 蓬朮 川棟子 玄胡索 甘草 各七 分

右剉作 一貼 入生薑三片 葱白二莖 水煎服。
(醫鑑)

[茴香安腎湯]

◆治左邊偏墜 丸如鷄鴨子大

人參 白朮 白茯苓 茴香 破故紙 檳榔 烏藥
便香附 縮砂 荔枝核 各八分，黃柏 澤瀉 各六分，木香 玄胡索 各四分，升麻 甘草 各二分

右剉作 一貼 煎服。(醫鑑)

(2). 中風手足不仁

[疎風湯]

◆治風中府 手足不仁 先宜解表 後用愈風湯
調理

羌活 防風 當歸 川芎 赤茯苓 陳皮 半夏 烏藥 白芷 香附子 各八分，桂枝 細辛 甘草 各三分

右剉作 一貼 入薑三片 水煎服。(回春)。

(3). 癲癇

[清心溫膽湯]

◆治諸癇 平肝解鬱 清火化痰 益心血

陳皮 半夏 茯苓 枳實 竹茹 白朮 石菖蒲 黃連薑汁炒 香附子 當歸 白芍藥 各一錢，麥門冬八分，川芎 遠志 人參 各六分，甘草 四分

右剉分 二貼 薑 三片 水煎服。(醫鑑)

○回春 一名 清心抑膽湯

(4). 孕婦痘瘡

[安胎散]

人參 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍藥
香附子童便炒 縮砂 紫蘇葉 赤茯苓 甘草 各三分

右剉作 一貼 入燈心七莖 糯米百粒 同煎服。
(正傳)。

(5). 漸濁 面黑 瘦 耳鳴 齒痛 目暗(虛勞 腎氣冷憊)

[小安腎丸]

◆治虛勞 腎氣冷憊 夜多漸濁 漸覺羸瘦 面黑 目暗 耳鳴 牙齒蛀痛

香附子 川練子 各半斤 用鹽二兩 水二升 同煮候乾剉焙，茴香炒 六兩，熟地黃 四兩，川烏炮 川椒炒 各二兩

右爲末 酒糊和丸 梧子大 空心 鹽湯 或溫酒任下三五十丸。(得效)

III 考察

1. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用範圍 調査

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用 범위를 조사해서 정리한 결과 婦人, 胞, 內傷, 氣, 積聚, 脹滿, 胸, 前陰, 咳嗽, 傷寒, 腹, 嘔吐, 痰飲, 神, 風, 血, 黃疸, 小兒, 後陰, 皮, 諸瘡, 牙齒, 諸傷, 癰疽, 虛勞, 瘰疬, 暑, 脾, 小便, 鼻門으로 30門에서 77病症에 111방이 活用되고 있다. (표1~3)

病症이 3가지 이상 기록되고 있는 痘門은 婦人, 胞, 內傷, 氣, 積聚, 脹滿, 胸, 前陰, 咳嗽門이며, 특히 婦人, 胞, 內傷, 氣, 積聚, 脹滿門의 痘症에 香附子가 配伍된 方劑가 가장 많이 活用되고 있으며 구체적인 活用 痘症을 열거하면 婦人科, 胞門에서는 不妊, 胎漏, 胎動, 惡阻, 崩漏, 半產, 產後 心腹腰脇痛, 產後浮腫, 經不調, 帶下, 血結盛瘕等에, 內傷病에서는 食厥, 噙氣, 嗜囉, 吞酸, 不思食 等에 氣門에서는 氣鬱, 中氣, 七氣, 九氣, 上氣等에,

積聚門에서는 積聚, 食鬱, 痞塊, 蟲積, 六鬱等에 脹滿門에서는 脹滿, 穀脹, 血脹, 蠕脹等에 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑를 활용하고 있다.

따라서 香附子는 婦人病, 內傷病, 氣病, 積聚, 脹滿病의 要藥임을 알 수 있다.

2. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 主治에 대한 系統的 分類 調査

먼저 香附子는 婦人病에서 要藥으로 활용되고 있기 때문에 婦人科의 痘症에 나타나는 主治를 중심으로 分類를 해보면 다음과 같다. (표5) 즉, 不妊, 月經病, 帶下, 胎漏, 惡阻, 小產, 婦人 產後病, 雜病등의 痘症에서 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑를 활용하고 있는데, 不妊 중에서 月經不調한 경우에는 百子附歸丸, 調經養血元, 鑫斯丸, 墨附丸을 사용하고, 七情損傷으로 月經不調할 경우에는 調經種玉湯을, 胞冷일 경우에는 琥珀調經丸을 사용하고 있다.

月經病 中에서 經閉有積하면 歸朮破癰湯, 四物調經湯, 立效散을, 經不調 脘腹痛엔 煮附丸을, 月經痛에는 清熱調血湯을, 婦人血海疼痛에는 烏藥湯을 사용하고 있다.

帶下病은 濕痰帶下에서는 蒼柏樗皮丸을 白帶下에서는 四神丸을 사용하고 있다.

惡阻에는 保生湯을, 小產病에서 胎氣가 不固하면 安榮湯을, 下血이 있으면 補氣養血湯을 사용하고 있다. 產後病에서 產後浮腫에는 正脾散을, 產後脇痛에는 養血佐肝丸과 推氣養血丸을 사용하며, 婦人雜病에서 氣血이 부족하면 滋陰百補丸을, 일상적인 雜病에서는 抑氣散, 異香四神散을 사용하고 있다. (표4)

따라서 香附子는 調經을 中心으로 帶下, 惡阻, 小產, 產後浮腫, 脇痛, 婦人雜病에 활용되고 있음을 알 수 있다.

그 다음으로 모든 神經性 系統의 痘症을 氣病으로 분류하여 정리해 香附子의 활용처방을 조사해보면 아래와 같다.

즉, 諸氣鬱滯에 交感丹, 降氣湯을, 氣鬱에는 木香調氣散을, 氣痰에는 開氣消痰湯을, 氣痛에는 木香破氣散을, 九氣作痛에는 神仙九氣湯, 正氣天香湯을 心腹刺痛에는 小烏沈湯을 中氣에는 木香順氣散을 一切通治에서는 蘇合香元을 上氣喘促에서는 快氣湯을 氣滯 經絡한 手足癱瘓에는 開結舒經湯을, 驚悸에는 加味溫膽湯을 사용하고 있어(표4) 諸氣鬱滯나 七情損傷 等의 原因으로 발생하는 氣病症에 香附子가 開鬱효능을 발휘하고 있음을 알 수 있다.

한편 香附子가 여러가지 유형의 諸般痛症의 치료에 활용되고 있는 것을 정리해보면 아래와 같다.

胃脘痛에 莎芎散, 胃中作痛에 清鬱湯, 胸腹脹痛에 行氣香蘇散, 婦人冷症脇痛에 茵藥散, 痰飲腹痛에 莎朮散, 風冷齒痛에 開笑散, 氣淋痛에 通秘散, 腹痛泄瀉에 衝寒散, 痛風에 趋痛散을 활용하고 있다. (표4)

이는 香附子가 胃, 胸, 腹, 脇, 血海部의 痛症과 熱, 火, 內傷, 七情, 風寒, 痰, 風冷, 痘冷, 血虛血污의 원인으로 인한 痛症에 활용되고 있음을 알 수 있다.

內傷病에서는 飲食傷에 丁香爛飯丸, 宿食不消에 穀神元 加味六君子湯, 痞滿에 內消散七香元, 有積엔 消食丸, 倒胞에는 香砂六君子湯, 食鬱에 平胃散, 嘴氣, 吞酸에 袴痰火丸, 破鬱丹, 消食清鬱湯, 增味二陳湯을 사용하고 있고 嘔吐, 反胃, 噫膈, 食不下等에서 加減四君子湯 神奇散 安中調氣丸 五膈寬中散을 사용하고 있기 때문에 香附子가 飲食傷과 脾胃病에 配伍되는 중요한 藥物임을 알 수 있으며 脾胃기능에 깊은 관계성이 있음을 알 수 있다.

또한 원인이 瘀血, 酒, 食等 有形인 경우나 六鬱, 氣脹의 無形인 경우의 積聚, 脹滿病에 香附子를 配伍한 처방을 활용하고 있어 香附子가 行氣破滯 作用에도 일정한 효능이 있음을 알 수 있다.

다음으로 傷寒, 傷暑, 瘧疫에 香蘇散, 莎朮

香蘇散, 十神湯, 香葛湯, 二香散, 神授太乙散等을 활용하고 있는데 이는 香附子가 外感邪氣를 發散하는 작용도 있는 것을 알 수 있다.

그밖에 香附子가 止咳, 止血 等에도 活用되는 경우도 있다. (표5)

총괄하면 香附子는 調經, 開鬱, 鎮痛, 理脾, 破滯, 發散, 止咳, 止血등의 다양한 효능을 配伍되는 藥物에 따라 발휘할 수 있음을 알 수 있다.

3. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑에 대한 病理調査

香附子가 主藥으로 配伍된 方劑에 대한 病理를 조사하여 정리하여 보면 다음과 같다. (표6)

즉 七情損傷으로 인한 病理로 발생하는 여러 가지 痘症에 香附子가 가장 많이 活用되고 있으며 대표적인 方劑로는 香橘湯, 交感丹, 開結舒經湯, 調經種玉湯, 烏附通氣湯, 小烏沈湯, 神仙九氣湯, 正氣天香湯, 快氣湯, 木香破氣散, 通秘散, 開氣消痰湯, 獨勝散, 加味溫膽湯 등이 있다.

이는 香附子가 配伍된 方劑에서 七情損傷, 諸氣鬱滯, 等의 病理와 관련된 痘症 및 症狀과 處方이 일관성 있게 일치되는 경우로 理, 法, 方劑의 原理가 잘 적용되고 있는 경우이다.

또한 香附子는 外感과 內傷, 外感과 內傷이 兼한 경우나 外感 內傷 七情傷이 兼한 病理에 사용되고 있는데 外感에서는 傷寒, 傷風, 兩感傷寒, 瘫瘓, 傷暑風寒, 內傷에서는 飲食傷, 外感, 內傷, 七情傷이 兼한 病理에서도 香附子가 主藥으로 사용되는 方劑가 있는데 内消散, 莎芎散, 行氣香蘇散 等이 代表의 方劑이다.

그 다음으로 濕과 痰의 病因에 의한 痰積腹痛, 久嗽 痰氣反胃, 濕痰, 帶下, 濕熱 痘痛에 香附子를 配伍한 方劑로 活用하고 있으며 이에 대한 處方으로는 莎朮散, 蜂蠻丸, 安中

調氣丸, 蒼柏橘皮丸, 十味蒼柏散 等이 사용되고 있다.

따라서 香附子는 濕痰의 病理로 인한 諸疾患에 사용할 수 있음을 보여주고 있다.

火와 관련된 胃中有伏火, 血虛有火, 火鬱의 病因으로 발생하는 胃痛, 反胃, 噁氣, 咳嗽에서도 香附子가 配伍된 方劑를 活用하는 것으로 보아 香附子가 火의 病理에서도 使用됨을 알 수 있다.

한편 香附子가 婦人科의 要藥으로 알려져 있는 바와 같이 少產, 月經不調나 少產, 經不調로 인한 瘦血이 積滯된 經閉, 膽腹痛에 香附子를 多이 活用하고 있으며 補氣養血湯, 桃奴散, 立效散 煮附丸, 歸朮破癥湯, 桃奴丸, 四物調經湯, 調經養血元 等이 代表의 方劑이다.

또한 氣, 血의 病理에도 香附子가 配伍된 方劑를 活用하고 있는데 氣血俱實한 月經痛, 血虛 血污한 痛風, 氣血不足으로 인한 婦人雜病, 血虛有火한 噫膈反胃가 여기에 해당된다.

그밖에 胃弱嘔吐, 脾虛倒胞, 腎氣冷脾, 婦人胞冷, 胎氣不固等 脾, 胃, 腎, 胞, 胎의 虛冷病理에도 香附子가 配伍된 方劑를 活用하고 있다.

한편 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 主治에 痘症이 없이 病理만 기록하고 있는 경우는 氣鬱, 氣病, 中氣, 鬱火, 血鬱, 食鬱, 肉積, 食積, 血積, 酒積, 血脹, 氣脹, 膜脹, 食厥, 飲食傷의 病理등이 있다. (표7)

요약하면 香附子는 七情損傷 및 諸氣鬱滯外感, 飲食傷, 濕痰, 火, 瘦血, 氣血虛冷 等의 病理에 사용되는 藥物임을 알 수 있다.

IV 總括 및 要約

동의보감에 수록된 香附子가 配伍된 方劑 111種에 대한 문헌적 조사를 통하여 다음과 같이 정리할 수 있었다.

1. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用범위는 婦人, 胞, 內傷, 氣, 積聚, 脹滿, 胸, 前

陰, 咳嗽, 傷寒, 腹, 嘔吐, 痰飲, 神, 風, 血, 黃疸, 小兒, 後陰, 皮, 諸瘡, 牙齒, 諸傷, 癰疽, 虛勞, 瘟疫, 暑, 脇, 小便, 鼻門等 30門, 77病症, 111方이였다.

2. 香附子가 配伍된 方劑의 主治望 분류를 통하여 婦人病, 氣病, 諸般痛症, 內傷病, 積聚, 脹滿, 嘔吐, 咳嗽, 瘡病, 傷寒 傷風 瘟疫, 出血病等에 活用 하고 있음을 알수 있다.

3. 香附子가 主藥으로 配伍된 方劑에 活用되고 있는 病理는 七情損傷, 外感, 飲食傷, 外感內傷七情傷, 濕痰, 火, 瘀血 哭 經不調, 氣血, 虛冷 등이였다.

< 參考文獻 >

1. 康舜洙 : 바른方劑學, 서울, 大星文化社, pp.108~109, 148~149, 176~177, 210~211, 360~361, 393~401, 1996.

2. 尹用甲 : 東醫方劑와 處方解說, 서울, 醫聖堂, pp.68, 319, 251~252, 412, 571, 483, 200, 513, 177, 216, 286, 244, 325, 567, 570, 578, 147, 182, 1998.

3. 康秉秀·金永坂 編 : 臨床配合本草學, 서울, 永林社, p.333~336, 1994.

4. 梁基相 編 : 치방 구성을 위한 한약의 배합과 응용, 서울, 전통의학연구소, pp.321~323, 1993.

5. 嚴潔·施雯·洪輝 著 : 得配本草, 北京, 中國中醫藥出版社, pp.72~73, 1997.

6. 陳維華外3人: 藥對論, 서울, 一中社, p.42~43, 77, 128~129, 174~177, 182, 187, 216, 225~229, 1993.

7. 辛民敎 編著 : 原色臨床配合本草學, 서울, 永林出版社, pp.385~387, 1988.

8. 申信求 : 申氏本草學, 서울, 壽文社, pp.16~20, 85~88, 1973.

9. 蔣介繁 輯 : 本草擇要綱目, 世界書局, p.33.

10. 科學百科辭典綜合出版社 著 : 再編輯東醫學辭典, 서울, 도서출판까치, p. 1152, 1990.

11. 李時珍 : 本草綱目, 1993. 醫聖堂, pp.888~894, 1988.

12. 新文豐出版公司 編 : 新編中藥大辭典中, 臺北, pp.1413~1415, 1971.

13. 宋益煥 編 : 方藥合編, 전주, 三進社, p.669, 1989.

14. 許俊 : 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, pp.430, 441, 439, 438, 437, 461, 463, 548, 464, 422, 133, 564, 134, 314, 318, 317, 313, 189, 470, 473, 184, 474, 96, 116, 604, 603, 605, 156, 609, 607, 618, 610, 622, 625, 626, 623, 161, 322, 92, 91, 89, 93, 531, 287, 564, 276, 275, 494, 490, 487, 488, 491, 493, 159, 361, 107, 263, 108, 112, 261, 406, 175, 239, 1994.