

# 愛用 驗方

蘇 秉 昌



## - 차례 -

- |         |                |
|---------|----------------|
| 1 前立腺炎  | 7 小兒腦炎         |
| 2. 白內障  | 8. 閉經後障礙       |
| 3 產後諸病  | 9. 閉經期障礙       |
| 4. 夏喘   | 10. 小兒尿白濁 血尿   |
| 5 婦人大病  | 11 甲狀腺腫        |
| 6 鬱症 不眠 | 12. 太陰腹痛 理中湯活用 |

### (1) 加減地黃湯

熟地黃 16g 王不留行 12g 澤瀉 10g 山藥 山茱萸 各8g 牡丹皮 豬苓 赤茯苓 蕙苡仁 各6g

- 功用：前立腺炎 小便不利
- 活套：血尿 加 塊殼炒 6g 小便頻數 加 益智仁 烏藥 各4g 或 韭子 12g

### (2) 加味四物湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各5g 枸杞子 甘菊花 各4g 白芷 防風 天門冬 麥門冬 犀角 甘草 各3g

- 功用：白內障 限3劑
- 別方(點眼劑)：龍腦 8g 枯白礬 4g 極細末 少許 點眼 一般 眼疾에 有效

### (3) 加味活血湯

當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各6g 蔚靈仙 白芷 黃柏 南星 蒼朮 荊芥 防風 桂皮 麻黃 防己 各4g 紅花 1g 薑五

## ■ 愛用 驗方

- 功用 : 產後諸病
- 參考 : 經產婦人의 產後風症에 有效

### (4) 加味理中湯

蘇子 南星 各12g 人蔘 白朮 乾薑炮 山楂肉 香薷 蒼朮 各8g 陳皮 5g 厚朴 白片豆 炙甘草 各4g 檳榔 木香 神曲 砂仁 各2g

- 功用 . 夏喘

### (5) 調中降火湯

當歸酒洗 白芍藥酒洗 白朮 各4g 黃連薑炒 麥門冬 黃芪酒炒 熟地黃 川芎酒炒 便香附子 各3 3g 貝母薑製 蘇子炒研 各3g 知母酒炒 遠志製 甘草 各2g

- 功用 : 婦人大病特效 年老者 尤好

### (6) 加味除鬱湯

便香附子 當歸 黃芪蜜炙 白朮蜜炒 尾蓼 龍眼肉 各8g 白芍藥酒炒 白茯神 酸棗仁炒蓮子肉 陳皮 甘草 各4g 柴胡 桔子 各3g 木香 五味子 各2g 薑三 棗二

- 功用 : 諸鬱症 咯 不眠症

### (7) 加味香薷散

香薷 柴胡 各12g 黃芩 8g 厚朴 白片豆 各6g 當歸 川芎 白芍藥 生地黃 藁本 防風 白芷 羌活 各4g 黃連 全蝎 甘草 各2g

### (8) 加味歸脾湯

白朮 肉桂 香附子 各12g 白芍藥 厚朴 神曲 蘇葉 各4 5g 龍眼肉 酸棗仁 白茯苓 黃芪 當歸 各4g 乾薑 桂枝 柴胡 甘草 各3 3g 木香 2g 棗二

- 功用 . 婦人經閉後障礙 虛冷 無力 消化不良 脈弱

### (9) 加味逍遙散

生地黃 8g 當歸 白芍藥 白朮 白茯苓 柴胡 酸棗仁 枸杞子 龍眼肉 香附子 蘇葉 甘草 各4g 牡丹皮 桔子 各3g 黃芩 黃連 各2g 薑三

- 功用 . 閉經期 障碍

- 效能 : 热症 補血 清肝 貧血 眼昏 鬱怒 脈弦緊

### (10) 水火分清飲

車前子 豬苓 各12g 澤瀉 陳皮 土茯苓 各8g 益智仁 白朮 各6g 石菖蒲 枳殼 各4g 甘草 3 3g 升麻 1g

• 功用：小兒小便白濁 尿血

• 用法 . 1貼 3~4回 分服

### (11) 消核湯

連翹 8g 皂角刺 6g 陳皮 半夏 赤茯苓 防風 黃芩酒炒 各4g 蒼朮 川芎 各12g 荊芥 肉桂 甘草 各1g

• 功用：甲狀腺腫大 咽 肩下有核如胡桃者

• 活套：虛弱者 加 人蔘 12g

• 別方：開氣消痰湯 去 射干 加 夏枯草 20g 三棱 蓬朮 各12g 鱗甲 貝母 各8g

### (12) 理中湯 活用方

人蔘 白朮 乾薑炮 各8g 炙甘草 4g

• 功用：太陰 腹痛 自利不渴

• 活套：① 寒泄 加 陳皮 青皮 名 治中湯

② 寒冷 積氣上攻 加 白芍藥 桂枝 各12g 薑五 東四 名 建理湯

③ 陽虛浮腫 合 五苓湯 散 名 理苓湯

④ 腹積腹痛 加 桂皮 附子 川椒 各4g 烏梅 2介

⑤ 氣虛 增 人蔘 20~28g

⑥ 陰疽 上 3의 理苓湯 加 茵陳 20g

⑦ 泄瀉 加 肉豆蔻 訶子 車前子 陳皮 白茯苓 各4g

⑧ 腹冷 河豚中毒(特效)

⑨ 胃冷 吐蛔 去 甘草 加 白茯苓 川椒 各4g 烏梅 2介

⑩ 憂愁多思 胸中有塊 消化不良 加 當歸 川芎 白芍藥 陳皮 厚朴 各4g 薑三

(副議長 學術季總務 · 전북 익산시 남중동1가 동인당한약방 ☎ 063-856-8448)