

紫斑에 對한 文獻的 考察

이용운*, 김일렬*, 최창원**, 이강녕**, 이영수**,곽정진**, 김희철**

Abstract

From ancient times to Ching Dynasty, we studied the causes and oriental prescriptions of purpura for 23 oriental medical records. The results were obtained as follows ;

1. Purpura is a disease that raises the purplish speckle or speckle mass on the skin by blood overflowing between flesh and skin and belongs to speckle occurrence(*Balban*, 發斑) or blood symptom(*Hyeoljeong*, 血證).
2. At ancient times, purpura named *Balban*(發斑), *Banjin*(斑疹), *Yin-yang dok*(陰陽毒), *Podoyeok*(葡萄疫) and *Bansa*(癩痧) etc.
3. In oriental cause of purpura, Insufficient symptoms are gastric energy insufficiency and groundless frame, and Sufficient symptoms are heat-evil in stomach, blood heat, season's improper energy, yin-evil height and wind-heat with phlegm.
4. At oriental prescriptions on purpura, Insufficient symptom used *Hwabantang*(化斑湯) mostly, the next *Hyunsam-seugmatang*(玄蔘升麻湯), *Jojungtang*(調中湯), *Seogak-cheongdaeum*(犀角青黛飲), *Heuknowhan*(黑奴丸) and Sufficient symptom used *Jojungikgitang*(調中益氣湯), *Wibitang*(胃脾湯), *Daegjeonjungtang*(大建中湯), *Hwanggi-geonjungtang*(黃芪建中湯) etc. much.
5. The medicines for external use for purpura were *Mil*(蜜), *Seungma*(升麻), *Mangcho-jeodamjeup*(芒硝猪膽汁), *Geongal*(乾葛), *Seontae*(蟬退), *Chongbaek*(葱白) and *Gangjeup*(薑汁) etc., pregnant woman used *Jeongjeoni*(井底泥).
6. The order of medicines were *Seungma*(升麻), *Hwanggi*(黃芪), *Insam*(人蔘), *Seokgo*(石菖), *Seogak*(犀角), *Hyunsam*(玄蔘) and *Chija*(梔子) ect.

* 동신대학교 대학원 한의학과

** 동신대학교 부속광주한방병원 간계내과학 교실

I. 緒 論

紫斑은 血液이 肌膚之間에 溢出하여 皮膚에 紫色의 斑點 或은 斑塊를 일으키는 疾病으로 發斑, 血證의 範疇에 屬하며, 古代에는 發斑(4,12,14,19,20,21,24,27,31,34), 斑疹(5,6,14,15,17,20,25,26,29,33), 陰陽毒(3,4,11,14,19,20), 葡萄疫(7,13,18), 癩痧(30,36) 등으로 命名하였다(1,2).

紫斑은 《金匱要略》³⁾에서 “陽毒之爲病 面赤斑斑如錦紋, 咽喉痛, 唾膿血. 陰毒之爲病 面目青, 身痛如被杖, 咽喉痛.”이라 하여 本病과 類似한 病症으로 最初 記載되었다.

歷代文獻에 나타난 紫斑의 病因을 보면, 巢登^{3,4,11,12,14,15,19-21,26,27,28,31)}은 熱毒溫積于胃, 沈 등¹⁹⁾은 陰邪至極, 朱 등^{5,6,14,20,26)}은 胃氣極虛, 李 등^{6,14,20,29)}은 無根之火, 陳 등^{7,13,30)}은 四時不正之氣로 因하여 紫斑이 나타난다고 보았으며, 現代의 《中醫臨床大全》²⁾에서는 紫斑을 熱盛迫血, 陰虛血熱, 脾虛不攝으로 辨證施治하였다.

西洋醫學에서는 紫斑症은 血小板減少性 紫斑症과 非血小板減少性 紫斑症으로 分類하고 있으며, 血小板減少性 紫斑症에는 血小板壽命의 減少에 의한 것과 骨髓의 形成不全에 의한 것이 있으며, 非血小板減少性 紫斑症에는 알레르기성과 血小板의 質的 機能障礙에 의한 것으로 分類하고 있다⁸⁾. 本症에 대하여 西洋醫學에서는 金⁹⁾은 小兒 알레르기성 紫斑症, 신¹⁰⁾은 小兒 알레르기성 紫斑症의 臨床的 考察 및 스테로이드 治療가 알레르기성 紫斑症 腎臟炎에 미치는 影響 等の 研究가 있었으나, 韓醫學系에서는 歷代文獻에 대한 紫斑의 原因 및 治方에 대한 研究는 아직 접하지 못했다. 이에 著者는 歷代醫家의 文獻的 考察 및 西醫學的의 類似疾患을 考察하여 若干의 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

II. 調查資料 및 方法

調查資料는 紫斑과 그 範圍에 該當하는 病名이 收錄되어 있는 古代부터 清代까지의 古典 23種의 書籍으로 하였다.

1. 調查資料

本 論文에서 參考한 書籍은 다음과 같다.

- 1) 張仲景 : 金匱要略
- 2) 巢元方 : 諸病源候論校釋
- 3) 王濤 : 外臺秘要
- 4) 陳無擇 : 三因方
- 5) 劉河間 : 劉河間傷寒六書
- 6) 李東垣 : 東垣十種醫書
- 7) 朱震亨 : 編註丹溪心法附餘
- 8) 朱震亨 : 丹溪醫集
- 9) 趙獻可 : 醫貫
- 10) 虞搏 : 醫學正傳
- 11) 許浚 : 東醫寶鑑
- 12) 陳實功 : 外科正宗
- 13) 龔廷賢 : 萬病回春
- 14) 徐春甫 : 古今醫統大全
- 15) 李梴 : 醫學入門
- 16) 陳復正 : 幼幼集成
- 17) 沈金鰲 : 雜病源流犀燭
- 18) 李用粹 : 證治彙補
- 19) 康命吉 : 原本 濟衆新篇
- 20) 葉桂 : 新教本 臨證指南醫案
- 21) 吳謙 : 醫宗金鑑
- 22) 祁坤 : 外科大成
- 23) 陳士鐸 : 辨證錄

2. 調查方法

- 1) 23種의 文獻에서 紫斑의 病因에 대하여 調查하였다.
- 2) 23種의 文獻에서 紫斑의 治療에 대하여 處方을 爲主로 調查하였다.

3) 그밖에 參考한 現代文獻은 本文에 수록 하였다.

III. 本 論

1. 金匱要略³⁾

陽毒之爲病，面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，唾膿血，五日可治，七日不可治，升麻鼈甲湯主之。

陰毒之爲病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛，五日可治，七日不可治，升麻鼈甲湯去雄黃，蜀椒主之。

○ 升麻鼈甲湯方

升麻二兩 當歸一兩 蜀椒(炒去汗)一兩 甘草二兩 雄黃(研)半兩 鼈甲手指大(炙)一片

2. 諸病源候論⁴⁾

1) 傷寒斑瘡候

傷寒病，證在表，或未發汗。或經發汗未解，或吐下後而熱不除，此毒氣盛故也。毒氣未散，而表已虛，熱毒乘虛出于皮膚，所以發斑瘡隱疹如錦紋，重者，喉口身體皆成瘡也。

2) 傷寒陰陽毒候

夫欲辨陰陽毒病者，始得病時，可看手足指，冷者是陰 不冷者是陽。若冷至一二三寸多病微，若至肘膝，爲病極 過此難治。

陰陽毒病無常也，或初得病便有毒，或服湯藥，經五六日以上，或十余日後不瘥，變成毒者。其候身重背強，喉咽痛，磨粥不下；毒氣攻心，心腹煩痛，短氣，四肢厥逆，嘔吐；體如被打發斑，此皆其候。重過三日即難治。

陽毒者，面目赤，或便膿血；陰毒者，面目青而體冷。若發赤斑，十生一死，若發黑斑，十死一生。陽毒爲病，面目斑斑如錦紋，咽喉痛，清便膿血，七日不治，五日可治，九日死，十一日

亦死。

3) 時氣發斑候

夫熱病在表已發汗未解，或吐下後，熱毒氣不散，煩躁謬言語，此爲表虛裏實

熱氣躁於外，故身體發斑如錦文。凡發斑不可用，發表藥，令瘡開泄，更增斑爛

表虛故也

4) 熱病斑瘡候

夫病在表，或未發汗，或已發汗吐下後，表證未解毒氣不散煩熱而渴，渴而不能飲，表虛裏實故，身體發斑如錦文。

5) 溫病發斑候

夫人冬月觸冒寒毒者，至春始發病，病初在表，或已發汗，吐下，而表症未罷，毒氣不散，故發斑瘡。

又冬月天時溫暖，人感乘戾之氣，未即發病；至春又被積寒所折，毒氣不得發泄；至夏遇熱，溫毒始發出于肌膚，斑熾隱疹，如錦文也。

3. 外臺秘要²⁾

1) 天行發斑

病源大熱病在表，已發汗未解，或吐下後熱毒氣不散，煩躁謬語，此爲表虛裏實 熱氣燥於外，故身體發斑如錦文。凡發斑不可用發表藥，今瘡開洩，更增斑爛，表虛故也。

取好蜜遍身摩瘡上，亦以蜜煎升麻數數拭之亦佳。

以水濃煮升麻漬錦洗之，若酒漬煮彌佳，但燥痛難忍也。

2) 溫病發斑

病源夫人冬月觸冒寒毒者，至春始發病，病初在表，或已發汗吐下而表證未罷 毒氣不散，故發斑瘡，又冬月天時溫暖，人感乘候之氣，未則

發病，至春又破積寒所折，毒氣不得泄，至夏遇熱氣春寒解，冬溫毒始發出於肌膚斑爛癰疹，如錦文也。

○ 肘後療溫毒發斑，大疫難救，黑膏方

生地黃半斤 好豉一升 右二味以豬膏二斤合露之 煎五六沸 令三分減一 絞去滓末 雄黃麝香如大豆 者 內中攪和晝服之 毒便從皮中出則愈忌蕪荑

○ 小品葛根橘皮湯 療冬溫未則病 至春被積寒所折不得發 至夏得熱 其春寒解 冬溫毒始發出肌中斑爛 癰疹如錦文 壯熱而欬 心悶嘔 但吐清汁 宜服此湯則靜方

葛根二兩 橘皮二兩 杏仁去皮尖二兩 麻黃去節二兩 知母二兩 黃芩二兩 甘草炙二兩

右七味切 以水七升 煮取三升 分溫三服 嘔悶吐當先定便且消息

○ 剛幣療肺部壯熱暴氣斑點 香豉湯方

香豉一升 葱髮切四兩 石膏八兩 梔子人三兩 生薑八兩 大青二兩 升麻三兩 芒硝三兩 右八味切 以水六升煮七味 取二升五合 去滓 然後下芒硝 分三服

○ 備急療溫毒發斑 赤斑者 五死一生 黑斑者 十死一生 大疫難救 黑奴丸方

麻黃去節三兩 大黃二兩 芒硝一兩 黃芩一兩 釜底默研一兩 竄尾默研一兩 屋梁上塵研二兩 右七味搗末 用蜜和如彈子大新汲水五合 研一丸服之 若渴 但與水 須臾當寒寒訖便汗則解 日二五丈不覺 更服一丸 此療六日胸中常大熱口渴 名壞病 醫所不療 服此丸多差

○ 古今錄驗黃連橘皮湯 療冬溫未則病 至春被積寒所折 不得發 至夏得熱其春寒解冬溫毒始發出肌中 斑爛癰疹如錦文而欬 心悶嘔吐清汁 眼赤口瘡 下部赤生瘡 已自得下痢 宜服此丸

黃連去毛四兩 橘皮二兩 杏仁去皮尖二兩 枳實炙一兩 麻黃去節二兩 葛根二兩 厚朴炙兩 甘草炙一兩 右八味煎以水八升煮取三升 分三服令盡此消息下當先止

○ 又漏蘆橘皮湯 療冬溫未則病至春被積寒

所折 不得發 至夏熱其春寒解冬溫毒始發出肌中斑爛隱疹如錦文而欬 心悶嘔吐清汁眼赤口瘡 下部赤瘡方

漏蘆 橘皮 甘遂 麻黃去節 杏仁去皮尖 黃芩各二兩 右六味切以水九升煮 取三升分四 服得下為佳 下後餘外證未除更服葛根橘皮湯方 在前小品方

4. 三因方¹¹⁾

1) 壞傷寒證治

○ 黑奴丸，治傷寒調理失序，醫所不治，及時行疫病，六七日不汗，脈洪數，面赤目瞪，身熱，煩躁，狂言，欲走，大渴，或口噤，精魂已散，但心下煖，幹開口灌藥，下咽即活，并治陽毒發斑。

麻黃去節 大黃 小麥奴 芒硝 釜底煤²⁾ 梁上塵³⁾研各別 竄突墨別研各一兩。

右為末煉蜜丸彈子大 新汲水研下一丸 渴者與冷水 盡飲之 須臾當寒 寒竟 汗出便瘥 若日移五尺 不汗依前法服一丸差 須病人大渴 乃可與之 不渴者莫服。

2) 陽毒證治

○ 升麻湯 治陽毒傷寒 一二日便成陽毒 或服藥吐下後 變成陽毒 腰背痛 煩悶不安面赤狂言 或走 或見魂 或下利 面赤斑斑如錦紋 咽喉痛 下膿血 脈浮數 五日可治 七日不可治。

升麻五錢 犀角 射干 黃芩 人蔘 炙草各二分。

右剉散 每服五錢 水一盞 煎七分 去滓熱服 并進三四服 溫覆汗出為度。

5. 劉河間傷寒六書²⁴⁾

發斑

2) 性味：辛苦溫

歸經：入肝脾二經

效能：治吐血咯血 外傷出血 聾耳 口瘡

3) 性味：微寒 無毒

效能：主中惡鼻衄 小兒軟瘡 又主金瘡。

發斑下證未全，涼膈散。未曾下，胃熱發斑，白虎湯 加人蔘白朮。陽明胃熱發斑，脈沈，須可下者，三一承氣湯下之。傷寒胃熱發斑，涼膈散加滑石調五苓散甚妙。傷寒七八日發黃，有斑微熱腹滿者，或痰實壅上，雖諸承氣湯不過者。仲景曰寸脈浮滑者，可用瓜蒂散⁴⁾吐之。

6. 東垣十種醫書¹⁷⁾

1) 潔考老人癩論

論曰，癩疹之病其爲證各異，瘡發焮腫於外者，屬少陽三焦相火也，謂之癩。小紅點行皮膚之中不出者，屬少陽君火謂之疹。

凡顯癩證，若自吐瀉者，慎勿亂治而多吉，謂邪氣上下皆出也，大凡瘡疹首尾皆不可下，恐妄動而變此謂少陽通表宜和之也，當先安裏解毒次微發之，安裏解毒須安五臟防風湯是也..... 身溫暖者順，身涼者逆，二者宜多服防風湯和之安裏 若大便實秘能飲食而內實宜當歸丸微裏之。

○ 解毒防風湯

防風一兩 地骨皮 黃芪 芍藥 荊芥 枳殼 鼠黏子各半兩 右爲粗末每服四五錢水煎

○ 當歸丸

當歸半兩 甘草一錢 黃連 大黃 各二錢半 右先將當歸熬膏子 入藥末三味爲丸 漸加服之以利爲度

○ 棗變百祥丸 治斑疹大便秘結

紅芽大戟去骨一兩 青州棗去核二十箇 右用水一碗同煎之水盡爲度 去大戟不用將棗焙乾可和作劑旋丸從少至多以利爲度

2) 海藏老人癩論

夫癩之爲病皆有子在母腹中時浸漬食母血穢蘊而成毒，皆太陰濕土壅滯君相二火之所作也。因小兒真氣既盛正氣又王，邪無所容，或因天冷，或因傷表，或因傷裏，癩由是而生焉。

3) 已顯癩證所用之藥

出不快化斑湯，出太多犀角地黃湯 地骨皮鼠黏子湯。咽不利桔梗甘草鼠黏子湯。煩者桔梗甘草梔子湯。肺不利紫草茸甘草枳殼湯。太陽出不快荊芥甘草防風湯。陽明出不快升麻加紫草湯。少陽出不快連翹防風湯。四肢出不快防風芍藥甘草湯。

7. 丹溪醫集⁵⁾

1) 斑疹

斑屬風熱挾痰而作，自裏而發於外，通聖散中消息，當以微汗散之，切不可下。

2) 內 傷

斑者，胃氣極虛，一身火流行於外所致，宜補以降，於《陰證略例》中求之。

發斑似傷寒者，痰熱之病發於外，微汗以散之，若下之非理。

疹屬熱與痰在肺，清肺火降痰，或解散出汗，亦有可下者。疹則瘡疹，汗之則愈，通聖散中消息之。

癩疹多屬脾，隱隱然在皮膚之間，故言癩疹也。發則多痒或不仁者，是兼風兼溫之殊，色紅者兼火化也。黃瓜水調伏龍肝⁵⁾，去紅斑。

載云.. 斑，有色點而無頭粒者是也。疹，浮小有頭粒者，隨出則收，收則又出是也，非若斑之無頭粒者，當明辨之。

○ 調中湯 治內傷外感而發陰癩。

蒼朮一錢半 陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥^炒 甘草^炙 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼 各一錢 川芎半錢 麻黃 桂枝各半錢

○ 消毒犀角飲子 治斑及癩疹。

牛蒡子六錢 荊芥 防風各三錢 甘草一錢

○ 通聖散

5) 性味：辛溫無毒

歸經：脾胃二經

效能：溫中止血，燥濕止嘔

4) 一方先取豉一合 溫水七合煮汁和藥末一錢 頓服不吐再服 快吐乃之。

川芎 當歸 麻黃 薄荷 連翹 白芍 黃芩 石膏 桔梗一兩 滑石三兩 荊芥 梔子 白朮 二錢半 甘草 右剉，水煎服。

如身疼，加蒼朮，羌活；痰嗽 加半夏，每服細末三錢，生薑三片

○ 玄參升麻湯 半在身，治汗下吐後，毒不散，表虛裏實發於外，甚則煩躁譫妄。

玄參 升麻 甘草 等分

○ 化斑湯 治傷寒汗吐下後，癍發脈虛。

白虎湯加 人參，守真再加 白朮

○ 大建中湯

黃芪 當歸 桂心 芍藥各二錢 人參 甘草各一錢 半夏 黑附炮，去皮 各二錢 右咬咀，每服五錢，水二盞，薑三片，棗二枚，煎，食前服

8. 丹溪心法附餘²⁵⁾

1) 斑 疹

斑屬風熱，挾痰而作，自裏而發於外，通聖散中消息，當以微汗 散之 切不可下。內傷 斑者，胃氣極虛，一身火流行於外所致，宜補以絳，於陰證略例中求之。發斑以傷寒者 痰熱之病發於外，微汗以散之，若下之 非理。

疹屬熱與痰，在肺清肺降痰，或解散出汗，亦有可下者，疹則瘡疹 汗之則愈 通聖散中消息之癍疹多屬脾，隱隱然在皮膚之間，故言癍疹也。發則多痒，或不仁者 是兼風 兼溫之殊。色紅者兼火化也，黃瓜水 調伏龍肝 去紅點斑。

載云：斑有色點而無頭粒者，隨出則收，收則又出 是也。非若斑之無頭粒者，當明辨之。

○ 玄參升麻湯(三因方) 治傷寒失下 熱毒在胃 發斑 或寒下吐後 餘毒不散 表虛裏實發於外 甚則煩躁譫妄。

玄參 升麻 甘草炙 各等分

○ 陽毒升麻湯(活人方) 治陽毒赤斑 狂言 咽喉痛 出膿血。

升麻三分 犀角 射干 黃芩 人參 甘草炙 各二分

○ 梔子仁湯(活人方) 治發斑 煩躁面赤 咽痛潮熱

梔子仁 赤芍藥 大青 知母 各一兩 升麻 黃芩 石膏 各二兩 甘草炙 半兩 杏仁去皮尖二兩 柴胡一兩五錢

○ 化斑湯 治傷寒 汗吐下後 發斑 脈虛。

人參 石膏 知母 甘草

守真 加白朮 一方 加玄參

○ 黃連橘皮湯 治陽毒發斑。

黃連去毛四兩 陳橘皮 杏仁去皮尖 枳實 麻黃去節 湯炮 葛根 各二兩 厚朴薑製 甘草炙各一兩

○ 調中湯 治內傷外感發陰斑。

蒼朮一錢半 陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥炒 甘草炙 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼各一錢 川芎五分 麻黃 桂枝各五分

○ 消毒犀角飲子

牛蒡子六錢 荊芥 防風各三錢 甘草一錢

○ 通聖散

川芎 當歸 麻黃 薄荷 連翹 白芍各半兩 黃芩 石膏 桔梗各一兩 滑石三兩 荊芥 梔子 白朮各二錢半 甘草二兩

上剉 水煎服 如身疼 加蒼朮羌活 痰嗽 加半夏 每服細末三錢 生薑三片

9. 古今醫通大全²⁷⁾

斑丹火毒門

熱邪積久，鬱於皮膚，輕則發為小斑，重則發為丹毒。平人發斑，如錦案，或赤色，大便結，心中煩躁，總為熱鬱，甚則防風通聖散，輕則解毒防風湯，疏風，清熱，涼血，或汗或下，隨治可愈。至於傷寒發斑，又非尋常之比，或因下之太早，汗之太遲，有表裏俱虛，有溫毒熱毒，不可汗下，惟可以化斑湯，升麻湯之類，若熱毒深入，斑發紫黑，多不可救也。

○ 防風通聖散 治實熱鬱結，發為錦斑。

防風 川芎 當歸 芍藥 大黃 芒硝 連翹 薄荷 石膏 桔梗 黃芩 白朮 荊芥 甘草 滑石各五分左右 水二盞 薑三 煎之八分服。

○ 解毒防風湯 治斑疹癢痛

防風 地骨皮 黃耆 芍藥 荊芥 枳殼 牛蒡子

各等分 水煎溫服。

○ 治陽毒梔子湯 治傷寒壯熱，百節痛而發斑
升麻 梔子仁 黃芩 芍藥 石膏 知母 杏仁 柴胡 甘草 右水二盞 薑三片 豆豉百粒煎服

○ 犀角消毒飲 治風熱發斑
牛蒡子四分 荊芥蕙 防風(去蘆)各三錢 甘草一分 犀角一錢五分

上細切，作一服，水二盞，煎之一盞，調犀角末服。

○ 玄蔘升麻湯 治傷寒吐下後發斑，甚則煩躁。
玄蔘 升麻各二錢 甘草一錢 水煎服

○ 人蔘白虎湯(一名 化斑湯) 治傷寒汗下失期而致發斑，急服此。

人蔘一錢 石膏三錢 知母錢半 甘草六分 右水盞半，加粳米一合，煎八分不拘時服。

10. 萬病回春¹²⁾

凡斑既出，須得脈洪數有力，身溫足溫者易治。若脈沈小，足冷元氣虛弱者難治。

發斑紅赤爲胃熱，若紫不赤爲熱甚，紫黑爲胃熾，故赤斑半生半死，黑斑者九死一生。大抵鮮紅起發稀朗者吉，紫黑者難治，雜黑斑熾子死。

凡斑欲出未出之際，此與升麻湯先透其毒。脈虛加人蔘；食少而大便不實加白朮。

斑見已出，不宜再發也。斑不可汗，斑熾不宜下。如脈洪數，熱甚煩渴者，人蔘化斑湯；若消斑毒，犀角玄蔘湯。

凡發斑疹，先將紅紙點灯照看病人面部，胸膛，背上，四肢，有紅點起者，內發斑也。若大紅點發于皮膚之上謂之斑；小紅點行于皮膚不出起者謂之疹。蓋疹輕而斑重也。先將薑汁噴于斑上，已後照陰陽虛實寒熱而用藥。

凡丹疹皆是惡毒熱血蘊蓄于命門，遇君相二火合起則發也。如遇熱時，以防風通聖散辛涼之劑解之；寒月以升麻葛根湯等辛溫之劑解之。凡丹疹先從四肢起而後入腹則死。

發斑者，熱毒蘊于胸中也。

○ 升麻湯 治陽毒赤斑，出狂言吐膿血。

升麻二錢 犀角屑 射干 人蔘 生甘草各一錢 上銼一劑，水二盞，煎之一錢，去渣，溫服。

○ 人蔘化斑湯

人蔘一錢 石膏二錢 知母三錢 甘草五分 粳米一撮 上銼一劑，水煎服。斑盛加大青。

○ 犀角玄蔘湯

犀角一錢 升麻二錢 香附一錢 黃芩一錢半 人蔘五分 玄蔘一錢 甘草三分 上銼一劑，加大青，水煎服。

○ 升麻葛根湯

升麻二錢 葛根二錢 芍藥二錢 甘草三分 上銼一劑，水煎服。

○ 犀角消毒湯

牛蒡子 荊芥蕙 防風 甘草 犀角一錢半 鎊爲細末，不入湯煎。 上銼一劑，水二盞 煎之一錢 調犀角末服。

11. 醫貫²⁸⁾

論陽毒陰毒

《金匱要略》云。陽毒之爲病。面赤斑斑如錦紋。咽喉痛。唾膿血。五日可治。七日不可治。陽毒之爲病。面目青。身痛如被杖。咽喉痛。死生如陽毒。升麻鱉甲湯并主之。

千金云。陽毒湯治傷寒一二日。變成陽毒。或服藥吐下後。變成陽毒。身重腰脊背痛。煩心不安。狂言或走。或見鬼神。或吐血下利。其脈浮。

12. 醫學正傳²⁶⁾

1) 斑疹

或傷寒溫熱病而發斑 斑如錦紋者，名曰發斑，皆熱毒之所致也。其證有陽毒，有陰毒，是皆冬應寒而反溫，人受不正之氣，故之春夏以發爲斑熾，夫陽脈浮數而陰脈實大者，名爲溫毒。或爲內外結熱極深，舌卷焦黑，鼻若咽煤，狂言見鬼，面赤而斑熾者，名爲陽毒。如溫病下之太早，熱氣乘虛入胃，或下之太遲，熱病鬱積胃中，或醫者誤用熱藥過多，胃氣熱甚，及內傷熱病，虛火

燔灼肺之間，皆能成發斑也。是故發赤斑者半生反死，發黑斑者九死一生。治法用化斑湯(即人蔘白虎湯)，升麻葛根湯，黑膏，黑奴丸之類，是皆正治之法也，學者宜詳察而用之。

2) 脈法

脈陽浮而數，陰實而大。

脈多沈伏，或細而散，或絕無。

3) 方法

丹溪曰：發斑屬風熱挾痰而作，自裏而發于外，通聖散中消息用，當微汗而散之，下之非理也。

載氏曰：有色點而無果粒者，曰斑。一云：發斑似傷寒，痰熱之病發于外也。有屬裡者，因胃熱助手少陰火，入手太陰肺也，故紅點如斑，生于皮毛間耳，白虎，瀉心，調味承氣從長選用之。

內傷發斑者，胃氣極虛，一身之火遊行于外所致，宜補以降之。

○ 消風散

荊芥蕙 甘草炙 陳皮(去白) 厚朴 白僵蠶(炒) 蟬退(去土炒) 人蔘 茯苓 防風 川芎 藿香 羌活各等分
上每細切，每服二錢，煎荊芥湯或茶清調下。

○ 葛根橘皮湯 治肌膚斑駁，冬溫治發，咳而心悶，但嘔清汁。

葛根 橘紅 杏仁 知母 黃芩 麻黃 甘草各等分

○ 陽毒升麻湯 治傷寒一、二日間，身發斑燉，或吐下後變成陽毒，腰背疼痛，面赤狂言，下利，脈浮大咽痛。

○ 玄蔘升麻湯 治發斑咽痛煩躁譫語。

玄蔘 升麻 甘草 等分

○ 陽毒梔子湯 治傷寒壯熱百節煩痛，身發斑治。
升麻 麻子仁 黃芩 芍藥各一錢 石膏二錢 知母一錢五分 杏仁七分半 柴胡一錢 甘草五分
上細切，作一服，入薑三片，香豉一百粒，煎服。

○ 犀角消毒飲 治發斑及癰疹等證。

牛蒡子四分 荊芥蕙 防風(去蘆)各三錢 甘草一分 犀角一錢五分

上細切，作一服，水二盞，煎之一盞，調犀角

末服。

○ 解毒消毒飲 治發斑癰疹痒痛。

防風一錢五分 地骨皮 黃芪 芍藥 荊芥蕙 枳殼 牛蒡子(炒)各七分半

上細末，作一服，水二盞，煎之一盞，去砂溫服。

○ 升麻葛根湯 治傷寒陽明實熱發斑。

升麻二錢 葛根二錢 芍藥二錢 甘草三分 上銼一劑，水煎服

○ 陰毒升麻鱉甲湯 治陰斑

升麻二錢 當歸 甘草各一錢五分 蜀椒二十粒 鱉甲(炙)一錢 雄黃四分(別研)

上細切，水二盞，煎之一盞，去砂，調雄黃末服。

○ 調中湯 治內傷外感所發陰斑。

蒼朮一錢五分 陳皮一錢 砂仁 藿香 芍藥 甘草炙 桔梗(去蘆) 半夏湯炮七次 白芷 羌活 枳殼各七分 川芎五分 麻黃(拒絕) 桂枝各三分

上細切，作一服，加生薑三片，水二大盞，煎七分，溫服。

○ 化斑湯 治傷寒汗吐下後，發斑脈伏。則傷寒門白虎加人蔘湯也。守真《類萃》又加 白朮，水煎，時時服之。

○ 黑膏 治溫毒發斑。冬月大溫，人受不正之氣，至春發斑如錦文，脈浮散屬陽，沈伏屬陰，用此以消疫毒之氣。

生地黃半斤 香豉一升

上二味細切，以猪膏二斤合煎之，取濃汁如膏，用雄黃麝香如豆豉內中，攪和勻，每服用彈子大，白湯化下。

○ 大青四物湯 治瘟疫發斑

大青四錢 阿膠(炒成珠子) 甘草(炙)各二錢 香豉一合
上細切，作一服，水煎服之。

○ 加味敗毒散 治瘟疫及癰疹等證。

羌活 獨活 前胡 柴胡 天歸 川芎 枳殼 桔梗 茯苓 人蔘各五分 甘草 薄荷各二分半 加：白朮 防風 荊芥 蒼朮 芍藥 生地黃各五分

上細切，作一服，加生薑三片，大棗二枚，水煎服。此因虛而感冒風濕以致發斑者，服之良驗。

13. 醫學入門⁶⁾

1) 斑疹屬火有二因.

斑屬三焦無根之火，疹屬心火其上侵於肺則一也。

2) 外因，初期頭疼，身大熱，口知味者，忌大汗下，宜解肌微汗，有自吐瀉者，則愈。

3) 內因，頭或微疼，但手心熱，脾胃虛者，宜大補以降其火，體壯者清肺以化其痰。

斑勢掀發如錦紋，有色痕而無頭粒。重者紅如錦繡，成片多發在胸腹，傷寒誤溫誤下，心火所主。雜病全是風熱挾痰，手少陽相火自裏發外。治宜安裏藥，多發表藥少。

○ 外感者 敗毒散 加 紫草 或 升麻葛根湯 加 玄蔘。

○ 咽痛者 玄蔘升麻湯

○ 狂言 或 見血者 陽毒升麻湯

○ 渴者 化斑湯

○ 便閉者 防風通聖散；微利之 便不甚閉 去硝黃；身疼 加 蒼朮 羌活；痰嗽 加 半夏；熱甚者 黑奴丸；斑爛者 黑膏。

○ 內傷發斑 輕如蚊迹。疹子者 多在手足，初期 無頭疼身熱乃胃虛火遊於外 宜調中益氣湯 黃芪健中湯。

○ 內傷痰熱上攻頭面者 升麻葛根湯 加 玄蔘 貝母 黃芩 生地 麥門冬

○ 內傷挾外感者 調中疏邪湯 蔘蘇飲 黑而入腹最傷人

凡斑疹 赤色 身燄 自胸腹散四肢者吉，黑色身涼 自四肢入腹者死，舊分癰疹丹疹各類 今合一以其人治同也。

14. 外科正宗⁷⁾

葡萄疫

葡萄疫，其患多生小兒，感受四時不正之氣，鬱于皮膚不散，結成大小青紫斑點，色若葡萄，發在遍體頭面，乃為腑症；自無表裏，邪毒傳胃，牙根出血，久即虛人，斑點方退。初起宜服羚羊

角散清熱涼血，久即胃脾湯滋益其內，又有牙根腐爛者人中白散。

15. 幼幼集成²⁹⁾

斑疹隱疹證治

小兒斑與疹，宜別證候陰陽。其掀腫於外者，屬少陽相火，謂之斑。其證發於面部，或背部，或四肢，極其稠密，色如錦紋，紅赤者胃熱也，紫黑者胃爛也。宜消斑青黛飲。

其紅點發於皮膚之內不出者，屬少陰君火，謂之疹。其證發於胸腹手足，稀而少者，此由無根失守之火，聚於胸中，上蒸於肺，隱於皮膚而成小疹，其狀如蚊跡，蚤斑而非錦紋也。理中湯。

斑疹自吐瀉者，慎勿止之，因其毒氣從上下出，宜調中氣。若吐瀉後遍身發熱，斑如錦紋者，恐防熱氣乘虛入胃，其夏月多有此證，化斑湯。

○ 消斑青黛飲 治陽毒發斑

正雅連 熟石膏 淨知母 北柴胡 黑梔仁 潤玄蔘 錄升麻 懷生地 片黃芩 已上俱各一錢 官揀蔘 洋青黛 灸甘草 各五錢 生薑三片 豆豉二十一粒 水煎，熱服。

○ 化斑湯 則人蔘白虎湯，治陽明胃熱發斑。

官揀蔘 一錢 熟石膏 四錢 淨知母二錢 灸甘草 一錢 淡竹葉 一錢 粳米一撮 水煎 熱服

16. 雜病源流犀燭¹⁹⁾

1) 春溫病源流

有治本冬溫，醫誤認傷寒，用實熱發汗，治令發斑成毒者，宜升麻葛根湯加犀角 黑蔘 或犀角黑蔘湯。而又有溫毒發斑者，夫發斑皆失于汗下之故，熱毒內攻，不得散，蘊結陽明，而發出肌表。或汗下不解，足冷耳聾，胸煩悶，咳嗽嘔逆，潮熱，起臥不安，俱是發斑之候。春至 病溫之人更遇時熱，辨為溫毒。

周氏亦有治法，更條例之。有治斑如錦紋，身熱煩躁而無燥結者，宜黃連解毒湯。

自汗煩渴而發斑，為胃熱者，宜人蔘化斑湯。

有治煩熱錯語不眠者 宜白虎湯合黃連解毒湯。
有治斑不透者 宜犀角大青湯。有治斑已透 熱不退者 宜犀角大青湯 去升麻 黃芩 加人蔘 生地 柴胡。有治斑色紫而為危候者 宜黃連解毒犀角地黃二湯合用。必須與病家言過，而後用藥，以此症雖藥，十中難九一二。若黑色而下陷，必死可勿藥。凡發斑雖禁下，若大便秘，躁渴色紫者，可微下之，宜大柴胡湯。若發斑已盡 外熱已退 內實不大便 譫語 微下之 宜小劑涼膈散 或大柴胡湯。

又曰：溫毒者，冬月感寒毒異氣，至春始發也，表症未罷，毒氣未散，故有發斑之後。心下煩悶，嘔吐咳嗽，後必下利，寸脈洪數，尺脈實大，為病則重，以陽氣盛故耳，通用元參升麻湯以治之。

○ 升麻葛根湯

升麻 葛根 白芍藥 甘草各一錢半

○ 犀角黑蓼湯

犀角 黑蓼 升麻 射干 黃芩 人蔘 甘草

○ 黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 山梔各錢半

○ 三黃石膏湯

黃連 黃芩 黃柏各二錢 山梔二十枚 石膏五錢 麻黃六分 豉三錢 薑三 葱白二 澄清地漿水煎服。半日許不出汗 再服。如脈數便閉 上氣喘急 舌卷囊縮 去豉 麻黃 加大黃 芒硝。節庵殺連捶法 加細茶一撮。

○ 人蔘化斑湯

人蔘一錢 石膏二錢 知母三錢 甘草五分 粳米一撮 上銼一劑，水煎服。斑盛加大青。

○ 白虎湯合黃連解毒湯

石膏 知母 甘草 粳米 黃連 黃芩 黃柏 山梔

○ 犀角大青湯

犀角 大青 元參 升麻 黃連 黃芩 黃柏 山梔 甘草 如脈虛熱甚 去升麻 芩 白 加人蔘 生地 柴胡 名消斑青黛飲

○ 大柴胡湯

柴胡 黃芩 人蔘 半夏 甘草

○ 小劑涼膈散

連翹 山梔 白芍 黃芩 大黃 芒硝各二錢 葱白一經 炙草五分 大棗二枚

○ 犀角地黃湯

犀角 生地 白芍 丹皮 加藕節汁 扁柏汁 磨金墨汁和服。

2) 陽毒陰毒源流

陽毒發斑，陽邪抗極病也。亦或誤服辛熱而成者。《金匱》云：陽毒之為病，面赤斑斑如錦紋，咽喉痛，唾膿血，五日可治，七日不可治，升麻鱉甲湯主之。

又有虛熱熾甚而毒不化者，宜陽毒升麻湯，便結去射干 加酒大黃，熱甚去人蔘 加青黛。

又有吐下未當，邪陷于內而壯熱，頭項強痛，燥悶不安，或狂言詈罵，妄見妄聞，或亦面生斑紋，口唾膿血，或病舌卷焦黑，鼻如烟煤，或更下利黃赤，六脈洪大而數者，宜犀角黑蓼湯，黃連解毒湯。切不可用下藥，勢甚者，以青布浸冷水搭病人胸膛，必喜，熱即易之，須叟得睡。

3) 陽毒證治

《金鑑》曰：三陽病深，必變為陽毒，或有失于汗下，或本陽症誤用熱藥，使熱毒陷深，發為狂亂，面赤顏紅，身發斑黃，宜黑奴丸，三黃瀉心湯，消斑青黛飲。

4) 治陽毒方九

○ 升麻鱉甲湯

升麻 鱉甲 蜀椒 雄黃 當歸 甘草

○ 陽毒升麻湯

升麻 犀角 射干 黃芩 人蔘 甘草 手足汗則解 不解重作。

○ 犀角黑蓼湯

升麻 犀角 射干 黃芩 人蔘 甘草 黑蓼 此即陽毒升麻湯加黑蓼一味也。

○ 黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 山梔各一錢半

○ 黑奴丸

麻黃 大黃 各二兩 黃芩 釜底煤 芒硝 灶突墨 梁上塵 小麥奴各一兩 蜜丸 彈子大 新汲水化服 須臾 振寒汗出而解 未汗再服。

○ 三黃石膏湯

石膏三錢 黃芩 黃連 黃柏 山梔各錢半 麻黃六分 香豉半合 薑三片 細茶一撮

○ 消斑青黛飲

黃連 甘草 石膏 知母 柴胡 元參 生地 山梔 犀角 青黛 人參 薑一 棗二 水煎 入苦酒一匙服。大便實者 去人參 加大黃。

○ 三黃巨勝湯

石膏三錢 黃芩 黃連 黃柏 山梔各錢半 芒硝大黃各一錢 薑一片 棗二枚 入泥漿 清水二匙服。

○ 大承氣湯

大黃 芒硝 枳實 厚朴

5) 陰毒發斑，陰邪甚極病也。

蓋有陰邪至極，反大熱燥渴，四肢厥冷，脈沈細而疾，或尺部短而寸口大，額上手背冷，汗不止，其原由房後着寒，或內傷生冷寒物而犯房事，內既伏陰，又加外寒相搏，積寒伏于下，衛陽消于上，遂成陰盛格陽，陽氣上脫之候也，後五六日胸前發出紅斑，其色淡，其點小，是為陰斑……總之，前一症純陰之極，畜熱自深于內，法當如仲景之治。後一症則止，陰寒凝結，非用回陽退陰之劑，內溫正氣，逼出外邪，斷不能起死而回生也，宜正陽散，復陽丹，還陽丹，破陰丹，退陰散，回陽救急湯。

6) 陰毒證治

《入門》曰：三陰經病甚必變為陰毒，其症四肢厥冷，吐利不渴，靜倦而臥，甚即目痛鄭聲，加以頭痛頭汗，眼睛內痛，不欲見亮，面唇指甲青黑，手背冷汗 心下結硬，臍腹疝痛，身如被杖，外腎冰冷，其脈附骨，取之則有，按之則無，宜甘草湯，正陽散。

陽氣乍復，或生煩躁者，破陰丹，復陽丹不可用涼藥。

《金鑑》曰：一人傷寒，四肢厥冷，臍下筑痛，身痛如被杖，蓋陰毒也。急服金液丹，來復丹等藥。其脈沈遲而滑，雖陰而無陽，脈可至，仍灸臍下百壯，乃手足溫，陽回得汗而解。

7) 治陰毒方十三

○ 升麻鱉甲湯

升麻 鱉甲 蜀椒 雄黃 當歸 甘草

○ 附子理中湯

附子 乾薑 甘草 人參 白朮

○ 附子散

附子 乾薑 肉桂 當歸 白朮 半夏 生薑

○ 人參三白四逆湯

人參 白芍 白朮 白茯苓 生薑 附子 乾薑 甘草 大棗

○ 正陽散

附子二兩 炮薑 炙草各二錢半 皂角一挺 麝香一錢 每末二錢 水一盞 煎五分 連渣熱服。一方用白湯調下。

○ 復陽丹

萆澄茄 木香 吳茱萸 全蝎 附子 硫黃各五錢 乾薑一錢 酒糊丸 每二三十丸 薑湯下 復以熱酒送下取汗。

此方治陰毒面青 肢冷脈沈

○ 還陽散

硫黃為末 每二錢 新汲水調下 良久 或寒一起 熱一起 再服 汗出而差。

此方治陰毒面青 肢冷脈沈 心躁腹痛。

○ 破陰丹

硫黃五兩 硝石 元精石各二兩 乾薑 附子 肉桂各五錢。各為末 用鐵銚先鋪元精次鋪硝石各一半 中鋪硫黃末 又鋪硝石末 再鋪元精末 以小盞蓋着 用炭三斤 燒令得所 勿令煙出 急取瓦盆合着地上 候冷取出 入余藥同為末 糊丸 每二十丸 艾湯下取汗。

此方治陰毒脈伏 及陽脫無脈 厥冷不省。

○ 退陰散

川烏 乾薑 等分 為粗末 炒令轉色 放冷 再

研細末 每末一錢 鹽一捻 水小許 煎溫服。

○ 回陽救急湯

人蔘 白朮 茯苓 陳皮 半夏 乾薑 附子 肉桂 炙草 五味子各一錢 薑七片

○ 甘草湯

炙甘草 升麻 當歸 桂枝各一錢 雄黃 川椒各錢半 鱉甲二錢 水煎服 毒縱汗出 未汗再服，

○ 金液丹

硫黃十兩。

硫黃用將鐵杓激溶 頃入井水 或麻油內 後用桑柴灰 淋瀝 炆七八遍 換水去紅暈為末 蒸餅丸梧子大 每口丸 空心服 米飲下之

○ 來復丹

元精石 硫黃 硝石 五靈脂 陳皮 青皮

17. 東醫寶鑑²⁰⁾

1) 斑 疹

色有點而無課粒者，曰癍。浮小而有課粒者，曰疹。隨出則沒而于出(丹心)

發癍者，因胃熱，調手少陰火入于手太陰肺也，紅點如斑生於皮膚之間，白虎湯，瀉心湯，調胃承氣湯，選用之。(丹心)

傷寒發斑謂之陽毒，春溫發斑謂之溫毒，夏熱發斑謂之熱毒，時行發斑謂之時毒，名雖不同，同歸於熱，皆心火入肺，故紅點，見於皮毛之間，輕如疹子蚊迹，只在手足先紅後黃，重如錦紋發在胸腹先紅後赤，切忌發汗，重令開泄，甚則皮膚斑爛。(入門)

○ 陽毒發斑宜人蔘白虎湯，三黃石膏湯，消斑青黛飲。

○ 溫毒發斑宜黑膏，葛根橘皮湯，玄蔘升麻湯。

○ 熱毒發斑，時行發斑宜化斑湯，豬膽鷄子湯，犀角玄蔘湯，斑盛破爛者用芒硝豬膽汁法⁶⁾。(入門)

○ 冬月溫暖人受不正之氣，至春冬溫，始發

肌中，斑爛如錦紋而咳心悶，但嘔清水宜用黑膏。(活人)

○ 斑斑如錦紋，色紅赤者 胃熱也。紫黑者胃爛也。

○ 孕婦傷寒發斑宜梔子大青湯。(入門)

○ 斑色紫黑咽喉肺痛 譫語煩躁宜用紫雪⁷⁾。(入門)

○ 消癍青黛飲 治陽毒發毒發斑如錦紋

黃連 石膏 知母 柴胡 玄蔘 生地黃 梔子 犀角 青黛各一錢 人蔘 甘草各五分 右剉作一貼 薑一片 棗二枚 煎入 苦酒一匙服

○ 黑膏 治溫毒發斑

生地黃二兩六錢半 好豉一兩六錢半 豬膏十兩 右合煎令三分減一絞去滓入雄黃麝香各一分為末 和勻，再煎分服 白湯化下。

○ 葛根橘皮湯 治冬溫發癍

葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻黃 甘草各一錢 右剉作一貼 煎服

○ 玄蔘升麻湯 治傷寒發斑 煩躁 譫語 咽喉閉痛

玄蔘 升麻 甘草各三錢 右剉作一貼 煎服

○ 化癍湯 治陽毒溫毒熱毒發斑 卽人蔘白虎湯也

人蔘一錢 石膏三錢 知母錢半 甘草六分 右水盞半，加粳米一合，煎八分不拘時服

○ 豬膽鷄子湯 治熱毒時毒發斑

豬膽二合 苦酒三合 鷄子生一箇 右煎三沸強人盡服 弱人煎五六沸服之

○ 犀角玄蔘湯 治發斑

犀角鎊一錢 升麻二錢 黃芩一錢半 香附子 玄蔘各一錢 人蔘五分 甘草三分 右剉作一貼

7) 升麻六錢 黃芩十兩 寒水石 石膏各四兩八錢 犀角 羚羊角一兩 玄蔘一兩六錢 沈香 木香 丁香各五錢 甘草八錢 水五盞 先煮黃芩 至三盞 入諸藥 再煎至一盞 去渣 入芒硝三兩二錢 煎慢火 以柳木 攪不停手 俟欲凝 入磁盆中 更下硃砂麝香末各三分 急攪令勻 俟冷 凝結成雪 每一錢 細細嚥之

6) 芒硝三錢 爲末하고 豬膽汁에 調하여 塗瘡上 하고 候乾한 즉 痂落하여 無癍하니 仍研末하여 糝之라.

加大青一錢 水煎服

○ 梔子大青湯 治孕婦傷寒發斑變黑

梔子 大青 黃芩各一錢半 升麻一錢 杏仁八分 右剉作一貼 入葱白三莖 水煎服

○ 芒硝豬膽汁法 治癩瘡紫黑臭爛右相和 鷄羽蘸塗之

2) 陰證發癩

陰證發癩，出胸背及手足，亦稀少而微紅，若作熱，投之涼藥大誤矣。此無根失守之火，取於胸中，上獨熏肺傳於皮膚而為癩點，但如蚊蚋蚤？，咬形狀而非錦紋也，宜用調中湯，升麻鱉甲湯之類，其癩自退。

○ 調中湯 治內傷外感為陰證發癩

蒼朮一錢半 陳皮一錢 縮砂 藿香 白芍藥 桔梗 半夏 白芷 羌活 枳殼 甘草各七分 川芎五分 麻黃 桂枝各二分 右剉作一貼 薑三片 水煎服

○ 麻黃鱉甲湯 治陰毒發斑

治升麻二錢 當歸 甘草各一錢二分 鱉甲炙一錢 雄黃末四分 川椒二十粒 右剉作一貼 水煎服

3) 內傷發癩

內傷發癩，乃胃氣極虛，一身之火，遊行於外所致，宜補以降之。

內傷發癩，亦或痰熱所致，火即補以降之，痰熱即微汗以散之，切不可下。

內傷發癩，輕如蚊跡，疹子者，多在手足，初起無頭痛身熱，宜調中益氣湯，黃芪健中湯。

4) 發癩候

凡汗下不解，足冷耳聾，煩悶嘔咳，便是發癩之候，宜化癩消癩之藥以防之。

癩欲未出之際，且與升麻葛根湯，先透其毒。

18. 證治彙補¹⁴⁾

1) 斑疹

斑屬三焦無根之火，疹屬心脾濕熱之火。其上侵于肺即一也。

2) 內因

熱則傷血，血熱不散，裏實表虛，出于皮膚而為斑也。

3) 外候

斑勢掀發微腫，有色痕而無頭粒，小者如芝麻，大如坎實，輕者如星布，重者如錦紋，其赤色者胃熱也，紫黑者胃爛也，或有青藍色者見即不治，要知赤斑半死半生，黑斑九死一生。針頭稠密者凶，喘促自汗者死，氣實足煖者易治，氣怯足冷者難醫，自胸腹散四肢者可治，自四肢入于腹者不治，將發之先 先自吐瀉者吉，既發之後久瀉不止者凶。

4) 外感發斑

有傷寒發斑，有時氣發斑，有陽毒發斑，有溫毒發斑，四症之中，溫毒為重，皆因熱邪在表，不當而下之，乘虛入胃 或熱邪在裏，胃熱不泄，二者皆能發斑也。初起必有頭疼身熱之表症，先宜辛涼微其表，後用寒涼清其中。

5) 內傷發斑

內傷發斑，輕如紋跡，多在手足，初起無頭疼身熱表證。乃勞役過度，胃氣極虛，一身之火，遊行于外，或他證汗吐下後，中氣虛乏，餘邪無所歸附，散于肌表，宜補宜降，不可妄行涼藥，大建中湯。

6) 陰證發斑

陰證發斑，亦出胸背手足，但稀少而淡紅，如蚊迹之狀，此名陰斑。終不似陽斑之紅顯，因腎氣太虛，陰盛于下，迫其無根之火 聚于胸中，上熏肺分而為斑，若悞作熱證而用涼藥者非，宜調中湯，溫胃其火自降而斑自退。

7) 脈法

斑疹鬱熱，或伏 或絕，或細 或散，斑疹熱盛，陽浮而數，陰實而大，大率洪數有力者生，沈小

無力者死。

8) 治法

疹宜涼解，斑宜清火，癢者祛風，痛者清熱，又斑疹並出者，不可純用風藥，恐變痰嗽渴嘔瘡瘍。

9) 用藥

外感斑勢未透升麻玄蔘湯發之，已透人蔘化斑湯清之，內傷發斑調中益氣湯斂之，風熱發疹消風百解散散之，疹毒未解鼠黏子湯清之，脾家風濕發疹用黃調水調伏龍肝散服。

10) 外治法

凡斑欲出未透用乾葛 蟬退 蘇葉煎湯搽之，或葱白擦，或薑汁噴，使斑勢掀發為度。

11) 斑疹選方

- 人蔘化斑湯 治外感陽實發斑，勢如錦紋。
人蔘一錢 知母二錢 石膏五錢 甘草一錢 粳米一撮 水煎
- 升麻玄蔘湯 治外感熱甚發斑，隱隱未透。
升麻 玄蔘 乾葛 甘草等分 水煎。
- 調中益氣湯 治內傷胃氣虛而邪火為斑。
黃芪 人蔘 甘草 當歸 白朮各五分 白芍 柴胡 升麻各三分 橘皮 五味三粒。水煎服。
- 調中湯
蒼朮 陳皮 砂仁 藿香 甘草 芍藥 桔梗 半夏各八分 白芷 羌活 川芎 麻黃 桂枝 枳殼各七分 水薑服。
- 大建中湯
黃芪 當歸 桂心 芍藥各二錢 人蔘 甘草各一錢 半夏 附子各五分 生薑 棗子 水煎。
- 消風百解散 治風熱不散 熱於皮膚而為斑。
荊芥 防風 白芷 羌活 陳皮 川芎 蟬退 蒼朮 柴胡 甘草各等分 生薑 葱白水煎。

【附妊婦斑疹】

妊婦發斑，先用透解，次用清熱，不可泥胎孕，執用養血，皆血藥凝滯，斑毒不能外透，每致纏綿變症，若已透而內熱未消，恐熱侵胎元 宜護胎塗臍法。

綿變症，若已透而內熱未消，恐熱侵胎元 宜護胎塗臍法。

妊婦發疹，宜清肺透表，亦不可用血藥以治疹邪，亦不可用條約以助疹熱。

塗臍護胎法，治妊婦外感發斑已透，熱未止，恐熱入子宮，用此塗之，以井底泥塗臍以下，二寸餘，以綿護之，良久再易。

19. 原本 濟衆新篇¹⁵⁾

1) 斑疹

有色點而無顆粒曰斑，浮小而有顆粒曰疹，隨沒隨出。

傷寒發斑謂陽毒人蔘白虎湯

春溫發斑謂溫毒，夏熱發斑謂熱毒，時行發斑謂時毒，皆火乘肺紅點見皮毛，輕如疹子，蚊迹發手足先紅後黃，重如錦紋發胸腹，先紅後赤，切忌發汗，又不宜下，癢欲出未出之際與升麻葛根湯先透其毒。溫熱毒狂言三黃石膏湯。

○ 消癰青黛飲 治陽毒熱毒發斑如錦紋

黃連 石膏 知母 石膏 玄蔘 生地黃 梔子 犀角 青黛各一錢 人蔘 甘草各五分 薑一片 棗二枚 苦酒一匙調服

○ 玄蔘升麻湯 治傷寒發斑煩躁譫語咽喉閉痛
玄蔘 升麻 甘草各三錢

○ 犀角玄蔘湯 治發癍

玄蔘二錢 黃芩一錢五分 犀角鎊 香附子 玄蔘各一錢 人蔘五分 甘草三分 加大青一錢服

○ 梔子大青散 治孕婦傷寒發斑變黑

梔子 大青 黃芩各一錢五分 升麻一錢 杏仁八分 入葱白三莖

20. 臨證指南醫案³⁰⁾

癍痧疹癩

○ 張 伏氣熱蘊三焦，心凜發熱，煩渴，遍體赤斑，夜躁不寐，兩脈數搏。(三焦伏熱)

羚羊角 犀角 連翹心 玄蔘心 鮮生地 金銀花 花粉 石菖蒲

○ 又 寒熱必有形象攻觸，及於胃脘之下，口

渴喜飲煖湯，癩已發現，病不肯退，此邪氣，久伏厥陰之界矣。

桂枝 川連 黃芩 花盆 牡蠣 枳實

○ 嚴 濕溫雜受，身發斑疹，飲水渴不解，夜煩不成寐，病中強食，反助邪威，議用涼膈疏斑方法。(濕溫)

連翹 薄荷 杏仁 鬱金 枳實汁 炒牛蒡 山梔 石膏

○ 又 舌邊赤，昏譫，早輕夜重，斑疹癢約，是濕濕已入血絡，夫心主血，邪干膈中，漸至結閉，爲昏瘡之危，苦味沈寒，竟入中焦，消導辛溫，徒劫胃汁，皆溫邪大禁，議清疏血分，輕劑以透斑，更參入方香逐穢以開內竅，近代喻嘉言申明戒律宜遵也。

犀角 玄蔘 連翹 銀花 石菖蒲

癩者 有觸目之色，而無礙手之質，卽稠如錦紋，稀如蚊跡之象也，或佈於胸腹，或見於四肢，總而鮮紅起發者爲吉，色赤者成片者爲重，色黑者爲胸，色青者爲不治。蓋有諸內而形諸外，可決其臟腑之安危，邪正之勝負也，殆傷寒溫疫諸症 失於宣解，邪溫於胃腑而走入營中，每有是患耳。考方書之治，其法不二，大抵由失表而治者，當求之汗，失下而治者，必取乎攻，火甚清之，毒甚下之，營氣不足者，助其虛而和之，托之，至於陰斑一說，見象甚微，若必指定些些之癩點爲陰，猶恐不能無誤，想前人此例，無非覺後人勿執見癩爲實熱之義也。吾故曰 必參之脈象及兼證方妥。

21. 外科大成¹⁸⁾

葡萄疫

葡萄疫者，形如青紫葡萄，大小不一，頭面身體，隨處可生。由感四時不正之氣，鬱於皮膚，乃腑證也。初起服羚羊角散，清熱涼血。久卽牙根出血，邪傳入胃也，服胃脾湯，滋益其內，如牙腐爛者，於牙疳門參考。

○ 羚羊角散

羚羊角 牛蒡子 防風 麥門冬 知母 玄蔘 黃

芩各八分 甘草一分

水鍾半，淡竹葉十片 煎七分服。

○ 胃脾湯

沙蔘 白朮 陳皮 遠志 麥冬 茯神各六分 五味子 甘草各五分

水煎服，有汗去沙蔘 加入蔘黃芪。

22. 醫宗金鑑¹³⁾

1) 瘟疫斑疹

傷寒斑疹失汗下，時氣初感卽其然，表邪覆鬱營衛分，外泛皮脈痧疹斑。痧白疹紅如皮粟，斑紅如豆片連連，紅輕赤重黑多死，淡紅稀暗是陰斑，未透升麻消毒治，熱盛三黃石膏煎，消癩青黛飲，痧疹表裏雙解先。

○ 升麻葛根湯合消毒犀角飲

升麻 葛根 芍藥 甘草生 牛蒡子 荊芥 防風 犀角

引用芫荽水煎服

○ 三黃石膏湯

黃連 黃芩 梔子 黃蘗 豆豉 麻黃 石膏

引用生葱水煎服

○ 消癩青黛飲

石膏煨 知母 犀角 甘草生 梔子生 川連生 青黛 元參 柴胡 生地 人蔘 大黃

引用薑棗水煎。臨服入苦酒一匙和服。

2) 葡萄疫

葡萄疫同葡萄狀，感受疫癘鬱凝生，偏身發點，青紫色，毒攻牙齒類疳形。

註) 此證多因嬰兒感受疫癘之氣，鬱於皮膚凝結而成，大小青紫斑點，色狀若葡萄，發於偏身，惟腿脛居多，甚卽邪毒攻胃以致，齒齦腐爛臭味出血，形類兒疳，而青紫斑點其色反淡，久卽令人虛羸。初起宜服羚羊角散，久虛者宜服胃脾湯，米疳水漱口，以非疳散，日擦四五次卽效，近見中年之人下虛者亦患此證 治法同前。

○ 羚羊角散

羚羊角 麥冬去心 黃芩 知母 牛蒡子 炒研 防風

元蔘各八分 甘草生二分

水二鍾淡竹葉十片 煎六分 食遠服。

○ 胃脾湯

白朮土炒 遠志去心 麥冬去心 沙蔘 茯神 陳皮各

六分 五味子 甘草炙各五分

水二鍾煎六分 食遠服。

○ 非疳散

冰片四分 人中白煨去臭氣存性 五倍子炒茶褐色存性 各一兩

共研細末 先用米泔水漱口 後擦此藥

23. 辨證錄³¹⁾

疹症門

人以爲發斑之傷寒也。

蓋疹與斑總皆熱毒耳。方用消斑化疹湯。

元蔘五錢 歸尾三錢 石膏三錢 白芍五錢 地骨皮三錢 丹皮三錢 荊芥二錢 木通一錢 青蒿三錢 升麻一錢 麥冬三錢 甘草一錢 水煎服。

24. 溫病學³³⁾

1) 辨斑疹

凡斑疹初見，須用紙撚照見胸背兩脇。點大而在皮膚之上者爲斑，或雲頭隱隱 或瑣碎，小粒子爲疹，又宜見而不宜多見。按方書謂斑色紅者屬爲熱，紫者熱極 黑者胃爛，然亦必看外證所合，方可斷之。

若斑色者，小點者，心包熱也。點大而紫，胃中熱也。黑斑而光亮者，熱勝毒成 雖屬不治..... 如斑疹出而昏者，正不勝邪，內陷爲患，或胃津內涸之故。

然春夏之間，濕病俱發疹爲甚，且其色要辨。如淡紅色，四肢清，口不甚渴，脈不紅數，非虛斑即陰瘧。或胸微見數點，面赤足冷，或下利清穀，此陰盛格陽於上而見當溫之。

2) 發斑戰汗合論

凡疫邪留於氣分，解以戰汗。留於血分，解以

發斑。氣屬陽而輕清，血屬陰而重濁。是以邪在氣分即易疏透，邪在血分恒多膠滯，故陽主速而陰主遲，所以從戰汗者，可使頓解，從發斑者，當圖漸愈。

3) 論斑疹

余每論熱疫不是傷寒，傷寒不發斑疹。或曰熱疫不是傷寒固已。至云傷寒不發斑疹，古人何以謂傷寒熱未入胃，下之太早，熱乘虛入胃，故發斑。熱已入胃 不卽下之，熱不得泄，亦發斑。斯何謂欵？曰：古人以溫熱皆統於傷寒..... 既云熱入胃，縱非溫熱，亦是寒邪化熱，故可用白虎三黃化斑解毒等湯 以涼解也。

25. 清宮秘方³⁵⁾

1) 辨證論治五

一人有熱極發斑，身中如紅雲一片者，人以爲內熱之極，而外發於皮膚矣，孰知此熱鬱於內而不能外發之故乎..... 天下火盛者，水必衰，徒解其火而不益之以水，未必火之遠散也，宜於補水之中，而行其散火之法，則火無乾燥之虞，而有發越之易也。

○ 風水散斑湯

元蔘二兩 當歸二兩 荊芥三錢 升麻三錢 生地一兩

2) 辨證論治六

一熱極發斑，目睛露出，兩手如手冷者，人以爲心火內熱之極，而不知又有肝火以助之也。夫熱病宜現熱象，何以反見寒冷之證乎。蓋火極似水耳，夫火極而何以似水也，熱極於心中，則四肢之血，齊來救心，轉無血而兩手足，故手足反寒如冰之冷者，外寒之極也，外寒之極，實內熱之極也。至於目睛突出者，又是何故..... 治之法，宜瀉心中之火，而更平其肝木，則木氣既舒，而心火自散。

○ 風水散斑湯加減而症自愈也

元蔘二兩 當歸二兩 荊芥三錢 升麻三錢 生

地一兩

30. 傷寒溫病瘟疫證治會通要訣³⁴⁾

1) 瘟疫發斑證治

邪留血分氣壅閉，熱鬱發斑難透齊，通下腑實斑得透，邪毒隨斑外解畢。

斑出誤下傷中氣，邪毒內陷危重襲，宜用托裏舉斑湯，復振中氣把毒理。

○ 托裏舉斑湯

白芍 當歸 升麻 白芷 柴胡 穿山甲 生薑

2) 發斑·戰汗合論

疫邪留氣易透達，陽氣輕清戰汗佳，停留血分膠難解，陰血重濁從斑發，

從戰汗者可頓泄，發斑漸癒圖緩法。

26. 中醫臨床鑑別診斷學²⁾

1) 熱入營血發斑

症狀：多出現于急性熱病過程中。斑色鮮紅或紫赤 身熱不退 或發熱夜甚 心煩不寐 口渴咽乾 甚即神昏譫語 痙攣抽搐 小便短赤 大便乾結或溏泄 或伴有吐血 衄血 舌質紅絳 脈數。

治法：清營 涼血 散瘀

治方：犀角地黃湯 或 化斑湯

2) 陰虛火旺發斑

症狀：斑色鮮紅 時發時止 心煩不安 口乾咽燥 手足心熱 或午後潮熱 夜寐盜汗 頭暈耳鳴 或有鼻出血 齒齦出血 舌光紅 小苔 脈細數。

治法：滋陰降火 散瘀

治方：茜根散 或 知柏地黃丸

3) 脾不統血發斑

症狀：紅斑反復發作 斑色淡紅 隱而不顯 面色萎黃 神疲氣怯 食少腹脹 月經過多 經

色淺淡 大便溏薄 舌質淡胖 脈細弱無力。

治法：健脾為主 兼補氣血

治方：歸脾湯加味

4. 陽氣虧虛發斑

症狀：斑色淺淡 一般多見于胸腹部 心悸怔忡 倦怠乏力 四肢逆冷 或下利清穀 面色蒼白或虛浮 食少便溏 舌質胖嫩 逸布齒痕 小便清長 脈虛弱無力。

治法：補陽益氣為主 兼顧脾胃

治方：右歸丸

5. 氣滯血瘀發斑

症狀：多見于癥瘕積聚患者 斑色青紫 面色灰黯 或蒼黃 腹露青筋 皮膚血絲縷縷 嘔血 便血 或齒齦出血 舌色紫暗 脈弦或遲澀。

治法：活血化瘀

治方：八珍湯加 紅花 赤芍 鱉甲 丹蔘之類

6. 風濕熱鬱發斑

症狀：斑多程環形 或皮下有結節 反復發作 多發于四肢 斑形大小不一 環形斑中心色淺 四周隆起 全身關節疼痛 或關節紅腫 面色蒼白 多汗 重者胸悶氣短脈數。

治法：疏風清熱活血通絡

治方：蠲痺湯加忍冬藤 防己 木瓜

27. 中醫內科學¹⁶⁾

血液溢出于皮膚之間，皮膚表現青紫斑點，或半壞的病證，稱為紫斑。亦有稱為肌衄，發斑及葡萄疫者。

證治分類

1) 血熱妄行証

症狀：皮膚出現紫色紅斑點 或斑塊 或兼鼻衄 齒衄 尿血 便血 發熱 口渴 便秘 舌質紅苔黃 脈弦數

治法：清熱解毒 涼血散瘀

方藥：犀角地黄湯

2) 陰虛火旺証

症狀：皮膚青紫斑點 或斑壞時發時止 或兼鼻衄 齒衄 月經過多 顏紅 手足心熱 潮熱 心煩 盜汗 舌質紅苔少 脈細數

治法：滋陰降火 寧絡止血

方藥：茜根散

3) 氣不攝血証

症狀：反復肌衄 病程較長 過勞加重 食慾不振 身倦乏力 頭暈目眩 心悸氣短 面色蒼白 舌質淡 脈細弱

治法：益氣攝血

治方：歸脾湯

28. 中醫臨床大全¹⁾

1) 熱盛迫血

主症：起病突發 皮膚紫斑 大小不一 形狀不一 發熱 口渴 便秘 瀉赤 伴鼻衄 齒衄 瀉血 便血 舌質紅絳 苔黃燥 脈弦勁有力

治法：輕症- 清熱涼血

重症- 宜瀉火解毒 涼血止血

治方：輕症- 清營湯(犀角 生地 玄蔘 竹葉心 脈動 丹蔘 黃連 銀花 連翹)

中症- 犀角地黄湯合化斑湯加減(犀角 生地黃 芍藥 丹皮 石膏 知母 生甘草 玄蔘 粳米)

重症- 犀角地黄湯合三黃瀉心湯加減(犀角 生地 側柏葉 阿膠 槐花 連翹 紫草 丹皮 黃連 黃芩 梔子 大青葉 仙鶴草 生石膏 升麻)

2) 陰虛血熱

主症：皮膚疹斑 色紅 或紫紅 反復發作或時間較長 或有齒衄 鼻衄 伴有頭暈乏力 心煩少寐 潮熱盜汗 舌質紅 少苔 脈細數

治法：滋陰降火 寧絡止血

方藥：輕症- 茜根散(茜草根 側柏葉 黃芩 生

地 阿膠 甘草)

中症- 玉女煎加味(石膏 地黃 麥冬 知母 牛膝 加漢三七 茜草)

重症- 茜根散和二至丸加味(旱蓮草 女貞子 茜草根 黃芩 側柏葉 生地 阿膠 丹皮 仙鶴草 龜板)

3) 脾虛不攝

主症：散在性紫斑 色紫暗淡 長期均有反復發作 神情倦怠 遇勞加重 心悸氣短 口淡納呆 頭暈目眩 溲清便溏 舌體胖大 舌質淡 舌苔白 脈虛或弱

治法：益氣止血

方藥：輕症- 四君子湯加味(人蔘 白朮 茯苓 甘草 加仙鶴草 蒲黃 茜草根)

中症- 六君子湯加味(人蔘 白朮 茯苓 炙草 芩皮 半夏 加白芨 浙貝母)

重症- 歸脾湯加味(白朮 茯苓 黃芪 當歸 龍眼肉 酸棗仁 人蔘 木香 遠志 炙草 生薑 大棗 加血余炭 炮薑炭 漢三七)

29. 外科 皮膚科의 辨證論治³²⁾

1) 血熱型

主症：갑자기 發病한다. 皮疹은 皮膚의 表面보다 약간 隆起되어 있으며 어떠한 것은 融合되어 薄片狀을 보인다. 또는 血疱가 발생되는 경우도 있다. 瘙癢感을 느끼며 慢性的인 疲勞, 體熱, 口渴, 咽痛, 股關節痛, 腹痛, 血尿 등의 症狀이 있다. 舌質은 紅하고 舌苔는 薄黃하며 脈은 細數하거나 또는 弦細數하다.

辨證：血熱壅盛, 兼感風邪

治法：清熱涼血, 活血散風

處方：金銀花炭 板藍根 白茅根 生地炭 生槐花 各 20g, 牡丹皮 防風 茜草根 荊芥 各 10g 花粉 15g.

2) 脾虛型

主症: 發病過程이 緩慢하고 寒冷을 접하면 發病한다. 顔面은 黃色을 나타내고 運기가 없고 몸이 나른하고 無力한 症狀을 隨伴한다. 舌質은 淡하고 齒痕이 있으며 舌苔는 白하다. 脈은 細弱하거나 또는 沈緩하다.

辨證: 中氣不足 脾不統血

治法: 補中益氣 涼血止血

處方: 八珍湯加減(黃芪 人蔘 茯苓 各15g 白朮 當歸 白芍藥 蒲黃炭 地榆炭 枳殼 阿膠 各 10g)

IV. 總括 및 考察

1. 韓醫學的 考察

紫斑은 皮膚나 粘膜에 點狀 또는 斑狀의 出血을 主症狀으로 하는 全身性 出血傾向을 나타내는 病으로 肌膚表面에 片狀의 瘀斑이 出現하고 皮面이 高出되지 않아 어루만졌을 때 손에 거침이 없는 것으로, 韓醫學의 發斑이나 血證의 範疇에 屬한다⁸⁾.

紫斑은 各種의 疾病 中에 나타나며 그 形狀, 大小 및 顏色이 같지 않으며²⁾, 《金匱要略》³⁾에서 “陽毒之爲病, 面赤斑斑如錦門, 咽喉痛, 唾膿血. 陰毒之爲病, 面色青, 身痛如被杖, 咽喉痛”이라 하여 本病과 類似한 症狀을 最初로 言及된 이래 歷代醫家들이 發斑^{4,12,14,19,20,21,24,27,31,34)}, 斑疹^{5,6,14,15,17,20,25,26,29,33)}, 陰陽毒^{3,4,11,14,19,20)}, 葡萄疫^{7,13,18)}, 癩痧^{30,36)} 등의 各 各 不同한 名稱을 使用하였다²⁾.

1) 紫斑의 原因 對한 考察

歷代文獻에 나타난 紫斑의 病因을 보면, 巢登^{3,4,11,12,14,15,19,20,26-28,31)}은 “傷寒病에 證在表한데 或未發汗하거나, 或經發汗未解하고 或吐下後

而熱不除하여 毒氣가 盛한 所致이며, 毒氣未散하고 表가 이미 虛한데 熱毒이 虛를 乘하여 出于皮膚하여 發斑을 일으킨다.”하였고, “斑毒之病, 是熱氣入胃, 而胃主肌肉, 其熱挾毒蘊積于胃, 毒氣熏發于肌肉”이라 하여 病因을 熱毒蘊積于胃로 보았으며, 특히 巢⁴⁾는 傷寒斑瘡候, 傷寒陰陽毒, 瘟病發斑候, 熱病斑瘡候, 時行發斑候外에 內科雜病 및 小兒科에서 나타나는 紫斑을 包括하여 分類하였다¹⁾.

陳¹¹⁾은 發斑의 原因을 腸胃燥熱 및 妄服燥藥, 熱食所致로 보았고, 李¹⁷⁾는 母血穢蘊而成毒, 小兒 因天冷, 傷表, 傷裏로 發斑이 나타난다고 하였다.

朱⁵⁾는 發斑의 主 病因을 熱盛의 所致로 認知하였을 뿐 아니라, “內傷發斑者, 胃氣極虛, 一身火流行于外所致”라 하여 內傷發斑의 概念을 最初로 言及하였다.

陳^{7,13,18)} 등은 “葡萄疫은 小兒에서 多生하는 疾患으로, 感受四時不正之氣로 인하여 鬱于皮膚不散하고 大小靑紫斑點을 이루는 것으로 色은 마치 葡萄와 같고 遍體頭面에 發한다..... 邪毒傳胃하면 牙根出血하고 久卽虛人하여 斑點方退한다.”라 하여 四時不正之氣로 인하여 發生하고, 發斑의 靑紫顏色과 紫葡萄가 비슷한 形狀을 보고 葡萄疫이라 稱하였으며, 吳^{13,18)}은 이런 陳의 理論과 相合하여 葡萄疫에 對한 理論을 提示했으며, 특히 吳¹³⁾는 “發于遍身, 惟腿脛居多”라 하여 發病部位가 下肢에 많은 特征적인 症狀을 記述하였다.

李⁶⁾는 發斑을 外感, 內傷, 內傷兼外感으로 分類하여 治療하였으며, 龔¹²⁾은 “무릇 斑이 이미 出하여 모름지기 脈洪數有力하고 身溫 足溫한 者는 易治하고 만약 脈沈小하고 足冷 元氣虛弱者는 難治이다. 發斑紅赤은 胃熱이고 만약 紫色이면서 不赤하면 熱이 甚한 경우이며, 紫黑한 경우는 胃熾한 것이다. 赤斑이면 半生半死하고 黑斑이면 九死一生하며, 大抵 色이 鮮紅하며 稀朗한 者는 吉하고 紫黑者는 難治이며, 雜黑斑熾者는 死한다.”하여 發斑의

原因과 豫後에 대하여 言及했다.

許 등^{6,14,20}은 腎氣太虛하고 陰盛于下한데 無根之火가 聚于胸中하여 陰癰이 나타난다고 보았으며, 李¹⁴는 “熱即傷血, 血熱不散, 裏實表虛, 出于皮膚而爲斑也”라 하여 血熱을 病因으로 보았고, 發斑을 外感發斑, 內傷發斑, 陰證發斑으로 分類하였는데, 外感發斑은 傷寒發斑, 時氣發斑, 陽毒發斑, 溫毒發斑 四症으로 區分하고 그 原因을 邪熱在表한데, 不當下而下之하여 乘虛入胃한 所致와 胃熱不泄로 보았고, 內傷發斑의 原因은 勞役過度로 인해 胃氣極虛하거나 他症汗吐下後 中氣虛乏으로 보았으며, 陰證發斑은 腎氣太虛하여 無根之火가 聚于胸中하고 肺를 上薰하여 發하는 것으로 보았다.

康¹⁵은 傷寒發斑을 陽毒, 春溫發斑을 溫毒, 夏熱發斑을 熱毒, 時行發斑을 時毒으로 分類하고 그 原因을 모두 火로 보았으며, 沈¹⁹은 溫毒發斑은 失于汗下로 因하여 熱毒內攻不得散하여 蘊結陽明하거나 汗下不解하여 發하는 것이고, 陽毒發斑은 陽邪亢極 或은 辛熱之物을 誤服하여 發生한 것이며, 陰毒發斑은 房後着寒, 內傷生冷寒物한데 犯故事로 인해 陰邪至極으로 인해 나타난다고 보았다.

특히 吳 등^{13,14,19,30}은 “傷寒疹斑失汗下, 時氣初感即其然 表邪覆營衛分”하여 紫斑을 溫病의 病機로 說明하였다.

《中醫臨床大全》¹¹에서는 熱盛迫血, 陰虛火旺, 脾虛不攝 《中醫內科學》¹⁶에서는 血熱妄行, 陰虛火旺, 氣不攝血 《中醫症狀鑑別診斷學》²에서는 熱入營血, 陰虛火旺, 脾不統血, 陽氣虧虛, 氣滯血瘀, 風濕熱鬱로 인해 發斑이 나타난다고 보았다.

以上을 살펴보면 紫斑의 病因을 虛證와 實證로 나눌 수 있으며, 虛證은 胃氣極虛로 因해 一身之火가 外行하는 所致, 또는 陰虛火旺, 脾虛不攝 등으로, 實證은 熱毒蘊積于胃, 毒氣薰發於肌肉하거나, 胃熱, 血熱, 四時不正之氣 등으로 分類하여 辨證할 수 있다. 【Table - 1】 또한, 清代以前에는 紫斑의 病因을 “傷寒病, 證

在表, 或未發汗. 或經發汗未解, 或吐下後而熱不除, 此毒氣盛故也. 毒氣未散, 而表已虛, 熱毒乘虛出于皮膚, 所以發斑”라 하여 傷寒傳變에 의한 熱毒으로 辨證하였고, 朱는 氣血虛 즉 胃氣極虛로 인한 內傷發斑의 概念을 導入하였으며, 清代부터는 紫斑의 病因을 “傷寒疹斑失汗下, 時氣初感即其然 表邪覆營衛分”이라 하여 溫病學說의 발달에 따라 衛氣營血 辨證을 도입하여 說明한 것으로 思料된다.

2) 紫斑의 治法, 治方에 대한 考察

紫斑의 治療는 《金匱要略》³에서 陽毒에 升麻鱉甲湯, 陰毒에 升麻鱉甲湯去 雄黃, 蜀椒를 사용한 이래 巢⁴는 특별한 治方은 言及하지 않았으나 治療方面에서 “凡發斑不可用發表藥.....表虛故也”라하여 發表藥을 禁忌할 것을 제시했다.

王²¹은 天行發斑에 蜜을 遍身瘡上에 摩하거나, 蜜煎升麻를 拭하거나, 水蜜煎升麻로 漬錦洗之 등으로 外治法을 使用한 것 외에 溫病發斑에는 黑膏方, 葛根橘皮湯, 香豉湯, 黑奴丸 등의 治方을 提示하였고, 陳¹¹은 治療方面에 있어서 清熱解毒, 清瀉胃熱, 養血消斑, 通腑瀉熱하는 黑奴丸, 升麻湯을 使用하였다.

劉²⁴는 紫斑을 “胃熱發斑에는 白虎湯加 人蔘 白朮, 陽明胃熱發斑한데 脈沈한 者는 三一承氣湯으로 下한다.”하여 清熱攻下法을 多用하였고, 특히 朱⁵는 內傷發斑을 最初로 言及하면서 補以降하는 大建中湯을 活用하였으며, 이런 朱⁵의 理論은 그 후 醫家들의 理論에 많은 影響을 미친 것으로 思料된다.

李⁶는 “外因의 경우 初期頭疼하고, 身大熱하며 口知味하는 者로 治法으로는 大汗下를 禁하고 마땅히 解肌微汗해야 하며 스스로 吐瀉하는 者는 愈한다.”하여 敗毒散加 紫草, 升麻葛根湯加 玄蔘 등의 治方을 活用하였고, “內因의 경우는 頭或微疼하고 但手心熱하여 脾胃가 虛한 者는 마땅히 大補하여 降其火한다.”하였으며, 內傷發斑의 症狀으로 初期 頭疼

身熱의 表證이 없으며 治方으로는 調中益氣湯, 黃芪健中湯을 活用하였고, 內傷挾外感者에는 調中疏邪湯, 蔘蘇飲을 活用하였다.

陳⁷⁾은 “葡萄疫은 初起에는 清熱涼血하는 羚羊角散을, 久病人 경우 滋益其內하는 胃脾湯을 사용하며, 牙根腐爛을 隨伴하는 경우 에는 人中白散을 活用했다.

李¹⁴⁾는 外感發斑은 먼저 辛涼藥으로 徹其表한 後 寒涼藥으로 清其中한다 하였고, 內傷發斑의 경우는 涼藥의 不可妄行을 警告하며 大建中湯을 活用하였으며, 陰證發斑에는 調中湯을 使用하였다. 또한 外治法으로 斑欲出未透인 경우 乾葛, 蟬蛻, 蘇葉을 煎湯하여 揩之하거나, 蔥白을 擦하거나, 혹 薑汁을 噴하는 方法을 提示하였다.

沈¹⁹⁾은 紫斑을 《春溫病源流篇》에서는 溫毒發斑에는 升麻葛根湯, 犀角黑蔘湯, 黃連解毒湯之類를 活用하였고, 《陽毒陰毒源流篇》에서는 陽毒發斑에 升麻鱉甲湯, 陽毒升麻湯, 犀角黑蔘湯, 黑奴丸之類 등을 活用하였으며, 陰毒發斑의 原因을 陰邪至極이라하여 附子理中湯, 正陽散, 復陽丹, 破陰丹, 退陰散, 回陽救急湯 등을 活用하였다.

現代文獻을 살펴보면 《中醫臨床大全》¹⁾에서는 發斑의 原因을 熱盛迫血, 陰虛血熱, 脾虛不攝으로 分類하고 熱盛迫血인 경우에는 清熱涼血하는 清營湯, 瀉火解毒 涼血止血하는 犀角地黃湯合化斑湯 或은 犀角地黃湯合三黃瀉心湯加減을 活用하였으며, 陰虛火動인 경우 滋陰降火 寧絡止血하는 茜根散, 玉女煎, 茜根散合二至丸加味를 使用하였고, 脾虛不攝인 경우는 益氣止血하는 四君子湯加味, 六君子湯加味, 歸脾湯加味 등의 治法, 治方을 使用하였다. 【Table-2】

以上을 살펴보면 金元시대까지는 紫斑의 原因을 傷寒傳變에 의한 胃의 熱毒으로 파악하고 清熱解毒, 清瀉胃熱, 養血消斑, 通腑瀉熱의 治法을 活用했으며, 明清 이후에는 각각의 原因에 대하여 外感에는 먼저 辛涼藥으로 徹其表한

後 寒涼藥으로 清其中하는 治法을 活用했고, 內傷發斑에는 大補以降其火하는 治法을 活用하였다. 가장 活用頻도가 높은 處方은 清熱解毒, 清瀉胃熱하는 化斑湯이었으며 升麻玄蔘湯, 調中湯 등이었다. 【Table-2】 外治法으로는 蜜, 升麻, 芒硝猪膽汁, 乾葛·蟬退·蘇葉, 蔥白, 薑汁등이 使用되었고, 妊婦斑疹에는 井底泥가 使用되었으며, 藥物로는 升麻, 黃芩, 人蔘, 石膏, 犀角, 玄蔘, 梔子 順으로 多用되었다.

【Table - 3】

以上으로 紫斑의 原因과 治療에 대하여 살펴보았으며, 紫斑의 韓醫學的인 보다 체계적인 認識 및 治療方法에 대한 積極的인 研究가 필요하다고 思料된다.

2. 西洋醫學的 考察

紫斑은 眞皮내지 皮下組織內에서 出血에 의해 생기는 자줏빛을 띠는 皮疹을 말하며, 紫斑病이라고도 한다²²⁾.

1) 紫斑의 分類

紫斑症은 血小板減少性 紫斑症과 非血小板減少性 紫斑症으로 분류한다. 血小板減少性 紫斑症에는 血小板壽命의 減少에 의한 것과 骨髓의 形成不全에 의한 것이 있으며, 非血小板減少性 紫斑症에는 알레르기성과 血小板의 質的 機能不全에 의한 것이 있다⁸⁾.

2) 血小板減少에 의한 紫斑

① 特發性 血小板減少性 紫斑症 (ITP, Idiopathic thrombocytopenic purpura)

○ 診斷要點 : petechia⁸⁾ 및 ecchymosis⁹⁾, 血小板數의 減少, 血小板 抗體檢査의 陽性, 골수소견상 거핵구의 수의 增加가 있으며, 一般的으로 急性 ITP는 出血性 疾患 中에서 가

8) 점상출혈

9) 반상출혈

장 높은 發生頻도를 나타내고 있다. 특히 15세 以下에서 急性 ITP 發生頻도가 높으며 대부분의 바이러스감염 後에 發病한다. ITP는 대부분 자연치유되는 疾患으로 대증요법으로도 4-6주 이내에 회복되는 것이 보통이며, 적어도 1년 이내에 90% 이상이 완전 회복되는 것으로 보고되고 있다²³⁾.

○ 症狀

急性 : 急性 ITP는 小兒 특히 2-6세에 많고 이중 약 70%에서 바이러스성 감염이 선행한 후 약 2주에서 紫斑症이 출현한다. 또한 急性型에서는 血小板抗體가 잘 證明되지 않으며, 갑자기 시작하여 各種出血을 일으키고 皮下出血은 흔히 나타나서 點狀出血에서 斑狀出血까지 出血斑을 볼 수 있으며, 粘膜炎도 흔히 나타나고 특히 鼻出血과 子宮出血이 잘 일어나며 가끔 齒齦出血이나 吐血, 下血이 나타나기도 한다.

慢性 : 慢性 ITP는 사춘기이후의 成人에 많고 男子보다 女子에게 더 자주 발생한다. 急性型의 약 80%이상에서 자연 완해되어 이중 1/2은 1개월 이내에 나머지는 4개월 이내에 낫는데 비하여 慢性型은 자연 완해되는 경우가 드물다. 臨床症狀으로는 서서히 시작하여 완만한 경과를 보이고 病程도 길다. 發作과 緩解가 交代로 나타나서 저절로 좋아지거나 악화하거나 하며 좋아지더라도 완전히 좋아지지는 않는다. 發作時에는 皮膚에 紫斑이 나타나는데 下肢에 현저하게 나타난다. 出血은 急性에 비해 輕하여 中等度の 出血 경향을 나타내며, 가끔 鼻出血이나 齒齦出血 또는 月經過多 등이 나타나고 外傷에 의한 紫斑症은 쉽게 나타난다. ITP患者의 妊娠婦는 血小板減少症을 가진 아기를 낳는 경우가 많다.

○ 檢査所見

急性 : 血小板數는 40,000이하로 減少되는데 이는 血小板 壽命의 短縮에 기인한다. 또한 出血時間(bleeding time)은 연장되어 있으나, PT, PTT 또는 그 외의 혈액응고검사는

正常이다.

慢性 : 血小板減少는 急性보다 심하지 않으며(50,000-100,000), 血小板의 형태에 이상을 초래하여 크거나 불규칙하거나 奇形의 이상한 모양으로 나타난다. 또한 出血時間이 연장되고, 90%이상에서 血小板抗體가 證明된다⁸⁾.

○ 治療

· 일반적인 治療로는 外傷을 받지 않도록 주의하는 것이 가장 중요하다. 특히 外傷으로 인한 頭蓋腔內 出血은 死亡은 가장 큰 原因이 되고 있다. 대부분의 경우 특수 치료가 필요없이 자연 치유된다. 다량의 出血으로 인한 심한 貧血이 동반되었을 경우에는 輸血로 보충해 줄 수 있다. 일반적으로 血小板輸血은 효과가 없다.

· 血小板數가 10,000/mm³이하이면서 出血現狀이 계속 진행될 경우에는 predni-sone 또는 prednisolone 2mg/kg/일을 경구적으로 사용할 수 있다. 2-3주 계속하다가 용량을 점차로 감량하면서 투약을 중지해야 한다.

· 최근에 개발된 방법으로는 고단위의 γ -globulin을 정맥 내로 주입하는 방법이 있다.

· 화학요법으로 만성 ITP인 경우 비장적출이 적용되는 환자에게 비장적출 전 또는 비장적출 후에도 계속 혈소판 감소현상이 있을 경우 vincristine, azathioprine등과 같은 화학요법을 시도해 볼 수 있다.

· 일반적으로 血小板減少가 1년 이상 지속될 경우 비장적출이 적용된다³⁴⁾.

② 藥物로 인한 血小板 減少症

藥物誘發性 血小板 抗體에 의한 血小板減少性 紫斑症을 말하며, 無巨核敍性인 경우와 巨核敍性인 경우로 區分된다.

○ 原因 : 골수기능을 저하시킬 수 있는 藥物이나 化學的 毒物質 등에 접촉되었을 때는 거핵구의 減少와 동시에 다른 血球들의 減少도 동반된다. 따라서 이런 경우는 재생불량성 빈혈 같은 症狀을 나타내게 된다. 반대로 거

핵구가 충분히 있으면서 血小板 減少가 있을 경우에는 藥物의 감각에 의한 것으로서 면역학적 기전에 의하여 發生된다. 대표적인 藥物로는 quinidine 또는 quinine등을 들 수 있다.

○ 治療 : 原因藥物의 제거로 쉽게 治療 될 수 있다²³⁾.

3) 非血小板減少性 紫斑症

① 알레르기성 紫斑

○ 臨床的所見 : Rheumatic열 때와 비슷하게 유주성 多發關節炎을 호소하면서 皮膚, 특히 下肢附近에 出血性 斑點이 나타나는 것이 특징이다. 대부분의 경우 腹痛이나 腸出血이 동반된다. 약 50%에서 腎臟炎이 합병되는데, 그 정도는 각기 다르게 나타난다. 가장 특징적인 所見으로는 皮膚病變으로서 처음에는 직경이 몇mm정도 크기의 鮮紅色을 띠고 皮膚表面으로부터 두드러진 發疹을 보이다가 시간이 지나면 여러 개가 합쳐지면서 큰 紫斑을 형성하게 된다. 好發하는 部位는 발목, 넓적다리, 그리고 팔꿈치 등이다.

○ 檢査所見

血小板數 및 機能檢査, 出血時間, PT (Prothrombine Time), PTT(partial thrombo-plastin time), 그리고 tourniquet檢査가 모두

정상이다. 小便檢査에서 血尿 또는 蛋白尿를 볼 수 있고 便檢査에서도 潛血이 陽性으로 나타날 수 있다. 많은 경우에 바이러스 感染이나 A군 β-hemolytic 연쇄상구균에 의한 感染 후에 發生되므로 ASO(antistreptolysin-O) titer의 上升을 흔히 볼 수 있다. 혈청 IgA의 상승을 약 50% 患者에서 볼 수 있다.

○ 合病症 : 가장 중요한 合病症은 腎臟炎으로서 약 50% 정도에서 합병이 된다. 그 중 약 10%에서는 腎不全症까지 야기시킬 수 있다. 장관벽 내 出血로 인해 흔히 장중첩증도 동반될 수 있으므로 심한 腹痛을 계속 호소할 경우에는 장중첩증을 의심해 보아야 한다.

○ 治療 : 특수한 治療法은 없다. 關節痛, 腹痛이 輕할 경우에는 aspirin 또는 acetaminophen으로 輕減이 된다. 效果가 없는 경우 corticosteroid를 사용할 수도 있다²³⁾.

그 밖에 血小板의 質的 機能障導 중 先天性 血小板障導에는 Granzmann病, Bernard-Soulier 症候群, Von Willebrand病이 있으며 後天性에는 aspirin, 抗히스타민제, 抗生劑, alcohol, dextran, corticosteroid등의 藥物과 尿毒症, 白血病, 肝疾患, 先天性心臟病 等の 疾病이 있다⁸⁾.

【Table - 1】 原因分類

	原 因	參 考 文 獻 番 號
實 證	熱毒(13회)	3) 4) 11) 12) 14) 15) 19) 20) 21) 26) 27) 28) 31)
	胃熱(3회)	20) 24) 29)
	血熱(1회)	14)
	四時不正之氣(4회)	7) 13) 18) 31)
	風熱挾痰(3회)	5) 6) 25)
	陰邪至極(1회)	19)
虛 證	胃氣極虛(7회)	5) 6) 14) 19) 21) 25) 26)
	無根之火(3회)	6) 14) 20)
기타	風濕	26)
	母血穢蘊而成毒(1회)	30)

【Table - 2】處方分類

횟수	參 考 文 獻
10회	化斑湯(人蔘白虎湯) ^{5,6,12,15,17,20,26,27,29)}
6회	玄蔘升麻湯 ^{5,6,14,15,20,27)}
5회	調中湯 ^{5,14,20,26,27)} 消斑青黛飲 ^{13,15,19,20,25)} 黑奴丸 ⁶¹¹¹⁹²¹²⁶⁾
4회	陽毒升麻湯 ^{6,19,20,26)} 升麻葛根湯 ^{12,15,19,26)} 升麻鱉甲湯 ^{3,19,26,28)} 黑膏 ^{5,20,21,26)} 三黃石膏湯 ^{13,15,19,20)}
3회	通聖散 ^{5,25,26)} 犀角玄蔘湯 ^{12,15,20)} 調中益氣湯 ^{5,14,20)} 胃脾湯 ^{7,13,18)} 羚羊角散 ^{7,13,18)} 葛根橘皮湯 ^{20,21,26)} 人蔘化斑湯 ^{12,14,19)} 防風通聖散 ^{6,12,27)} 犀角地黃湯 ^{16,17,19)} 大建中湯 ^{5,14,20)}
2회	消毒犀角飲子 ^{5,25)} 陽毒梔子湯 ^{26,27)} 犀角消毒湯 ^{12,27)} 黃芪健中湯 ^{5,20)} 黃連橘皮湯 ^{21,25)} 升麻湯 ^{11,12)} 涼膈散 ^{19,24)} 解毒防風湯 ^{17,27)} 梔子大青散 ^{15,20)}
1회	黃連解毒湯 ¹⁹⁾ 白虎湯 ²⁰⁾ 升麻鱉甲湯去雄黃蜀椒 ³⁾ 香豉湯 ²¹⁾ 漏蘆橘皮湯 ²¹⁾ 白虎湯加人蔘白朮 ²⁴⁾ 三一承氣湯 ²⁴⁾ 涼膈散加滑石調五苓散 ²⁴⁾ 瓜蒂散 ²⁴⁾ 當歸丸 ¹⁷⁾ 棗變百祥丸 ¹⁷⁾ 地骨皮鼠黏子湯 ¹⁷⁾ 甘草鼠黏子湯 ¹⁷⁾ 桔梗甘草梔子湯 ¹⁷⁾ 紫草茸甘草枳殼湯 ¹⁷⁾ 荊芥甘草防風湯 ¹⁷⁾ 升麻加紫草湯 ¹⁷⁾ 防風芍藥甘草湯 ¹⁷⁾ 連翹防風湯 ¹⁷⁾ 白虎湯合黃連解毒湯 ¹⁹⁾ 犀角大黃湯 ¹⁹⁾ 黃連解毒湯合犀角地黃湯 ¹⁹⁾ 大柴胡湯 ¹⁹⁾ 犀角黑蔘湯 ¹⁹⁾ 三黃巨勝湯 ¹⁹⁾ 大承氣湯 ¹⁹⁾ 附子理中湯 ¹⁹⁾ 附子散 ¹⁹⁾ 人蔘三白四逆湯 ¹⁹⁾ 正陽丹 ¹⁹⁾ 復陽丹 ¹⁹⁾ 還陽散 ¹⁹⁾ 破陰丹 ¹⁹⁾ 退陰散 ¹⁹⁾ 回陽救急湯 ¹⁹⁾ 甘草湯 ¹⁹⁾ 金液丹 ¹⁹⁾ 來復丹 ¹⁹⁾ 瀉心湯 ²⁰⁾ 調胃承氣湯 ²⁰⁾ 豬膽鷄子湯 ²⁰⁾ 風水散斑湯 ³¹⁾ 麻黃鱉甲湯 ²⁰⁾ 升麻玄蔘湯 ¹⁴⁾ 疏風百解散 ¹⁴⁾ 鼠黏子湯 ¹⁴⁾ 梔子仁湯 ²⁵⁾ 消風散 ²⁶⁾ 解毒消毒飲 ²⁶⁾ 大青四物湯 ²⁶⁾ 加味敗毒散 ²⁶⁾ 敗毒散加紫草 ⁶⁾ 升麻葛根湯加玄蔘 ⁶⁾ 調中疏邪湯 ⁶⁾ 蔘蘇飲 ⁶⁾ 人中白散 ⁷⁾ 非疔散 ¹³⁾ 消斑化疹湯 ³¹⁾ 理中湯 ²⁹⁾

【Table - 3】藥物分類

순번	藥物	횟수	순번	藥物	횟수	순번	藥物	횟수	순번	藥物	횟수	순번	藥物	횟수
1	甘草	76	25	大棗	12	49	枳實	5	73	梁上塵	2	97	貝母	1
2	升麻	44	26	羌活	11	50	薄荷	5	74	黑參	2	98	牡蠣	1
3	黃芩	38	27	川芎	11	51	砂仁	5	73	金銀花	2	99	鬱金	1
4	人參	32	28	大黃	11	52	麥門冬	5	76	花粉	2	100	人中白	1
5	生薑	28	29	牛蒡子	11	53	硫黃	5	77	石菖蒲	2	101	五倍子	1
6	石膏	27	30	豆豉	11	54	麝香	4	78	蟬退	2	102	穿山甲	1
7	犀角	24	31	蒼朮	10	55	蜀椒	4	79	鷄子	2	103	牡丹皮	1
8	玄參	23	32	枳殼	9	56	厚朴	4	80	沙參	2	104	皂角刺	1
9	知母	21	33	桔梗	9	57	豬膽	4	81	遠志	2	105	華澄茄	1
10	麻黃	20	34	雄黃	8	58	羚羊角	4	82	茯神	2	106	吳茱萸	1
11	梔子	20	35	附子	8	59	茯苓	4	83	川椒	2	107	全蝎	1
12	芍藥	19	36	青黛	7	60	豬膏	3	84	硝石	2	108	川烏	1
13	荊芥	18	37	白芷	7	61	梔子仁	3	85	元精石	2	109	五靈脂	1
14	當歸	18	38	粳米	7	62	地骨皮	3	86	冰片	1	110	青皮	1
15	黃連	16	39	葱白	7	63	竹葉	3	87	漏蘆	1	111	官棟參	1
16	防風	15	40	橘皮	7	64	五味子	3	88	甘遂	1	112	釜底默	1
17	葛根	14	41	桂枝	7	65	肉桂	3	89	鼠黏子	1	113	鼠尾默	1
18	白朮	14	42	連翹	7	66	元參	3	90	白僵蠶	1			
19	柴胡	13	43	黃柏	7	67	滑石	3	91	橘紅	1			
20	半夏	13	44	生地黃	6	68	香附子	3	92	麻子仁	1			
21	大青	12	45	射干	6	69	木香	3	93	阿膠	1			
22	芒硝	12	46	黃芪	6	70	小麥奴	2	94	獨活	1			
23	杏仁	12	47	藿香	6	71	桂心	2	95	前胡	1			
24	陳皮	12	48	鱉甲	5	72	釜底磷	2	96	紫草	1			

V. 結 論

古代로부터 清代에 이르기까지 23種의 韓醫學 文獻考察을 통하여 紫斑의 原因 및 治方을 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 紫斑은 血液이 肌膚之間에 溢出하여 皮膚에 紫色의 斑點 或은 斑塊를 일으키는 疾病으로 發斑, 血證의 範疇에 屬한다.
2. 紫斑은 古代에는 發斑, 斑疹, 陰陽毒, 葡萄疫, 癩痧 등으로 命名하였다.
3. 紫斑의 韓醫學의 病因에 있어서 虛證은 胃氣極虛, 無根之火로 實證은 熱毒蘊積于胃, 血熱, 四時不正之氣, 陰邪之極, 風熱挾痰으로 分類할 수 있다.
4. 紫斑에 대한 處方은 實證에는 化斑湯이 가장 活用頻도가 높았으며, 그 다음으로 玄蓼升麻湯, 調中湯, 犀角青黛飲, 黑奴丸 등이 多用되었고, 虛證에는 調中益氣湯, 胃脾湯, 大建中湯, 黃芪健中湯이 多用되었다.
5. 紫斑에 대한 外用藥으로는 蜜, 升麻, 芒硝, 豬膽汁, 乾葛, 蟬退, 蘇葉, 蔥白, 薑汁 등이 使用되었으며, 妊婦斑疹에는 井底泥가 使用되었다.
6. 紫斑에 活用되는 藥物로는 升麻, 黃芩, 人蔘, 石膏, 犀角, 玄蓼, 梔子 등이 多用되었다.

參 考 文 獻

1. 楊思澍外: 中醫臨床大全, 北京, 北京科學技術出版社, 1991, pp.456-460
2. 中醫研究院: 中醫症狀鑑別診斷學, 北京, 人民衛生出版社, 1987, pp.48-50
3. 張仲景: 金匱要略, 北京, 人民衛生出版社, 1989, pp.108-112
4. 巢元方: 巢氏諸病源候論, 北京, 人民衛生出版社, 1983, p.244, 277, 315, 335, 348
5. 朱震亨: 丹溪醫集, 北京, 人民衛生出版社, 1993, pp.221,222
6. 李梴: 醫學入門, 서울, 高麗醫學, 1987, p.367
7. 陳實功: 外科正宗, 北京, 人民衛生出版社, 1983, pp.281, 282
8. 金秉雲외: 肝系內科學, 서울, 東양의학연구원출판사, 1989, pp.425-433
9. 金洪培: 소아 알레르기성 紫斑症, 慶熙大學校大學院, 1982.
10. 신성호: 소아 알레르기성 자반증의 임상적 고찰 및 스테로이드 치료가 알레르기성 자반증 신장염에 미치는 영향, 중앙대학교대학원, 1994.
11. 陳無擇: 三因方, 臺北, 臺聯國風出版社, 1978, 卷5, pp.1-5
12. 龔延賢, 萬病回春, 香港宇宙出版工社, 香港, pp.181-182
13. 吳謙: 醫宗金鑑, 서울, 大星文化社, 1994, pp.504, 505, 612-614
14. 李用粹: 證治彙補, 臺北, 旋風出版社, 1976, pp.170-175
15. 康命吉: 原本濟衆新篇, pp.149,150
16. 張伯叟: 中醫內科學, 北京, 人民衛生出版社, 1988, pp.190-196
17. 李東垣: 東垣十種醫書, 臺北, 五洲出版社, 1984, pp.687-696
18. 祁坤: 外科大成, 臺北, 文光圖書有限公司, 1979, PP.369,370
19. 沈金鰲: 雜病源流犀燭, 北京, 中國中醫藥出版社, 1994, pp.299-319
20. 許浚: 東醫寶鑑 聯合醫書 第2卷, 1990, pp.390-394

21. 王燾：外臺秘要，臺北，文光圖書有限公司，卷上，pp.119133,134
22. 新太陽社編輯局 百科事典部：原色最新醫療大百科事典，서울，圖書出版社 新太陽社，1996，第22卷，p.93
23. 醫學教育研修院：家庭醫學，서울，서울大學校出版部，1987，pp.368-374
24. 劉河間：劉河間傷寒六書，서울，成輔社，1976，p.375
25. 朱震亨：編註 丹溪心法附餘，서울，大星社，1993，pp.447,448
26. 虞搏：醫學正傳，成輔社，서울，1986，pp.56-61.
27. 徐春甫：古今醫統大全，北京，人民衛生出版社，1994，p72-73
28. 趙獻可：醫貫，서울，圖書出版鼎談，p.33
29. 陳復正：幼幼集成，北京，人民衛生出版社，1988，pp.364-365
30. 葉桂：新教本 臨證指南醫案，新文豐出版公司，臺北，1980，pp.367-372.
31. 陣士鐸：辨證錄，北京，人民衛生出版社，1989，pp.842-846
32. 柳志允：外科 皮膚科의 辨證論治，서울，書苑堂，1987，p239,240
33. 孟樹江：溫病學，台北，知音出版社，1991，pp.78-81， 347-351， 474， 484， 485， 645-651
34. 載新民：傷寒溫病瘟疫證治會通要訣，台北，啓業書局有限公司，1986，pp.178,179
35. 甘地出版社編輯局：辨證專門全書 清宮秘方，台北，甘地出版社，1980，p.282~283
36. 王新華：中醫歷代醫家選論，江蘇城，江蘇科學技術出版社，1983，pp.552， 553