

經驗方

金 洙 珩



1. 肺癌, 肺癰(未破者)

(1) 全肺湯 - 金銀花 十兩 玄蔘 三兩 麥門冬 二兩 生甘草 五錢 天花粉 百茯苓 白芍藥 各三錢

- 功用 肺癰 肺癌 三 ~ 五貼用(未破腫者用之)
- 用法 ① 金銀花 十兩 水十碗 煎至 四碗各金銀汁

② 金銀汁 二碗 餘藥六味入하고 更加生水 二碗 煎至二碗

③ 金銀滓 + 六味滓 + 金銀汁 二碗 生水二碗 煎至 二碗

④ ②번二碗 + ③ 二碗 煎至 二碗 分二回 朝夕 食後 30分 服用

- 由來 辨證錄
- 提供 金洙珩

2. 肺癌 肺癰(已破者)

(1) 完肺湯 - 金銀花 玄蔘 各二兩 人蔘 一兩 蒲公英 五錢 天花粉 生甘草 桔梗 各三錢 黃芩 一錢

- 功用 . 肺癌 肺癰 已破潰者 十餘貼 用之夾 肺癰 癌 未破者는 易于消腫이나 已破者는 難于治之다
- 用法 : 水煎 食後服之
- 由來 . 辨證錄
- 提供 . 金洙珩

3. 胃癌 反胃初期

(1) 加味正元散 - 香附子 黃芩 藿香 陳皮 白朮 桔梗 山查肉 枳殼 黑丑 各二錢

柴胡 川練子 五靈脂炒 當歸酒洗 木香 川芎 厚朴 玄胡索 胡黃連 連子肉 各一錢 月砂 仁 木通 杏仁 大茴香 沒藥 木賊 草果 甘草 各五卜

- 功用 . 中脘部位가 腫塊而堅如石하고 消化不良 間間嘔吐 三劑服而有效
- 用法 : 水煎食遠服 日三回
- 由來 . 經驗方
- 提供 . 金洙珪

4. 反胃 嘔吐

(1) 止嘔湯 - 竹茹 陳皮 枳實炒 日砂仁 當歸酒洗 香附子便炒 白朮土炒 杏仁 神曲炒 檳榔 各一錢

- 功用 . 治反胃 嘔吐 及 諸癰腫 嘔吐而食과 藥이 入則 即時吐하여 諸物而不納者 二~三貼而有效
- 用法 . 黃土 二合을 必히 去石하고 最高極熱로 炒하며 水에 浸하여 其水로 煎上藥 而無時服而 限止嘔時한다
- 由來 . 先代 傳受方
- 提供 . 金洙珪

5. 肝癰, 肝癌方

(1) 枝肝散毒湯 - 金銀花 十兩 白芍藥 三兩 當歸 二兩 梔子炒 三錢 生甘草 三錢

- 功用 肝癌 初期 二~三貼用 次藥服後瀉則可治, 無瀉則不治
- 用法 ① 金銀花 十兩에 水十碗을 부어서 煎至四碗 分1/2씩 二碗씩 各金銀汁
- ② 金銀花 二碗入 上記藥四味하고 再加生水 二碗하여 煎至 二碗하고 取滓
- ③ 滓金銀花 滓四味藥에 金銀花汁二碗 生水二碗 煎至 二碗
- ④ ②번 二碗과 ③번二碗 合하여 煎至二碗하여 空心에 每一碗式 服用 二回 則 泄瀉而 惡物而 出則 蘇生可也
- 由來 : 石室秘錄
- 提供 . 金洙珪

■ 經驗方

(2) 紅肝散 - 黃芪蜜灸 金銀花 各五錢 紅花 玄胡索 桔梗 各三錢 五靈脂炒 蒲黃炒 白薇 細辛 各二錢 三稜竝醋炒 蓬朮竝醋炒 乾干炒黑 山桃仁 杏仁 滑石 甘草 各一錢

- 功用：肝癌 先 援肝 散毒湯 1~2貼用後 泄瀉 三~五次而後 蘇生이 可能하면 用次方 2~3劑
- 用法：水煎 食遠服 一日 2~3次 隨氣量 用之
- 由來：鄭周永 先生任 傳受方
- 提供：金洙珩

6. 食道癌(一)

(1) 初期方 - 金銀花 八兩 當歸 三兩 地榆 二兩 意以仁 五錢

- 功用：食道癌
- 用法：① 金銀花 水十碗 煎至二碗
② 再加 三種藥 又入水十五碗하여 煎至 二碗 午前에 服一碗하고 夜半枕時 服一碗하고 必히 取枕한다. 用一~二貼하고 次用 附方用

(2) 附方 - 玄胡索 一兩 沒藥 七錢 山桃仁去皮尖 五靈脂 乳香 各五錢

- 用法：細末 醋糊丸 梧子大 每二~三十丸 食後服

7. 食道癌(二)

- 用法：服痛時 乾薑湯服, 心痛時 淡醋湯服, 竹鹽 兼服則必大效
- 由來：先代 傳受方
- 提供：金洙珩

8. 臍臑癌方(一)

(1) 加減歸脾湯 - 香附子童便製 酸棗仁炒 黃芪 當歸身 各三錢 白茯苓 遠志干汁炒 白朮 龍眼肉 蒼朮 厚朴 神曲炒 麥芽炒 唐木香 貢砂仁 白豆寇 各一錢 益母草 二錢 陳皮甘草 各五錢 薑三 棗二

- 功用：臍臟癌
- 用法 水煎 食後 1時間 1日 三回 20貼而 見效
- 由來 · 先代 傳受方
- 提供 · 金洙珥

9. 臍臟癌(二)

(1) 南臍湯 - 金銀花 二錢 皂角刺 一錢半 穿山甲炒 天花粉 赤茯苓 玄蔘 蒲公英 山查肉 唐木香 小茴香炒 各一錢

- 功用 · 臍臟炎 臍臟癌
- 用法 · 水煎食遠服 1~2劑而見效
- 由來 鄭先生任 傳受方
- 提供 金洙珥

10. 直腸癰 腸癰

(1) 大黃牡丹皮湯 - 大黃 牡丹皮 一錢半 蘇葉 人蔘 黃芪 各一錢 當歸 川芎 桂皮 厚朴 陳皮 白芷 防風 烏藥 檳榔 白芍藥 枳殼 木香 桔梗 甘草 各八分

- 功用 直腸癌 盲腸 甚妙
- 用法：水煎 日三回 空心服 服用 三日則見效 一劑服則大效
- 由來 · 東醫寶鑑
- 提供 金洙珥

11. 膀胱癌方

(1) 黃金猪苓湯 - 黃芪 金銀花 猪苓 各五錢 澤瀉 虎杖根 木通 雷丸碎 石菖蒲 白茯苓 香需 白扁豆炒 杏仁 大黃 五靈脂 各二錢 紅花 厚朴 陳皮 砂仁 滑石 香附子 甘草 各一錢

- 功用 · 膀胱癌 小便隆閉
- 用法 · 水煎 空心服用 1日 三回 20貼用
- 由來：權鳳宇 先生 傳受

■ 經驗方

- 提供 · 金洙珩

12. 乳房癌

(1) 金銀止貝湯 - 金銀花 二錢 白芷 當歸尾 一錢半 瓜蒌仁 貝母 皂角刺 天花粉 穿山甲炒 甘草 各一錢

- 功用：乳房癌
- 用法 · 水二碗 濁酒一碗하여 煎至一碗 食遠服 一劑用癒
- 由來 · 經驗方
- 提供 · 金洙珩

13. 子宮癌(一)

(1) 龍膽瀉肝湯(方藥合編下137)

- 功用 子宮癌 初期 全身而腫하고 惡心乾嘔하며 間間 陰部癢者 先用 次藥 二十貼 而後服 加味大營煎 三~五劑

(2) 加味大營煎 - 熟地黃上品 當歸 牛膝 各五錢 艾葉炒 益母草酒九蒸 枸杞子 杜沖干汁炒 人蔘錦山產 肉桂 各二錢 香附子 炙甘草 各一錢半 鹿茸元上 二~五錢 射香 二~三分

- 功用 子宮癌 子宮筋腫 子宮水腫 交媾痛 一切子宮疾患 其效 甚妙而如神服之 一劑 而 腫塊가 解始하고 二劑而漸小하며 三劑而 可治累驗
- 用法 水煎 空心 溫服 調射香末
- 由來 經驗方
- 提供 金洙珩

14. 各種 癌腫 治中에 脫氣者 起死回生方

(1) 橘皮一物湯 1~2貼用

- 功用：各種 癰疽 及 癌腫을 治療中에 患者가 갑자기 脫氣하여 全不食藥하고 眞汗

而出하며 寸步를 不起動者 用一貼而 起死回生 累驗

- 用法 · 橘皮는 必五年 以上 陳者를 用함 橘皮一兩 濃煎服

(2) 陳倉米粥 - 陳倉米(五年以上陳者) 免系子(酒浸丸蒸) 橘皮(五年以上陳者) 各等分 爲末 造粥食之

- 功用 · 各種 癌腫及 重病患者가 治癒中에 또는 癒後에 食飲을 全廢而 食則吐者
- 由來 經驗方
- 提供 : 金洙珩

15. 劫藥(鎮痛劑)

(1) 三七根 紅花 各三錢 五靈脂 蒲黃 山桃仁 黃芪 各五錢

- 用法 · 上爲細末 每一 ~ 二錢式 溫水 溫酒에 服用
- 功用 · 鎮痛劑

(2) 當歸 五靈脂 蒲黃 益母草 各二錢 紅花 菟絲子 枳實 玄胡索 各一錢半 南星 熟地黃 桂枝 桔梗 甘草 各一錢

- 功用 · 上二 劫藥은 人體의 餘何한 苦痛이라도 服用하면 鎮靜 鎮痛而可也
- 用法 : 水煎無時服
- 提供 : 金洙珩

16. 解 抗 生 劑 諸 藥 毒

(1) 石心散 - 香附子 黃芪 各3錢 半夏 二錢 蘇子 陳皮 厚朴 前胡 桂皮 當歸 各一錢 甘草 七分

- 功用 · 久患之因으로 抗生劑를 過多 濫用하고 又是 多種의 藥을 過服하여 무아지 경이어서 어떠한 新藥을 服用하여도 反應이 없고 전혀 差度가 없는 者 先服 此藥 20貼而 解諸藥毒而後에 用本病藥으로 治之
- 用法 : 水煎 食遠服 20貼用
- 由來 經驗方
- 提供 : 金洙珩

■ 經驗方

17. 齒齦炎 最惡者

(1) 加味解毒湯 - 升麻 二錢 黃連 黃芩 黃柏 梔子 各一錢半 當歸 生地黃 各一錢, 齒根腫起者 加石羔 二錢

- 功用: 齒齦이 腫肛脫하고 全齒根이 動搖하며 齒間漸開而齒가 自脫하고 百藥而無效者 源因은 神經過多而 心肝이 大怒하여 大熱이 上沖之因也
- 用法: 水煎食後服 若一月服用 其效如神
- 由來: 經驗方
- 提供: 金洙珩

(2) 別方 - 두더지 1俱去內腸하고 入靑鹽二合하여 過十餘日後 取鹽作末 朝夕으로 漱齒

18. B型 肝炎

(1) 茵陳清肝湯 - 茵陳 二斤半 蒼朮 葛根 各一斤 玉蜀黍 桑白皮 各半斤 元柴胡 四兩

- 功用: B型肝炎 數值가 最高로 上升하고 疲勞가 極甚하여 生活而 不可者 三~五劑而完治
- 用法: 水煎 每食後 一時間服用
- 注意: 切忌 過勞하고 酒는 一盞도 不可함
- 由來: 金守敦先生 傳受方
- 提供: 金洙珩

19. 腎不全症方

(1) 順氣治風湯

烏藥 香附子 麻黃 各二錢 防風 白僵蚕 白芷 白芍藥 天麻 全蟲 川芎 桔梗 羌活 獨活 半夏 南星 細辛 附子 甘草 各一錢半 木香 一錢 草烏 二分

- 功用: 腎臟炎 最惡症 全身浮腫 按之即痛甚 手不可近 兼治 腎不全

- 用法・水煎 空心에 冷服 1日 2~3回 40貼 用卽 大效 累驗
- 由來 先生任의 傳受方
- 提供：金洙珪

20. 連珠瘡

(1) 杏蚣丸 - 蜈蚣百首炒 銀杏去皮炒 一斤

- 功用・連珠瘰癧瘡 神妙
- 用法：上二味炒作細末 蜜丸 梧子大 日三回 每十丸式 食後服 服之一個月而愈

※自五丸 - 漸至 十丸而 隨氣量하고 過服卽 脫氣而 不起動이라 不病而 健者 三十丸式 服之라도 健而不脫氣라

- 由來・經驗方
- 提供 金洙珪

21. 國際梅毒

(1) 加味腎氣丸 - 熟地黃 生地黃 山藥 山茱萸 各四兩 牡丹皮 白茯苓 澤瀉 鎖陽 酒製 龜板 各三兩 牛膝酒洗 枸杞子 人蔘 天門冬 麥門冬 知母竝鹽水炒 黃柏竝鹽水炒 五味子 肉桂 各二兩 原蠶蛾 附子 巴戟酒製 紫河車 各二兩

- 功用 國際梅毒 百治百生
- 製法：上爲細末 蜜丸 梧子大 每八十丸式 溫水 服用 1日 三回
- 由來・經驗方 醫學入門
- 提供：金洙珪

(서울 동대문구 제기동 廣一院韓藥房 ☎ 02-962-4700)