

各種經驗方

蘇 秉 昌



(1) 加味雙和湯

黃芪 20g 何首烏 12g 當歸 10g 川芎 乾薑 肉桂 木香 白朮 各4g 陳皮 厚朴 山香 甘草 各3g 附子 2g 棗二 薑三

- 功用 陰陽俱虛病 前後 被勞 房事過度
- 用法 · 1日 2貼 再湯服 或加 五味子 菟絲子 枸杞子 蛇床子 家韭子 覆盆子 豬實子 鹿茸 4g 尤好

- 由來 · 愛用方
- 提供：蘇 秉 昌

(2) 五種膏

當歸身 黃芪 熟半 人蔘 附子 各40g 牛肉 150g

- 功用 · 老虛弱者
- 活套：食慾不振 氣力不足 冷 加 乾干 40g
- 用法 同煎 5~6次 分服
- 由來：傳受方
- 提供 · 蘇 秉 昌

(3) 消濃飲

南星炮 4g 射干 天花粉 桔梗 薄荷 蘇葉 杏仁 半夏 防風 各3g 知母 貝母 阿膠 川芎 生乾地黃 桑白皮 白芨 白芷 甘草 各2g 生子 七尾 梅一介

- 功用：治 肺癰
- 由來 · 經驗方
- 提供 · 蘇 秉 昌

■ 各種 經驗方

(4) 加味龍膽瀉肝湯

蒼朮 8g 白朮 6g 乾薑炒 人蔘 白茯苓 木香 藿香 訶子 肉豆寇 破故紙酒炒 金櫻子 陳皮 車前子 檳榔 各4g 山藥 甘草 各2g 蛇床子微炒 4g

- 功用：膀胱及尿道炎
- 效用：肝濕氣 男陰挺 女陰痒瘡
- 由來：經驗方
- 提供 蘇秉昌

(5) 增味龍膽瀉肝湯

澤瀉 6g 柴胡 草龍膽 木通 車前子 赤茯苓 生地黃 當歸 蛇床子 梔子 各4g 黃芩 甘草 各2g

- 功用 治 肝經濕熱 小便淋澀 男陰莖作痛 睪丸部濕疹睪丸炎 陰囊水腫 女陰部痒瘡 子宮內膜炎 急慢性 尿道炎 膀胱炎
- 用法：1日 2貼 水煎服 二貼再湯服
- 由來 經驗方
- 提供 蘇秉昌

(6) 參芪湯

黃芪蜜炙 人蔘 各8g 何首烏 當歸 乾地黃 白芍酒炒 白茯苓 各6g 白朮 升麻 肉桂 陳皮 乾干 附子炮 甘草 各4g

- 功用：脫肛症
- 用法：1日 2貼 再湯 空心服
- 由來：經驗方
- 提供：蘇秉昌

(7) 羌活湯

羌活 6g 秦艽 黃芪 蒼朮 各4g 防風 升麻 麻黃 柴胡 甘草 各2g 膏本 1.5g 細辛 紅花 各1g

- 功用：痔疾通治

- 用法：1日 3貼 每空心服
- 禁忌：鷄, 猪, 酒
- 由來：經驗方
- 提供：蘇 秉 昌

(8) 加味清暑六和湯

香薷 厚朴 各6g 赤茯苓 藿香 白扁豆 木果 黃連 各4g 砂仁 半夏 杏仁 人蔘 甘草 各2g 棗二 薑三

- 功用：治 傷暑心脾 嘔瀉 霍亂 轉筋 腫瘡
- 用法：① 吐瀉 合 縮脾飲 ② 暑瘡 加 柴胡 4~12g 黃芩 檳榔 草果 各4g
③ 暑痢 去 蔘砂 加 檳榔 枳殼 木香 各4g. ④ 泄瀉 加 猪苓 澤瀉 燈心 各4g
⑤ 暑霍 加 神曲 檳榔 枳實 各4g. ⑥ 浮腫 加 澤瀉 10g 猪苓 赤茯苓 白朮 各6g
⑦ 黃疸 加 茵陳 12g 猪苓 澤瀉 各6g
- 由來：經驗方
- 提供：蘇 秉 昌

(9) 升陽除濕湯

蒼朮 6g 升麻 柴胡 羌活 防風 神曲 澤瀉 猪苓 各3g 陳皮 麥芽 炙甘草 各2g

- 功用：通治黃疸 氣虛 泄瀉 不思飲食 困倦無力
- 效能：空心服 五苓散 平胃散 選用。
- 由來：經驗方
- 提供：蘇 秉 昌

(10) 調中降火湯

當歸酒洗 白芍藥酒洗 白朮 各4g 黃連干炒 麥門冬去心 黃芪酒炒 熟地黃酒炒 川芎 微炒 便香附子 各3 5g 貝母干製 蘇子炒研 各3g 知母酒炒 遠志干製 甘草 各2g 生干 三片

- 功用：治 婦人火病 年久者 尤好
- 用法：1日 2貼 再湯 食後 1時間服

■ 各種 經驗方

- 由來：經驗方
- 提供：蘇秉昌

(11) 加味對金飲子

何首烏 青皮 各20g 陳皮 葛根 各12g 厚朴 蒼朮 赤茯苓 砂仁 神曲 良干 甘草 各4g

- 功用：斷酒(술 끊는 명처방).
- 用途：飲酒過度 每日長醉 알콜中毒者에 斷酒方 此藥 1劑를 服用中 술맛이 적어진다.
- 由來 經驗方
- 提供：蘇秉昌

(12) 金敗湯

金銀花 敗將西 當歸 川芎 各12g 白朮 8g 砂仁 苦楝皮 各4g 犀角 3g

- 功用：妊娠婦 盲腸炎 下腹疝痛
- 用法：1日 3回 空心服
- 由來：傳來方
- 提供：蘇秉昌

(13) 安神湯

當歸 白芍酒炒 生地黃 乾地黃 人蔘 黃芪 各4g 白朮 白茯苓 酸棗仁炒 黃連炒 梔子炒 麥門冬 竹茹 遠志 龍眼肉 甘草 各3g 朱砂小飛 2g 薑三 棗二 梅一 粘米一匕

- 功用：邪祟 狂症 癩疾
- 用法：上煎湯에 朱砂末 同時服 1日 3回 食間服
- 由來：經驗方
- 提供：蘇秉昌

(14) 仙方活命湯

大黃 20g 金銀花 12g 當歸尾 皂角刺 陳皮 各6g 貝母 天花粉 白芷 赤芍藥 流香 甘草 各4g 防風 3g 沒藥 2g 穿山甲 3尾

- 功用：各腫 無名腫毒 一切癰疽 不論陰陽瘡毒 未成者即消 已成者即潰

- 用法：好酒水相半煎穿山甲 燒研服後 再飲酒 醉爲度 病處가 땅에 닿도록 누워서 잠잔다. 乳腫에는 皂角刺 20g 大黃 12g 面頭腫에는 白芷 爲君 四肢腫에는 金銀花 爲君함
- 禁忌：忌 鐵器 忌食酸物
- 由來：經驗神方
- 提供：蘇 秉 昌

(15) 加味昇氣湯

沙蔘 12g 升麻 10g 當歸 8g 熟地黃 川芎 人蔘 各4g 甘草 2g 棗二 薑三

- 功用：產後脫陰
- 用法：1日 2貼 再湯服
- 別方：年久 脫陰 昇堤湯 - 黃芪 8g 人蔘 白朮 當歸 熟地黃 川芎 肉桂 升麻 甘草 各4g 2~3劑 連服則 有效
- 由來：經驗方
- 提供：蘇 秉 昌

(16) 清肺飲

白朮 4g 前胡 當歸 陳皮 桔梗 枳殼 杏仁 黃芩 半夏 山藥 麥門冬 連翹 白茯苓 各3g
蘇葉 蘇子 白芥子 甘草 各2g

- 功用：小兒 肺炎 身熱 喘息 咳嗽 痰盛 脇痛
- 用法：取汗 3~4貼 完快
- 由來：經驗方
- 提供：蘇 秉 昌

(17) 加味消脹飲

山楂 8g 蒼朮 神曲 麥芽 陳皮 赤茯苓 豬苓 澤瀉 大卜皮酒洗 木通 各4g 三稜 薑酒炒
蓬朮 薑酒炒 使君子 木香 枳殼 草果 各2g 薑三片

- 功用：小兒食滯 腹脹 消化不良
- 由來：韓方臨床 四十年 經驗方
- 提供：蘇 秉 昌

■ 各種 經驗方

(18) 神秘左經湯

麻黃 桂心 黃芩 枳殼 柴胡 赤茯 半夏 羌活 元防風 厚朴 白僵蠶 遠志 防己 麥門冬 乾干 細辛 甘草 各2g 薑三 棗二

- 功用 小兒麻痺 初期 發熱時
- 注意 發病時 必히 高熱이 있을 時 失期치 말고 3~4貼 用則 百發百中
- 用法 空心服 1日 4~5次 服用
- 由來 傳受方
- 提供 蘇秉昌

(19) 化痰清火湯

南星 半夏 蒼朮 白朮 陳皮 白芍 黃連 黃芩 知母 梔子 石古 各4g 甘草 2g × 先服一劑
滋腎湯 - 熟地黃 薏苡仁 各8g 白朮 當歸 木通 木果 元防風 羌活 續斷 各4g 菟絲子 白芷 甘草 各2g

- 功用 小兒麻痺 通治方
- 用法 先服化痰 清火湯 次用 滋腎湯 2~3劑 連服
- 由來 崔炯彩 先生方
- 提供 蘇秉昌

(20) 犀角湯

犀角 朴硝 甘草 各8g 桔梗 白茯 牛方子 生地黃 玄蔘 各6g 青黛 金銀花 薄荷 各4g

- 功用 胎毒 胎熱 黃水瘡
- 用法 1貼 1日 3回服
- 塗藥 松香 黃丹 無名墨 官粉 各4g 輕粉 0.4g 細末 眞油化 患處 塗之
- 由來 傳受方
- 提供 蘇秉昌

(21) 加味玉屏風散

白朮 黃芪 各6g 白茯炒 4g 當歸 防風 桂皮 甘草 各2g × 盜汗에는 當歸六黃湯 用

- 功用 小兒自汗(땀이 無時로 부실부실 나온다 陽虛함이라)
- 由來 韓方臨床 四十年
- 提供 蘇秉昌

(22) 加味地黃湯

熟地黃 16g 山藥 山茱萸 各8g 白茯苓 牡丹皮 澤瀉 各6g

- 功用 · 아이가 늦될 때
- 用法 · ① 말이 더딜 때(言遲) 鹿茸 五味子 各4g ② 걸음이 늦을 때(步遲) 鹿茸 牛膝 五加皮 各4g ③ 이가 나지 않을 때(齒不生) 鹿茸 五味子 各4g ④ 말을 못할 때(失語) 去 山茱萸 牡丹皮 加 麥門冬 6g 五味子 黃連 知母 黃栢 甘草 各4g
- 由來 : 傳受方
- 提供 : 蘇秉昌

(23) 加味補金湯

當歸身 10g 白朮 8g 熟地黃 龍眼肉 各6g 白茯苓 白芍 黃芪 山藥 麥門 桔梗 陳皮 菖蒲 遠志 鹿茸 各4g 貝母 前胡 木香 山茱萸 五味子 杏仁 工砂仁 益智仁 甘草 各2g

- 功用 · 小兒 初 中學生 補藥, 感氣가 잘 걸릴 때 百日咳 雜病預放 成長促進
- 用法 · 年齡에 따라 適當히 服用시킴(例 10歲는 五貼으로 함)
- 由來 經驗方
- 提供 : 蘇秉昌

(24) 加味柴胡湯

柴胡 12g 黃芩 貫衆 各8g 半夏 玄蔘 桔梗 甘草 各4g

- 功用 · 小兒耳下線炎(불거리)
- 用法 : 1日 1貼 3回 分服
- 由來 : 經驗方
- 提供 · 蘇秉昌

(25) 導滯湯

當歸 白朮 半夏 三稜 蓬朮 赤茯苓 山查 各4g 杏仁 大黃 麻仁 各3g

- 功用 : 治 小兒 大便不通
- 用法 1日 1貼 3回 分服
- 由來 傳受方
- 提供 蘇秉昌

■ 各種 經驗方

(26) 加味承氣湯

大黃 8g 芒硝 枳實 各4g 厚朴 桃仁 牡丹 各2g 甘草 1g

- 功用 . 小兒 便秘
- 用法 : 1日 1貼 3回 分服
- 由來 : 傳受方
- 提供 : 蘇 秉 昌

(27) 加味建中湯

白芍 10g 桂枝 6g 白朮 砂仁 陳皮 山楂 神曲 白茯苓 烏藥 炙甘草 各4g 棗二 薑三

- 功用 : 小兒 夜尿 夜啼
- 用法 : 1日 1貼 3回 分服
- 由來 : 經驗方
- 提供 : 蘇 秉 昌

(28) 加味八味湯

熟地 16g 山藥 鷄內金 各8g 白茯苓 牡丹 澤瀉 烏藥 各6g 益智 附子炮 肉桂 乾薑 甘草 各4g

- 功用 : 十歲以上 成人夜尿症
- 用法 . 隨力服
- 由來 . 經驗方
- 提供 : 蘇 秉 昌

(29) 加味補益湯

家韭子 8g 黃芪 山茱 五味子 各6g 人蔘 白朮 烏藥 甘草 各4g 當歸身 陳皮 益智仁 各2g 升麻 柴胡 各1.5g

- 功用 : 治 小便頻數 遺尿, 少便赤澀
- 用法 隨力服.
- 由來 : 傳來方
- 提供 : 蘇 秉 昌

(學術委員長 전북 익산시 남중동1가 173-14 동인당한약방 ☎ 063-856-8448)