


꿀벌의 월동준비 및 봉군관리



고려양봉원장 고상인

월동 사양을 10월 중순이전 까지 끝내게 되면 꿀벌들은 월동의 마지막 준비를 위해서 자연의 기후변화에 순응하기 위해 여왕벌은 몸을 줄여가면서 산란을 서서히 중단하게되고 일벌들은 월동에 불필요한 숫벌을 소상 밖으로 쫓아내어 스스로 죽게하는 등 많은 변화가 발생하게 된다. 일벌들은 저장되어 있는 꿀이나 사양액을 전화시켜 숙성된 먹이는 모두 소방에 충만되는 즉시 봉개하여 변질이 없도록 함과 동시에 계속되는 기온의 하강에 마지막 육아중인 유충에 피해가 없도록 최선을 다하고 있을때이다.

이러할때 월동사양을 10월중순 이후 늦게까지 계속 시킨다면 꿀벌들이 안정을 유지하지 못하고 계속 많은 활동을 하도록 하면 급격한 체력소모로 인해 꿀벌들의 수명이 단축되게 되므로 봉군세가 약군으로 전락하게 될뿐만 아니라 월동에 실패하는 원인이 되기도 한다.

뿐만 아니라 10월에 들어와서도 많은 산란을 하도록 방치하거나 밤낮의 기온차가 심할 때 봉군주변에 유밀이 되는 밀월식물이 있어 꿀벌들의 활동이 심하게되면 오히려 월동에 심각한 피해를 입게 될 수도 있다.

지금부터 12년전 강원도 연천군에 집단으로 자생하고 있던 외뢰식물인 연백초가 현재는 전국으로 퍼져있어 10월말까지 만개되고 있는데 개화기간이 늦고 늦게까지 개화됨으로 인해 꿀벌에게 도움을 주기보다는 오히려 피해를 줄 우려가 많아 양봉인들이 싫어하는 밀원식물로 전락되고 있다. 10월 및 11월의 기온이 계속해서 높을때에는 꿀벌에 도움이 되는 밀원식물이 되겠으나 그렇지 못한 금년도와 같은 기온조건에서는 피해가 예상됨으로 연백초가 없는곳으로 옮기는 것이 좋을것으로 생각된다.

월동준비군의 봉군은 지금부터는 안정을 유지한 가운데 많은 활동을 하지 않는 상태에서 조용한 가운데 월동을 맞이하는 것이 가장좋은 관리방법이라고 하겠다. 봉충이 많아 이들이 출방한 후 많은 공방이 생겼을 때에는 10월중순 이후에는 사양을 시켜

서는 안되므로 다른 저밀소비로 교환해주거나 소비를 뽑아내어 축소시켜주는 것이 좋다.

첫 추위가 온 후 통상 외부 월동포장을 하게되는데 외부 월동포장전에는 소상내부는 보온격리판 등을 이용해서 내부포장을 해주는 것이 좋다. 겨울 월동기간에도 꿀벌은 다른 동물과는 달리 동면(冬眠)을 하지않고 활동을 중단한채 평소와 같이 집단생활을 하고 있다. 다만 기온의 저하로 산란, 육아, 수밀작업등 모든 활동을 일시 정지하고 있는 것 뿐이다.

여왕봉이 산란을 중단하고 육아작업이 끝나 키우는 유충이 없게되면 꿀벌진드기의 숫놈은 스스로 죽어버리고 암놈만 살아남게 되는데 이때를 이용해서 마지막 진드기 구제작업을 해줄 필요가 있다. 금년도는 가을철의 계속된 가뭄으로 해충들에 의한 피해가 많은 해였다고 생각된다. 특히 대추벌이나 밀원식물들의 가지나 잎사이에 작은 거미줄을 치고사는 작은 개미의 피해가 그 어느해 보다도 피해가 많으므로 계속 주의를 해야하겠다.

봉장주위에 이러한 작은 거미줄이 많을 때에는 거미줄을 제거시켜 죽여야하고 거미는 찾아서 모두 죽여야한다. 거미는 살려두고 거미줄만 제거시키면 밤사이에 다시 거미줄을 만들어 놓으므로 꿀벌의 피해를 줄일수가 없다.

특히 추위가 빨리 찾아 올것으로 예상되는 금년겨울은 10월중순에 만개가되어 피고있는 연백초는 꿀벌의 월동에 많은 피해가 예상되므로 연백초가 없는 지역으로 월동장소를 옮겨주는 것도 생각해볼 문제라고 판단된다.

I. 월동에 적합한 봉군의 기준

월동에 적합한 봉군은 젊은 유봉이 많은 강군이여야 함은 당연한 원칙일 것이다. 그렇다고 젊은 유봉을 많이 양성하고 확보하기 위해 늦은가을인 10월에도 산란을 유도하거나 방치해서는 안된다. 늦게 출방되는 꿀벌들은(10월하순 이후) 꿀벌의 3대 요소의 하나인 자연적인 출방이 아니기 때문에 허약체질의 꿀벌로 태어나므로 새롭히 출방되는 꿀벌들에 의한 도움보다는 기출방되어 있는 꿀벌들에게 과중한 체력소모만을 시켜 수명단축을 시키는 결과만을 초래하게 되어 오히려 피해가 많게 된다.

여왕벌이 늦게까지 산란을 하는 것은 월동사양의 지연이나 부족이 원인이므로 충분한 월동사양을 적기에 시켜 월동에 사용되는 모든소비는 월동식량으로 충만하게하여 여왕봉이 산란할수 있는 여백을 주지 않도록 하면된다.

월동준비기의 젊은 벌이란 반드시 출방한지 얼마되지 않는 유봉만을 의미하는 것이 아니다. 꿀벌들의

수명은 그들의 체력소모와 직결되므로 출방한 날자는 큰 문제가 되지 않는다. 출방일령보다는 수명이 많이 남아있는 꿀벌을 젊은 꿀벌이라고 보면된다. 즉 꿀벌은 출방한 시기가 언제이며 출방한후 체력 소모를 얼마나 했느냐에 따라 젊은벌과 늙은 벌로 구분할 수가 있다. 꿀벌들이 출방에서 죽을때까지 꿀벌의 3대요소인 자연, 자유, 습성에 얼마나 적합한 가운데 생활했느냐에 따라 달라진다고 본다. 월동기간 중 일벌의 수명은 다른시기에 비하여 현저하게 길어진다. 통상적으로 체력소모를 적게하는 월동기간에는 6개월은 생존한다.

2. 월동군의 자격군

월동을 무사히 마칠수 있는 봉군의 자격기준을 어디에 두느냐 하는것에 대해서는 양봉가의 경력 및 기술정도에 따라 여러 가지 이론이 있을수 있겠으나 양봉경험이 많지 않은 초보자에게는 매우 어렵고 궁금한 사항이 아닐수 없다.

꿀벌은 대자연의 기후조건 속에서 많은 밀원식물을 상대로 생활하는 곤충이므로 간단하게 월동군의 자격기준을 설정할 수는 없다고 하겠다. 그러나 양봉 산업의 성공요소는 100군의 약군보다는 1군의 강군이 필요하다는 말과같이 강군유지에 있으므로 성공적으로 월동을 마칠수 있는 조건과 기준은 강군유지에 있다는 것을 명심해야 한다.

봉군세가 강하면 강할수록 월동을 더욱더 성공적으로 마칠수 있으나 약세군은 그렇지 못하기 때문이다. 때문에 월동군의 자격기준은 꿀벌의 군세가 최소한 그만하면 되겠다고 느낄 수 있는 소비4~5매 착봉군 이상을 기준으로 삼아야한다. 그러나 반드시 강군이라야만 월동을 시킬수 있다는 것은 절대 아니다. 적절한 보호와 관리를 병행해주면 2매 착봉군 정도의 약군이라도 월동을 무사히 마칠수는 있다. 그러나 약군의 벌들로 월동을 한다는 것은 단지 여왕벌을 내년 봄까지 확보하는 의미 외에는 별다른 의미가 없으며 이러한 봉군들은 아카시아 유밀기까지 채밀군으로 양성하기가 어려우므로 다량의 채밀은 기대할 수가 없게된다.

양봉에 경험이 많지 않은 초보단계에서는 월동이후에까지 미치는 제반문제점들을 파악하지 못할뿐아니라 약군은 여왕벌을 죽이고 합봉을 시켜야 하는데 봉군의 수에만 집착을 한 나머지 많은 봉군수만을 월동시키려고 노력하는 경우를 많이 볼수 있다. 현대 양봉산업의 경영은 강군육성의 관리로 아카시아 벌꿀을 최대한 많이 생산하는데 있으므로 외형상의 많은 군수에만 집착하여 약군을 많이 보유하는 양봉을 해서는 안된다.

또한 우수한 여왕벌을 보유해야 하는데 금년도에 양성된 신왕봉이어야 한다.

3. 봉군의 축소 및 합봉

월동군의 봉군은 어느정도 밀착을 시켜 착봉소비권(소방의 구멍이 많이 보이지 않을정도의 착봉상태) 외의 소비는 모두 뽑아내어야 한다.

뽑아내는 소비는 화분이 많이 저장되어 있는 소비는 절대 뽑아 내어서는 안된다. 봉군을 착봉소비권에 맞추어 축소시킨 다음 3매군이하의 봉군은 월동 후 조준번식의 자력군이 되지 못하므로 월동전에 모두 합봉을 시켜주는 것이 좋다. 약군을 합봉시킬 때에는 약군의 여왕봉을 죽여 버리고 봉군은 강하게 밀착시킨 다음 4매군이상의 월동자격군에 1매 ~2매씩 보충시켜 주면 된다. 이때에는 별다른 합봉법은 없으나 약소군끼리의 합봉은 해서는 안되어 약군을 강군에 보충시키는 방법으로 합봉을 시켜야 한다. 약군끼리의 합봉은 합봉당시에는 강군으로 만들어진 것으로 보이나 얼마가지 않아 다시 약군으로 전환되어 버리기 때문이다. 합봉작업시 저밀소비의 무단방치등으로 도봉이 발생되지 않도록 주의해야하며 합봉작업은 신속하게 이루어져야하고 작업시에는 반드시 훈연기를 자주 사용하는 것이 좋다.

뽑아낸 저밀소비는 공소비와 혼합하여 보관하지 말고 별도로 보관해 두어야하며 월동포장직전이나 조준 봉군 번식시에 사용하기 편리하도록 저밀상태 별로 구분하여 보관해 두는 것이 좋다.

가을철에 접어들면서부터 월동직전에 이르기까지 봉군의 군세가 점차 약군으로 전환되는 것은 가을철 및 월동준비군의 관리부주의의 원인도 있겠으나 근본적 원인은 밤꽃 유밀기 이후 화분의 부족에서부터 여름철의 봉군관리에 소홀히한 원인이 더 많다고 볼수있다.

월동시기에 봉군이 약군으로 변모되는 원인은 다음과 같다.

- 가. 아카시아 유밀기이후 대용화분을 가을까지 계속 공급 해주지 않았을 때
- 나. 농약 및 오염된 물에 의한 피해방지대책을 소홀히하여 봉군에 많은 피해가 발생되었을 때
- 다. 진드기 구제 및 봉병 예방약제 처리를 하지않았을 때
- 라. 삼복더위에 봉군을 나무 그늘 밑이나 벌통에 그늘을 지워주지 않고 태양광선에 계속 방치해 두었을 때
- 마. 먹이를 충분히 공급하지 않고 가끔씩 절양을 시켰을 때
- 바. 월동사양을 늦게 시켰을 때
- 사. 해충이나 해적 등에 의한 피해가 많을 때
- 아. 10월 하순까지 유밀이 잘되는 밀원식물이 개화되어 있을 때
- 자. 월동사양시나 가을에 도봉이 발생되었을 때

소상에서 뽑아낸 소비는 저밀소비와 공소비로 구분하여 비닐주머니를 만들어 빈벌통에 10매단위로하여 비닐주머니 속에 소비를 넣고 이류화탄소를 약 30cc정도 비닐주머니에 직접 부은다음 밀봉시켜

보관해야 한다.

공소비의 보관은 적은 수량 단위(10매 단위)로 포장하여 보관하는 것이 좋다. 내년봄 공소비를 사용하기 위해 비닐주머니를 개봉했을 때 남은 소비가 있을 때는 다시 이류화탄소를 재주입해야 하기 때문이다. 한번 이류화탄소를 주입하게 되면 비닐주머니에 작은 구멍이라도 생기지 않는다면 5~6개월은 소총의 피해 없이 보관이 가능하다. 저밀이 있는 소비는 공소비보다 이류화탄소를 30% 정도만 주입해도 된다. 이류화탄소는 휘발성이 휘발유보다 훨씬 빠르므로 사용할 때에는 특히 불조심을 해야 한다.

사용하고 남은 이류화탄소는 용기에 반드시 물을 부어 놓아야만 증발되지 않고 보관이 가능하다.

4. 월동에 적합한 장소

월동에 알맞은 장소는 외부날씨의 변화에 크게 영향을 받지 않는 음지가 양지보다 좋다. 하지만 다른 봄 번식시에는 음지보다는 따뜻한 양지가 훨씬 좋기 때문에 월동에도 좋고 봄철에도 좋은 곳을 월동장소로 선택하는 것이 좋다.

겨울철의 강한 찬바람을 막을 수 있는 곳과 지면의 높고 낮은 곳이 없는 평평한 곳이어야 하며 습기가 없는 건조한 곳이어야 한다. 배수가 잘되어야 하고 봉장주변은 차량이 많이 다니는 곳에서 떨어져 차량의 진동이 느껴지지 않는 곳이어야 하며 월동기간 동안 도로공사나 기타작업이 계속되어 소음과 진동이 없는 곳이어야 한다.

10월 하순까지도 개화가 계속되어 유밀이 잘되는 밀월식물이 있는 곳은 피해야 한다. 월동장소는 월동장소에서 내년 봄 번식까지 계속 관리하는 경우와 월동만을 시키고 봄번식은 다른 장소에 옮겨 관리하는 경우의 두 가지를 생각할 수가 있다.

가. 월동장소에서 내년 봄번식까지 같은 장소에서 관리하는 경우 동일한 장소에서 월동과 봄 관리를 같이 할 경우에는 특히 월동 장소의 선택에 주의를 해야 한다. 이때에는 월동과 봄관리 중 봄관리에 치중해서 장소를 선택하고 월동조건에 맞지 않는 부분은 월동포장이나 월동군에 적합한 봉군관리 방법을 동원해서 월동중에 발생될 수 있는 피해를 최소화 할 수 있도록 해야 한다.

봄 번식에 편리한 양지바른 곳에 월동을 시키게 되면 겨울내내 별들의 활동이 계속되게 되므로 이를 방지하기 위해 월동포장에 세심한 주의를 기울여야 한다.

나. 월동만을 시키고 봄번식은 다른 장소로 옮길 경우 월동만을 시킬 경우에는 양지보다 음지에 봉군의 월동장소를 선택하면 꿀벌들은 월동기간 동안 활동이 적게 되므로 월동에 도움이 된다.

대신 월동포장시 추위에 대한 대비를 잘 해줄 필요가 있다.

5. 월동포장의 시기

꿀벌의 월동에 대비한 월동포장은 내부포장과 외부포장의 두 종류로 구분할 수가 있으며 통상 내부포

장을 먼저 한다음 외부포장을 하게 된다.

가. 꿀벌의 내부포장시기

꿀벌의 내부포장은 월동사양이 끝나고 난 다음 사양 시킨 먹이를 꿀벌들이 숙성시킨 이후부터 해주는 것이 좋다. 10월 중순 이전에 마지막 정리사양 까지 모두 끝나게 되므로 10월 중순 이후 봉군을 축소시키면서 내부포장을 하면 된다. 내부포장은 편리하고 간단하게 할 수 있는 방법을 선택하는 것이 좋다.

20~30m/m정도 두께의 스치로풀 양면에 합판을 부착하여 광식사양기와 같은 모양(스치로풀을 모두 합판과 목재로 완전 포장시킨 것)의 보온격리판을 사용해서 축소시킨 착봉소비 양면에 보온격리판을 밀착시켜 놓으면 내부포장으로는 충분하다.

스치로풀만을 그대로 사용하는 것은 내부포장용으로는 적합하지 못하다.

나. 꿀벌의 외부포장 시기

꿀벌의 외부포장은 기온이 영하로 떨어지는 첫 추위가 왔을 때 실시한다. 때문에 외부포장의 시기는 지역에 따라서 포장하는 시기가 다르다. 첫 추위가 오기 전에 미리 실시하는 경우도 있으나 이것은 꿀벌의 외부활동을 촉진시키는 결과가 될 수도 있으므로 가능한 조기 외부포장은 하지 않는 것이 좋다. 꿀벌은 봉병예방이 잘된 건강한 봉군일 경우 월동포장을 하지 않아 추위에 피해를 당하는 경우는 절대 없다. 그러나 월동이 끝나고 이른 봄철 육아작업이 시작될 때부터 봉군에 보온이 절대적으로 필요 하므로 겨울 월동포장은 겨울철 외부의 심한 추위를 면할 수 있을 정도로 해둔 다음 이른 봄에 완벽한 포장을 다시 하는 것이 원칙이다.

6. 겨울철 스치로풀 소상을 이용한 봉군의 월동

최근에는 스치로풀 소상의 편리함을 이용하여 봉군의 월동에 목재소상대신 스치로풀 소상을 사용하는 경우가 많은데 꿀벌의 월동용으로는 스치로풀 소상이 적합하지 못하다. 꿀벌의 겨울철 월동기간에는 소상내에서 발생되는 습기에 의해 많은 피해가 발생될 수 있으므로 습기 발생에 주의를 해야 한다.

스치로풀 소상은 보온에는 이상이 없으나 꿀벌들의 봉구온도 및 열기에 의해 자연적으로 발생되는 습기를 제거할 수 있는 자정능력이 없으므로 봉군에 피해가 발생될 수가 있다. 그러나 월동을 끝내고 이른 봄 봉군의 번식시기에 스치로풀 소상을 적절히 사용하면 봉군의 번식에 많은 도움이 되며 조기 봉군의 증식에도 유리한 면이 있다. 이른 봄철 봉군의 육아에는 어느 정도의 습도가 절대적으로 필요하기 때문이다. 화분 매개용으로 사용되는 비닐하우스 용 꿀벌의 관리시에도 스치로풀 소상의 이점은 많다.

- 다음 호에 계속 -