

사고와 응급처치

매일유업 www.mail.com

찰과상

작은 상처는 깨끗이 씻어준 다음 소독하여 붕대를 감아줍니다.
깊거나 폭 패인 상처는 이물질의 감염이 우려되므로 소독한 다음 의사의 치료를 받아야 합니다.
간혹 표피의 상처는 작아 보이는데 의외로 출혈이 심한 경우도 있습니다.
머리부분에 난 상처일수록 붕대를 감기가 힘들기 때문에 상처가 작더라도 반드시 꿰매야 합니다.



골절

뼈가 부러진 상태를 골절이라 하는데 아기들은 사소한 일로도 골절되는 수가 있습니다. 아기의 뼈가 골절되면 다친 부위는 가능한 한 움직이지 않도록 하고, 즉시 병원으로 옮깁니다. 이럴 경우에 부러진 팔을 몸통에 붙여 삼각건 안에 움직이지 못하게 고정시킵니다.

수술이 필요한 경우도 있으므로 마실거나 먹을 것을 주지 않아야 합니다.

쇼크와 의식불명

심한 쇼크는 사고나 질병이 원인입니다. 얼굴이 창백해지고 식은땀이 나며 가는 호흡과 빠른 맥박이 특징으로 저혈압을 동반한 순환 혼란상태입니다. 토하거나 기절하는 경우도 있습니다.

이런 경우 아기를 눕혀서 진정시키고 담요로 덮어줍니다.
심한 쇼크로 의사의 처치가 필요한 경우에는 먹을 것과 마실 것을 주지 않습니다.

아기가 의식이 없을 때는 우선 먼저 아기가 질식하지 않도록 해야 합니다. 의식을 잃기는 하였으나 숨쉬는 게 확실하다면 앞으로 돌리게 한 다음 상체를 뒤로 기울입니다.

손발을 같은 쪽으로 향하게 하는 것도 회복에 도움이 됩니다. 그렇게 해야 만일의 경우 토하더라도 질식하는 일은 없어집니다.

의식을 잃은 아기는 졸려서 자는 아기와는 분명한 차이점을 보이는데 코를 곤다는 것이 특징입니다. 의식을 잃은 후 곧바로 흔들어 보아 얼른 깨어나지 않거나 깨어나는 시간이 길면 의사의 검진을 받아야 합니다. **PPFK**