

## 補氣解暈湯에 關한 文獻的 考察

李廷華 · 柳同烈 \*

### Abstract

The literatual study on the Bogi haehun-tang(補氣解暈湯)

Lee Jung Hwa · Yoo Dong Yeol

Dept. of Oriental Medicine Gynecology, College of Oriental Medicine, Daejeon Univ.

The literatual study on the Bogi haehun-tang(補氣解暈湯), the results were obtained as follows :

1. Bogihaehun-tang(補氣解暈湯) is reported Fuqingzhu's Gynecology, Qing dynasty at the first and is used when puerperal faintness, a disorder due to deficiency of vital energy and blood and upward attack of the asthenic yang, or due to lochistisis and blood stasis attacking the heart.
2. Bogihaehun-tang(補氣解暈湯) is composed of Radix Ginseng(人蔘), Radix Astragali(黃芪), Radix Angelicae sinensis(當歸) Rhizoma Zingiberis praeparatae(乾薑), Spica Schizonepetae(荊芥).
3. Bogihaehun-tang(補氣解暈湯) have an effect on homeostasis by invigorating the vital energy, a treatment for prolonged bleeding due to deficiency of vital energy(補氣攝血) applicable to the patient suffering from chronic hemorrhagic disease accompanied with the manifestations of the deficiency of vital energy.

### I. 緒論

補氣解暈湯은 清代 傅<sup>11)</sup>의 傅青州女科에 처음  
收載된 處方으로 人蔘, 黃芪, 當歸, 荊芥, 黑薑으  
로構成되어 있으며 补氣血 行瘀하는 效能이 있어  
産後 失血過多로 誘發된 血暈을 治療하는데 活用  
되어 왔다.

產後 發生하는 疾病중의 하나인 產後血暈이란  
產後眩暈의 뜻으로 鬱冒 혹은 暗風이라고도 부르  
는데, 이는 婦人이 分娩後 忽然히 頭眩目華하고  
일어설 수 없거나 혹 心胸이 답답하고 惡心 嘴吐  
하고 心煩不安하고 심하면 口噤 神昏 人事不省하  
는 症狀을 指稱한다<sup>1-4)</sup>.

產後血暈에 대해 巢<sup>5)</sup>는 產後去血過多로 血虛  
氣極하거나, 下血하는 量은 적으나 오히려 氣逆하

여 血이 氣를 따라 心으로 上冲하기 때문이라 하였는데, 前者は 後者에 비해 虛症에 屬하고 後者는 痘血不下하여 閉厥의 實證을 나타낸다고 볼 수 있으며, 張<sup>6)</sup>은 “若氣脫作血暈而用辛香逐血化痰等劑則立刻殘矣 不可不慎也. .... 氣脫證產時血既大行, 則血去氣亦去多, 致昏暈不省, .... 血暈之證, 本由氣虛, 所以一時昏暈”이라 하여 血暈의 原因을 氣脫로 認識했다. 또한 繡<sup>7)</sup>은 陰血暴亡하여 心神이 濡養함을 얻지 못하거나, 下血이 적어도 惡露不下로 인해 위로 心에 끌어 心下滿急하여 神昏不省함으로 발생된다하여 產後血暈의 原因을 크게 血虛氣脫과 瘡阻氣逆의 두 가지 病因病機로 認識하고 있음을 알 수 있다.

產後血暈의 治法에 있어서는 크게 大補氣血 活血祛瘀를 基本으로 하여 治療하고 있으며, 處方으로 血虛氣脫로 因한 血暈에는 獨參湯, 補中益氣湯, 安心湯, 蔷歸湯, 佛手散, 茯神安心散, 八珍湯, 補氣解暈湯, 當歸補血湯, 大補元煎, 加味八珍湯 등이 주로 使用되고 있고, 血瘀氣逆으로 因한 血暈에는 尊命散, 黑神散, 失笑散, 佛手散加味, 二陳湯 등이 주로 使用되고 있다<sup>8~10)</sup>.

產後血暈은 產科 重要病症의 하나로, 특히 產後出血로 起因된 경우에는 危險한 狀況에 이를 수 있으므로 產後 血暈에 대한 適切한 治療가 必要하다.

이에 著者は 產後血暈의 治療를 위한 目的으로 活用되는 補氣解暈湯의 實驗的 研究에 앞서 文獻의 考察을 施行한 結果若干의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

## II. 本論

### 1. 資料調査 및 研究方法

#### 1) 資料調査

韓醫學의 歷代 文獻中 黃帝內經부터 現代文獻에 이르기까지 40餘 種의 文獻을 選定하여 研究資料로 삼았다.

#### 2) 研究方法

(1) 補氣解暈湯의 用法, 處方構成, 症狀, 治法에 對하여 調查하였다.

(2) 產後血暈의 定義와 症狀, 原人, 診斷, 治療에 對하여 調查하였다.

### 2. 文獻調査

#### 1. 金匱要略<sup>12)</sup>

問曰 新產婦人由三病 一者病瘧 二者病鬱冒 三者大便難 何爲也

師曰 新產血虛 多汗出 喜中風 故令病瘧 亡血復汗 汗多 故令鬱冒

#### 2. 諸病源候論<sup>5)</sup>

運悶之狀 心煩氣欲絕是也 亦有去血過多 亦有下血極少 皆令運 若產去血過多 血虛氣極 如此而運悶者 但煩悶而已 若下血過少 而氣逆者 則血隨氣上掩于心 亦令運悶 則煩悶而心滿急 二者爲導 亦當候其產婦血下多少 則知其產後應運與不運也.

#### 3. 外臺秘要<sup>13)</sup>

產後血暈心悶方

凡產後忽悶冒汗出不識人者是暴虛故也方

取破鷄子吞之便醒若未醒可與童子小便一升甚驗丈夫小便亦得切不得用病人者

又若久不識人 或時復發者此爲 有風因產後氣暴虛風行脈中故也 若產後去血多者尤增此病與鷄子不醒者可急與竹葉汁一服五合須臾 不定復與五合頻得三五 服立差

#### 4. 女科百聞<sup>14)</sup>

產後血暈者何如也

答曰 產後氣血暴虛 微得安靜血隨氣上迷亂心神故眼花甚者令人迷絕 口噤神昏氣冷 醫者不識呼爲暗風若作此治病必難愈但服清魂散

七寶散 初產後調血和氣補虛 壓驚悸 治虛暈

#### 5. 辨證寄聞全書<sup>15)</sup>

血暈門

辨證論治一：婦人甫產兒後 忽然眼目昏花 惡心

欲吐 心中無奈 或神魂外越 恍若天上雲行 人以爲惡血衝心之患也 誰知是氣虛欲脫而血暈乎

臨床處方：方用解暈湯

#### 6. 血證論<sup>16)</sup>

產後血暈 由血隨氣上 迷亂心神 故眼前生花 甚者悶絕口噤 神昏氣冷 有下血過多而暈者 屬虛 但昏悶煩亂而已 法當補血 宜炙甘草湯 及急 神昏口噤 絶不智人 法當破血 宜當歸玄胡色血竭 没藥 茄芥蕙京墨煅紅醋淬童便引 血暈之證 吐衄家間亦有之 醫者不可不知

#### 7. 傳奇主女科<sup>11)</sup>

婦人甫產兒時忽然眼目昏花 嘔惡欲吐 中心無主神魂外越 人以爲惡血奔心之患也 誰知是氣虛欲脫而然乎 蓋新產之婦 血必盡傾 血室空虛 心中之血 前已蔭胎 胎下而心血亦隨之俱下 心無血養 所賴者幾微之氣耳 令氣又虛而欲脫 天君無護 所剩殘血欲奔回救之 而血非正血 不能歸經 遂成血暈之證矣 治法必須大補氣血 斷不可單以暈治或疑血暈 是熱血上沖更補氣血 不愈助氣上沖之勢乎 不知新血不生 舊血不散補血以生新血 正活血以逐舊血也 血有形而難以速生 氣無形而易於迅發 補氣生血 尤易於補血以生血耳 方用補氣解暈湯。

人蔘一兩 生黃芪一兩 當歸一兩不酒洗 黑芥蕙三錢 薑炭一錢

水煎服一劑而暈止 二劑而心定 三劑而血生 四劑而血旺再不暈矣 此乃解暈之聖藥 用蔘芪以補氣 使氣旺而生血也 用當歸以補血 使血旺而養氣也 氣血旺而心自定 更用黑芥蕙引血歸經薑炭引陽行瘀 則瘀血去而正血歸 不必解暈而暈自無不解矣。

分娩後 眼見黑花 頭眩昏暈 不省人事者 非因勞倦甚而氣竭神昏 卽因大脫血而氣微欲絕 此所以神不守舍而爲暈也 當急服生化湯 不拘貼數 以施救 若因其有血塊未消 而偏信古方認爲惡血擔心 輕用無補耗散之劑 認爲痰火冲上 輒用無補消降之方 鮮有不誤者。

加味生化湯 治產後三等血暈證

川芎三錢 當歸六錢 黑薑四分 桃仁十粒 炙草五分 茄芥炒黑四分 大棗 水煎服

凡勞倦之甚 而暈及血脫氣脫汗脫而暈者 索宜連進此湯 索加人蔘三四錢 決不可宜參爲補而畏之

若痰火乘虛泛上而暈 於方內加橘紅四分 虛甚者亦須加人蔘 總不可用枳朴破氣 蓬稜破血等藥 卽山楂性緩 亦能害命 不可擅用 其或血塊痛甚 兼送益母丸 或鹿角炭 或元胡散 或獨勝散 凡用消血塊方中病即止 不可過劑 從權急救而耳。

#### 8. 臨床產婦科學<sup>17)</sup>

產後에 갑자기 血暈을 일으켜 일어설 수 없으며甚하면 昏迷하여 말을 할 수 없게 되고, 人事不省에 빠지는 것을 產後血暈이라고 한다. 혼히 心胸部의 苦悶感 嘔吐 惡心 혹은 痰이 자주 나와서 呼吸이 促迫하다던지 牙關緊急을 일으켜 말을 못하는 症狀을 隨伴한다.

血虛氣脫

產後 失血 過多로 갑자기 眩暈 心悸 心亂 煩躁 嘔吐를 일으킨다. 일어서지 못하고 잠자昏迷하여人事不省에 빠지고 심한 경우는 눈을 감고 입을 벌린다. 손을 벌린다. 四肢冷 冷汗淋漓 같은 증상을 수반한다. 顏色蒼白 舌淡少苔 脈微欲絕 或浮大하고 虛하다.

補氣固脫

清魂散《丹溪心法》

澤蘭 人蔘 川芎 茄芥蕙 甘草

小柴胡湯《傷寒論》

芍歸湯《天眞處方解說》

意識恢復後

大補氣血

當歸補血湯

#### 9. 中醫婦科學<sup>18)</sup>

分娩後 突然頭眩眼花 不能起坐 或心胸滿悶 惡心嘔吐 痰忪氣急 心煩不安 甚即口噤神昏 人事不省稱爲產後血暈 本證產後急重症之一 若不及時探救常可危急產婦生命。

西醫產後出血之昏厥休克 產後血管舒縮性虛脫等可參考本病進行辨。

<血虛氣脫>

◆ 婦科證候特点：產時產後流血特多 質稀 突然

眩暈 心悸煩悶不適 甚則昏不知人

◆ 全身症狀：面蒼白 眼閉口開 手散指冷 冷汗 淋離 脈微欲絕 或浮大而虛

◆ 症候分析：心主血藏神，產後失血過多，血不養心，心神失守，故心悸，煩悶不舒，甚則昏不知人。出血過多，則氣隨血脫，陽氣虛衰，失于溫煦，則面色蒼白，四肢厥冷，氣虛不攝，營陰外泄，則冷汗淋漓。舌淡無苔，脈微欲絕或浮大而虛，是血虛氣脫之證。

◆ 治療原則：益氣固脫

◆ 方藥：可選獨蔘湯 或 補氣解暈湯

獨蔘湯

補氣解暈湯 《傅青主女科》

人蔘30克 生黃芪30克 當歸30克 黑芥蕙9克 薑炭3克  
方中蔘，芪補氣以生血，攝血，當歸補血，黑荊芥，姜炭引血歸經，止血。

本型血暈，雖屬失血過多而致血虛氣脫，但治之必以補氣為主，以固脫止血，生血。

#### 10. 辨證錄<sup>18)</sup>

婦人甫產後 忽眼目昏暈 惡心欲吐 額上鼻尖有微汗 鼻出冷氣 神魂外越 人以為惡血沖心之患也 誰知是氣虛欲脫而血暈乎 蓋新產之後 血必盡傾 血舍空虛 止存微氣 尚其人陽氣素虛 則氣祛原不能生血 及胎破而心血隨胎而墮 則心無血養 所望者氣以固之也 令氣又虛脫 心君無護 所剩殘血非正血 不可歸經 內庭變亂 反成血暈之證矣 治法必須大補氣血 不宜單治血暈也 是熱血上沖 更補氣血 不愈助氣上沖之勢乎 不知新血不生 舊血不散補血以生新血 正活血以逐舊血也 血有形而難以速生 氣無形而易於迅發 補氣生血 尤易於補血以生血耳

方用補氣解暈湯。

荊芥三錢 人蔘一兩 當歸一兩 炮薑一錢 黃芪一兩  
水煎服 一劑量止 二劑心定 三劑氣旺 四劑血生  
不再暈也

#### 11. 青崗醫監<sup>19)</sup>

分娩過程에 疲勞 虛脫 그리고 產後 授乳로 인한  
氣血虛損 및 生理變化로 因하여 母體의 虛弱과 抵  
抗力 減退를 招來하게 되어 各種 疾病의 罹患性이

많아진다. 대개 產後 12일을 경과하기 전에는 절대 安定調理가 필요하며 이 기간에 발병한 疾病의 치료에 있어서 補虛와 理血治法을 바탕으로 하여 該當治療劑를 加味하는 것이 타당하다.

產後血暈 產血過多 氣血虛損

當歸補血湯 黃芪5錢, 當歸 3錢, 川芎去油1錢半  
荊芥 乾薑炒黑 炙甘草 各 5分

#### 12. 女科秘方<sup>20)</sup>

治產後昏倒不省人事 眼黑 耳鳴 或中風嘔吐涎沫  
手足癱瘓

當歸 川芎 荊芥蕙各等分 水煎入童便溫服

#### 13. 壽世保元<sup>21)</sup>

產後血暈者 乃下血過多而眩暈也 不省人事者氣血大脫而神不用也 故用人蔘剉兩劑水煎溫服 盖人蔘甘溫益元氣之品可以回氣以生血而身熱氣急者加童便一杯身寒氣弱者加附子三錢外以炭火以酸醋沃之使醋氣熏入鼻內則能收斂神效

#### 14. 標準韓方婦人科<sup>22)</sup>

產後血暈

<氣脫斗血暈>

心中의 血이 過去에는 胎를 保護하다 分娩하면  
중심의 血도 胎兒를 따라 흐르게 되어 心은 血의  
濡養을 잃고, 微弱한 氣로 버티고 있어서 氣도 虛  
脫하여 心을 保護할 수 없으므로 남아있는 殘血이  
心을 救하려하나, 精血이 아니므로 經에 돌아가지  
못하여, 血暈하게 되니 治法은 氣血을 大補해야  
하며, 血만 補하는 것은 옳지 않으며, 血暈을 热血  
上衝으로 誤認하고 다시 補血하면 낫지 않고, 上  
衝하는 것을 들판 되면 新血이 생겨나지 않으면,  
舊血이 흘어지지 않는다. 補血하여 新血이 생겨나  
는 것은 바로 活血하여 舊血을 驅逐하는 것이 되  
므로 補氣解暈湯을 用한다.

#### 15. 漢方婦人科臨床診療<sup>23)</sup>

產後血暈

產後血暈은 下血過多로 因한 것과 敗血衝心으로  
因한 것이 있다. 下血過多로 因한 것은 平素에 虛

弱하여 分娩後에 子宮에 收縮力이 缺乏되면 漏血不止하고, 調攝하지 않으면 破裂된 血管으로 血液이 暴下하여 百脈이 空虛하고 心臟이 衰弱하여 腦에 營養을 供給하지 못하므로 갑자기 暈厥하여人事不省하고 面白 脣淡하며 呼吸이 微弱하고 手足이 厥冷하며 脈微欲絕하는 腦貧血의 症狀을 나타낸다. 產後 下血過多하여 昏暈不省하면 獨蔘湯, 補中益氣湯, 安心湯, 芎歸湯, 佛手散, 加味 獨蔘湯, 加減補中益氣湯, 安心湯, 芎歸湯, 佛手散, 加味獨蔘湯, 加減補中益氣湯, 茯神安心散, 八珍湯, 補氣解暈湯, 當歸補血湯, 大補元煎, 加味八珍湯等을 써서 扶養益氣한다.

#### 補氣解暈湯

人蔘 黃芪 當歸 各 五錢, 荊芥炒黑 一錢半, 乾薑炒黑 五分을 水煎服한다.

**【效能】** 產後 氣血이 俱虛하여 昏迷 眩暈함을 다스린다.

**【評解】** 性은 平하고, 補虛 祛風 理血한다.

#### 16. 方藥合編<sup>24)</sup>

##### 補氣解暈湯

治產後血暈 <用法>水煎服

人蔘 黃芪 當歸 各 五錢 荆芥 一錢五分 黑薑五分  
產後의 瘀血로 因한 어지러운 症勢를 다스린다.

#### 17. 方藥合編解說<sup>25)</sup>

##### 補氣解暈湯.

人蔘, 黃芪, 當歸 各 5錢, 荆芥 1錢 5分, 黑薑 5分

解說; 人蔘, 黃芪는 補氣하고, 當歸는 補血한다. 氣가 旺하면 生血하고 血旺하면 養氣하는 바, 氣血이 旺하면 心은 자연 안정된다. 荆芥는 引血歸經하는 作用이 있고, 黑薑은 引陽行瘀하여 瘀血을 除去하므로써 解暈하여 正血이 循環하게 된다.

#### 18. 朱小南婦科經驗選<sup>26)</sup>

產後血暈多由陰血暴脫, 氣未有不隨之而虛者, 因此腦部及指梢首當其沖, 難以正常供養, 頭眩指麻, 甚至昏厥, 治療當以峻補氣血為先. 若單純用補血藥, 新血一時未能到達末梢, 惟有稍加有行血功能者, 使

運行循環加速, 上至顱頂, 未至指趾, 臘脂肌肉, 均得充分榮潤而恢復正常機能, 頭可不暈, 指可不麻. 開舉一醫案, 用當歸, 川芎補血, 加桂枝溫通經絡, 運行血液, 黃芪補氣以生血, 復加健脾補腎之品而治療.

#### 19. 婦人科方劑學<sup>27)</sup>

##### 補氣解暈湯 《傅青主女科》

**【構成】** 人蔘 12g, 黃芪 30g, 當歸 12g, 黑荊芥 10g, 乾薑炭 3g

**【用法】** 水煎服

**【主治】** 產後氣虛血暈

婦人產後失血過多, 突然眼目昏花, 嘔惡欲吐, 心神不定, 精神恍惚, 面色蒼白, 呼吸微弱, 脈沈細欲絕

**【運用】**

1. 本方의 辨證要點 : 產後失血過多, 突然昏倒, 汗出肢冷, 面色蒼白, 脈微欲絕

2. 加減法 : 手足厥逆을 兼하면 製附子, 乾薑을 加하여 回陽救逆한다. 心悸, 汗出過多하면 龍骨, 牡蠣, 五味子를 加하여 收斂止汗한다.

**【注意】** 邪氣內閉로 因한 神昏에는 마땅하지 않다.

**【方解】** 本方은 產後失血過多, 氣隨血脫로 因한 血暈을 治한다. 治法은 마땅히 大補元氣, 氣將生血, 氣旺攝血케 한다. 人蔘은 大補元氣하여 固脫하고, 黃芪는 補氣健脾하여 人蔘을 도와 資生氣血하고, 當歸는 補血和營하여 耗散된 陰血을 補充하며 黃芪와 合用하여 氣血雙補하니 氣血이 充滿하면 心神이 安靜된다. 荆芥炭, 乾薑炭은 血分에 入하여 止血, 引血歸經한다. 모든 藥物을 合用하면 補氣生血, 補氣攝血하며 補中有澁, 標本兼顧하여 氣血이 旺盛하면 眩暈이 낫는다.

#### 20. 傅青主女科新解<sup>28)</sup>

##### 正產氣虛血暈

##### ◆ 痘因病機

**【原文】** 正產氣虛血暈 ..... 人以為惡性血沖心之患也, 誰知是氣虛欲脫而然乎! 盖新產之婦, 血必盡傾, 血室空虛, 止存几微之氣, 倘其人陽氣素虛, 不能生血, 心中之血, 前已蔭胎, 胎墮, 而心中之血亦隨胎而俱墮, 心無血養, 所賴者, 几迷之氣以固之耳, 今氣又虛而欲脫, 而君心無握, 所剩殘血, 欲奔回救主, 而

血非正血，不能歸經，內庭變亂，而成血暈之症矣。

【新解】此症多由於產婦素體血虛氣弱，復因產程過長與產後失血過多，以致營陰下奪，孤陽上冒，氣隨血脫，心神無所養，發為產後血暈。

#### ◆ 臨床表現

【原文】婦人 甫產兒時忽然眼目昏花 嘔惡欲吐 中心無主 或神魂外越 恍若天上行云。

【新解】症見產後陰道出血多 突然出現頭暈目眩，面色蒼白，心悸不安，潰悶不適，漸至昏不知人，甚而四肢厥冷，冷汗淋漓，手撤眼閉口開，舌淡無苔，六脈微細欲絕或浮大而虛。

#### ◆ 辨證分型 血虛氣脫型

#### ◆ 治療原則

【原文】治法必須大補氣血 斷不可單以暈治血暈也，……不知新血不生 舊血不散補血以生新血 正活血以逐舊血也 血有形而難以速生 氣無形而易於迅發 補氣生血 尤易於補血以生血耳 方用補氣解暈湯。

【新解】治宜補氣益血，固脫救急法。

#### ◆ 方劑名稱及組成

【原文】補氣解暈湯：人蔘 30克，生黃芪 30克，當歸一 30克不酒洗 黑芥蕙 9克 薑炭 3克。

水煎服一劑而暈止 二劑而心定 三劑而血生 四劑而血旺再不暈矣

#### ◆ 方劑分解

【原文】此乃解暈之聖藥 用蔘芪以補氣 使氣旺而生血也 用當歸以補血 使血旺而養氣也 氣血旺而心自定 更用黑芥蕙引血歸經薑炭引陽行瘀 則瘀血去而正血歸 不必解暈而暈自無不解矣。一方之中，藥止五味，而其奏功之奇而大如此，其神矣乎！

【新解】此方中用人蔘，黃芪以補氣，當歸以補血；補氣以生血，血旺以養氣，氣血兩旺，而心可安矣，更用黑芥蕙以引血歸經，姜炭以行瘀引陽，使瘀血去而正血歸，方中雖無解暈之品，而暈可自解矣。

◆ 按語 婦人新產後，突然發生頭暈目眩，不能起坐，或心下滿悶，惡心嘔吐，或痰湧氣急，甚則神昏口噤，不省人事，稱為“產後血暈”，亦稱“產後血運”。

本病為產後危急症之一，若不及時搶救，或處理不當，可瞬即導致產婦死亡，故臨証須倍加注意。

此症頗與今之產科休克相同，常發生在胎盤娩出後

一小時之內，常由多種因素綜合引起：最常見是以前置胎盤，胎盤早期剝離，產後流血，流產，宮外孕等為主的失血；其次如子宮破裂，宮頸或陰道嚴重損傷，產科手術，羊水過多，多胎或畸形胎妊娠分娩後宮腔突然排空，羊水栓塞，孕期營養不良，貧血，心血管疾患，先兆子癇或子癇，產程過長造成脫水，酸中毒，感染等。

此症為產後突然失血過多，心腦缺血，以致頭暈昏花，嘔惡欲吐，甚至神昏外越，氣隨血脫，危在旦夕，若遲疑不決，多致不救。急以益氣養血，固脫行瘀之法，傅氏補氣解暈湯，藥証合拍，臨証驗之，確有效果。

#### 21. 傅青主女科發擇<sup>29)</sup>

#### 【原文】

婦人 甫產兒時忽然眼目昏花 嘔惡欲吐 中心無主 神魂外越 人以為惡血奔心之患也 誰知是氣虛欲脫而然乎 蓋新產之婦 血必盡傾 血室空虛 心中之血 前已蔭胎 胎下而心血亦隨之俱下 心無血養 所賴者幾微之氣耳 令氣又虛而欲脫 天君無護 所剩殘血欲奔回救之 而血非正血 不能歸經 遂成血暈之證矣 治法必須大補氣血 斷不可單以暈治或疑血暈 是熱血上沖更補氣血 不愈助氣上沖之勢乎 不知新血不生 舊血不散補血以生新血 正活血以逐舊血也 血有形而難以速生 氣無形而易於迅發 補氣生血 尤易於補血以生血耳 方用補氣解暈湯。

人蔘一兩 生黃芪一兩 當歸一兩不酒洗 黑芥蕙三錢 薑炭一錢

水煎服一劑而暈止 二劑而心定 三劑而血生 四劑而血旺再不暈矣 此乃解暈之聖藥 用蔘芪以補氣 使氣旺而生血也 用當歸以補血 使血旺而養氣也 氣血旺而心自定 更用黑芥蕙引血歸經薑炭引陽行瘀 則瘀血去而正血歸 不必解暈而暈自無不解矣。一方之中，藥止五味，而其奏功之奇而大如此，其神矣乎？

#### 【發揮】

按語：產後而有血暈者，乃氣虛欲脫之病也，應當大補其氣以攝血。須知血乃有形，而難以速生，氣屬無形，易于迅發也。若遲疑不決，多致不救。故方中以蔘芪補氣，氣足而攝將貴之血，當歸補血，血旺而充迅發之氣，氣血兩旺，而心自定。用黑芥蕙引血歸經，

又理血中之氣；用姜炭以引陽行瘀，瘀去穢淨而血自歸經，不必解暈，而暈自解矣。此方之妙在補氣為主，補血為次，再以引陽行瘀引血歸經合之，故效果良佳。如見目瞑汗出，急用獨參湯灌之以回陽急救。若見惡露未淨所致血暈，乃本虛標實，宜引血祛瘀，用“清魂散”（即當歸，元胡，血竭，沒藥，荊芥炭，童便等），待瘀下后再補。可用毫針刺眉心（即印堂穴）出血，促其蘇醒。

## 22. 國譯 傳奇主女科<sup>30)</sup>

婦人이 겨우 出產 한 후에 갑자기 眼目昏花 嘔惡欲吐 心中無主 或神昏外越 恍然함이 하늘위에 구름이 가는 것 같은데 사람들은 惡血이 心을 相衝한 疾患이라 여기니 누가 이것이 氣虛欲脫하여서 그렇게 된다는 것을 알겠는가？ 대개 新產한 婦人은 血이 반드시 盡傾해져 血室이 空虛하며 단지 幾微의 氣만 남게 된다。 만일 그사람이 陽氣가 평소 虛한 사람이라면 生血을 할 수 없으며 心中の 血은 前에 이미 薩胎하였고 胎墮할 때 心中之血 또한 隨胎하여 모두 墮되어 心은 血을 滋養할 수 없고 依存하는 것은 幾微의 氣로서 堅固하게 할 뿐이다 지금 氣 또한 虛하여 脫하려 하고 君心이 保護를 받지 못하므로 殘血을 남기니 빨리 主를 회救하려고 하나 血은 正血이 아니어서 歸經할 수 없고 內庭이 變亂하여 血暈의 症狀이 생긴다 治法은 반드시 氣血을 大補해야 하며 결코 血暈을 單治해서는 안된다。或 血暈이 血熱이 相衝되어 생긴다고 의심되어 다시 補氣血하면 더욱 相衝之勢를 돋지 않겠는가？ 이를 모르면 新血이 生하지 못하고 舊血이 散하지 못하니 補血하여서 新血을 生하고 活血하여서 舊血을 逐出한다。그러나 血은 有形之物이므로 速生하기 어렵고 氣는 無形之物이므로 迅發하기 쉬우니 補氣로서 補血하는 것이 補血로서 生血하는 것보다 더욱 쉽지 않겠는가？

### <補氣解暈湯>

人蔘 黃芪 生各一兩 當歸不酒洗 一兩 黑荊芥穗 三錢 薑炭一錢 水煎服한다  
一劑면 血暈이 그치고 二劑면 心이 安定되고 三劑면 血生하고 四劑면 血旺하여 다시血暈하지 않게 된다. 이는 解暈하는 聖藥으로 人蔘 黃芪로서

補氣하여 氣壯하게 하여 生血하며 當歸로서 補血하여 血旺하게 하며 氣를 慎養하니 氣血이 兩旺하면 心은 저절로 安定이 된다. 荊芥로서 引血歸經하며 薑炭으로서 行瘀引陽하여 瘀血이 除去되면 正血이 돌아와 解暈이 필요없이 血暈이 自解된다. 方中에 藥이 五味에 지나지 않으나 그 功이 奇異하며 크니 이와같이 神效함이 있겠는가？

## 23. 漢藥臨床應用<sup>31)</sup>

### ◆ 人蔘 (Ginseng Radix)

基源：五加科 人蔘의 根을 乾燥한 것이다.

性味：味甘・微苦，性微溫，(歸經：肺・脾經)

藥理作用：大補元氣，安神益氣，健脾益氣，生津

(1) 神經系의 興奮

(2) 下垂體-副腎皮質系의 興奮

(3) 性機能의 增強

(4) 强心

(5) 血壓降下

(6) 消化吸收・新陳代謝를 높이고, 食慾을 增進하며・蛋白合成을 促進한다.

(7) 抗利尿

(8) 抗 Anaphylaxie

臨床應用：急性 shock와 慢性 虛弱症에 使用한다.

### ◆ 黃芪 (Astragalus Radix)

基源：豆科 黃芪의 根을 乾燥한 것

性味：味甘，性微溫(歸經：脾・肺經)

藥理作用：補氣升陽，固表止汗，利水消腫，托毒排膿

(1) 强壯

(2) 利尿

(3) 抗腎炎

(4) 降壓

(5) 血管擴張

(6) 强心

(7) 抗菌

臨床應用：慢性衰弱，中氣下陷(脫肛・子宮脫・內臟下垂・子宮出血)，痺症，表虛自汗，急・慢性 腎炎，久敗의 化膿症

### ◆ 當歸 (Angelicae gigantis Radix)

**基源：** 薑形科 當歸의 根을 乾燥한 것

**性味：** 味甘·辛, 性溫(歸經：心·肝·脾經)

**藥理作用：** 補血·行血·潤腸·調經

(1) 子宮機能調節

(2) 鎮靜·鎮痛

(3) 利尿

(4) Vitamin E 缺乏症

(5) 抗菌作用

**臨床應用：** 月經調整, 心血虛症狀(動悸·健忘·不眠·精神不安), 打撲·捻挫·血栓性動脈炎, 虛寒으로 因한 氣血瘀滯型 腹痛, 慢性 化膿症, 腸燥便秘

#### ◆ 莖芥(Schizonepetae Herba)

**基源：** 脣形科 莖芥의 穗가 달려 있는 莖枝 또는 穗炒黑한 것을 黑菥芥 또는 莖芥炭이라 한다.

**性味：** 味辛, 性微溫(歸經：肺·肝經)

**藥理作用：** 祛風解表·止血·產後血暈

(1) 發汗·解熱

(2) 消炎

(3) 止血

**臨床應用：** 外感(風寒·風熱), 咽喉炎·扁桃腺炎, 產後血暈, 蔴麻疹·風疹·癩疹 出血 을 治療할 경우 莖芥炭을 쓴다.

產後血暈을 治療하는데 莖芥穗를 使用한다 莖芥穗의 效能은 莖芥와 같은데 作用이 더 強하다.

#### ◆ 乾薑(Zingiberis Rhizoma)

**基源：** 生薑科 薑의 根莖을 乾燥한 것

**性味：** 味大辛, 性大熱(歸經：心·肺·脾·胃·腎經)

**藥理作用：** 溫中·回陽·溫肺化痰

(1) 循環促進

(2) 健胃·止嘔

(3) 升壓

**臨床應用：** 脾胃虛寒(慢性胃炎·慢性大腸炎·消化不良症), 痰飲, 虛寒症에 屬하는 崩漏·吐血·血便, Shock·虛脫(亡陽)

<附> 炮薑

乾薑을 炒黑이 되게 炮炙한 것이다.

味辛 苦 性大熱 效能은 乾薑과 비슷한데 溫裏 止血效果가 強하다. 吐血 不定性器出血 등의 陽虛出血에 使用한다. 또 產後血虛 裏寒 瘀血로 因한 腹痛에는 川芎 當歸를 配合하여 使用한다. 陰虛內熱 血熱妄行에는 禁忌다.

#### 24. 本草學<sup>[32]</sup>

##### ◆ 人蔘(Ginseng Radix)

**【基源】** 이 藥은 五加科(두릅나무과)에 속한 다년생 本草인 인삼의 뿌리를 乾燥한 것이다.

**【性味】** 性은 微溫 無毒하고, 味는 甘微苦하다.

**【歸經】** 脾·肺·心經

**【效能 主治】** 大補元氣, 固脫生津, 安神, 治勞傷虛損, 食少, 健忘, 反胃吐食, 大便滑脫, 虛咳喘促, 自汗暴驚, 驚悸, 健忘, 眩暉頭痛, 陽痿, 頻尿, 消渴, 婦女崩漏, 小兒慢驚, 久虛不復, 一切氣血津液不足

##### ◆ 黃芪(Astragali Radix)

**【基源】** 이 藥은 豆科에 속한 多年生 本草인 黃芪의 根을 乾燥한 것이다.

**【性味】** 性은 溫無毒하고, 味는 甘하다.

**【歸經】** 脾·肺經

**【效能 主治】**

- ① 生用 : 益衛固表, 利水消腫, 托毒, 生肌 治自汗, 盗汗, 血腫, 浮腫, 瘰疽不潰, 漢久不驗
- ② 炙用 : 補中益氣, 治內傷勞倦, 脾虛泄瀉, 脫肛 氣虛血脫, 崩帶, 一切氣衰血虛之證

##### ◆ 當歸(Angelicae gigantis Radix)

**【基源】** 蔷薇科에 속한 多年生 本草인 참당귀의 뿌리를 가을에 채취하여 乾燥한 것이다.

**【性味】** 性은 溫無毒하고, 味는 甘辛하다.

**【歸經】** 心·肝·脾經

**【效能 主治】** 補血和血, 調經止痛, 潤燥滑腸. 治月經不調, 經閉腹痛, 癰瘕結聚, 崩漏, 血虛頭痛, 眩暉, 瘻瘍, 腸燥便難, 瘰疽瘡瘍, 跌打損傷

##### ◆ 莖芥(Schizonepetae Herba)

**【基源】** 이 藥은 脣形科(꿀풀과)에 속한 一年生 本草인 형개의 地上部分을 乾燥한 것으로, 여름과 가을에 꽃이 피고 이삭이 퍼질 때 베어 雜質을 除去하고 晒乾한다

【性味】性은 溫 無毒하고, 味는 辛하다.

【歸經】肺·肝經

【效能 主治】發表, 散風, 透疹, 理血. 治感冒, 頭痛, 咽痛, 瘰疹, 風疹, 瘡瘍初期. 炒炭治便血, 崩漏, 產後血暈

#### ◆ 乾薑(Zingiberis Rhizoma)

【基源】이 藥은 生薑科(생강과)에 속한 多年生本草인 생강의 根莖을 乾燥한 것으로, 가을에 採取하여 曬干 혹은 微火로 烘乾한다.

【性味】性은 热 無毒하고 味는 辛하다.

【歸經】肺·脾·胃經

【效能 主治】溫中逐寒, 回陽通脈. 治心腹冷痛, 吐瀉, 肢冷脈微, 寒飲喘咳, 風寒濕痹, 陽虛吐衄, 下血

25. 本草學<sup>33)</sup>

#### ◆ 人蔘 (Ginseng Radix)

【基源】五加科(오갈피나무과)에 屬한 多年生草本인 爪의 根이다.

【性味】性은 微溫 毒하고, 味는 甘微苦하다.

【歸經】入脾 肺經(通行十二經, 大補益肺中元氣, 大益元陽之品)

【主治】大補益肺中元氣, 燥火除煩, 生津止渴, 開心益智, 聰明耳目, 安精神定魄魄, 止驚悸, 通血脉, 破堅積, 消痰水, 氣壯而胃自開, 氣和而食自化. 治虛勞內傷, 發熱自汗, 心腹寒痛, 傷寒溫疫, 嘔嘔反胃, 瘰癧羸弱, 淋瀝脹滿, 多夢紛紜, 離魂異疾, 妊娠吐水, 胎產諸虛, 小兒慢驚, 痘科險症, 因虛失血.

#### ◆ 黃芪 (Astragali Radix)

【基源】豆科(콩과)에 屬한 多年生 本草인 단녀 爪의 地下莖이다.

【性味】性은 微溫 無毒하고, 味는 甘하다.

【歸經】入脾·肺二經(實表補氣之品)

【主治】

生用固表, 無汗能發, 有汗能止, 溫分肉, 實腠理, 补肺氣, 燥陰火, 解肌熱.

炙用補中, 益元氣, 溫三焦, 將脾胃, 生血生肌, 排膿內托, 瘰癧聖藥, 痘症不起, 陽虛無熱者宜之.

#### ◆ 當歸 (Angelicae gigantis Radix)

【基源】傘形科(미나리과)에 屬한 多年生 本草인 참당귀의 뿌리다

【性味】性은 溫無毒하고, 味는 甘辛微苦하다.

【歸經】入心·肝·脾 三經(養血潤燥之品)

【主治】和血(甘溫), 散內寒(辛溫), 助心散寒(苦

溫), 治虛勞寒熱, 咳逆上氣, 溫瘡潰爛, 頭痛腰痛, 心腹肢節諸痛, 跌打血凝作瘡, 風瘡無汗, 痘瘡癰癧, 痘症癰疽瘡瘍, 婦人諸不足, 一切血症, 潤腸胃, 澤皮膚, 祛瘀生新, 溫中養營, 活血舒筋, 排膿止痛

#### ◆ 薏苡(Schizonepetae Herba)

【基源】唇形科(꿀풀과)에 屬한 一年生 本草인 형개의 禾穀와 莖葉을 乾燥한 것이다.

【性味】性은 溫 無毒하고, 味는 辛하다.

【歸經】入 肝經 兼入膽, 胃, 肺 三經(發表祛風理血之品)

【主治】發汗, 散風濕, 利咽喉, 清頭目. 治傷寒頭痛, 中風口噤, 身強項直, 口眼喎斜, 通利血脉, 吐衄腸風, 崩中血痢, 產後血暈

#### ◆ 乾薑(Zingiberis Rhizoma)

【基源】生薑科(생강과)에 屬한 多年生 本草인 생강의 根莖을 乾燥한 것이다.

【性味】性은 溫無毒하고 味는 辛하다.

【歸經】入心, 肺, 脾, 胃, 腎, 大腸六經(除寒散結回陽通脈之品)

【主治】

生用時 - 逐寒邪而發表

炮用時 - 辛苦大熱, 除胃冷而守中, 溫經止血, 定嘔消痰, 祛臟腑沈寒痼冷, 能去惡生新.

<補氣解暈湯에 對한 各 文獻의 藥物構成比較表>

| 書名      | 藥物構成                                |
|---------|-------------------------------------|
| 傅青主女科   | 人蔘一兩 生黃芪一兩 當歸一兩不酒洗<br>黑芥蔥三錢 薑炭一錢    |
| 辨證錄     | 人蔘一兩 黃芪一兩 當歸一兩 黑芥三錢<br>炮薑一錢         |
| 方藥合篇    | 人蔘 黃芪 當歸 各五錢 荊芥一錢五分<br>薑炭五分         |
| 韓方婦人科   | 人蔘 黃芪 當歸 各五錢 荆芥炒黑一錢半<br>臨床診療        |
| 中醫婦科學   | 人蔘30克 生黃芪30克 當歸30克<br>黑芥蔥9克 薑炭3克    |
| 國譚傅青主女科 | 人蔘 黃芪 各一兩 當歸不酒洗一兩<br>黑荊芥蔥三錢 薑炭一錢    |
| 傅青主女科發揮 | 人蔘一兩 生黃芪一兩 當歸一兩不酒洗<br>黑芥蔥三錢 薑炭一錢    |
| 傅青主女科新解 | 人蔘30克 生黃芪30克 當歸30克不酒洗<br>黑芥蔥9克 薑炭3克 |
| 婦人科方劑學  | 人蔘12g 黃芪30g 當歸12g 黑荊芥10g<br>薑炭3g    |

&lt;補氣解暈湯에 대한 각 문헌의 服用法 比較表&gt;

| 書名        | 主治症                       |
|-----------|---------------------------|
| 傅青主女科     | 水煎服一劑暈止 二劑心定 三劑血生 四劑血旺再不暈 |
| 辨證錄       | 水煎服                       |
| 方藥合編      | 水煎服                       |
| 韓方婦人科臨床診療 | 水煎服                       |
| 中醫婦科學     | 水煎服                       |
| 國譯傅青主女科   | 水煎服                       |
| 傅青主女科發揮   | 水煎服                       |
| 傅青主女科新解   | 水煎服                       |
| 婦人科方劑學    | 水煎服                       |

&lt;補氣解暈湯에 대한 각 문헌의 主治症 比較表&gt;

| 書名        | 主治症   |
|-----------|---|
| 傅青主女科     | 婦人甫產兒時 忽然眼目昏花 嘴惡欲吐 中心無主 神魂外越 人以為惡血奔心之患也   |
| 辨證錄       | 婦人甫產後 忽眼目昏暈 惡心欲吐 額上鼻尖有微汗 鼻出冷氣 神魂外越 成血暈之證矣   |
| 方藥合編      | 產後血暈-產後의 瘀血로 因한 어지러운 症勢   |
| 韓方婦人科臨床診療 | 갑자기 暈厥하여人事不省 面白 膜淡 呼吸微弱 手足厥冷 脈微欲絕하는 腦貧血의 症狀   |
| 中醫婦科學     | 分娩後 突然頭眩眼花 不能起坐 或心胸滿悶 惡心嘔吐 痰松氣急 心煩不安 甚即口噤神昏 人事不省 稱爲產後血暈<br>全身症狀：面蒼白 眼閉口開 手散指冷 冷汗淋漓 脈微欲絕 或浮大而虛 |
| 國譯傅青主女科   | 婦人分娩後 忽然眼目昏花 嘴惡欲吐 中心無主 神魂外越   |
| 傅青主女科發揮   | 婦人甫產兒時 忽然眼目昏花 嘴惡欲吐 中心無主 神魂外越 人以為惡血奔心之患也   |

|             |  |
|-------------|--|
| 傅青主女科<br>新解 | 症見產後陰道出血多 突然出現頭暈目眩，面色蒼白，心悸不安，瀕悶不適，漸至昏不知人，甚而四肢厥冷，冷汗淋漓，手撤眼閉口開，舌淡無苔，六脈微細欲絕或 浮大而虛。 |
| 婦人科方劑學      | 產後氣虛血暈<br>婦人產後失血過多，突然眼目昏花，嘔惡欲吐，心神不定，精神恍惚，面色蒼白，呼吸微弱，脈沈細欲絕                       |

### III. 總括 및 考察

補氣解暈湯은 清代 傅<sup>11)</sup>의 傅青州女科에 처음  
수록된 處方으로 人蔘一兩 生黃芪一兩 當歸一兩  
不酒洗 黑芥蔥三錢 薑炭一錢으로構成되어져서 大  
補氣血 行瘀血으로 產後血暈을 治療하는데 活用되  
어 왔다.

產後血暈이란 產後急症의 하나로 娃産婦가 出產  
後 갑자기 頭暈·頭眩·目華하고 일어설 수 없거나  
或 心胸이 답답하고 惡心·嘔吐·心煩不安하고  
甚하면 口噤·神昏·人事不省하게 되는 것을 말한다<sup>1-4)</sup>. 產後 發生하는 疾病중의 하나인 產後血暈이  
란 產後眩暈의 뜻으로 鬱冒 혹은 暗風이라고도 부  
르는데, 이는 婦人이 分娩後 忽然히 頭眩目華하고  
일어설 수 없거나 혹은 心胸이 답답하고 惡心 嘔吐  
하고 心煩不安하고 심하면 口噤 神昏 人事不省하는  
症狀을 指稱한다<sup>1-4)</sup>.

一般的인 眩暈은 動脈硬化症, 高血壓, 低血壓과  
같은 心臟血管系統의 疾病, 各種 貧血, 白血病과  
같은 血液疾患, 頭部外傷과 그 後遺症, 腦炎, 腦腫瘍과  
같은 中樞神經系疾患, 甲狀腺機能低下, 低血糖,  
肝性昏睡 등과 같은 內分泌 및 代謝性 疾病,  
迷路炎을 비롯한 耳鼻咽喉科疾患, 그 밖에 藥物中  
毒과 副作用등 많은 疾病에서 볼 수 있다<sup>37)</sup>.

出產後 發生하는 眩暈인 產後血暈에 대해서 劉  
<sup>38)</sup>는 “產後血暈 有因惡露排泄未盡 內有停瘀 血氣  
上攻 使腦部充血 發生血暈的：有因產後失血過多  
以致腦部貧血 而發生血暈的” 이라 하여 腦部貧血  
과 腦部充血로써 眩暈이 發生한다고 하였고, 王<sup>39)</sup>

은 產後血暈은 西洋醫學의 으로 異常妊娠, 前置胎盤, 胎盤早期剝離, 不完全 流產등의 各種 原因에 의한 大出血 및 子宮破裂, 子宮頸部損傷, 會陰陰道裂傷, 膀胱과 直腸 損傷등의 婦人科의 損傷에 起因한 產後出血과 血液容量의 減少로 誘發된 循環障礙, 組織內 酸素不足, 代謝機能 紊亂과 意識障碍에 該當된다고 하였다.

產後血暈의 原因에 대해 張<sup>6)</sup>은 產後亡血後, 血虛하여 厥하면 반드시 冒가 되어 眩暈을 일으킨다고 하였고, 巢<sup>5)</sup>는 產後去血過多로 血虛 氣極하거나, 下血하는 量은 적으나 오히려 氣逆하여 血이 氣를 따라 心으로 上冲하기 때문이라 하였는데, 前者는 後者에 比해 虛症에 屬하고 後者는 瘀血不下하여 閉厥의 實證을 나타낸다고 볼 수 있다.

產後에 發生하는 疾病들은 대부분 產母가 極度로 氣血이 衰竭된 狀態에서 發生하기 때문에 食餌나 攝生이 잘못 지켜지면 害를 끼치게 되고, 또한 藥物服用도 產母에게 커다란 危害를 끼칠 수 있기 때문에 攝生 및 食餌, 產後病의 豫防과 治療法, 治療方劑들이 다른 痘症보다 重要하므로, 歷代醫家<sup>2,19,34~36)</sup>들은 產後의 治療方法에 對하여 大補氣血等 아니라 瘀血을 消散시키는 治法을 主張하였다.

治療法에 있어서도 失血過多로 因한 血虛氣脫과 惡露不出로 因한 瘀阻氣逆의 두 가지로 나누어 大補氣血 活血祛瘀의 治法으로 治療하고 있다<sup>1), 5~11, 22, 23)</sup>.

補氣解暈湯은 血虛氣脫型 血暈을 治療하기 위해 大補氣血하는 藥材로 構成된 處方<sup>1, 11, 15, 18, 22~30)</sup>으로 人蔘, 黃芪, 當歸, 荊芥, 黑薑으로 構成되어 있다.

各 藥材의 效能에 대해 살펴보면, 人蔘은 五加科(Araliaceae)에 屬하는 多年生 本草인 蔘의 根으로 正氣가 虛하여 外部로부터 들어오는 邪氣의 侵害을 받아 疾病이 發生한 境遇나 疾病後 正氣가 虛한 狀態에 正氣를 補하는 補養藥으로 使用되었고, 大補元氣, 驅火除煩, 生津止渴 健脾益氣, 安神益智 등의 效能이 있어 虛勞內傷, 發熱自汗, 反胃, 吐食, 諸虛, 因虛失血, 食少, 胎產諸虛, 妊娠吐水 등의 治療에 使用되어지고 있다<sup>31~33)</sup>.

黃芪는 豆科(Leguminosae)에 屬한 多年生 本草인 단녀삼의 地下莖으로 補氣升陽, 固表止汗, 溫分

肉, 實腰理 補肺氣, 益元氣, 生血生氣, 利水消腫, 排膿托毒 등의 效能이 있어 慢性衰弱, 脫肛, 子宮脫, 內臟下垂, 子宮出血등의 中氣下陷, 痢症, 表虛自汗, 血虛眩暈, 崩漏, 小兒身體虛弱, 結核性 疾患, 急·慢性腎炎의 治療에 活用된다<sup>31~33)</sup>.

當歸는 繖形科(Umbelliferae)에 屬한 多年生 本草인 참당귀의 뿌리로 和血, 散內寒, 補血, 行血, 潤腸, 調經의 效能이 있어 頭痛, 腰痛, 心腹肢節諸痛, 婦人諸不足一體血症, 子宮機能의 調節, 月經痛, 動悸·怔忡·不眠·精神不安, 鎮痙, 利尿, 抗菌, 慢性化膿症, 腸燥로 인한 便秘, 腹痛, 打撲, 捻挫등의 治療에 活用되고 있다<sup>31~33)</sup>.

荆芥는 脣形科(Labiatae)에 屬한 1年生 本草인 荊芥의 花穗가 달려 있는 莖葉와 花穗를 乾燥한 것으로 祛風解表, 理血 散風濕, 利咽喉, 清頭目의 效能이 있어 傷寒頭痛, 身強項直, 口眼喎斜, 崩中血痢 產後血暈, 咽喉炎, 扁桃腺炎, 出血, 莎麻疹, 風疹, 癲癇 등에 活用되고 있다<sup>31~33)</sup>.

乾薑은 生薑科(Zingiberaceae)에 屬한 多年生 本草인 생강의 根莖을 乾燥한 것으로 溫中·回陽通脈·溫肺化痰, 除寒散結의 效能이 있어 脾胃虛寒으로 因한 惡心·嘔吐·吃逆·腹痛·泄瀉, 咳嗽, 崩漏, 血便, 虛脫(亡陽), 眩暈 등의 治療에 活用되어지고 있다<sup>31~33)</sup>.

以上에서 살펴본 바와 같이 人蔘과 黃芪로 補氣하고, 當歸로 補血하며, 荆芥로 理血, 清頭目하고, 黑薑으로 溫中·回陽通脈하는 效能이 있어 氣가 旺하면 生血하고 血旺하면 養氣하는바, 氣血이 旺하면 心은 自然 安靜되고<sup>25, 31~33)</sup> 瘀血을 除去하므로써 解暈하여 正血이 循環하게 된다<sup>25, 31~33)</sup>.

즉 補氣解暈湯은 各 藥物의 補氣血, 理血, 清頭目, 回陽通脈하는 作用을 通하여 產後血暈症을 治療하는 것으로 料된다.

構成 藥物의 用量은 처음 《傅青主女科》<sup>11)</sup>에서 記載된 人蔘一兩 生黃芪一兩 當歸一兩不酒洗 黑芥蕙三錢 薑炭一錢으로 크게 變化가 없으며 處方의 加減이 거의 없었다. 《中醫婦科學》<sup>1)</sup>, 《辨證錄》<sup>18)</sup>, 《傅青主女科新解》<sup>28)</sup>, 《傅青主女科發揮》<sup>29)</sup>, 《國譯 傅青主女科》<sup>30)</sup>에서는 《傅青主女科》<sup>11)</sup>에서와 同量으로 構成되어 있으며, 《漢方婦人科臨

床診療》<sup>23)</sup>, 《方藥合編》<sup>24)</sup>, 《方藥合編解說》<sup>25)</sup>에서는 用量을 半으로 減量하여 構成되어 있으며, 《婦人科方劑學》<sup>27)</sup>에서는 人蔘 12g, 黃芪 30g, 當歸 12g, 黑荊芥 10g, 乾薑炭 3g으로 黃芪가 君藥으로 當고, 荊芥의 用量이 增加되었는데 이는 补氣祛風시키는 作用을 強化 시킨 것이라고 볼 수 있다.

補氣解暈湯은 處方構成이 單純하면서 治療效果가 優秀한 處方이나 後世에 많이 活用되지 못하였는데, 氣血暴虛로 因한 產後乏乳, 閉經, 或은 產婦의 抵抗力 弱化로 因한 產褥期에 感染이 畏고, 產後血暈이 產科의 重症中 하나인 것을 볼 때 活用할 價值가 있는 處方으로 思料된다.

#### IV. 結論

補氣解暈湯에 關한 文獻的 考察 結果, 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 補氣解暈湯은 清代 傅青主女科에 처음 收載된 處方으로 分娩後 突然頭眩眼花 不能起坐 或心胸滿悶 惡心嘔吐 心煩不安 甚即口噤 神昏人事不省 等의 症狀을 隨伴하는 產後 血暈에 活用되어져 왔다.
2. 補氣解暈湯은 方劑 構成上 人蔘, 黃芪로서 补氣하고 當歸로 补血하며, 荊芥로 引血歸經하고, 薑炭으로 行瘀引陽하는 效能이 있어 產後 治療原則인 大補氣血, 逐瘀血에 適合한 處方임을 알 수 있었다.
3. 補氣解暈湯의 藥物構成은 時代의 으로 加減變化가 없었다.
4. 補氣解暈湯 構成藥物의 用量은 文獻別로 다소 차이가 있으나 큰 變化는 없었다.

#### 參考文獻

1. 羅元愷 外 : 中醫婦科學, 北京, 人民衛生出版社, pp. 259-262, 1988.
2. 宋炳基 : 韓方婦人科學, 서울, 杏林出版社, pp. 467-469, 1978.
3. 楊醫亞主編 : 中醫學問答 下卷, 北京, 人民衛生出版社, p. 238, 1985.
4. 張愛芳 : 中醫婦科學表解, 天津科技翻譯出版公司, 河北省, pp. 150-152, 1995.
5. 巢元方 : 諸病源候論校釋, 서울, 경답출판사, pp. 1198-1199, 1993.
6. 張景岳 : 景岳全書 婦人規, 廣東, 廣東科學技術出版社, pp. 219-222, 1984.
7. 繪損 : 女科經論, 江蘇省, 江蘇科學技術出版社, pp. 175-186, 1886.
8. 李鍾筆 編 : 韓方婦人科臨床診療, 癸丑文化社, 서울, pp. 629-632,
9. 孫宰燁 : 產後血暈에 關한 文獻的 考察, 大田大 論文集(韓醫學編), Vol. 1 No. 2(237-254), 1992.
10. 具恩貞 : 產後血暈의 原因, 症狀, 治法 및 治方에 關한 연구, Vol. 1 No. 1 : 001-018, 1997.
11. 傅山 : 傅青主男女科, 台北, 力行書局有限公司, pp. 169-170, 186-187, 1981.
12. 張仲景 : 金匱要略, 北京, 北京中醫研究院, p. 407-408, 1987.
13. 王燾 : 外臺秘要, 서울, 大星文化社, pp. 426-430, 1992.
14. 齊仲甫 : 女科百聞, 서울, 醫聖堂, pp. 60-62, 1983.
15. 錢鏡湖 : 辨證寄聞全書, 台北, 甘地出版社, p. 447-449, 1980.
16. 裴正學 編 : 血證論評釋, 서울, 一中社, pp. 167-168, 1991.
17. 姜明孜 : 臨床產婦科學, 서울, 成輔社, pp. 287-290, 1989.
18. 陳士鐸 : 辨證錄, 北京, 人民衛生出版社, pp. 737-740, 1989.
19. 金永勳 : 青崗醫監, 서울, 成輔社, p. 436, 1984.

20. 範和尚 : 重刊女科秘方, 中國醫學大成續編九  
卷, ?沛然, 上海科學技術出版社, 1992.
21. 龔廷賢 : 壽世保元, 서울, 醫聖堂, p. 618, 62  
1, 1966.
22. 李鍾華 외 : 標準韓方婦人科, 醫藥社, 서울,  
p. 394, 1979.
23. 李鍾筆 編 : 漢方婦人科臨床診療, 癸丑文化  
社, 서울, pp. 629-632.
24. 黃度淵 : 對譯證脈方藥合編, 서울, 南山堂, p.  
343, 1989.
25. 申載鑄: 方藥合編解說, 傳統醫學研究所, pp.  
331-332, 1993.
26. 朱南孫 외 : 朱小南婦科經驗選, 第 1 版, 北  
京, 人民衛生出版社, p. 88, 1981.
27. 大田大學校 第12期 卒業準備委員會 編譯 :  
婦人科方劑學, 木瓜社, 서울, p. 227, 2000.
28. 肖進順 編著 : 傅青主女科新解, 北京, 學苑出  
版社, pp. 134-136, 1999.
29. 謝孟志 編著 : 傅青主女科發揮, 北京, 中國中  
醫藥出版社, pp. 122-123, 1998.
30. 尚志大學校 韓醫科大學 第 2 期 卒業準備委  
員會: 國譯 傅青主女科, 서울, 大成文化社 p  
p. 269-271, 1995.
31. 李尚仁 외 : 漢藥臨床應用, 서울, 成輔社, pp.  
49-50, 230-232, 345-350, 353-356, 399-402,  
1982.
32. 全國韓醫科大學 本草學 教授 共編 : 本草學,  
서울, 永林社, pp. 127-128, 334-335, 531-53  
3, 534-536, 578-580, 1991.
33. 李尚仁 : 本草學, 서울, 學林社 pp. 51-56, 1  
01-103, 192-193, 388-389, 1986.
34. 朱丹溪 : 丹溪心法附餘, 서울, 大星文化社, p  
p. 749-763, 1982.
35. 壞天民 : 醫學正傳, 서울, 成輔社, p. 377, 19  
86.
36. 尹吉榮 : 東醫臨床方劑學, 서울, 名寶出版社,  
p. 547, 1985.
37. 과학백과사전총합출판사 : 東醫學辭典, 서울,  
驪江出版社, p. 971, 973, 1144, 1989.
38. 劉子剛 : 婦科病中醫治療法, 台北, 文化圖書  
有限公司, pp. 179-170, 1979.
39. 王愛芹 外 : 實用中西醫結合婦科學, 北京, 北  
京出版社, pp. 659-662, 1996.
40. 金完熙 外 : 臟腑辨證論治, 서울, 成輔社, pp.  
60-61, 1993.
41. 郭志強 외 : 中醫婦科治療大成, 河北, 河北  
科學 技術 出版社, pp. 336-339, 1997.