

名人處方

編輯委員會

1. 「金四物」活用方 (全北 舊泰仁 故 金昌浩先生 方文)

- 四物湯 - 當歸 川芎 白芍藥 熟地黃 各2錢(但投量加減隨意)
- 血熱 加 丹蔘 牧丹皮 益母
 - 血熱脚痛 加 牛膝 知母 黃柏
 - 血寒 加 桂心 牛膝
 - 經水將來痛者는 血實氣滯니 或心腹連腰作痛이니라
 加 黃連 香附子 玄胡索 牧丹皮 蓬朮 青皮 桃仁 紅花 換生地黃
 - 經水過期不來作痛者는 血虛有寒이니라
 加 香附子 肉桂 木通 蓬朮 蘇木 桃仁 紅花 甘草
 - 經行時 腰腹疼痛에 拒按者 加 玄胡索 香附子 木香
 - 經後 腹痛에 喜按者 加 人蔘 白朮 乾薑 甘草
 - 經事에 血少하고 色淡한 者 同上
 - 經閉 腹痛 加 苦練皮 2錢 地黃 4倍
 - 經水先期來者는 血虛有熱이니 用生地黃하고 加 香附子 黃芩 黃連 阿膠
 知母 黃柏 甘草 竹葉
 - 經水過期而來하고 紫黑成塊者는 氣鬱血滯이니 用生地黃하고 加 香附子
 玄胡索 牧丹皮 青皮 桃仁 紅花 甘草
 - 經水去多 久不止豆 發腫滿者는 是脾經血虛이다.
 加 白朮 荻苓 砂仁 腹皮 厚朴 陳皮 木香 蘇子 猪苓 木通 香附子 玄胡
 索 牛膝 甘草
 - 經水月久不行에 發腫者는 是 瘀血 渗入脾經이니 去地黃하고 加 牧丹皮
 乾薑 肉桂 厚朴 木香 只角 香附子 牛膝 紅花 玄胡索 桃仁

- 經水先期 而至하여 血紫有塊하고 腰腹痛하여 手足冷痺에 口乾 頭眩하면 用生地黃하고 加 黃芩 菊芥 香附子 小茴 繢斷 玄胡索 杜沖 地榆 甘草
- 錯經忘行하여 於口鼻出者는 是火載血上氣之亂이니 用生地黃하고 加 黃芩 桔子 牧丹皮 犀角 阿膠 茯苓 麥門 陳皮
- 經水行後 作痛者는 氣虛니 合 四君子湯하고 加 乾薑
- 經水過期而來에 色淡者는 痰多이니 加 半夏 陳皮 赤茯 甘草 生薑
- 經水適來適斷에 或寒來往이면 先服 小柴胡湯하고 後用此湯
- 肥白人으로서 經水過期者는 是 痰이니 用 二陳湯에 加 南星 蒼朮 香附子 滑石 菖歸
- 經水過多 久不止者로 成 血崩이면 用生地黃 加 白朮 黃芩 阿膠 茯苓 桔子 地榆 菊芥 香附子 甘草
- 經水過多 加 黃芩 白朮
- 經水澁少 加 萍花 紅花
- 骨蒸勞熱 加 地骨 知母 柴胡 黃芩
- 血虛發熱 將成虛勞 加 牧丹皮 玉竹 麥門冬 山藥 白茯
- 孕婦胎氣上逆 加 黃芩 白朮
- 孕婦 咳嗽 加 沙蔘 2錢5分 桑白 5分
- 同上一方 加 五味 桑白 沙蔘 麥門 各1錢 橘皮 杏仁 各5分 甘草 3分
- 孕婦飲食不進 加 益母 草果 砂仁 各5分 甘草 3分
- 孕婦觸房犯事 加 柴胡 5分
- 孕婦腹脇痛 加 山香 苦練 各2錢 乾薑 1錢5分
- 孕婦胎動不安 下血不止 加 艾葉 阿膠 黃芩
- 血臟虛冷 崩中去血過多 加 阿膠 艾葉
- 血崩 加 蒲黃 用生地黃 一方 加 阿膠 艾葉 黃芩
- 胎漏下血 用 膠艾四物湯 亦好
- 漏血 加 人蔘 薑三 棗二
- 便前下血 加 阿膠 1錢 黃連 黃芩 各5分

■名人處方

- 便後下血 加 黃芪 槐花 槐角
- 便血 無論前後 加 黃芪 砂仁 杏仁 各1錢 黃連 黃芩 各5分
- 赤白帶下 加 香附子 白芷
- 便滑 加 乾薑 桂枝
- 水泄 或 水氣上逆 嘔吐不止 加 人蔘 半夏 益智 各1錢 丁香 5分
- 膽中虛冷 腹疼 腰脊間痛 加 玄胡索 川練子
- 腹中痞滿 去地黃 加 丹蔘 陳皮 香附子
- 膽腹痛 加 只實 桔梗 各1錢
- 小腹痛 地黃 4倍 白芍藥倍加
- 腹痛或咳喘吐血 加 黃芪 人蔘 各3錢 防風 1錢
- 夜間咳嗽 加 乾薑 桂枝 五味
- 感冒瘥後 自汗 咳嗽 加 人蔘 白茯
- 胸膈痞滿 加 香附子 半夏 草果 只實 桔梗
- 中濕身重無力 身冷微汗 加 白茯 白朮 兼 筋骨 肢節 疼痛及 憎寒 頭痛 加 羌活 防風 細辛 藁本
- 下元不足 氣逆咳喘 加 乾薑
- 脊下牽引痛 加 檳榔 青皮 各5分
- 氣上沖心 脫肋刺痛 加 苦練皮 玄胡索 1錢 木香 檳榔 各5分
- 身熱煩疼引飲 加 升麻 葛根
- 傷寒壞症 加 黃芩 白朮 各1錢 人蔘 5分
- 血虛發熱 加 乾薑 2錢5分 牡丹皮 1錢5分 柴胡 5分
- 房勞傷寒熱如瘡 加 乾薑 牡丹皮
- 婦人 頭痛 肢節痛 倍 川芎 加 白芷
- 血熱 相搏 舌乾口渴 加 天花 麥門
- 嘔吐 加 車前 5錢
- 咽痛 加 乾薑 2錢
- 膽臟秘澁 加 大黃 桃仁

- 怔忡 加 香附子 茯神 砂仁 橘皮
- 月事不調及蛔腹痛 加 苦練 1錢5分 薑三 棗二 梅二
- 火鬱 倍 當歸 加 沙蔘 肉桂 五味 菖蒲
- 眩暈 加 藜芻
- 眼疾 赤腫風瘡 加 黃芩 防風 各1錢 人蔘 桔梗 各5分
- 眼疾 加 羌活 防風
- 目暴 赤作 翳疼 加 羌活 防風 防己 龍膽
- 煩熱 頭痛 惡寒 發熱 加 牧丹皮 白朮 柴胡 黃芩
- 左半身不遂 加 桂枝 1錢 或加 桃仁 紅花
- 鮎血 加 黃芪 5錢 防風 5分
- 頸強 加 人蔘 黃芩
- 虛損不昧 加 人蔘 酸棗 竹葉
- 淋疾 龜頭 紅腫 加 黃連 連翹 各5分
- 瘰疾 加 乾葛 牧丹皮 各2錢 柴胡 5分
- 難產 加 車前 2錢
- 血痢 加 黃連 阿膠
- 產前 血痢腹痛 加 黃連 槐花 粟角
- 產後 惡寒不通 加 桃仁 蘇木 牛膝
- 小兒感冒 加 烏藥 防風 升麻
- 小兒 寒熱 往來 自汗 痿軟 加 升麻 3分
- 小兒 麻疹 痘疹 初痛 加 肉桂 5分
- 小兒 消斑後 不食 加 神曲 砂仁
- 小兒 痘後餘症 加 黃芩
- 麻疹前後 有 潮熱不退等症에 發渴 加 麥門冬 犀角汁 嗽 加 瓜萎 有痰 加 貝母 陳皮 紅紫 乾燥 暗晦 用生地黃 加 紅花 黃芩
- 產後 惡寒不盡하여 畫則明了하고 暮則譫語에 寒熱이 尤甚往來하야 如見 鬼狀은 此熱入血室이니 加 柴胡 最效

■ 名人處方

- 產婦 無兒豆 吃乳致하여 乳汁腫脹으로 堅硬疼痛하야 難忍者는 加 麥芽 5錢
- 產婦 虛弱하여 乳汁不通者는 加 赤茯 天花 麥門 王不留行 山甲 木通 甘草

► 补血湯 - 治 血虛 功倍四物湯

熟地黃 1兩 當歸 5錢 麥門 枸杞 各3錢 甘草 1錢 桑葉 1片

2. 「崔五積」活用方 (故崔致文先生 方文 全州市大正洞六番地)

► 五積散 - 當歸 川芎 白芍藥 蒼朮 厚朴 陳皮 半夏 白茯 白芷 枳殼 桔梗 各1錢 麻黃 8分 乾薑 官桂 各5分 甘草 2分 薑三 棗三

- 外感 挾滯 加 山楂肉 神曲 檳榔
- 動蛔 加 島梅 川椒
- 風溼 加 羌活 獨活 防風
- 腰痛 加 牛膝 杜沖 小茴
- 手足攣拳 加 檳榔 木果 牛膝
- 咳嗽 加 杏仁 桑白
- 足浮腫 加 大腹皮
- 挫閃及瘀血腫痛 去麻黃 加 茴香 檳榔 木香 桃仁 紅花
- 風傷腎腰左右無常強急 加 防風 全蝎
- 遍身疼痛 加 乳香 沒藥 細辛
- 難產 加 肉桂 射香
- 產後 挾滯 瘀血 腹痛去 麻黃 加 山楂 2錢 玄胡索 1錢
- 寒濕 客於經絡하여 腰脚酸痛이면 加 牛膝 杜沖 羌活 防風
- 虛弱之人으로 患瘡 初起 感寒者는 加 柴胡 草果 黃芩 檳榔 薑三 葱二
- 感風濕手搏하여 或通 或木 或遍身 麻木者는 加 羌活 防風 全蝎
- 寒邪人浸에 內傷生冷하여 肚腹痛不已하고 手足厥冷者는 倍加 官桂
- 臂痛 因於寒者 加 草烏

- 四肢骨節痛因虛寒者 加 羌活 獨活 山甲
- 風濕流注 兩脚酸痛 加 羌活 獨活 檳榔 烏藥 木香
- 痘氣 發寒月者는 多是寒邪 入膀胱이니 加 沙蔴 茴香
- 婦人 經行時 肢體麻疼하고 寒熱頭痛에 目眩等症은 此 觸經感冒니 去 乾薑하고 加 羌活 獨活 牛膝 薑葱
- 帶下屬虛寒者 加 香附子 茴香 吳茱
- 胎死腹中에 產母氣乏하여 產道乾澀거나 或 手足冷腹痛이면 去麻黃하고 加 川烏 附子 南星 阿膠炒 木香 砂仁

3. 「鄭平陳」活用方 (元山市 大和洞 保元局 鄭鳳祥先生 方文)

- 平胃散 - 蒼朮 2錢 厚朴 陳皮 各1錢5分 甘草 1錢
- 食滯 腹痛 泄瀉 加 葛根 2錢 澤瀉 五味子 各1錢
 - 肉滯 加 山楂 3錢 草果 1錢
 - 麵滯 加 神曲 麥芽 各1錢
 - 酒滯 加 葛根 良薑 2錢 赤茯 神曲 砂仁 草豆蔻 各1錢
 - 生冷瓜傷食 加 乾薑 青皮 各1錢
 - 泄瀉 加 白朮 白茯 各1錢
 - 嘔吐 加 半夏 烏梅一方 加 蕁香 半夏 益智 各1錢
 - 痰結 脇痛 加 葛根 牡丹皮 各1錢
 - 痰痞 飲食不進 加 白芍藥 2錢 草果 砂仁 各1錢
 - 浮腫 加 腹皮 白芍藥 各1錢 檳榔 木香 各5分
 - 臂痛 加 桂枝
 - 脚氣 加 黃芪 腹皮
 - 胞衣不下 加 山茱 3錢
 - 胎死不下 加 朴硝 5錢
 - 食滯 加 山楂肉 神曲 麥芽 檳榔 蘿卜 砂仁 草果之類
 - 暑滯 合 香薷散

■ 名人處方

- 便血 加 山楂肉 2錢 當歸 枳殼 地榆 各1錢 荊芥 7分
- 寒熱 合 小柴胡湯 亦治 瘡疾
- 滯痢 加 黃連 枳殼 檳榔 各1錢 木香 5分
- 泄瀉 合 四苓散 加 燈心 車前之類
- 孕婦諸症 換白朮 只忌 半夏 神曲類
- 冷積 加 乾薑 桂枝

► 二陳湯 - 半夏 2錢 陳皮 1錢5分 赤茯 甘草 各1錢 薑三

- 痰痞飲食不進 加 白芍藥 2錢 草果 砂仁 各1錢
- 食積痰 加 山楂 2錢 神曲 香附子 各1錢
- 食滯 加 山楂 2錢 厚朴 蒼朮 各1錢
- 嘔吐煩渴 加 葛根 五味 澤瀉
- 風痰 加 防風 桔梗 南星 枳實
- 寒痰 加 乾薑 肉桂
- 咳嗽線痰者는 脾胃有濕이니 加 蒼朮 白朮 山藥 砂仁
- 痰氣者는 胸膈有痰하여 氣脹痛이니 加 砂仁 香附子 瓜萎 只實 蘇子 桔梗
當歸 貝母 去半夏
- 胸膈 痰結 加 瓜萎 貝母
- 痰飲者는 痰在胸膈之間하여 痛而有聲이니 加 蒼朮 瓜萎 只實 木香 砂仁
當歸 川芎 香附子 青皮 白朮
- 痰涎症者는 潤身胸背脇痛하여 不可忍이니 加 白朮 砂仁 木香 茴香 香附
子 只實 酒芩 當歸
- 濕痰流注者는 潤身有腫塊이니 加 瓜萎 枳殼 蒼朮 酒芩 羌活 防風 連翹
當歸 香附子 砂仁 木香 紅花 竹歷 薑汁 少許
- 有熱 加 柴胡
- 上痛 加 川芎 白芷
- 下痛 加 牛膝 黃柏
- 塊 加 乳香 没藥

- 頭項痛 加 蔚靈仙
- 腫塊痛 外用 五倍子 大黃 芒硝 南星 為末 醋調 敷腫塊上
- 痰核者는渾身上下에 結核不散이니 加 皂角刺豆 引藥하여 至毒所濕痰核하고 再加 蒼朮 白朮 枳殼 桔梗 香附子 砂仁
- 热痰 加 黃芩 梔子 只實 桔梗 貝母 麥門冬 竹歷 去半夏
- 痰火 加 黃連 貝母 竹歷 去半夏
- 痰呃 加 砂仁
- 酒痰 去半夏 加 貝母 桔梗 黃連 砂仁 葛根 烏梅
- 背腰痛重墜 加 蒼朮 白朮 各2錢
- 肩項背骨節疼痛老痰 加 瓜蔞仁 只實 海石 連翹 黃芩 桔梗 香附子 去半夏
- 咳嗽 咳吐 黃痰者는脾胃熱이니 加 瓜蔞 只實 梶子 黃芩 桔梗 杏仁 桑白天門 蘇子 竹歷
- 咳吐 黑痰 成塊者는勞傷心腎이니 治法同前
- 脾虛生痰 加 人蔘 白朮 白芍藥 只實 砂仁 桔梗
- 痰喘氣急 去半夏 加 瓜蔞仁 只實 當歸 川芎 蘇子 砂仁 木香 茴香 白芥酒芩 羌活 蒼朮 竹歷 薑汁
- 痰症發熱 咳嗽生痰 加 黃芩 麥門 五味 貝母 桑白 知母 當歸 桔梗 竹歷 薑汁 去半夏
- 左偏頭痛 屬血虛 朝輕夕重 合 四物湯 加 茉莉花 薄荷 細辛 蔓荊子 柴胡 黃芩
- 氣鬱 煎水 交感丹
- 飲酒 嘔噦 吐痰 加 砂仁 烏梅
- 痰在頭作痛者 加 川芎 薤本 升麻 柴胡 蔓荊子 細辛 薄荷
- 痰在腰膝下腫痛 加 黃柏 防己 木通 草薢 木果 牛膝
- 痰在胸腹中하여 作痛하고 或 痘滿한者 加 白朮 砂仁 神曲 麥芽 枳殼 桔梗
- 痰在胸下作痛 加 柴胡 川芎 青皮 白芥 梶子
- 痰在經絡中하여 或胸背臂膊斗 手足作痛者豆 在上이면 加 靈仙 羌活 防風 在下이면 加 防己 牛膝 木通 冬月 加 烏附 行經
- 痢疾 加 白芍藥 黃連 地榆 潤瀉

■名人處方

- 小便淋澀 加 澤瀉 連翹
- 小便不通 加 益智 澤瀉

4. 「許六味」活用方 (全北 雲峰 故 許昌洙先生 方文)

- 六味湯 - 熟地黃 4錢 山藥 山茱萸 各2錢 白茯 牡丹皮 澤瀉 各1錢5分
- 肝腎虛衰遺精 加 益智 五味
 - 腎水不足 虛火上炎 加 肉桂 5分
 - 命門火衰 加 官桂 5分
 - 虛勞夜嗽 加 五味子 1錢5分
 - 腎虛 加 肉桂 五味子 各5分
 - 陰虛火動 尺脈偏盛 加 知母 黃柏 各5分
 - 腎虛精滑 加 蓮肉 3錢 菖絲子 2錢
 - 腎虛 火不歸經而喘急 加 肉桂 附子 五味子 各5分
 - 脾腎大虛하여 腹脹肢腫하고 痰喘氣하며 小便不利한 者 加 牛膝 車前子 各1錢5分
 - 小便頻數 加 益智仁 1錢5分 去澤瀉
 - 老人及孕婦轉脬倍 加 澤瀉
 - 冷淋先寒戰 不得洩 加 肉桂 附子 各5分
 - 虛損勞熱 加 麥門 1錢5分 五味子 1錢
 - 尿濁 加 蒼朮 1錢 黃柏 7分 附子 5分
 - 腎虛晨泄 加 菖絲子 3錢 破故紙 2錢 五味子 1錢
 - 命門火衰하여 脾土虛寒으로 泄者 加 肉桂 附子 各5分
 - 心腎不交 加 麥門冬 1錢5分 遠志 1錢 五味子 5分
 - 腰膝酸痛 加 牛膝 杜沖 各1錢
 - 陰虛浮腫 減熱地 加 牛膝 車前子 肉桂 附子
 - 兼疸 加 茵陳
 - 傷寒過經에 虛熱不退呈 口燥舌乾하고 脈虛한 者는 加 人蔘 麥門冬 橘皮

之類

- 陰虛陽衰 加 麥門冬 1錢5分 五味子 5分
- 陰虛吐衄 加 玄蔴 白芍藥 麥門冬 各2錢 地骨皮 五味子 各1錢
- 脾土虛寒은 無火之症故로 食入不消而反出이니 非氣膈所致者라 加 肉桂
附子하고 兼服補中益氣湯하되 加 半夏 茯苓 官桂類나라
- 遺尿 每夜無度 去澤瀉 牧丹皮 加 五味子 遠志 鹿角膠
- 肺腎受傷 咳嗽吐血 加 麥門冬 2錢 阿膠 1錢5分
- 肺腎兩虛 加 麥門冬 2錢5分 牛膝 2錢
- 肺腎兩虛 火不歸源 加 麥門 1錢5分 五味子 肉桂 各5分
- 肝腎兩虛 加 當歸 白芍藥 各2錢 肉桂 5分 於婦人尤好
- 耳鳴 加 當歸 川芎 白芍藥
- 酒色過度하여 兩目赤腫하고 尺脈이 洪大하여 按之微弱者는 加 麥門冬
五味子
- 房勞兼 怒氣風府하야 兩脇脹痛者는 加 柴胡 當歸
- 遍身作痛에 骨節尤甚하여 不能屈伸하고 口乾目赤에 頭重眩暈하며 痰涎
壅盛하야 胸膈不利하고 小便短赤에 夜間殊甚이오 遍身作痒이 如蟲行者
加 柴胡 桔子
- 脚氣上入하여 小腹不仁者 加 肉桂 附子
- 男子消渴로 飲一斗者 加 肉桂 附子 五味子

5. 「金補益」活用方 (全北 南原郡 德黑面 蓮洞 故 金光益先生 方文)

- 補中益氣湯 - 黃芪 蜜灸 1錢5分 人蔴 白朮 炙甘 當歸 陳皮 各1錢 升
麻 柴胡 各2分
- 少加黃柏하면 以救腎水하고 能瀉陰中之伏火하며 紅花 2分 加하면 入養
血이니 薑三 穀二하여 水煎空腹하라
 - 自汗 加 附子 麻黃根 浮小麥
 - 汗多 去升麻 柴胡 加 酸棗仁 不昧亦如之 一方 加 防風 1錢 桂枝 2錢 浮

小麥 烏梅

- 頭痛 加 蔓荊子 川芎 細辛 藁本
- 腹痛 加 白芍藥 如惡寒冷痛 加 肉桂
- 小腹痛 加 熟地黃
- 腹痛喜冷 加 白芍藥 黃芩
- 飲食少進^이 或傷食^{이면} 山楂肉 神曲 麥芽 枳實
- 額痛 加 升麻 葛根 白芷
- 口乾或渴 加 葛根
- 有痰 加 前胡 貝母
- 泄瀉 加 白芍藥 白茯 澤瀉
- 便秘 倍 當歸 加 法肉 阿膠
- 久痢變水 加 附子
- 虛痢下重 加 黃連 檳榔 木香 或 吳茱萸
- 腹痛 加 桂心 有熱 加 大黃 微利之
- 痢後嘯 加 附子 竹茹 生薑
- 滑泄 加 謝子 肉久
- 惡寒 冷痺 加 肉桂
- 身重疼痛 加 蒼朮 升麻 羌活 防風
- 潤身麻 氣虛 加 烏藥 香附子 木果 防風 青皮 川芎 少加 桂枝
- 胸中氣促 加 青皮
- 脊痛 倍 柴胡
- 心胸覺痞悶 去 黃芪 升麻 柴胡 加 黃連 枳實
- 心下痞滿^이 脈緩有痰而痞者 加 黃連 半夏
- 脈弦하고 四肢滿^{하여} 便難而心下痞者 加 黃連 甘草 柴胡
- 大便閉燥 加 黃連 桃仁 少加 大黃 當歸身
- 心下痞 大力悶 加 黃連 白芍藥
- 心下痞 腹脹 加 白芍藥 砂仁 五味子

- 如天寒少 加 乾薑 肉桂
- 心下痞或中寒者 加 黃連 附子
- 心下痞 嘔逆者 加 黃連 陳皮 生薑
- 冬月 加 黃連 少加 丁香 藿香
- 能食而心下痞 加 黃連 枳實 然如不能食 心下痞者 勿加之
- 夏月咳嗽 加 麥門冬 五味子
- 鼻塞 加 麥門冬 梓子
- 遺尿 加 山藥 五味子
- 氣虛潮熱 加 別申 倍柴胡
- 咳嗽 加 桑白皮 五味子
- 用心太過至 神思不寧하여 怔忡驚悸者 加 茯神 遠志 酸棗仁 菖蒲 柏子仁
- 傷心脾二經하여 舌乾口燥면 加 黃連 梓子
- 虛火上炎 加 玄蔴 知母 黃柏蜜炒
- 夢遺 加 牡蠣 龍骨
- 下部無力 加 牛膝 杜沖
- 脚弱 加 木果 防己
- 有痰 或兼 脾胃不和 加 半夏 麥芽
- 飲酒人으로 元氣虛弱하여 四肢無力하고 飲食減少에 面紅如粧者로 小便閉면 加 麥門冬 大便閉면 加 桃仁 紅花 火麻仁
- 陰虛內熱有痰에 或上焦有火者 加 天花粉 貝母
- 有熱 加 黃連 黃芩
- 血熱壅盛하여 或眼赤腫者 加 草龍膽
- 感風寒하여 或頭痛身熱者 加 川芎 白芷 羌活 防風 汗多 加 黃芪 眼痛 加 甘菊 熟地黃 苦身熱 加 生地黃
- 夏病에 屬元氣不足者 去升麻 柴胡 加 白芍藥 黃柏炒 挾痰者 加 半夏 陳皮
- 脾氣虛弱하여 不能消濕而 生痰者 加 半夏 赤茯
- 咳嗽에 早間吐痰하고 夜間嗽甚하여 喘急不昧者는 是 早間吐痰은 日脾虛

■ 名人處方

所致오 夜間喘急은 肺虛하여 陰火上沖이니 加 麥門冬 五味子

- 咳嗽에 面白하고 鼻流清涕함은 此 脾肺虛而 兼外邪니 加 茯苓 半夏 五味子
- 素有喘病하여 發熱惡寒하고 喘甚短氣하야 脈洪盛而似實者는 加 麥門冬 五味子 附子
- 瘧疾에 用藥해도 寒熱不止하고 反發持續이오 飲食少思하고 神思昏倦에 脈或浮洪거나 或 微細함은 此陽氣虛寒이니 加 乾薑 附子
- 血痢로 胸腹膨脹하여 大便欲去나 不去오 枝體殊倦者는 此脾氣虛弱하여 不能攝血歸源이니 加 茯苓 半夏
- 久瀉 脾胃虛寒下陷者 加 木香 破故紙 肉豆蔻
- 吐痰泄瀉 久不止豆 見食則惡하고 面色痿黃하며 神精困倦者 加 肉豆蔻 附子炮 半夏 乾薑 去當歸
- 噫膈翻胃之症은 皆有亡情之氣나 大過誤投攻伐之藥 過多豆 以致危殆者는 加 半夏 白茯 白芍藥酒炒 黃連干炒 神曲 枳實
- 脳噎不通하여 渣質之物이 不能下咽하고 反爲吐沫不已者 去升麻 柴胡 甘草 加 桃仁 生乳 白蜜 薑汁
- 中氣不足하여 脈虛微하고 氣不相續而發呃者는 加 人蔘 麥門冬 五味子 黃柏 少加 附子
- 胸腹脹滿에 嘘氣吞酸하고 足指腫痛에 指縫出水者 加 茯苓 半夏
- 五積六聚에 癥瘕癖塊豆 元氣虛弱하여 肌體瘦怯하고 飲食不進者 加 三稜 蓬朮 香附 薑香 陳皮 青皮 益智 桔梗 肉桂
- 虛勞豆 發熱咳嗽하고 極衰虛弱하여 頭重眩暈에 右脈虛軟者는 如 五味 蕃茲 乾薑 肉桂
- 每興憤 且言語過多면 卽時吐血함이 常習的이오 久有此症함은 勞傷肺氣 하야 其血必散이니 加 麥門冬 五味子 山藥 熟地黃 茯神 遠志
- 每觸吐血이 過勞即作이오 咳嗽 有痰吐血은 脾肺腎 俱虛豆 此三脈이 皆 浮洪數이니 加 麥門冬 五味子 茯苓 貝母 山藥

- 虛人大便下血 加 阿膠 椿根皮酒炒 地榆 槐花
- 便血이 在糞前이거나 或便後에 食少體倦하고 面色瘦黃者는 加 黃連 吳茱萸
- 內傷虛症으로 發熱自汗하여 如雨不止者 加 桂枝 麻黃根 浮小麥 附子炮
- 勞役人 饑寒眩暈者 加 半夏 熟地黃 白芍藥 天麻
- 十指盡麻 並面目皆麻 加 烏藥 麥門冬 木香 羌活 防風 附子炮
- 遺精 屬肝胃氣虛者 加 山藥 山茱萸
- 遺溺失禁 身體虛瘦者 加 山藥 山茱萸 白芍藥酒 酸棗仁 去柴胡
- 氣虛頭痛 加 川芎 細辛 蔓荊子 白芍藥
- 鼻流清涕 不聞香穢 加 麥門冬 梔子
- 口舌生瘡에 發熱惡寒하고 勞則體倦에 不思飲食者 加 麥門冬 五味子
- 胃經虛熱豆 齒牙作痛者 加 熟地黃 白芍藥 牡丹皮 白茯 輸 屬 脾胃虛弱하야 陰火熾盛者 加 黃柏酒炒
- 午後咽痛者 加 玄蔴 知母 黃柏
- 內傷 勞役脇下痛 加 川芎 白芍藥 青皮 木香 砂仁 茴香 枳殼 去 黃芪 白朮 升麻
- 精漏面黃 四肢困倦 煩熱不安 加 黃柏黑 防風 白芍藥 兼服 歸脾湯尤好