

인공임신중절

청소년 성·생식보건 100문 100답 중

Q 인공임신중절과 유산은 같은 것인가요? 유산에 대해서 알고 싶어요.

A 임신 5개월 이전에 어떤 원인에 의해 태아가 모체 밖으로 나오는 경우를 넓은 의미로 유산이라고 합니다. 임산부의 10 - 15%가 유산을 경험한다고 합니다.

유산에는 자연유산과 인공유산이 있습니다. 자연유산은 임신 4개월 이내에 주로 일어나기 쉬운데 대개 자궁에 염증이나 혹이 생긴 경우, 또는 외상, 타박상 등의 물리적인 충격을 받은 경우, 호르몬 환경이 불량한 경우에 일어납니다.

인공임신중절은 인공적으로 임신을 중절시키는 것으로 현행법으로 금지되어 있습니다. 단, 유전적으로 장애나 질병이 있을 경우, 본인 또는 배우자가 대통령령이 정하는 전염성 질환이 있는 경우, 강간에 의한 임신일 경우, 법률상 혼인 할 수 없는 혈족 또는 친척간에 임신이 된 경우, 임신이 지속될 때 모체의 건강을 심각하게 해칠 우려가 있는 경우는 인공임신중절을 허용하고 있습니다.

Q 친구가 인공임신중절 수술을 하고 나서 건강이 안 좋습니다. 수술 때문인가요? 부작용과 후유증에 대해서 알고 싶어요.

A 인공임신중절은 위험할 뿐만 아니라 수술에 따른 부작용이 많습니다. 대표적인 부작용은 다음과 같습니다.

첫째, 간혹 수술하던 내용물이 자궁에 남아 있을 경우가 있으며, 임신 기간이 3개월을 초과하여 수술을 받을 경우 그러한 위험은 더욱 가중됩니다. 이러한 경우에는 수술 후 복통과 출혈이 계속됩니다.

둘째, 자궁벽이 손상 될 위험이 있습니다.

셋째, 수술 도구나 난관을 자극하면 난관이 막혀 불임이 되는 수가 있습니다.

많은 청소년들이 임신이 된 줄도 모르고 있다가 뒤늦게 인공임신중절 수술을 하게 되는 경우가 있는데 이렇게 되면 휴유증으로 건강을 해치게 됩니다. 적절한 수술시기를 놓치게 될 경우 건강관리를 제대로 하지 못하고 약물 등을 복용한 산모로 부터 태어난 아기는 조산아나 미숙아, 장애아가 될 가능성이 높습니다.

넷째, 수술로 인해 난관 구멍이 좁아질 경우 이후에 자궁외 임신을 할 수 있고 이것은 생명까지도 위험해 질 수 있습니다.

다섯째, 태아의 골격이 크게 성장했을 경우 이 잔해들이 자궁밖으로 나오다가 자궁경관을 상하게 할 수 있습니다.

여섯째, 인공임신중절 수술을 반복적으로 할 경우에는 자궁구가 헐거워짐에 따라 습관성 유산이 될 수 있습니다.

일곱째, 난관염이나 복막염이라는 합병증의 가능성이 있습니다.

여덟째, 수술 당시 사용하는 마취약은 일부 체질에 따라 부작용이 일어날 수 있습니다.

Q 인공임신중절에 따른 문제점은 어떤 것들이 있나요?

A 임신에 대하여 사전 지식이 없어서 또는 자각 증상을 전혀 의식하지 못하여 임신 후기에 수술을 하는 경우가 있습니다. 이럴 경우 수술 후 출혈, 분비물, 미열 등 의 합병증이 있을 수 있습니다. 반복적인 수술의 경우에는 불임증을 초래할 수 도 있습니다.

심리적인 측면으로는 하나의 생명을 없애는데 대한 죄책감을 느끼게 됩니다. 인공임신중절 수술 자체에 대한 두려움도 느낍니다.

사회적, 도덕적 측면으로는 사회적인 멀시뿐만 아니라 친구나 주위 친척들의 비난을 감수해야 합니다.

그리고 무엇보다도 스스로의 혼돈을 감수해야 합니다. 실패감으로 좌절할 수도 있고 생활의 자신감을 잃을 수도 있습니다. 자신에 대한 존중감을 잃어버리고 자포자기할 수도 있습니다. 사춘기에 겪을 수 있는 경험으로 보기에는 결코 가볍지 않습니다. PPFK