

# 方藥合編 下統 方劑의 病症 및 病理 活用に 대한 考察

염현식<sup>1)</sup>, 김희수

<sup>1)</sup>염한의원장, 진솔한의원장

## Abstract

### A Study On Symptom, Pathology In Prescription of Ha-Tong from *Bangyakhappeun*

Eyum Hyun-Sik<sup>1)</sup>, Kim Hui-Soo

<sup>1)</sup>Eyum Oriental Medicine Clinic, Jin-Sol Oriental Medicine Clinic

From the study of the symptom, pathology in prescription of Ha-Tong from The *Bangyakhappeun*. I have reserched 163 prescription. It can be concluded as follows.

1. Prescription about Fecal disease which was the most as 11.66% of the whole, following order Internal disease(6.75%), Uterus Disease(5.52%) Sick-by-Cold Disease(5.52%), Eye Disease(4.91%), Blood Disease(4.91%), Unbalanced humoral status Disease(4.91%), Gynecologic Disease(4.91%).
2. The Fecal Disease divide diarrhea and dysentery; The Internal Disease divides with Sik-sang|(食傷) Chu-sang(酒傷), Sik-juck-yu-sang-han(食積類傷寒), Carbonic acid, Vomiting acid; The Uterus Disease divides with Urinary Disadvantage, Urinary retention, Incontinence; The Sick-by-Cold Disease divides with yang-myung-byung(陽明

---

교신저자 : 김희수

광주광역시 광산구 신가동 917-5 진솔한의원

Tel : 063) 956-7572 E-mail : jinsolguy@hanmail.net

접수 : 203/5/21 수정 : 2003/5/25 채택 : 2003/5/30

- 病), sang-han-goi-jng(傷寒壞證), sang-han-bun-gal(傷寒煩渴), sang-han-sum-ou(傷寒譫語), sang-han-hyul-jng(傷寒血證), sang-han-ja-ri(傷寒自利), sang-han-bun-jo-jng(傷寒煩燥證).
3. The Diarrhea and Dysentery many used o-ryung-san(五苓散), hwng-gum-jak-yak-tang(黃芩芍藥湯) hyang-ryun-hwan(香連丸) etc, and The Internal Disease many used pyung-we-san(平胃散) as a basic prescription.
  4. The organ problem use the Sil-yuol(實熱) of the liver, stomach, lung, uterus, small intestine; six natural factors problem used the Sil-jng(實證) of the wind, fire, heat, cold, dampness; And used Unbalanced humoral status, Intrnal hurt, qi and blood, seven extream feeling.

**Key Word** : *BangYakHapPeun*, Ha-Tong, symptom, pathology, Fecal Disease.

## I. 緒 論

方藥合編은 鄉藥集成方·醫方類聚·東醫寶鑑과 함께 韓國 臨床家에서 주류를 이루는 醫方書 중의 하나인데, 朝鮮時代 高宗 21年(1885年) 12月 惠庵 黃度淵先生의 遺稿를 아들인 黃必秀가 編纂하였다.

그 內容을 보면 書頭に 證脈要訣의 雜病提綱, 醫方活套의 活套針線을 配列하고 四段으로 구분하고 있다.

全四段의 上一段에 損益本草(藥性歌)를 下三段을 名 上統·中統·下統으로 區分으며, 上統은 補益之劑, 中統은 和解之劑를 下統은 攻下之劑를 중심으로 수록하였다.

이와 같은 上·中·下統 配列은 神農本草經에서 本草를 上·中·下品으로 구별한 前例는 있지만 處方은 세 가지로 分類한 경우는 찾아보기 힘든 獨創性을 갖고 있다. 따라서 病症이나 症狀에 따라 處方선택을 용이하게 할 수 있으며, 補·和·攻法의 治法을 사용하기가 편리하고 處方마다의 特殊性을 살려서 臨床活用範圍를 정

할 수 있도록 한 것이 특징이다.

한편, 인용된 醫書는 東醫寶鑑을 주축으로 하고 醫宗損益, 濟衆新編, 壽世保元, 景岳全書, 萬病回春 등에서도 일부를 선발하여 포함시켰다. 특히 上·中·下統의 處方마다 東醫寶鑑分類 方式과 같이 風, 寒, 暑, 濕, 燥, 火, 內傷, 虛勞, 霍亂, 嘔吐, 咳嗽, 積聚, 浮腫, 脹滿, 消渴, 黃疸, 瘡疾, 邪祟 身形, 精, 氣, 神, 血, 夢, 聲音, 津液, 淡飲, 蟲, 小便, 大便, 頭, 面, 眼, 耳, 鼻, 口舌, 牙齒, 咽喉, 頸項, 背, 胸, 乳, 腹, 腰, 脇, 皮, 手, 足, 前陰, 後陰, 癰疽, 諸瘡, 婦人, 小兒 등 54項目으로 區分하고 있으며, 또한 54項目마다 가장 요긴한 處方으로 압축하여 각 病症의 基本處方을 수록하고 이에 따른 附方 38方도 첨가하고 있다.

이에 著者는 攻下之劑를 중심으로 수록하고 있는 方藥合編 下統의 163方에 대한 臨床活用 病症 및 主治를 조사하여 유형별로 구분하였고 기록상 病理가 표시된 처방 57方에 대한 病理를 분석하여 이에 대한 몇 가지 見地를 얻었기에 보고합니다.

## Ⅱ. 本 論

편, 病因 病理가 기록상 표시되고 있는 57  
 方에 대한 자료를 調査하여 도표화하였다.

方藥合編 下統의 163方에 대한 病症과  
 이에 따른 處方 인용빈도를 조사하는 한

### 1. 方藥合編 下統處方의 病症 調査

(표 1-1)

구분	병 증	처 방	빈도수	백분율
大 便	泄證有五	胃苓湯	19	11.66
	暑 泄	藿苓湯		
	虛 泄	升陽除濕湯		
	飧 泄	蒼朮防風湯		
	濕 泄	萬病五苓散		
	赤 痢	導赤地榆湯, 蘇感元, 萬億丸		
	赤 白 痢	茱連丸		
	膿 血 痢	黃芩芍藥湯, 導滯湯		
	噤 口 痢	倉廩湯		
	虛 痢	調中理氣湯		
	積 痢	感應元		
	疫 痢	薑茶湯		
	痢疾腹痛	香連丸		
	痢疾通治	六神丸		
大便秘結	通乳湯, 四磨湯			
內 傷	胃 病	平胃散(2)	11	6.75
	食 傷	枳朮丸, 香砂平胃散, 內消散, 消滯丸 大和中飲, 千金廣濟丸, 立效濟中丹		
	醒酒令不醉	對金飲子		
	食積類傷寒	陶氏平胃散		
	吞酸吐酸	增味二陳湯		
小 便	小便不利	萬全木通湯, 導赤散	9	5.52
	小便不通	八正散, 滋腎丸, 大分清飲, 禹功散		
	關 格 證	枳縮二陳湯		
	諸淋通治	五淋散		
	血 淋	增味導赤散		
寒	陽明形證	白虎湯	9	5.52
	傷寒裏證	小承氣湯, 大柴胡湯		
	傷寒煩渴	五苓散		
	傷寒譫語鄭聲	黃連解毒湯		
	傷寒血證	桃仁承氣湯		
	傷寒自利	柴苓湯		
	壞 證	參胡芍藥湯		
	煩 躁	梔豉湯		

(표 1-2)

구분	병증	처방	빈도수	백분율
眼	外障	石決明散, 洗肝明目湯, 四物龍膽湯, 白蠶蠶散, 瀉清丸	8	4.91
	眼疼	夏枯草散		
	眼昏	加味磁朱丸		
	洗眼	洗眼湯		
血	衄血	莎芎散, 犀角地黃湯	8	4.91
	嘔血吐血	七生湯		
	咳血嗽血唾血咯血	加味逍遙散(2)		
	尿血	清腸湯		
	便血	平胃地榆湯, 厚朴煎		
	齒衄	綠袍散(2)		
痰飲	熱痰	小調中湯	8	4.91
	鬱痰	瓜蒌枳實湯		
	氣痰	加味四七湯		
	食痰	正傳加味二陳湯		
	痰飲流注證	控涎丹		
	痰塊	竹瀝達痰丸, 開氣消痰湯		
	痰飲通治	滾痰丸		
婦人	胞衣不下	牛膝湯	8	4.91
	子癰	羚羊角湯		
	子淋	澤瀉湯(2)		
	子痢	當歸芍藥湯		
	兒枕痛	失笑散, 起枕散		
	產後發熱	牛黃膏		
	產後食傷	理脾湯		
風	風中血脉腑臟	滋潤湯	7	4.30
	口眼喎斜	牽正散		
	痰涎壅盛	導痰湯(2)		
	中風熱證	防風通聖散		
	諸風通治	木香保命丹		
	歷節風	大羌活湯		
	五痺	行濕流氣散		

(표1-3)

구분	병증	처 방	빈도수	백분율
諸瘡	天疱瘡	仙遺糧湯, 丹粉丸	6	3.68
	瘰癧	梔子清肝湯		
	癩頭瘡	酒歸飲		
	腎臟風瘡	活血驅風湯		
	救急	備急丸		
咳嗽	肺實	瀉白散	5	3.07
	鬱嗽	清金降火湯		
	痰喘	千縉湯, 定喘化痰湯, 蘇子導痰降氣湯		
咽喉	單乳蛾雙乳蛾喉痺	牛黃涼膈元, 龍腦膏(3)	5	3.07
	懸雍垂	吹喉散(3)		
	咽喉痛	必用方甘桔湯		
	利咽膈	薄荷煎元		
前陰	寒疝	蟠葱散	5	3.07
	筋疝	龍膽瀉肝湯		
	血疝	神聖代鍼散(2)		
	癰疝	橘核丸, 三疝湯		
積聚	積聚癥瘕疝癖	六鬱湯	4	2.45
	痞塊證治	保和丸		
	積聚	消積正元散, 大七氣湯		
脹滿	穀脹	大異香散	4	2.45
	氣脹	三和湯(2)		
	熱脹	七物厚朴湯		
	蠱脹	消脹飲子		
神	癲癇	追風祛痰丸, 清心滾痰丸, 龍腦安神丸	4	2.45
	癲狂	當歸承氣湯		
口舌	口糜	回春涼膈散	4	2.45
	舌腫	黃連湯		
	重舌	青黛散		
	口舌瘡糝付	龍石散		
胞	調血	四製香附丸, 七製香附丸	4	2.45
	通血	通經湯		
	血結成瘕	歸朮破癥湯		
瘰癧	瘰癧	爭功散, 十將軍丸	3	1.84
	瘰癧通治	茵朮湯		

(표1-4)

구분	병증	처방	빈도수	백분율
牙齒	蟲蝕痛	清胃散, 瀉胃湯	3	1.84
	齒病含漱	玉池散		
暑	暑熱煩渴	益元散(2)	2	1.23
	伏暑證	酒蒸黃連丸		
火	上焦熱	九味清心元	2	1.23
	積熱	涼膈散		
浮腫	水腫	赤小豆湯	2	1.23
	浮腫通治	四苓五皮散		
黃疸	黃疸	茵陳五苓散, 加減胃苓湯(2)	2	1.23
鼻	鼻瘡	黃芩湯(2)	2	1.23
	鼻鼈	清血四物湯		
皮	丹毒	犀角消毒飲(2)	2	1.23
	麻木	開結舒經湯		
手	痰飲多爲臂痛	半夏芩朮湯	2	1.23
	氣血壅滯	舒經湯		
足	脚氣	清熱瀉濕湯, 檳蘇散	2	1.23
後陰	瘻痔	秦芫蒼朮湯	2	1.23
	腸風臟毒	升陽除濕和血湯		
癰疽	癰疽初發	三仁膏	2	1.23
	癰疽祛瘀新生	神聖餅		
燥	燥宜養血	當歸承氣湯(2)	1	0.61
精	濕痰滲爲遺精	加味二陳湯(5)	1	0.61
氣	氣痛	神保元	1	0.61
津液	盜汗	當歸六黃湯	1	0.61
蟲	蛔厥	練陳湯	1	0.61
頭	痰厥頭痛	芎辛導痰湯	1	0.61
頸項	項強	回首散	1	0.61
背	背痛	三合湯	1	0.61
積聚	食鬱	當歸活血湯	1	0.61
합계			163	100.0

2. 方藥合編 下統 處方의 病理調查

(표 2-1)

구분	病 理	病 症	處 方	비고
臟腑	肝臟濕熱	熱男子陰挺 腫脹 婦人陰挺 瘡痒 或陰莖濕痒 出膿水 此因酒得之	龍膽瀉肝湯	
	肝熱	眼赤腫痛 忽生翳膜 或脾熱臉內 如鷄冠 蜆肉 或蟹睛疼痛 或旋螺尖起	石決明散	
	肝腎虛 風濕所侵	腎臟風瘡 痒痛	活血驅風湯	
	肝實		瀉青丸	
	肝膽火盛	耳後頸項 胸乳 等處 結核腫痛 寒熱	梔子清肝湯	
	胃熱	上下齒痛 不可忍牽引頭腦 滿面發熱其痛 喜冷惡熱	清胃散	
		牙痛如神	瀉胃湯(2)	
	脾胃虛冷	心腹攻刺 連胸脇 膀胱小腸 腎氣作痛	蟠葱散	
	脾胃不和	不思飲食 心腹脹痛	平胃散(2)	
	肺虛遇風	冷淚 淚出 冬月尤甚	白殭蠶散	
	肺火盛	鼻孔乾 燥或生瘡腫痛	黃芩湯(2)	
	膀胱熱積	小便 閉 不通	八正散	
	膀胱熱	小便難 而黃	萬全木通湯	
	血結 膀胱	小腹結急便黑 譫語漱水	桃仁承氣湯	
小腸熱	小便不利	導赤散		
心胸毒熱		九味清心元		
風	中風	喎斜	牽正散	
		痰盛 語澁眩暈	導痰湯(2)	
		一切諸證	木香保命丹	
	風中藏	二便閉澁 先服此 後以愈風湯 調理	滋潤湯	
	風熱 中風	諸風熱	防風通聖散	
	風濕相搏	肢節腫痛 不可屈伸	大羌活湯	
	風濕	脚氣 腫痛拘攣 用此疎通氣道	檳蘇散	
	風寒濕	痺麻木不仁 手足煩軟	行濕流氣散	
	風熱	眼目赤腫疼痛	洗肝明目湯	
咽喉腫痛 或喉痺神效		必用方甘桔湯		
鼻衄 大小便血		薄荷煎元		
風痰	發癇	追風祛痰丸		
食	傷食	傷食	香砂平胃散	
	傷食生冷	硬物痞滿脹痛	內消散	
	酒食傷	和胃消痰	對金飲子	
	食積類傷寒	食積 類傷寒	陶氏平胃散	
	食積痰	食積及痰	正傳加味二陳湯	

(표 2-2)

구분	病 理	病 症	處 方	비고
火	三焦火盛	口舌生瘡	回春凉膈散	
	火舌上	生瘡或舌上腫燥裂 或舌尖出血 或舌硬	黃連湯	
	酒過度腸胃積熱	或吐血下血	酒蒸黃連丸	
	積熱	煩躁 口舌生瘡 目赤 頭昏	凉膈散	
		腸胃燥澁 便尿秘結		
產後熱入血室	產後熱入血室	大分清飲		
寒	傷寒病	身熱不 惡寒反惡熱 大便堅 小便赤	大柴胡湯	
	少陽轉屬陽明	譫語 腹脹 潮熱		
	傷寒熱	發熱 泄瀉	柴苓湯	
	傷寒 大熱	煩躁 不得眠 或差後 飲酒復劇者 及一切熱毒	黃連解毒湯	
	太陽證入裏	煩渴 而小便不利	五苓散	
陽明病	汗多煩渴 脉洪大	白虎湯		
痰	一切痰火	及百般怪病 善調脾胃神效	小調中湯	
	痰結	咯吐不出 胸膈作痛 不能轉側 或痰結胸滿氣急 或痰迷心竅不能言	瓜蒌枳實湯	
	痰氣鬱結	窒碍於咽喉之間 咯之不出 嚥之不下 謂之 梅核氣者	加味四七湯	
	痰隔中焦	治關格 上下不通 服此出痰	枳縮二陳湯	
	痰厥	頭痛	芎辛導痰湯	
	痰飲流注	作痛	控涎丹	
	痰飲	臂痛 不能舉	半夏芩朮湯	
濕	濕熱	黃疸	茵陳五苓散	
		脚氣 腫痛諸證	清熱瀉濕湯	
	濕熱痰積	變生百病	滾痰丸	
濕熱風	痔	秦艽蒼朮湯		
氣血	氣血俱熱	生瘡疥 變爲腫滿	赤小豆湯	
	氣血凝滯經絡	臂痛不舉 瘀血	舒經湯	
	氣虛泄瀉	不思飲食 困弱無力	升陽除濕湯	
	氣弱困倦	治虛痢	調中理氣湯	
七情	氣滯	大便秘澁	四磨湯	
	婦人七情六鬱	氣滯經絡 手足麻痺	開結舒經湯	
暑	中暑	吐瀉 下痢	益元散(2)	
기타	痰飲 氣血鬱結	積聚脹痛	消積正元散	
	食積 氣不升降			
	毒氣上衝 心肺	噤口痢 心煩 手足熱 頭痛 此乃	倉廩湯	
	所以嘔 而不食			
結陰	便血	平胃地榆湯		
瘀血	衄吐血不止 及上焦 面黃 大便黑	犀角地黃湯		



### Ⅲ. 考 察

#### 1. 方藥合編 下統處方の 病症 調査

下統 163方의 病症을 調査하여 보면 표(1-1) 표(1-2) 표(1-3) 표(1-4)에서 보는바와 같이 大便疾患中 泄病의 症狀이 전체 163 處方中 11.6%로 가장 많이 處方을 引用하고 있음을 알 수 있다.

그 症狀을 구체적으로 살펴보면 暑泄, 虛泄, 飧泄, 赤痢, 赤白痢, 膿血痢, 噤口痢, 虛痢, 積痢, 疫痢, 痢疾腹痛, 痢疾通治, 大便秘結 13개 病症에 19개 處方을 사용하고 있음을 알 수 있다.

內傷에서는 胃病, 食傷症 酒傷, 食積類傷寒, 吞酸吐酸症에 11개 處方을 사용하고 있어 6.75% 引用頻度を 차지하고 있다. 이 중 食傷과 胃病에 平胃散등 8개 處方을 사용하고 있다.

小便에서는 小便不利, 小便不通, 關格, 血淋, 諸淋, 通治등의 症狀으로 區分하여 9개 處方을 사용하고 있는데, 5.52% 인용 빈도로 3번째로 보여주고 있다. 이 중 小便不通에 八正散等 4개 處方을 사용하고 있다.

傷寒에서는 傷寒自利, 壞證, 煩躁증에 9개 處方을 사용하고 있어, 전체의 5.52% 인용 빈도를 차지하고 있으며, 이 중 傷寒裏證에 大柴胡湯, 小承氣湯등을 사용하고 있다.

眼病에서는 外障, 眼疼, 眼昏, 洗眼에 8개 處方을 사용하고 있어 4.91%의 인용빈도를 나타내고 있는데, 이 중 外障에 洗肝明目湯등 5개 處方을 이용하고 있다.

血病에서는 衄血, 嘔吐血, 咳嗽咯血, 尿血, 貧血, 鴟肉의 症狀에 8개 處方을 사용하고 있어 4.91%의 인용빈도를 나타내고 있다.

婦人에서는 胞衣不下, 子癰, 子淋, 自利, 兒枕痛, 産後發熱, 産後食傷等の 症狀에 8개 處方을 사용하고 있어 4.91%의 인용빈도를 나타내고 있다.

風에서는 風中血脉, 臟腑, 口眼喎斜, 痰涎壅盛, 中風熱症, 臍風通治, 歷節風, 五痺等の 症狀에 7개 處方을 사용하고 있는데, 歷節風과 五痺症은 中風과는 구분이 다른 것을 오히려 手足에다 分類하는 것이 바람직하다고 본다.

諸瘡에서는 天疱瘡, 癩癰, 癩頭瘡, 腎臟風瘡, 救急症에 6개 處方을 사용하고 있어 3.68%의 인용빈도를 나타내고 있다.

咳嗽에서는 肺實, 鬱嗽, 痰喘에 5개 處方을 사용하고 있어, 3.07%의 인용빈도를 나타내고 있으며, 이 중 痰喘에 千縉湯등 3개 處方을 사용하고 있다.

咽喉에서는 單乳蛾雙乳蛾, 懸雍垂, 咽喉痛, 利咽膈등에 5개 處方을 사용하고 있어 3.07%의 인용빈도를 나타내고 있다.

그밖에도 前陰에서는 寒疝, 筋疝, 血疝, 癢疝症에, 積聚에는 積聚癥瘕痞癰, 痞塊證治, 積聚症에, 脹滿에서는 穀脹, 氣脹, 熱脹, 蠱脹症에, 神에서는 癩癰, 癩狂症에, 口舌에서는 舊官, 舌腫, 重舌, 口舌瘡糝付, 胞에서는 調血, 統血, 血結盛夏症에 모두 4개 처방을 사용하고 있어 2.45%의 인용빈도를 나타내고 있다.

또한 疥瘡에서는 疥瘡, 疥瘡通治症에, 牙齒에서는 蟲蝕痛, 齒病含漱症에, 暑에서는 暑熱煩渴, 伏暑症에, 火에서는 上焦熱, 積熱에, 浮腫에서는 水腫, 浮腫通治症으로 구분하여 표(1-4)에서와 같이 각각의 處方을 사용하고 있다.

그밖에도 黃疸, 鼻瘡, 鼻鼈, 丹毒, 麻木, 臂痛, 脚氣, 瘻痔, 腸風, 臟毒, 癰疽, 燥, 遺

精, 氣痛, 盜汗, 蛔厥, 痰飲頭痛, 項強, 背痛, 食鬱等 症狀으로 구분하여 治療하고 있음을 알 수 있다.

## 2. 方藥合編 下統處方에 使用된 病理 調査

方藥合編 下統處方에서 使用하고 있는 病理를 調査해보면 표(2-1) 표(2-2) 표(2-3)에서 보는바와 같다.

즉, 臟腑에 관한 病理에 관련된 것은 표(2-1)에서 보는바와 같이 肝, 肝腎, 肝膽, 胃, 脾胃, 肺, 膀胱, 小腸, 心胸에 관련된 病理가 使用되고 있으며, 구체적인 病理로는 肝臟濕熱, 肝熱, 肝腎虛 風濕所侵, 肝實, 肝膽火盛, 胃熱, 脾胃虛冷, 脾胃不和, 肺虛 遇風, 肺火盛, 膀胱熱(積), 血結膀胱, 小腸熱, 心胸毒熱 등의 病理가 使用되고 있는데, 이는 臟腑에 火, 熱, 濕等 六氣病邪가 침입한 病理가 使用되고 있으며, 臟腑 자체의 病理로는 肝實, 脾胃虛冷, 脾胃不和 등이 使用되고 있다.

六氣病理中 風邪에 관련된 것으로는 표(2-1)에서 보는바와 같이 中風, 中藏, 風熱, 風濕, 風寒 등의 病理가 使用되고 있으며, 風, 濕, 熱이 합해진 病理가 가장 많이 活用되고 있음을 알 수 있다. 風邪만이 침입한 경우는 牽正散, 導痰湯, 木香保命丹, 滋潤湯을 使用하는 경우로 調査되었다.

火에 관련된 病理는 표(2-2)에서 보는바와 같이 三焦火盛, 火舌上, 積熱, 産後熱 入血室 등의 病理가 使用되었으며, 寒에 관련된 病理는 傷寒大熱, 傷寒熱, 傷寒少陽病, 專屬陽明, 太陽病入裏, 陽明病 病理등이 使用되고 있다.

濕에 관련된 病理로는 濕熱, 濕熱痰積, 濕熱風 病理가, 暑에 관련된 病理는 中暑가 使用되는 것으로 調査되고 있다.

痰飲의 病理로는 痰火, 痰結, 痰氣鬱結, 痰隔中焦, 痰厥, 痰飲流注, 痰飲 등이 使用되고 있다. 이에 관련된 處方으로 小調中湯, 瓜蒌枳實湯, 加味四七湯, 枳縮二陳湯, 芎辛導痰湯, 控涎丹, 半夏芩朮湯을 使用하고 있다.

內傷에 관한 病理로는 食傷, 食傷生冷, 酒食傷, 食積類傷寒, 食積痰 등이 使用되고, 관련 處方으로는 香砂平胃散, 內消散, 對金飲子, 陶氏平胃散, 正傳加味二陳湯을 使用하고 있다.

그밖에도 氣血病理로써 표(2-3)에서 보는바와 같이 氣血俱熱, 氣血凝滯經絡, 氣虛泄瀉, 氣弱困倦, 七情병리로써, 氣滯, 婦人七情六鬱 등이 使用되고 있고, 기타 여러가지 病理가 합해진 病理들이 使用되기도 하였다.

## IV. 요약 및 총괄

方藥合編 下統 163方に 대한 病症 및 病理 調査를 통하여 다음과 같이 요약 할 수 있었다.

1. 大便病에 活用된 處方이 전체의 11.66%로 가장 많았고, 內傷病(6.75%), 小便病(5.52%), 傷寒病(5.52%), 眼病(4.91%), 血病(4.91%), 痰飲病(4.91%), 婦人病(4.91%) 순이었다.
2. 大便病에서는 泄瀉와 痢疾 症狀으로, 內傷病에서는 食傷, 酒傷, 食積類傷寒, 吞酸, 吐酸 症狀으로, 小便病에서는 小便不利, 小便不通, 淋症으로, 傷寒病에서는 陽明病, 傷寒壞證, 傷寒煩渴, 傷寒譫語, 傷寒血證, 傷寒自利, 傷寒壞證, 傷寒煩躁

- 症으로 區分하고 있다.
3. 泄痢病에서는 五苓散, 黃芩芍藥湯, 香連丸 등을, 內傷病에서는 平胃散을 基本方으로 가장 많이 活用하고 있다.
  4. 臟腑病理로는 肝, 胃, 肺, 膀胱, 小腸의 實熱이, 六氣病理로는 風, 火, 熱, 寒, 濕의 實證이 그밖에도 痰飲, 內傷, 氣血, 七情의 病理가 使用되고 있다.
  8. 康命吉 濟衆新編 서울 행림서원 p. 40 1971.
  9. 醫學正傳 서울 성보사 p. 183, 364, 1986.
  10. 陳自明 校注婦人良方 북경 집문서방 p. 6권 37, 41
  11. 危亦林 世醫得效方 북경 인민위생출판사 p.201, 208, 1990.
  12. 張仲景 金匱要略 북경 인민위생출판사 p. 452 1989.
  13. 張介賓 國譯景岳全書 서울 일중사 p. 6 권 38, 406, 518, 1992.
  14. 錢乙 小兒藥證直訣 서울 의성당 p. 111, 112, 2002.

## 參 考 文 獻

1. 許俊 東醫寶鑑 서울 남산당 p. 24, 67, 103, 106, 147, 203, 206, 273, 287, 297, 319, 322, 400, 401, 426, 443, 528, 530, 535, 619, 694, 722, 804, 977, 986, 997, 1966.
2. 龔廷賢 萬病回春 북경 인민위생출판사 p. 106, 113, 283, 289 1984.
3. 李樾 編註醫學入門 서울 대성문화사 p. 3권 317, 349, 368, 392, 4권 31, 65, 90, 192, 235, 275, 393, 401, 403, 404, 412, 417, 433, 436, 437, 455, 483, 484.552, 656, 812, 5권 128, 6권 190, 197, 413 1990.
4. 張仲景 傷寒論 북경 인민위생출판사 p. 103, 155, 163, 208, 273, 276, 292, 388, 1991.
5. 太平惠民和劑局方편 太平惠民和劑局方 북경 인민위생출판사 p. 88, 94, 114, 174, 175, 177, 266, 276, 1985.
6. 龔廷賢의 古今醫鑑 남창 강서과학기술출판사 p. 95, 96, 109, 123, 153, 156, 163, 209, 259, 337, 1990.
7. 羅天益 衛生寶鑑 북경 인민위생출판사 p. 251, 371, 1987.