

# 愛用方

蘇 秉 昌

## I. 愛用方

### 1. 加味助仙湯

- 處方：白茯苓 陳皮 各5錢 鹿角 白朮 白芍藥 山藥 各3錢 兔絲子 2錢 杜沖 丹蔘 甘草 各1錢
- 適應症：女人 月經 數月不行 或 更年期 障碍 骨多孔症 豫防

### 2. 加味芎歸湯

- 處方：川芎 當歸 各5錢
- 適應症：產前 產後諸疾 及 血暈 不省 橫 逆 死胎不下 血崩不止 臨月服之 縮胎易產 產後服之 惡血自下
- 用法 ① 產後腹痛 加 三棱 蓬朮 桃仁 紅花 玄胡索 牧丹皮 各1錢  
② 原因不問 一切下血 加 香附子 牧丹皮 山楂肉 各2錢 陳皮 甘草 各1錢 神曲 麥芽 砂仁 各7分半  
③ 血虛 及 過多出血 昏睡不省 加 鹿茸 丹蔘 各1錢

### 3. 加味升麻胃風湯

- 處方：升麻 2錢半 甘草 2錢 白芷 1錢半 當歸 葛根 蒼朮 各1錢2分 全蟲 白殭蠶 白附子 各1錢 麻黃 不去節 7分半 柴胡 藁本 羌活 黃柏 草荳蔻 各5分 蔓荊子 3分 薑三片 藕二個

## ■ 愛用方

- 適應症 : 顏面神經麻痺 一般藥으로 無效時
- 用法 : 모든 麻黃製材量 使用하여 不眠症이 을 境遇 薦苡仁 加1錢

## 4. 加味地黃湯

- 處方 依本方 加 王不留行 3錢 澤瀉 2錢半 山豆根 白朮 豬苓 赤茯苓 薦苡仁 各1錢半
- 適應症 前立腺炎 小便不利
- 用法 尿血則 加 槐殼炒 1錢半

## 5. 加味快笑湯

- 處方 · 熟地黃 生地黃 當歸 各2錢半 麻子 桃仁 杏仁 枳殼 黃芩 厚朴 陳皮 大黃 各1錢半 甘草 7分半
- 適應症 : 一切便秘
- 用法 : ① 热 加 柴胡 1錢  
② 腹痛 加 木香 1錢  
③ 血虛粘燥 加 當歸 熟地黃 各3錢  
④ 風燥 加 薦苡仁 蘿覆子 羌活 各1錢  
⑤ 氣虛 加 人蔘 薦苡仁 各1錢  
⑥ 氣實 加 檳榔 1錢  
⑦ 痰火 加 瓜蔞仁 1錢半 竹瀝 一匙 化服

## II. 'SARS' 예방한약 (전통의학신문 발췌)

요즘 세계 여러 나라에서 많은 인명피해를 내며 급속히 확산되고 있는 공포의 괴질. SARS(중증급성 호흡기증후군)를 예방하는 처방이 어제 중국으로부터 본 전통의학신문에 “本草의 新紀行”을 연재하는 李尙烈박사에게 전송돼 왔다.

당국의 발표에 의하면 SARS로 의심되던 한 환자의 최종검사결과는 SARS가 아니라는 판정이 나왔다 일단 안도하는 분위기지만, 언제 우리나라에도 전파될지 모르는 상태여서 초긴장 상태이다.

중국 신화사통신의 전송기사를 지난 10일자로 보도한 중국의 〈江城日報〉에 의하면, 북경중의약대학교 東直門病院의 姜良鐸, 周平安 두 교수가 시민들을 위해 공개한 SARS 예방약의 한약처방은 다음과 같다.

蒼朮 12g 藿香 12g 金銀花 20g 貫衆 12g 黃芪 15g 沙蔴 15g 防風 10g 白朮 15g이다

이 약 1첩을 물로 달여서 아침, 저녁에 나누어 복용하는데 각 개인의 건강 상태에 따라 3첩 또는 7첩을 매일 혹은 격일로 복용하면 된다고 한다. 3첩 또는 7첩을 다 복용하여 체내의 약 성분이 일정한 수준에 도달하면 약의 복용을 멈추고 관찰하면 되므로, 너무 오랫동안 연속 복용하지 않아도 된다고 한다. 여러 시민들을 대상으로 한 처방이므로 어떤 독성이나 부작용은 없지만, 소아는 감량 복용해야 하고, 임신부는 의료진의 지시에 따르도록 주의를 해야 한다고 하였다. 본 처방 입수는 중국 吉林化工大學교수 洪明子박사의 협조로 이루어졌다.

(학술위원장 전북 익산시 남중동 173-14 동인당한약방 ☎ 063-856-8448)