

經驗方

黃 貴 淵



● 加味通順散

① 處方構成：金銀花 2錢 赤芍藥 木通 白芷 何首烏 枳殼 小茴香 烏藥 當歸 甘草 各1錢

② 適應症：火帶瘡(帶狀疱疹)

③ 原因：火毒溫痰이 經絡을 侵犯하여 通路를 阻塞함.

④ 加減法：虛則 加附子, 病實則 加大黃, 痰則 加南星 半夏, 腫硬則 加川芎 麻黃 葱白 全蝎 穿山甲, 流走則 加獨活, 氣虛則 加人蔘, 便秘則 加大黃, 溫腫則 加活 防風, 痰結則 加桔梗 白芥子, 虛冷則 加乾薑炒 附子

⑤ 由來：仙傳外科氣驗方 臨床經驗方

⑥ 湯煎法：好酒水各半 煎服

⑦ 禁忌：鷄 猪 酒 麵

⑧ 臨床經驗實例：金○鎮, 男, 62歲, 健狀한 體格임. 數週日 前부터 肋間神經痛이 일어나더니 左側 肋膜部 및 胸部에 皮膚가 過敏하면서 따끔 따끔하고 때로는 바늘로 찌르는듯 놀랄정도로 아프고 그곳에 손을 댈 수도 없고 하더니 일주일 후에는 水疱樣發疹을 일으키면서 눈물이 나올 정도로 몹시 아프더니 따갑고 쓰리고 하여 잠을 이루지 못할정도 고통이 심하다고 호소하였음. 上記 何首烏散에 加南星 半夏 獨活 桔梗 白芥子 各1錢을 加味하여 1劑를 服用하여 完治되었음.

(대전광역시 서구 용문동 594-6 제창원한약방 ☎ 042-531-4580)