

吳在烈의 臨床二題

吳 在 烈



I. 古方散策

30여년간 오랫동안 古方을 접하다보니 재미있는 처방들이 있어서 고방산책이란 이름으로 처방들을 소개 할까 합니다.

1. 안면신경마비

葛根 3錢 麻黃 1錢 桂枝 白芍藥 各1錢半 蒼朮 桔梗 2錢 石膏 1錢半 川芎 1錢 大黃 5分 白芷 1錢 附子 1錢 茯苓 2錢

· 특징 · 감기후에 와우에 염증이 있을 때는 다른 약이 필요없다. 귀를 만지면 통증을 느낄때에 특효.

× 한방진료의전에 안면신경마비에 葛根湯이 처방되었지만 알수가 없었다. 박종갑씨가 저자인 침구대성에서 안면신경마비 와우에 염증으로 인하여 등등 .. 보고난 이후에 이해하여 葛根湯本方 桔梗 2錢 石膏 1錢半 芎黃散인 川芎 1錢 大黃 5分 蒼朮 2錢 附子 1錢 茯苓을 처방하여 치료하였더니 아주 효과있어 많은 환자를 치료하였다.

2. 안검하수증

‘꺼적눈’, ‘근무력증’ 이라고도 한다. 안면신경마비증에 사용한 葛根湯 加味方을 사용하여 여러 환자를 치료하였다.

경험담을 이야기 한다면 15년전 전북 진안에 산다는 중학생 허○○가 운동장에서 축구공으로 안면부를 맞고 양쪽 눈꺼풀이 내려 앉았다하며 치료를

요구하기에 葛根湯이 안면신경마비 삼차신경통도 치료된 것을 감안하여 안면신경마비 사용한 갈근탕을 사용하였더니 정상으로 치료가 되었다. 그런데 또 여동이 꺼적눈이 되어서 찾아왔기에 동처방을 사용하였더니 완전치료가 되었다. 그런데 10년이 지난후 또 男妹가 재발하여 찾아왔기에 동처방을 사용한 결과 완전히 치료되었다. 그후 지금으로부터 3년전에 일본서적을 번역한 「한방진료백화」에서 근무력증에 안검하수에 葛根湯이나 小青龍湯을 사용하면 치료가 잘 된다는 내용이 있었는데 麻黃에 에페드린 성분때문에 치료가 된다 하였다. (「한방치료 백화」 3권 137p 참조)

3. 複示

① 苓桂朮甘湯 合 黃連解毒湯 合 芎黃散

茯苓 4錢 桂枝 3錢 白朮 甘草 各2錢 黃連 黃芩 黃柏 梔子 各1錢半 川芎 1錢 大黃 5分 車前子 1.5錢 細辛 5分

② 苓桂朮甘湯 合 小柴胡湯 合 芎黃散

茯苓 4錢 桂枝 3錢 白朮 甘草 各2錢 合 柴胡 3錢 半夏 2錢 人蔘 1錢 黃芩 1錢 車前子 1錢半 細辛 5分 黃連 5分 川芎 1錢 大黃 5分 生薑 大棗

③ 顔面神經麻痺 葛根湯加味方

4. 魚肉中毒으로 인한 두드러기

① 香蘇散 加味 櫻皮

② 일반두드러기 피부소양증 人蔘白虎湯

5. 小兒夜尿

① 小建中湯

② 葛根湯

③ 六味元

6. 小兒夜啼

- 神經性 ① 甘麥大棗湯 ② 柴胡加龍骨牡蠣湯
- 腹痛으로 ① 小建中湯

7. 片頭痛

- ① 清上蠲痛湯 合 五苓散
- ② 五苓散
- ③ 吳茱萸湯 - 頭痛이 심하고 구역이 심할 경우

8. 疣贅 사마귀

- ① 무사마귀는 薏苡仁 20 甘草 1 (20:1)로 하여 달여 먹으면 치료.
藿香正氣散 薏苡仁 3錢 해결
- ② 사마귀 표면이 퉁퉁같이 열리어 있으면 뜸속으로 제일 큰 것을 선정하여 떼버리면(灸) 다른것도 빠져버린다.

9. 딸국질(횡경막경련)

- ① 吳茱萸湯

10. 腹中雷鳴下利 心下痞塞

腸鳴 下利 拾數行 배속에 가스가 차서 배가 우글거리며 설사를 많이 하는 질환. 止瀉劑를 처방해도 방법이 없다.

- 甘草瀉心湯
- 半夏瀉心湯
- 生薑瀉心湯에 茯苓 2錢을 加味하여 사용한다

11. 柴胡桂枝湯 牡蠣粉 小回香

위궤양 담석증 야뇨증 담낭염

胃無力 柴胡桂枝湯 合 人蔘湯

12. 柴胡加龍骨牡蠣湯

협심증, 간질, 정신이상

13. 오줌소태

- ① 當歸芍藥散 合 猪苓湯
- ② 八味元 合 猪苓湯
- ③ 五苓散 合 猪苓湯

14. 精神病

- ① 柴胡 加 龍骨牡蠣湯 → 胸脇苦滿 目標
- ② 黃連解毒湯 → 胸脇苦滿이 없고 胃內停水

15. 感氣

- ① 葛根湯 - 頭痛 發熱 惡寒 脈浮 項背 強硬急者
- ② 桂枝 加 黃芪湯 桂枝加 附子黃芪湯
특정 양약이나 한약 발한제를 복용하지도 않았는데 땀이 나고 줄줄 흐르는 자
- ③ 香蘇散 : 위하수, 위장허약자
- ④ 小青龍湯 - 桔梗 2錢 石膏 1錢半 杏仁 茯苓 1錢半 급만성 기관지염

16. 不定愁訴症

- ① 加味逍遙散 - 소요산증으로 不眠이 심할때는 芍藥의 양을 배로한다.
- ② 半夏厚朴湯 - 가슴이 답답하고 인후이물감
- ③ 柴胡 加 龍骨牡蠣湯 - 신경성

■ 吳在烈의 臨床二題

17. 流行性 耳下腺炎

- ① 葛根湯 桔梗 2錢 石膏 1錢半 川芎 1錢 大黃 5分 - 初期
- ② 小柴胡湯 桔梗 2錢 石膏 1錢半(口苦) 소양증일때
- ③ 驅風解毒湯 桔梗 石膏

18. 小兒체질개선

- ① 小建中湯 加 人蔘 當歸 黃芪 : 야뇨, 야제, 변비, 衄血, 발육부진
- ② 小柴胡湯

19. 耳鳴

- ① 小柴胡湯 合 香蘇散
- ② 八味元

20. 水逆

五苓散 - 어린아이의 吐乳 설사에는 散으로 하여 물에타서 먹여도 해결되고 달여 먹여도 된다. 가성 코체라도 잘 해결된다.

21. 신장염

- ① 五苓散
 - ② 五苓散 合 小柴胡湯
 - ③ 分消湯
- × 陰症에 빠져 치료불가능 할때는 附子 5分을 加味하면 탁월한 효과가 있다 하였다 (한방치료백화)

22. 간질

- ① 柴胡龍骨牡蠣湯 - 鈞藤 羚羊角 芍藥 甘草

② 抑肝湯 陳皮 半夏

③ 甘麥大棗湯

23. 食慾不振

① 小柴胡湯

② 抑肝扶脾湯

24. 급만성 기관지염

① 小青龍湯 桔梗 石膏 杏仁 茯苓

② 小柴胡湯 合 小陷胸湯 - 口苦할 경우, 胸痛

25. 肥滿症

① 大柴胡湯 合 五苓散

② 防風通聖散

26. 방광결석, 신결석, 요도결석, 猪苓湯

血尿가 심할 때 猪苓湯 合 四物湯

痛症이 심할 때 芍藥甘草湯 合 猪苓湯

27. 妊娠中 下腹痛 - 當歸芍藥散

當歸芍藥散은 月經不順 月經困難症 같은 虛症에 쓰는데 生理痛이 심한 경우
는 當歸建中湯을 쓴다. ×婦人不感症 神效

28 肝腫大 腹水(만성)

① 大柴胡湯 合 五苓散 附子 5分

② 小柴胡湯 合 五苓散 附子 5分

③ 小柴胡湯 合 分消湯 附子 5分

■ 吳在烈의 臨床二題

29. 不整脈

- ① 炙甘草湯
- ② 小柴胡湯 合 苓桂朮甘湯

30. 紫斑病

- ① 疎風活血湯 류마티스성
- ② 小建中湯 복부성 복통 衄血

31. 小兒咳嗽

麻杏石甘湯 - 石膏 3錢 麻黃 7分 杏仁 7分 甘草 7分

젖먹는 아이가 코막히고 힐힐 소리나며 호흡곤란을 일으킬 때

32. 桂麻各半湯

감기후에 열이 풀리지 않아 피부표면이 닭살같이(속기증) 솟고 가렵고 麻疹 같은 현상이 나타날 때

桂枝 3.5 芍藥 生薑 大棗 麻黃 2 杏仁 2.5

그렇지 않을 때는 人蔘白虎湯을 배로해서 복용하면 피부소양증 두드러기 (만성) 神效

33. 不妊症

- ① 美人형 허약체질은 當歸芍藥散
- ② 장부형은 桂枝茯苓丸 또는 湯

34 狹心症

- ① 柴胡 加 龍骨牡蠣湯
- ② 人蔘湯 - 가성협심증

35. 三叉神經痛

- ① 葛根湯
- ② 五苓散

36. 婦人膾乾燥症(交接時 分비물 不足)

- ① 加味逍遙散 薏苡仁 3錢
- ② 當歸建中湯

37. 多汗症

- ① 桂枝 加 黃芪湯
- ② 桂枝 加 附子湯
- ③ 桂枝 加 苓朮附芪湯

38. 허리 하반신 춘하추동 할것없이 찬바람이 나고 무거웁고 시린것

茯苓 4錢 乾薑 3錢 白朮 2錢 甘草 1錢 → 苓姜朮甘湯
× 경우에 따라 附子 5分

39. 眞武湯 合 人蔘湯

- ① 慢性下痢
 - ② 胃無力症
 - ③ 괴사성장염
- × 溫服하여야 한다.

▶ 처방중량은 도설한방진료요방 한방진료실제 참조

[참고서적]

황한의학, 한방진료의전, 한방진료 30년, 상한론해설, 한방치료백화, 도설한방진료요방

Ⅱ. 아플로 눈병

1 아플로 눈병

茯苓 4錢 桂枝 3錢 白朮 2錢 甘草 2錢 車前子 1錢半 細辛 5分 川芎 1錢 大黃 5分

2 苓桂朮甘湯

茯苓 4錢 桂枝 3錢 白朮 2錢 甘草 2錢

3 明郎飲

茯苓 4錢 桂枝 3錢 白朮 2錢 甘草 2錢 + 車前子 1錢半 細辛 5分 黃連 5分

4 芎黃散

川芎 1錢 大黃 5分

(전주시 남노송동 540-6 영화당한약방 ☎ 063-284-7118)