

乳房癰腫과 結核

徐錫培



近間의 醫學정보에 의하면 婦人乳房癌이 날로 增加하는 추세에 있다고 한다 婦人乳病이 왜 이처럼 날로 增加되는 것일까? 그의 原因을 파악하고 그에 適用되는 方劑를 찾아보고자 한다.

婦人乳病은 주로 產母에게 발생되며 哺乳를 前後한 女性에게 많다

乳房은 足陽明經의 所屬이고 乳頭은 足厥陰經의 소속이라 乳病에는 足陽明과 足厥陰을 基本으로 하여 治療함이 大法이다.

哺乳中에 많은 發病은 乳兒가 哺乳하면서 그대로 睡眠하여 乳道가 不通되면 氣가 不通되고 氣가 不通되면 乳滯가 原因되고, 哺乳時期에 乳兒에게 哺乳를 시행하지 않고 牛乳로 代替하니, 婦人產後에는 의당이 乳道가 疏通되는 것이 自然의 分리인데 人爲的으로 乳道를 不通케하여 痘을 유발한다. 이 모두 足陽明과 足厥陰經이 被害하여 乳病이 발생되는 것이 大體를 이루고 있다

그외에 惑 精神的 우울증으로 氣道가 鬱滯되어 발병되는例도 허다하다.

以上과 같이 哺乳할 때도 포유를 기피할 때도 혹 정신적 우울증에서 오는 일절의 乳病에 足陽明經이 受邪하여 乳癌腫硬初期에는 加味芷貝散이 有效하고, 足厥陰經이 受邪되어 乳房結核에는 清肝解鬱湯이 有效하며, 오랜기간 경과되어 乳癌이 의심될 때에는 加味十六味流氣飲을 長期間 服用시키면 有效하다.

여기서 우리가 看過해서는 않될 의문이 있다 近間 婦人乳房에 肿硬이 발생한다든지 時期가 경과되어 結核性으로 전환될 때 현대 洋方에서는 거의 乳

房癌으로 취급할 때가 흔히 있다.

腫硬 結核 등 韓方으로 충분히 治療할 수 있는 痘症을 外科的 手術로 治療시켜 後遺症으로 고통받는 이를 간혹 보았다. 진정 癌이라면 再考할 필요가 있으며 어디 최악의 乳房癌이 그리 흔한 病인가. 韓方으로도 손쉬운 것을 많은 시간을 허송할 때가 있다.

이런 의도에서 加味芷貝散과 清肝解鬱湯 加味十六味流氣飲 三方이 婦人乳病治療에 多用方임을 밝히고자 한다.

먼저 婦人乳病이 發生되었을 때 初期에 腫痛硬強에는 清肝解鬱湯에 換七生乾地黃이 치유되고, 이 시기가 경과되어 또는 初症부터 乳癰腫硬에는 加味芷貝散을 投與한다. 婦人乳病을 간혹 관찰하여 보면 初期부터 별로 痛症 없이 乳房이 단단한 結核을 이루어 病者 자신도 痘症을 확인 않고 여러 날을 보내는 예가 있다 清肝解鬱湯을 복용시켜야 한다 加味芷貝散은 癰腫의 病狀이 나타날 때 有效한 方이며, 乳房結核이 硬強如石하여 長期間 경과된 病에는 加味十六味流氣飲을 오랜 기간 服用하여야 한다.

1. 清肝解鬱湯

足厥陰經이 鬱火로 結核症候에 비교적 服藥期間이 다소 소요되는 方이다.

當歸, 白朮 各5g 貝母 赤茯苓 白芍藥 生乾地黃 山梔 各3.75g 人蔘 柴胡 牧丹皮 陳皮 川芎 甘草 各2g

2 加味芷貝散

足陽明經이 痘邪를 받아 癰腫疼痛에 사용한 方이며 清肝解鬱湯보다 비교적 服藥기간이 短時日에 治癒된다.

白芷 貝母 天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲土炒 當歸尾 瓜蔞仁 甘草 各4g 酒水各半煎

■ 乳房癰腫과 結核

3. 加味十六味流氣飲

淸肝解鬱湯症보다 結核症候가 악화되고 淸肝解鬱湯으로는 치료가 어렵고
癌狀에 가까운 증후에 長期間 投與할 方이다

蘇葉 6g 人蔘 當歸 黃芪 青皮 各4g 川芎 桂皮 厚朴 白芷 防風 烏藥 檳榔
白芍藥 枳殼 木香 桔梗 甘草 各2g 加 蒲公英 6g

(전남 곡성읍 읍내리2구 천우당한약방 ☎ 061-363-2609)