

方藥合編 中 婦人科에 관련된 方劑의 활용에 대한 고찰

조대연 · 김영일 · 이용숙 · 강성현 · 박종찬 · 노의준 · 윤용갑*

원광대학교 한의과대학 방제학교실

Studies on Symptom, Pathology, Composition and Clinical Applications of Woman-related Disease Prescriptions in *Bang Yahk Hap Peun*

Dae Yeon Cho, Young Il Kim, Young Sook Lee, Sung Hyun Kang, Jong Chan Park, Euy Joon Rho, Young Gab Yun*

Departments of prescription, in Oriental Medicine Wonkwang University

In this study, symptoms, pathologies, compositions and clinical applications of 52 prescriptions for woman-related disease treatment described in *Bang Yahk Hap Peun* were investigated. The results were same as following; Classification of prescriptions for woman-related disease treatments was 23 prescriptions in high-chepter, prescriptions in 16 medium-chepter, and prescriptions in 13 low-chepter prescriptions and the frequency of clinical applications for high-chepter, medium-chepter and low-chepter prescriptions was 44%, 31% and 25%, respectively. Clinical applications of woman-related disease prescriptions were identified according to pre-pregnancy and post-birth, uterus, breast disease, before pregnancy. Inferfile, emmeniopathy, uterus Bleeding made practical application to high frequency in the treatments. Oriental Medical Pathology applied with prescriptions were Biheo(脾虛), Ganbinoyool(肝脾怒鬱), Infirmy(虛弱), 熱入血室, Jungpung(中風), Gihyulguheo(氣血俱虛), hylueo(血虛), Aeohyul(瘀血) etc. Prescriptions applied with the most frequency in woman-related disease were Samuoltang(四物湯), Sagunjatang(四君子湯), Gungkuitang(芎歸湯), Boanbaekchuolsan(保安白朮散), Dangguibohyeltang(當歸補血湯), Sanhyointang(酸棗仁湯), Dohongsamuoltang(桃紅四物湯), Jipeisan(芷貝散), Silsosan(失笑散).

Key words : *Bang Yahk Hap Peun*, woman-related disease, classification of prescriptions, clinical applications, oriental Medical Pathology, Samuoltang(四物湯), Biheo(脾虛)

서론

朝鮮時代 高宗 21年(1885年) 12月 惠庵 黃度淵先生의 遺稿를 아들인 黃必秀가 編纂한 方藥合編은 鄉藥集成方·醫方類聚·東醫寶鑑과 함께 韓國 臨床家에서 주류를 이루는 醫方書 중의 하나이다.

그 내용을 보면 書頭に 證脈要訣의 雜病提綱, 醫方活套의 活套針線을 配列하고 四段으로 구분하고 있다. 全四段의 上一段에 損益本草(藥性歌)를 下三段을 名 上統·中統·下統으로 區分으며, 上統은 補益之劑, 中統은 和解之劑를 下統은 攻下之劑를 중심으로 수록하였다. 이와 같은 上·中·下統 配列은 神農本草經

에서 本草를 上·中·下品으로 구별한 前例는 있지만 處方은 세 가지로 分類한 경우는 찾아보기 힘든 獨創性을 갖고 있다. 따라서 病症이나 症狀에 따라 處方선택을 용이하게 할 수 있으며, 補·和·攻法의 治法을 사용하기가 편리하고 處方마다의 特殊性을 살려서 臨床活用範圍를 정할 수 있도록 한 것이 특징이다. 한편 方藥合編에 수록된 婦人科에 관련된 方劑는 上統에 調經散을 비롯한 23개 處方이 있으며, 中統에는 達生散을 비롯한 16개 處方이 있고, 下統에는 四製香附丸을 비롯한 13개의 處方이 있다.

婦人科 疾患中 月經後에 관련된 方劑로는 調經散, 加味歸脾湯, 壽脾煎, 復元養榮湯, 調經種玉湯, 毓麟珠, 附益地黃丸, 四物黃狗丸, 四製香附丸, 七製香附丸, 逍遙散 등이 수록되어있다. 妊娠中 産前에 관련된 方劑로는 保生湯, 芎歸膠艾湯, 膠艾四物湯, 安胎飲, 金匱當歸散, 加味八珍湯, 佛手散, 單鹿茸湯, 達生散, 竹瀝湯, 紫菀湯, 紫蘇飲 등이 수록되어있다.

* 교신저자 : 윤용갑, 전북 익산시 신동동 344-2 원광대학교 한의과대학

· E-mail : yunyg@wonkwang.ac.kr, · Tel : 063-850-6834

· 접수 : 2004/09/20 · 수정 : 2004/10/27 · 채택 : 2004/11/22

産後에 관련된 方劑로는 鯉魚湯, 補虛湯, 當歸羊肉湯, 當歸黃芪湯, 參朮葶, 安胎飲, 荊芥散, 小參蘇飲, 柴胡四物湯, 愈風湯, 豆淋酒 등이 수록되어 있다. 이밖에도 乳房에 관련된 方劑로는 通乳湯, 十六味流氣散, 神效瓜蒌散, 芷貝散, 加味芷貝散, 清肝解鬱湯이 수록되어 있으며, 前陰에 관련된 方劑로는 龍膽瀉肝湯이 수록되어 있다. 이에 저자는 方藥合編에 수록된 婦人病에 관련된 方劑 52方1~15에 대한 處方病症分類, 主治, 病理, 處方構成內容 등을 調査하여 다음과 같은 臨床活用に 필요한 地見을 얻었기에 보고합니다.

본 론

方藥合編에 수록된 處方中 婦人科 疾患에 직접 관련성이 있는 方劑 52方に 대한 上統·中統·下統의 區分, 病症 調査, 病理 調査, 處方 構成 內容을 도표화하여 정리하였다.

1. 方藥合編 中 婦人科에 관련된 處方의 上·中·下統의 區分調査

표 1. 方藥合編 中 婦人科에 관련된 上·中·下統의 區分調査

구분	處方	빈도수 (백분율)	비고
上統	調經散, 加味歸脾湯, 壽脾煎, 復元養榮湯, 調經種玉湯, 毓麟珠, 附益地黃丸, 四物黃狗丸, 保生湯, 膠艾芎歸湯, 膠艾四物湯, 安胎飲, 金匱當歸散, 加味八珍湯, 佛手散, 芎歸湯, 單鹿茸湯, 鯉魚湯, 參朮飲, 補虛湯, 當歸羊肉湯, 當歸黃芪湯, 參朮葶	23 (44%)	補劑
中統	達生散, 竹瀝湯, 紫菀湯, 紫蘇飲, 荊芥散, 小參蘇飲, 柴胡四物湯, 愈風散, 豆淋酒, 逍遙散, 通乳湯, 十六味流氣散, 神效瓜蒌散, 加味芷貝散, 清肝解鬱湯, 芷貝散	16 (31%)	和劑
下統	四製香附丸, 七製香附丸, 通經湯, 歸朮破癥湯, 牛膝湯, 羚羊角湯, 澤瀉湯, 當歸芍藥湯, 矢笑散, 起枕散, 牛黃膏, 理脾湯, 龍膽瀉肝湯	13 (25%)	攻劑
합계		52	

2. 方藥合編中 婦人科에 관련 方劑의 病症 調査

표 2. 方藥合編中 婦人科에 관련된 病症 調査

구분	病症	處方	비고
婦人 産前	求嗣	調經種玉湯, 毓麟珠	
	調經	附益地黃丸, 四物黃狗丸, 調經散, 七製香附丸, 四製香附丸, 逍遙散	
	惡阻	保生湯	
	胎漏	膠艾芎歸湯, 膠艾四物湯, 安胎飲	
	半産	金匱當歸散, 加味八珍湯	
	易産	佛手散, 達生散	
	妊娠通治	芎歸湯	
	難産最奇	單鹿茸湯	
	子淋	參朮飲, 澤瀉湯	
	子腫	鯉魚湯	
	子癰	羚羊角湯	
	子痢	當歸芍藥湯	
	子煩	竹瀝湯	
	子嗽	紫菀湯	
子懸	紫蘇飲		
胞	通血	加味歸脾湯, 通經湯	
	崩漏	壽脾煎, 復元養榮湯	
	血結	歸朮破癥湯	

婦人 産後	産後治法	補虛湯	
	産後虛勞	當歸羊肉湯	
	産後陰脫	當歸黃芪湯	
	産後淋瀝遺尿	參朮葶	
	血暈	荊芥散	
	喘嗽	小參蘇飲	
	産後發熱, 熱入血室	柴胡四物湯, 牛黃膏	
	産後風	愈風散, 豆淋酒	
	胞衣不下	牛膝湯	
	兒枕痛	矢笑散, 起枕散	
乳	産後食傷	理脾湯	
	下乳汁	通乳湯	
	成癩	十六味流氣散	
	乳癰	神效瓜蒌散, 加味芷貝散	
前陰	疥癬	清肝解鬱湯, 芷貝散	
	筋疔	龍膽瀉肝湯	

3. 方藥合編 中 婦人科에 관련된 方劑의 主治調査

표 3. 方藥合編 中 婦人科에 관련된 主治調査

구분	處方	主治	비고
求嗣	調經種玉湯	婦人無子 經不調	
	毓麟珠	婦人氣血俱虛 或帶濁 凡種子諸方無以	
調經	附益地黃丸	血虛 月水不調 不能受孕	
	四物黃狗丸	經血不調 大有養血功	
	調經散	月候不調	
	四製香附丸	月候不調 結成癥瘕	
惡阻	七製香附丸	月候不調 結成癥瘕	
	逍遙散	治月經不調 及血虛 五心煩熱 寒熱如瘧	
胎漏	保生湯	惡阻 或惡聞食氣 或吐清水	
	膠艾芎歸湯	胎動下血 及半産下血	
半産	膠艾四物湯	胎漏腹痛	
	安胎飲	胎動五六個月 常服數貼 或加阿膠	
易産	金匱當歸散	孕婦常服 養血 清熱 寒積 半産者宜服	
	加味八珍湯	素稟虛弱 胎元不固 乃壯養氣血終始 以此多用	
娠通治	佛手散	孕婦臨月服之則縮胎易産自無難産之患	
	達生散	孕婦臨月 服二十餘貼 易産 無病	
難産最奇	單鹿茸湯	産前後諸疾 及血暈 不省 橫逆 死胎不下 血崩不止 臨月服之 縮胎易産 産後服之 惡血自下	
	參朮葶	胞系於腎 以此補腎液 難産最奇	
子淋	參朮葶	孕婦轉胞尿閉	
	澤瀉湯	子淋	
子腫	鯉魚湯	子腫	
子癰	羚羊角湯	子癰	
子痢	當歸芍藥湯	子痢	
子煩	竹瀝湯	子煩	
子嗽	紫菀湯	子嗽 胎不安	
子懸	紫蘇飲	子懸 急氣結難産	
産後治法	補虛湯	産後當 大補氣血 雖有難症 未治之	
産後虛勞	當歸羊肉湯	虛勞	
産後陰脫	當歸黃芪湯	産後陰脫	
産後淋瀝遺尿	參朮葶	産後瘳損 成淋	
血暈	荊芥散	血暈如神	
喘嗽	小參蘇飲	産後敗血 入肺 面黑 發喘	
産後發熱	柴胡四物湯	産後發熱 及熱入血室	
産後風	牛黃膏	産後熱入血室	
	愈風散	産後中風	
胞衣不下	豆淋酒	産後風	
	牛膝湯	産後胞衣不下 腹滿即殺人	
兒枕痛	矢笑散	産後兒枕 臍腹痛 欲死	

	起枕散	兒枕痛	
產後食傷	理脾湯	產後傷食 胸膈飽悶 寒熱不思食	
通血	加味歸脾湯	肝脾怒鬱 月經不通	
	通經湯	月閉	
崩漏	壽脾煎	脾虛 不能攝血 或誤用攻伐 犯損脾陰 或婦人無火 崩淋 等症	
	復元養榮湯	崩漏過多 心神恍惚 虛空	
血結	歸朮破癥湯	經閉 腹中有積塊 痰痛	
下乳汁	通乳湯	氣血不足 乳汁減少	
成婦	十六味流氣飲	妳巖	
乳癰	神效瓜蒌散	乳癰及妳巖	
	加味正貝散	乳癰 腫硬 作痛	
妳巖	清肝解鬱湯	肝臟鬱火 傷血 乳房結核	
	艾貝散	乳房結核	
筋疝	龍膽瀉肝湯	肝臟濕氣 男子陰挺 女人陰痒瘡	

4. 方藥合編 中 婦人科 處方의 病理調查

方藥合編 中 婦人科 疾患과 직접 관련성이 있는 方劑 52方에서 病因, 病理가 나타내고있는 13方을 중심으로 調查하여 정리하였다.

표 4. 方藥合編 中 婦人科 疾患과 관련된 主治調查

구분	病 理	病 症	處 方	비 고
臟腑	肝脾怒鬱	月經不通	加味歸脾湯	
	脾虛 不能攝血 誤用攻伐損脾陰 婦人無火	崩淋 等症	壽脾煎	
	素稟虛弱 產後脬損	胎元不固 成淋	加味八珍湯 參朮苜	
六氣	熱入血室	產後發熱	柴胡四物湯	
	產後中風 產後風		愈風散 豆淋酒	
氣血	氣血俱虛	或帶濁 凡種子諸方無以 月水不調 不能受孕	毓麟珠 附益地黃丸	
	血虛	寒熱如癰 月經不調 五心煩熱	逍遙散	
瘀血	下血不絕	胎動下血 在八九月內者 及治半產後	膠艾芎歸湯	
	產後敗血入肺	面黑 發喘欲死者	小參蘇飲	
七情	七情所傷	致經水不調 不能受孕 婦人無子	調經種玉湯	

5. 方藥合編 中 婦人科 관련 方劑의 構成 內容 調查

표 5. 方藥合編 中 婦人科 관련된 構成 內容 調查

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
求嗣	調經種玉湯	熟地黃 香附子炒 各六錢 當歸身酒洗 吳茱萸 川芎 各四錢 白芍藥 白茯苓 陳皮 玄胡索 牡丹皮 乾薑炒 各三錢 官桂 熟艾 各二錢	四物湯 交感丹
	毓麟珠	熟地黃 兔絲子 各四兩 人參 白朮 茯苓 白芍藥 杜仲 鹿角霜 川椒 各二兩 當歸 四兩 川芎 甘草 各一兩	雙補丸 八珍湯
調經	附益地黃丸	熟地黃 八兩 香附子 五兩 山藥 山茱萸 益母草 當歸 各四兩 白茯苓 牡丹皮 丹參 各三兩 澤瀉 吳茱萸 肉桂 各二兩	八味丸類 交感丹
	四物黃狗丸	熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 使香附 各五兩 黃狗 一雙去腸膜蒸	四物湯
	調經散	麥門冬 二錢 當歸 一錢半 人參 半夏 白芍藥 川芎 牡丹皮 各一錢 阿膠珠 甘草灸 各七分半 吳茱萸 肉桂 各五分	四物湯類
	七製香附丸	香附子 十四兩	香附子
	四製香附丸	香附子 一斤	香附子
	逍遙散	白朮 白芍藥 白茯苓 柴胡 當歸 麥門冬 各一錢 甘草 薄荷 各五分	

忌阻	保生湯	白朮 香附子 烏藥 橘紅各二錢 人參 甘草各一錢	異功散類
胎漏	膠艾芎歸湯	阿膠珠 艾葉 川芎 當歸 各二錢 草灸一錢	芎歸湯
	膠艾四物湯	熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 阿膠珠 條芩 白朮 縮砂 艾葉 香附子炒各一錢	四物湯 保安白朮散
	安胎飲	白朮 二錢 條芩一錢半 當歸 白芍藥 熟地黃 縮砂研 陳皮 各一錢 川芎 紫蘇葉 各八分 甘草 四分	保安白朮散 四物湯
半產	金匱當歸散	黃芩 白朮 當歸 川芎 白芍藥 各一兩	保安白朮散 四物湯類
	加味八珍湯	八物湯(人參 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸)加 陳皮 砂仁 各一錢 海參(人參代) 三五錢	八珍湯
易產	佛手散	當歸六錢 川芎四錢	
	達生散	大腹皮酒洗 二錢 甘草灸 一錢半 當歸 朮 白芍藥 各一錢 人參 陳皮 紫蘇葉 枳殼 縮砂研 各五分	異功散
妊娠通治	芎歸湯	川芎 當歸 各五錢	
難產	單鹿茸湯	鹿茸(酒炙) 一兩	鹿茸
子淋	參朮飲	芎歸湯材 各一錢 加入參 白朮 半夏 陳皮 各一錢 甘草 五分	四物湯 六君子湯類
	澤瀉湯	澤瀉 桑白皮 赤茯苓 枳殼 檳榔 木通 各一錢半	
子腫	鯉魚湯	白朮 赤茯苓各二錢 白芍藥 當歸 各一錢半 橘紅五分	
子癰	羚羊角湯	羚羊角鎊 獨活 酸棗仁 五加皮 各一錢二分 防風 薤白仁 當歸 川芎 茯神 杏仁 各七分 木香 甘草 各五分	芎歸湯 酸棗仁湯類
子病	當歸芍藥湯	白芍藥 白朮 各一錢半 當歸 白茯苓 澤瀉 條芩 各一錢 木香 檳榔 黃連 甘草 七分	芍藥甘草湯 保安白朮散 香連丸
子煩	竹瀝湯	赤茯苓 一兩	赤茯苓
子嗽	紫菀湯	紫菀 天門冬 各二錢 桔梗一錢半 杏仁 桑白皮 甘草 各一錢	四磨散類 甘桔湯
子懸	紫蘇飲	紫蘇葉 二錢半 人參 大腹皮 川芎 陳皮 白芍藥 當歸 各一錢 甘草 五分	芎歸湯 芎歸湯類
產後治法	補虛湯	人參 白朮 各一錢半 當歸 川芎 黃芪 陳皮 各一錢 甘草 七分	四君子湯 當歸補血湯
產後虛勞	當歸羊肉湯	肥羊肉 四兩 當歸 川芎 黃芪 各一兩二錢半 生薑 一兩半	芎歸湯 當歸補血湯
產後陰脫	當歸黃芪湯	黃芪(酒炒)三錢 人參 當歸 升麻 各二錢 甘草一錢	補中益氣湯類
產後澀滯遺尿	參朮膏	人參 二錢半 白朮 二錢 黃芪 一錢半 陳皮 桃仁 白茯苓 各一錢 甘草 五分	異功散
血暈	荊芥散	荊芥穗 搗爲末 每二錢	荊芥
喘嗽	小參蘇飲	蘇大二兩 劉水二椀煎 至一椀 調人參末 二錢服之	蘇木
發熱	柴胡四物湯	柴胡 生地黃各二錢 川芎 赤芍藥 當歸 黃芩各一錢 人參 半夏 甘草各五分	小柴胡湯 四物湯
產後風	愈風散	荊芥穗略炒爲末 每三錢豆淋酒調下	荊芥
	豆淋酒	黑豆一升 炒熟乘熱投三升 清酒中密封 隨量飲之	黑豆
胞衣不下	牛膝湯	滑石末 二錢 木通 當歸 牛膝 瞿麥 各一錢半 冬葵子 一錢	
	矢笑散	五靈脂 蒲黃炒 各等分	
兒枕痛	起枕散	當歸 白芍藥 各二錢 川芎 一錢半 白芷 桂心 蒲黃 牡丹皮 玄胡索 五靈脂 沒藥 各七分	矢笑散 四物湯類 手拈散類
產後發熱	牛黃膏	朱砂 鬱金 各三錢 牛黃 二錢半 牡丹皮 二錢 甘草 一錢 龍腦 五分	
產後食傷	理脾湯	厚朴 一錢半 蒼朮 陳皮 神麩 麥芽 查肉 各一錢 乾薑 八分 砂仁 甘草 各五分	平胃散
通血	加味歸脾湯	歸脾湯 加 柴胡 山梔仁 各一錢	
	通經湯	當歸 川芎 白芍藥 生乾地黃 大黃 官桂 厚朴 枳殼 枳實 黃芩 蘇木 紅花 各七分	桃紅四物湯類 八承氣湯
崩漏	壽脾煎	附子 人參 二錢 白朮 當歸 山藥 乾薑(炮) 各二錢 酸棗仁 一錢半 甘草 一錢 遠志 五分 蓮肉 二十枚	酸棗仁湯 附子理中湯
	復元養榮湯	人參一錢半 當歸 白芍藥 黃芪 酸棗仁 楡 白朮 各一錢 荊芥 八分 遠志 五分 甘草 三分	酸棗仁湯 當歸補血湯

血結	歸朮破癥湯	香附子醋炒一錢半 三稜 蓬朮並醋煮赤芍藥 白芍藥 當歸尾 靑皮各一錢 烏藥七分 紅花 蘇木 官桂各五分	桃紅四物湯類
下乳汁	通乳湯	猪蹄 四隻 通草 川芎 各一兩 穿山甲 十四片 炮黃甘草 一錢	
成婦	十六味流氣飲	蘇葉一錢半 人參 黃芪 當歸 各一錢 川芎 肉桂 厚朴 白芷 防風 烏藥 檳榔 白芍藥 枳殼 木香 甘草 各五分 桔槩 三分	十全大補湯類 桔梗枳殼湯 四磨散類
乳癰	神效瓜萎散	黃瓜萎大者一箇 去皮焙爲末 甘草生當歸 酒浸焙各五錢 乳香 沒藥 並另研各二錢半	乳香散
	加味芷貝散	白芷 貝母 天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲 土炒 當歸尾 瓜萎仁 甘草節 各一錢	芷貝散 金銀花散 透膿散類
婦癥	清肝解鬱湯	當歸 白朮 各一錢 貝母 赤茯苓 白芍藥 熟地黃 山梔子 各七分 人參 柴胡 牡丹皮 陳皮 川芎 甘草 各五分	丹梔逍遙散類 四物湯 異功散類
	芷貝散	白芷 貝母 等分	
筋疝	龍膽瀉肝湯	龍膽草 柴胡 澤瀉各一錢 木通 車前子 赤茯苓 生地黃 當歸並酒拌 山梔仁 黃芩 甘草 各五分	導赤散

고찰

方藥合編에 수록된 方劑 570方 中 婦人科 治療에 직접 관련성이 있는 方劑 52方に 대한 上統·中統·下統의 분류를 정리하여 도표화 하면 (표 1)에서 보는바와 같다. 上統의 補益之劑는 調經散을 비롯한 22方이 수록되어 있어 전체의 44%를 차지하는 것으로 조사되었고, 中統의 和解之劑는 達生散을 비롯한 15方이 조사되어 31%를 차지하고, 下統의 攻下之劑는 四製香附丸의 12方으로 전체의 25%를 차지하는 것으로 조사되었다. 즉, 方藥合編에 수록된 婦人科 疾病 治療에 직접 관련성이 있는 方劑를 上統·中統·下統의 분류상으로 조사해 보면, 補益之劑, 和解之劑, 攻下之劑 순으로 處方의 인용빈도를 나타내고 있다.

그 다음으로 婦人科에 관련된 方劑의 病症을 조사해보면 (표 2)와 같다. 즉, 妊娠前에 관련된 病症은 求嗣, 調經, 惡阻, 胎漏, 半產, 妊娠通治, 難產, 子淋, 子腫, 子癰, 子疝, 子煩, 子嗽, 子懸 등이 조사되었고, 出產後에 관련된 病症으로는 產後通治, 產後虛勞, 產後陰脫, 產後淋瀝遺尿, 產後血暈, 咳嗽, 產後發熱, 熱入血室, 產後風, 胞衣不下, 兒枕痛 產後食傷 등이 조사 되었다.

胞에 관련된 病症은 統血, 崩漏, 血結이, 乳房에 관련된 病症은 下乳汁, 成婦, 乳癰, 婦癥이, 前陰에 관련된 病症은 筋疝이 조사되었다. 또한 각 病症의 治療에 관련된 處方은 (표 2)에서 보는 바와 같이 調經種玉湯에서 龍膽瀉肝湯 까지를 사용하고 있는 것으로 조사되었다.

婦人科 疾患에 사용된 方劑의 主治를 조사해 보면 (표 3)에서 보는 바와 같다. 즉 (표 2)의 病症 調查와 비교하면 각 處方의 사용 病症을 좀더 구체화 한 것과, 기타 合病症 并病症등을 겸한 것임을 알 수 있다.

요약하여 설명하면, 不妊, 調經, 惡阻, 胎漏, 胎動, 半產, 易產, 難產, 子淋, 子腫, 子癰, 子煩, 子嗽, 子懸 등 妊娠에 관련된 病症의 主治와 產後虛勞, 陰脫, 淋瀝, 眩暈, 咳嗽, 發熱, 產後風, 胞衣不下, 兒枕痛, 食傷 등 產後에 관련된 主治 症狀이 조사 되었다.

그밖에도 月經不通, 崩漏, 乳汁分泌 乳房의 癰疽, 結核, 外陰部瘡에 대한 主治症狀이 조사되었다.

婦人科에 관련된 處方의 病理를 조사해 보면 (표 4)과 같다.

즉, 臟腑에 관련된 病理로는 肝脾怒鬱, 脾虛不能攝血, 素稟虛弱, 產後疴損으로 月經, 崩淋, 胎元不固 등의 症狀에 관련된 것으로 조사되었다. 六氣에 관련된 病理로는 熱入血室, 產後中風, 產後風이 조사되었고, 氣血에 관련된 病理로는 氣血俱虛, 血虛가, 瘀血에 관련된 것으로는 下血不絕 產後敗血入肺, 七情에 관련된 것으로는 七情所傷에 의한 月經不調와 不能이 조사되었다. 婦人科 疾患의 治療에 관련된 方劑의 處方 構成 內容을 조사해 보면 (표 5)와 같다.

求嗣과 調經에 사용한 調經種玉湯, 調經散, 四物黃拘丸 등은 基本方을 四物湯으로 하고 있고, 毓麟珠는 八珍湯을, 附益地黃丸은 八味丸을 基本方으로 하고 있음을 알 수 있다. 四製香附丸, 七製香附丸은 香附子를 基本으로 하고 있음을 알 수 있다. 그 밖에도 逍遙散을 사용하기도 하였다. 따라서 血, 精, 氣의 세 가지 분류에 따라 調經이나 求嗣에 적당한 方劑를 사용할 수 있음을 시사하고 있다. 惡阻에 사용한 保生湯은 異功散이 基本方이며, 半產에 사용한 方劑들은 四物湯, 保安白朮散, 芎歸湯 등을 基本으로 하고 阿膠珠 艾葉 등의 止血之劑인 陳皮, 蘇葉, 砂仁 등의 利己之劑도 併用하고 있음을 알 수 있다.

평소 稟賦가 虛弱 하여 半產이 있는 경우에는 八珍湯에서 人蔘대신 海參을 君藥으로 한 것이 특징이고, 易產과 妊娠通治에는 芎歸湯을 사용하고 있으며, 達生散은 大腹皮와 甘草를 君臣으로 配合하여 升降을 조절 하므로써 易產을 돕도록 한 것이 특징이다. 또한 鹿茸單味만을 사용한 單鹿茸湯을 사용하는 경우도 있다. 子淋에 사용한 參朮飲은 四物湯에 六君子湯을 合方하였고, 子癰에 사용한 羚羊角湯을 羚羊角에 酸棗仁湯, 芎歸湯을 合하고 安神之劑로 가미하고 있는 것이 특징이다. 子癰에 사용한 當歸芍藥湯, 芍藥甘草湯, 保安白朮散, 香連丸을 合方하고 있으며, 產後 治療에는 當歸補血湯을 基本方으로 사용하고 있음을 알 수 있다.

產後陰脫에 사용한 當歸黃芪湯은 補中益氣湯의 變方이며, 產後淋瀝遺尿에 사용한 參朮膏는 異功散의 加味方이며, 產後風에는 荊芥, 黑豆가 眩暈에는 荊芥를 喘嗽에는 蘇木등 單味를 사용한 것이 특징이다. 發熱에는 小柴胡湯과 四物湯을 合方한 柴胡四物湯을 사용하였고 兒枕痛에는 失笑散, 四物湯類, 手拈散類를 合方한 起枕散을, 產後食傷에 사용한 理脾湯은 平胃散의 加味方임을 알 수 있다. 歸朮破癥湯과 通經湯은 桃紅四物湯을 基本으로 하고 있으며, 通經湯은 小承氣湯을 歸朮破癥湯은 香附子, 三稜, 蓬朮, 靑皮, 烏藥 등 破氣行氣之劑를 가미한 것이 특징이다.

崩漏에 사용한 壽脾煎, 復元養榮湯은 酸棗仁湯을 공통적으로 사용하고 있고, 十六味流氣飲은 蘇葉을 君으로 하고 十全大補湯類 桔梗枳殼湯, 四磨散 등이 合方된 處方으로 볼 수 있으며, 乳癰에 사용한 加味芷貝散은 芷貝散, 金銀花散, 透膿散類를 合하여 사용하고 있다. 婦癥에 사용한 清肝解鬱湯은 丹梔逍遙散, 四物湯, 異功散을 合方하였고, 筋疝에 사용한 龍膽瀉肝湯은 草龍膽, 柴胡, 黃芩 등 肝經을 瀉하는 藥物을 君으로 하고 導赤散을 合하여 사용하고 있다.

요약 및 총괄

方藥合編 中 婦人科 疾患 治療에 직접 관련성 있는 方劑 52 方에 대한 자료 조사를 통하여 다음과 같이 요약·정리 할 수 있었다. 處方의 上統·中統·下統의 분류는 上統 23方(44%), 中統 16方(31%), 下統 13方(25%)으로 조사 되었다. 임상활용의 구분은 産前, 産後 胞, 乳, 前陰으로 조사되었으며, 産前에는 不妊과 調經, 崩漏등의 症狀에 가장 많은 處方 인용빈도를 나타내었다. 활용된 病理는 脾虛, 肝脾怒鬱, 稟賦虛弱, 熱入血室, 中風, 氣血俱虛, 血虛, 瘀血, 七情所傷 이었다. 가장 많이 사용된 基本方은 四物湯, 芎歸湯, 保安白朮散, 當歸補血湯, 四君子湯, 酸棗仁湯, 桃紅四物湯, 芫貝散, 失笑散 등 이었다.

감사의 글

본 논문은 2003년도 원광대학교 교비지원에 의한 것임.

참고문헌

1. 黃度淵, 國譯編註方藥合編, 서울, 永林社, pp. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 215, 21, 221, 222, 223, 274, 279, 280, 281, 282, 283, 1991.
2. 許 浚, 對譯東醫寶鑑, 서울, 法人文化社, pp. 361, 363, 365, 364, 370, 687, 689,690, 691, 692, 824, 1596, 1588, 1589, 1599, 1600, 1602, 1606, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1621, 1623, 1624, 1626, 1628, 1631, 1632, 1633, 1635, 1638, 1639, 1640, 1644, 1999.
3. 黃度淵, 醫宗損益, 서울, 醫藥社, pp. 656, 657, 669, 1976.
4. 康命吉, 原本濟衆新編, 杏林書院, 서울, 1971, pp. 254, 257.
5. 龔廷賢, 壽世保元, 人民衛生出版社, 北京, pp. 494, 1993.
6. 李 梴, 國譯編註醫學入門, 南山堂, 서울, pp. 174, 171, 189, 427, 447, 127, 189, 128, 1985.
7. 陳自明, 婦人大全良方, 人民衛生出版社, 北京, pp. 341, 503, 582, 1985.
8. 危亦林, 世醫得效方, 人民衛生出版社, 北京, p. 497, 501, 1990.
9. 龔 信, 古今醫鑑, 北京, 中國中醫藥出版社, pp. 303, 313, 324, 337, 341, 1985.
10. 朱震亨, 丹溪心法附餘, 五州出版社, pp. 719, 722, 1985.
11. 虞 搏, 醫學正傳, 成輔社, 서울, pp. 310, 347, 360, 364, 365, 426, 1986.
12. 太平惠民和劑局, 太平惠民和劑局方, 人民衛生出版社, 北京, p. 266, 1985.
13. 樓 英, 醫學綱目, 上海技術出版社, 北京, p. 1141, 1984.
14. 龔廷賢, 萬病回春, 人民衛生出版社, 北京, p. 386, 1998.