

不整脈形狀과 治療法

朴 東 喆



筆者 18年前에 서울大病院에서 心臟心房細動이라고 하면서 여기서 不整脈이오는 것이라고 診斷이 내려서 病院에서 디곡신, 큐니딩 두가지약을 받아서 큐니딩 한개을 먹고서 20分後 청색의 泄瀉가 나오면서 口渴과 食欲이 즉시 떨어져서 擔當醫師任계 이러하다고 말씀을 드렸더니 그 약이 맞

지 않으니 먹지말고 디곡신 1개를 2回씩 먹어라고 하셨다.

그 디곡신이란? 약 說明書を 읽어보니 利尿制가 들어 있는 것을 發見하여 디곡신을 먹지 않고서 地黃湯 140貼을 服用해서 九死一生으로 살아난 사람입니다.

來訪한 不整脈患者들을 많이 고쳤습니다. 筆者는 여러 先生任들께서 不整脈患者가 많이 있으니 地黃湯을 使用하셔서 고쳐주시기 바란다.

現代醫學(洋方)에서 못고치는 病이고 手術도 못한 病이다.

不整脈形狀

脈搏이 10번 뛰다가 20~30번 뛰어야 하는데 中止하고 또 脈搏이 20번 뛰다가 40~50번 뛰어야하는데 中止되는것이다. 中止(絶脈)란 脈搏이 끊김. 이것이 心脈의 心房細動(心房이 가늘게 움직임)

心房이 弱해서 일어난다.

心臟이 두근거린다.

놀랄때 뛰듯이 心脈이 두근 두근한다.

■ 不整脈形狀과 治療法

呼吸도 간혹 喘息이 있다.

傾斜 길을 가면 숨이 찬다. 그러나 기침은 하지않는다.

地黃湯

- 熟地黃 - 6兩 · 230g
- 山茱萸 - 150g
- 白茯苓 - 150g
- 澤 瀉 - 150g
- 木 通 - 各回兩 : 150g
- 牡丹皮 - 3兩 : 25g
- 薄 荷 - 1兩 4錢 : 55g
- 車前子 - 1兩 4錢 : 55g
- 羌 活 - 1兩 2錢 : 46g
- 元防風 - 1兩 2錢 : 46g

一人治療5劑

上記藥은 日劑單位量이니 물 3바가지 붓고 3時間다려서 一回用봉지로 30個 나오게해서 1日 2回, 아침食後 30분후 1봉 微温服, 점심食後 30분후 1봉 微温服.

不整脈者가 各地方에 많이 있습니다. 本人이 治療한 사람 10명 이상됩니다. 이 不整脈治療와 症狀을 會員任들께 直接說明을 해서 充分히 理解가 되어서 治病하는데 꼭 도움이 되었으면 합니다. 우리 會員任들 그리고 韓醫師들도 못 고치는 것으로 觀測하는바 입니다.

(第一韓藥房 全州 淳昌邑 南溪里)