


## 癇疾에 對한 考察

- 간질에 대한 연구 -

柳 相 基



### 1. 간질(癇疾)과 전간(癲癇)이란?

간질이란 일찍이 천질(天疾)이라 불려지기도 합니다. 인간이 죄를 지으면 그 죄값으로 받은 병이라는 이유 때문입니다. 또 다른 속설로는 하나님이 노하여 천둥번개를 치는 데도 어리석고 탐욕스런 인간이 욕정을 즐기다가 임신하여 출생한 아이에게 이런 증상이 생긴다 하여 예전부터 이런 질병을 숨기고 부끄러워했던 병이다. 그러나 이는 모두 근거가 없는 속설에 지나지 않을 뿐입니다. 따라서 전통의 처방과 과학화된 한의학에서는 이를 대수롭지 않은 질병으로 치료하면 회복이 가능한 질병이라 생각합니다.

### 2. 간질의 명칭

이에 대한 다른 이름으로써 천금요방(千金要方) 권14에 의하면, “전간(癲癇), 간병(癇病), 간풍(癇風), 풍현(風眩), 전병(癲病)”이라고도 말합니다. 한의학에서는 전(癲) 자와 간(癇) 자가 서로 통용되어오고 있습니다.

때로는 환자의 연령에 따라서 전(癲) 자와 간(癇) 자를 구별하여 쓰는 경우도 있습니다. 제병원후론(諸病源候論) 권45에 의하면, “10세 이상은 전(癲)이라 하고, 10세 이하는 간(癇)이라 한다.”고 하였습니다. 풀어 말하면, 10세 이

상의 환자에게는 ‘전’이라 하고, 10세 이하에게는 ‘간’이라 한다는 것입니다. 이를 근거로 하여 서사백(徐嗣伯)은 “어른에게는 ‘전’, 어린아이에게는 ‘간’이다.”고 하였으나 실제로는 똑같은 질병에 지나지 않을 뿐입니다.

### 3. 간질의 종류

간질의 종류는 크게 세 부류로 구별되며, 질병의 심도에 따라 그 증상이 다양합니다.

먼저 간질에 나타나는 세 부류란 곧 선천성 간질과 후천성 간질, 그리고 유전성 간질을 말합니다.

선천성 간질이란 임신기간 중에 임신부의 부주의와 주의의 환경에 의해 깜짝 놀라거나 몹시 겁에 질렸을 적에 모태에서 태아가 놀란 나머지, 경기의 증상을 가지고 태어난 아이가 선천성입니다.

또 다른 후천성 간질은 출생 후 성장하면서 어떤 일시적 충격에 의해 경기를 일으키는 것입니다.

부모나 형제 친족 중 유전인자에 의해 태어난 것이 유전성 대발작, 소발작, 원발성, 속발성이 있습니다. 이로 보면 임신모의 부주의와 후천적 환경공해에 의해 생겨지는 경우와 어쩔 수 없는 유전인자의 장난이라 할 것입니다.

### 4. 간질의 증상과 현대 의학에서 보는 원인

간질을 쉽게 알 수 있는 증상으로는 대발작과 소발작이 있으며 발작중 거품을 토하는, 다양한 양상이 있습니다. 더러는 주위 사람이 모르는 사이 본인만이 느낄 수 있는, 일시적으로 정신이 아찔하는 명현(瞑眩) 현상이 일어나기도 합니다.

간질 발작으로는 부분발작, 전반발작 두 가지로 구분되는데 전자는 초점발

작이라 하며, 한쪽 대뇌 반구의 한 부분에 국한된 간질 원초점에서 시작되는 발작으로 의식 장애가 없는 단순 발작과 의식 장애가 생기는 복합 부분 발작이 있습니다.

이러한 증상에 대해 현대 의학에서는 뇌파의 불균형으로 일어나는 증상이라 합니다. 의식상실과 강직성으로 시작하여 간대성(間代性) 경련(痙攣) 증상을 일으키는 것이 특징입니다. 이는 만성 뇌질환인데 전간이라고도 합니다. 이의 원인에 대해서는 현재까지도 분명하지 못한 상태이며, 그런 증상이 생기게 되는 원인에 관계되는 것으로 원발성 간질과 속발성 간질로 구분됩니다.

원발성(原發性) 간질이란 간질발작의 원인이 되는, 어느 일부분의 국한성 뇌손상 부위에 의해 발생되는, 불확실한 것이 원발성 전반간질(全般癇疾)입니다. 속발성 간질에는 초점이 확실한 부분 간질과 초점이 불확실한 속발성 전반간질이 있습니다. 부분간질과 속발성 전반간질은 뇌손상을 일으키는 외적 원인[外因]이 주된 원인입니다.

## 5. 현대의학의 치료방법

간질의 치료방법으로는 약물치료와 수술치료라는 두 가지가 있습니다.

약물치료로는 항전간(간질)제의 지속 복용으로 단순발작만 억제하면서 성장과 함께 자연치유를 유도하는 것입니다. 그러나 수술치료로는 전두엽(前頭葉), 후두엽(後頭葉), 측두엽(側頭葉), 중앙, 좌측, 우측에서 산발적으로 나타나게 되면 수술도 불가능하지만 전두엽이나 후두엽 어느 한 곳에서 뇌파의 불균형이 일어날 때 그곳만 수술하게 되면 60~70% 완치가 가능하다고 합니다. 그 중에서도 후두엽에 증상이 일어나는 환자는 90% 완치가 가능하다고 합니다. 그러나 전두엽, 후두엽, 측두엽, 중앙, 좌측, 우측의 정확한 위치 파악이 그리 쉬운 일은 아닙니다. 경제적인 부담 역시 서민으로서는 감당하기 어렵습니다. 뿐만 아니라, 위치파악을 담당하는 신경과 의사와 집도(執刀)하는 외과 의사

모두 훌륭한 분을 만난다는 것은 말처럼 그리 쉬운 일은 아닙니다.

## 6. 한의학(韓醫學)에서 보는 간질

종류나 증상에 대한 인식은 현대 의학과 다를 바 없습니다. 하지만 발병의 원인에 대한 인식과 치료의 방법은 크게 다릅니다. 성의(聖醫)들은 각자 나름대로 학설이 다르지만 그 치료방법만큼은 대동소이(大同小異)하다 할 것입니다.

석실비록(石室秘錄) 권4 卷에서는 간질의 원인에 대해 다음과 같이 적고 있습니다.

비위(脾胃)가 허한(虛寒)하여 섭취한 음식물이 생명력이 되는 정액(精液)으로 변하지 못하고 오히려 병이 되는 담(痰)으로 변하여 흉격(胸膈) 사이에 엉켜있어 기혈(氣血)이 심장으로 흘러들어가지 못하여 뇌신경에 혼미 증상이 일어나면서 전증(癲症) 경련을 일으킨다.

雷公眞君曰 癲病之生也，多生於脾胃之虛寒。脾胃虛寒，所養水穀，不變精而變痰，痰凝胸膈之間，不得化流於心，而癲症生矣。

뿐만 아니라, 간혹 하얀 담을 토하는 환자는 비위가 허한하여 담을 만들어 내는 양이 과다한 자이며 발작과 동시 흉격 사이에 고여 있던 담이 흐트러지면서 다시 정신이 환원하는 것입니다. 위에서 인용한 석실비록에서는 화간(花癟)에 대해서도 논급하고 있습니다.

흔자서 사모하는 여인이 있는데 상대방은 무관심하고 내성적인 성격 · 이어서 누구에게 말은 못하고 얻는 병이다. 그러나 이 역시도 비위(脾胃)가 허한(虛寒)하여 사기(邪氣) 사특한 기운이 침입한 데서 생긴 질 병이다.

惟是花癩之症，乃女子思想其人而心邪。然亦因脾胃之寒而邪入也。

이 역시도 울화(鬱火)가 38목(三八木) 간경(肝經)에 침입하여 섭취한 음식 물이 몸에 이로운 정액으로 변하지 못하고 오히려 몸에 해로운 담(痰)으로 변하여 흉격 사이에 엉켜있어 심장으로 기혈이 흘러 들어가지 못하여 일어나는 증상이다.

## 7. 한방의 치료방법

한의학에서는 비위를 보(補)하고 허한을 몰아내며 가슴에 엉켜있는 담을 소멸시키면 자연적으로 정기(正氣)하여 기혈이 탄력을 받아 정상적으로 심장에 유유히 흘러들어 정신이 맑아오는데 어찌 혼미상태나 명현현상이 일어나리 오라고 하였습니다. 따라서 의원의 지시에 따라 약을 쓰고 규칙을 지키면 95% 완치가 가능합니다.

## 8. 결론

현대 의학에서는 뇌파의 불균형만 논하였지 왜 뇌파가 불균형을 일으키는 가에 대한 규명은 하지 못했습니다. 그러나 한의학에서는 원인을 분명히 규명해주고 있습니다. 그리고 뇌파의 불균형한 위치를 찾아 수술로 제거를 한다 해도 원인을 제거하지 못했을 경우, 또 다른 뇌파에 발생할 수 있지만 한의학에서 주장한대로 그 원인을 알고 제거한 후 또다시 다른 뇌파에 파급되기는 그리 쉽지 않다고 확신하는 바입니다. 이에 대한 처방조제시 어려움이 있을 때는 기꺼히 응하겠습니다.

## 處方

### ■ 一方 ■

天麻 三錢, 雷丸炮, 白干蚕, 白茯神 各 四錢, 露蜂房, 龍眼肉, 釣鉤藤 二錢,  
甘草, 人蔘, 黃芪, 龍骨, 石菖蒲, 遠志, 麥門冬, 白朮 一錢半, 當歸身, 土川芎,  
木香, 香附子, 山棗仁, 賢砂仁 各 一錢, 荊芥, 薄荷 五錢

- 功用 . 治五癇 神方
- 用法 : 一日 一貼 三回 分服, 一年 以內者 2제정도만 복용해도 完治可能
- 禁忌 : 成人은 房事를 절대 금함

### ■ 二方 ■

月石 十兩, 生百礬 八兩, 紅靈砂 九煎 一兩半, 全虫 一兩, 寶豆 五錢

- 功用 : 諸般癇疾
- 製法 : 白狗大腸에 混合調製(蒸三時間) 함, 乾燥細末, 糯米糊丸(찹쌀풀)  
梧子大
- 用法 : 一日 二回 朝夕 50丸式 食後 服
- 禁忌 : 上同

### ■ 三方 ■

白朮秒, 白芍 一兩, 白芥子 五錢, 桔子, 半夏干製, 柴胡 二錢, 陳皮, 生薑, 甘  
草, 石菖蒲 各 一錢, 天麻 二錢, 雷丸 一錢半, 全虫 一錢

- 功用 : 治花癇者(상사병으로 인한 간질에 특효)
- 用法 : 2~3제면 完治可能

(柳韓韓藥房 강원도 원주시 명륜2동 815-2 ☎ 033)762-7575)