

茶可菌을 藥으로 使用할 때 痘別效能

月仁 李 昌 煥



(一) 學說

하늘은 罪많고 불상하고 慾心으로 感은 惡心으로 받은
代價가 바로 痘이라는 것인데 하늘은 人間 卽罪로 因하여
得病한것도 모르고 그저 時間만 있으면 他人에게 爲割를
加하는 미련하고 無知한 生命을 救하기 위해 하늘은 人間
에게 마지막 善物을 준 것이 바로 極寒帶地方인 시베리아 產 자작나무 卽樺木
에 索生한 外皮菌 다시 말하여 자작나무에 생긴 癌이라는 것이다.

(二) 本樺木癌을 人類의 難治病인 糖尿와 諸器管에 癌으로 死亡하는 것을
막기위하여 하늘이 最後로 人間에게 善物한 것이라고 學者들은 말하고 있다.
例(樺木菌研究學者) (∴韓國茶可菌研究의 最高權威者이신 韓國農業專門學校教
授이신 張현우 박사 外一同)

(三) 茶可菌을 使用可能患者

- 1) 糖尿病을 治敎함 效能 90%라함
- 2) 諸般癌疾患者를 治療한다. (乳房, 胃, 耳下腺, 肺, 直腸, 皮膚癌 등)
- 3) 에이즈를 이길 수 있다. 에이즈를 억제하는 效力이 있다.
- 4) 모든 人體內에 細胞壽命을 增進하고 신진대사를 促進함
- 5) 老化를 防止한다.
- 6) 전염성 바이러스를 防止한다.

■ 茶可菌을 藥으로 使用할 때 痘別效能

- 7) 高血壓豫防과 治療를 하고 콜레스테롤을 除去한다.
- 8) 알레르기性 皮膚를 改善한다.
- 9) 만성 胃潰瘍을 치료하고 위염도 함께 치유된다.

(四) 茶可菌의 性分과 效能

- 1) 茶可酸 60%
- 2) 폴리당
- 3) 호르마도젠
- 4) 페놀그룹
- 5) 폴리페놀
- 6) 토리텔페노이드
- 7) 리그닌
- 8) 다당류
- 9) 사포닌

以上은 韓國과 소련의 研究學者들이 分析한 性分이다.

(五) 茶可菌을 研究中인 나라

- 1) 소련은 茶可의 宗主國이니 이미 始作한지 오래이다.
- 2) 中國은 茶可菌에서 藥性分을 30~40種 以上을 發見하여 研究中이다.
- 3) 日本은 近年에 와서 茶可를 人工栽培를 하여 小數成功을 거둔다고 한다.
- 4) 美國은 北部寒帶地方에서 一部分 조금씩 自然生이 모일 정도라고 한다.
- 5) 유럽에도 急한 情報入手로 始作한다고 함.

우리나라에 最初로 茶可를 流入시킨분은 三星버섯연구원 李康和所長님이 시다.

이분은 月刊 商業農經營誌에 北韓 農業에 關한 글을 많이 執筆中

本 茶可의 癌治療에 자작나무 버섯 卽 樺木皮(癌)를 研究開發하여 여러차례 學問的인 研究에 突入한바 있었다고 한다.

다음은 앞서말한 장현우박사님이 차가버섯에 간여하시고 두산그룹에 연구진을 同參 시킨바 있었다고 한다.

앞으로 人類의 큰 成果를 보여줄 本 茶可의 效能을 機待하면서 우리 韓藥業에 從事하시는 會員님께서 必要하실때는 村老가 案內하여 貴한 眞品 茶可를 紹介하여 드릴까합니다.

西紀 2003年 11月

(慶北英陽 健一堂)