

사이버 성상담 www.yline.re.kr

Q 오럴섹스를 하게 되면 성병에 걸릴 수 있다고 하는데 가능한지 궁금합니다. 걸리게 된다면 증상은 어떠한지 혹시 정자를 먹으면 어떻게 되나요?

A 구강성교도 성병 감염이 되는지 궁금한 가 봅니다. 구강성교를 하는 사람들의 성대에서 간혹 임질 등의 성병균이 검출되는 경우가 있다고 합니다. 증상으로는 편도선이 부을 수 있는데 다른 이유로도 편도선이 부을수 있는데 이런 경우와 구분하기가 쉽지 않습니다. 그런데 성병은 이미 감염된 사람을 통해 전염

된다는 사실입니다.

따라서 만약 본인과 이성친구가 그동안 건전한 생활을 해왔다면 안심해도 될 것입니다. 무분별한 성적 활동을 하는 사람들은 그만큼 성병등의 감염에 노출되기 쉽기 때문입니다. 그렇기 때문에 성적 접촉 즉 성교를 맺는다는 것은 남녀 모두 건전한 성생활을 하고 있어야 할 뿐만 아니라 믿음을 줘야 할 것입니다.

그리고 정자를 먹었을 때 어떤 여성의 경우 알리지 반응을 보이기도 합니다만 그런 증상이 없었다면 특별히 신체에 영향을 주지는 않으니 안심해도 좋습니다.

엄마 젖 최고! 상담 www.mom-baby.org

Q 젖말리는 약을 먹었는데 다시 모유수유를 하고 싶습니다. 젖의 양은 적은데 가능할까요?

A 젖말리는 약의 이름을 아시는지요. 대부분의 약은 안전합니다. 또 약을 드신지 3,4일 지났다면 거의 모든 약의 경우 이미 엄마 몸에서 나왔을 것으로 안전합니다. 따라서 약을 걱정은 하지 마시고 다시 젖을 빨리기 시작하십시오.

그러나 지금은 젖양이 충분하지 않을 수도 있으니 수유보충기라고 하는 것을 사용해보셔도 좋겠습니다.

엄마 젖양을 늘여 나가면서 젖이 늘때까지 분유로 보충을 하는 방법입니다.

분유를 담은 용기와 연결된 튜브를 엄마 유두 가까이에 붙여주고 아기를 물리면 젖을 빠는 동안 흘러나오는 분유를 먹게 됩니다.

젖양이 늘어나면 차츰 추가하는 분유량을 줄여서 끊을 수 있습니다. 의사와 상담하고 젖 놓리는 약을 복용할 수도 있습니다.